



LIBRARY OF

Dr. Z. P. Metcalf

1885-1956

IOH. CHRIST. FABRICII

OR. NAT. OECON. ET CAMERAL. PROF. KILONIENS.
ACAD. HAFNIENS. NORWEG. BEROLINENS. ET
LVND. SOC.

ECIES INSECTORVM


EXHIBENTES

EORVM

DIFFERENTIAS SPECIFICAS, SYNONYMA
LITORVM, LOCA NATALIA, METAMORPHOSIN

ADIECTIS

OBSERVATIONIBVS, DESCRIPTIONIBVS.




T O M. I.

HAMBVRGI et KILONII

IMPENSIS CAROL. ERNEST, BOHNII
MDCCLXXXI.





LECTORI.



Species Insectorum L. B. nunc offero, at
nimia copia obrutus vix omnes deter-
minare aut verbis distinguere valui. Vidi
eorum quotidie incrementem numerum, vi-
di quotannis species novas in Europa dete-
ctas aut ex aliis regionibus allatas, quo
breui tempore plantarum cognitarum nu-
merum aequabit. Systema, genera distin-
ta, determinata, et species differentia mu-
ltae ideoque magis necessaria, ne omnia
confundantur; at hic labor, hic opus. In-
secta multa minutissima vix nudo oculo co-
gnoscenda, characteres genericos vix extri-
bitiles gerunt, et ingenue fateor, me inse-



cta haud pauca vidisse, quae oculo quidem, at
 haud differentia distinguere potui. Pertin-
 ent huc imprimis Noctuae et Phalaenae sic
 dictae rusticae coloribus mixtis indistinctis,
 Curculiones et Carabi minores, quorum dif-
 ferentias distinctas eruere omni adhibita dili-
 gentia nullo modo valui. Accedunt adhuc
 varietates plurimae et colorum inconstantia,
 quibus determinatio et denominatio incer-
 tiores redduntur. Optandum ideo foret, vt
 monographiis accuratioribus genera amplio-
 ra inuestigarentur, vti Coccinella, Curculio,
 Carabus, Bombyx, Noctua, Phalaena, Ti-
 nea, Musca, Syrphus, Ichneumon, Tenthre-
 do aliaque, vt tandem determinatio specie-
 rum, qua omnis nititur entomologia, fir-
 miori stet talo.

Insectorum hic descriptorum numerum
 imprimis auxere itinera propria varia. Lu-
 strauit Sueciae montes, Norwegiae rupes
 1778, Daniae campos, Germaniae sylvas, Hol-
 satiae aquas, Belgii fabuleta, Heluetiae al-
 pes, Galliae nemora, Italiae vineta, saepius-
 que Angliae cretacea. Examinaui deinde
 musea

musea Europae celeberrima *Gunneri* Ni-
 drofiae, Reginae Sueciae Drotningholm, a
Linné Vpsaliae, Academiae Hafniensis, Comi-
 tis *Tott* Hafniae, *D. Schulz* Hamburgi, *Edleri*
 Lubecae, *Schaller* Halae Saxonum, *Hermann*
 Strasburgi, *Cramer* Amstelodami, Principis
 aurifiaci Hagae, *Voet* Hagae, *Allemand* Lei-
 dae, *Bernoulli* Basileae, *Geoffroy*, *Mallet*, *Mau-*
duit Parisiis, *Allioni* Taurini, *Fortis* Venetiae,
Schaeffer Regensburgi, et Anglorum ditissima
D. Banks, *Hunter*, *Drury*, *Yeats*, *Blomfield* Lon-
 dini, *Lee*, *HammerSmith*, *Blackburn* Oxfordiae.
 Amici Entomologi praeterea communica-
 runt insecta rariora, *Stroem* Norwegica, *de*
Slangbusch Danica, *Schefted*, *Lund* Holsatica,
Hattorf, *Edler* Germanica, *Allioni* Italica, *v. Rohr*
 Americana, *Koenig* Indiae orientalis, *Smeath-*
mann Africana, *D. Gray* Lusitanica, quo co-
 piam insectorum collegi haud mediocrem.

A scriptoribus entomologicis pauca mu-
 tuavi et haec tantum in Glossatorum classe.
 Reliqua haud visa de genere haerens semper
 omisi, ne dubia certioribus miscerem. Fi-
 lum systematis ariadneum nimis amisere, quo

determinatio et denominatio omnino vacillantes. Glossata quaedam imprimis Papiliones e *Cramero* recepi, quem accuratiorem cognoui.

Insecta haud pauca antehac iam determinavi, denominaui partim in systemate entomologiae, partim in mantissa insectorum generibus adiecta, partim in itinere Norwagico. Nomina haec passim dispersa consultum duxi colligere inque vnum opus proponere, differentiis specificis saepius emendatis, quum novis speciebus detectis haud amplius sufficerent, antea quamvis optimae.

Nouas species plurimas vndique introduxi, nomine triuali, differentiaque specifica distinxerunt, descriptionibusque amplioribus muniui, ut determinatio faciliteretur. Genera etiam noua addidi pauca, vti, *Ips*, *Rhinomacer*, *Manticora*, *Squilla*, *Pycnogonum* characteribus sufficientibus distincta. Possem quidem plura addere, vti *Curculiones* antennis moniliformibus, *Papilionum* subdiuisiones aliaque, quorum characteres mihi vero nondum satisfecere. Cauendum
semper,

femper, genus absque charactere distincto vel speciem absque differentia sufficienti proponere, ne in pristinam barbariem ruat scientia entomologica.


Synonyma auctorum praestantiora e systematicis et ichniographis addidi et systematicis saepius erronea emendavi. Synonymia certe difficillime eruitur. Requirit plurimarum specierum cognitionem et laboriosam collationem, et tamen ob varietates et colorum inconstantiam saepius erronea euadit. Loca natalia, vbi licuit, semper adieci, vti et plantas, quibus victitant phytophaga. Inservit collectoribus, oeconomis simulque viam ad oeconomiam naturae pandit. Collectores haud omnes in his satis accurati. Metamorphosis insectorum diligentiore inspectionem meretur. Plura adhuc sunt genera, quorum metamorphosis adhuc omnino latet, quae imprimis entomologis oculatis commendo. Larua et pupa specierum etiam annotandae, vt tandem cognitio insecti omnibus partibus completa.



Auctores entomologiae in hisce temporibus plurimi, systematici pauci, ichniographi praestantissimi, at damnandae memoriae *John Hill*, qui decadem insectorum Londini 1773. 4. figuris fictitiis edidit.

Hisce vtere L. B. vsque dum alii plura melioraque sistant.

Dab. Kiliae d. xxiv. Sept. 1780.





SPECIES INSECTORVM.

PARS I.

CLASSIS I.

ELEUTERATA.

I. LVCANVS.

1. **L.** mandibulis exsertis apice quadridentatis. *Syst. Alces.*
Ent. 1. 1. *
Petiv. Gazoph. tab. 47. fig. 15.
Habitat in Asia.
2. **L.** mandibulis exsertis unidentatis apice bifurcatis, latere deflexo; ruga transuersali eleuata. *Syst. Ent.*
1. 2.
Lucanus Cereus scutellatus, maxillis exsertis apice bifurcatis, latere unidentatis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 559.
1. *Fn. Sv.* 405.
Platycerus fuscus, cornubus duobus mobilibus apice bifurcis, latere unidentatis, intus ramo denticulisque instructus. *Geoff. Inf.* 1. 61. 1. tab. 1. fig. 1.
Scarabaeus maximus platyceros, Taurus nonnullis, aliis *Cereus* volans dictus. *Raj. Inf.* 74. 2.
Roef. Inf. 2. *Scarab.* 1. tab. 4. 5.
Bergstraeff. Nomencl. 1. 18. 1. 2. 3. tab. 3. fig. 1.
2. 3. et tab. 4. fig. 1.
Olear. Mus. tab. 16. fig. 5.
Fabr. Spec. Inf. A De

Degeer Inf. 4. tab. 12. fig. 1.
Voet. Scarab. tab. 29. fig. 1. 3.
Schaeff. Icon. tab. 133. fig. 1.
Schluga tab. 1. fig. 1.

β. *Platycerus fuscus*, elytris laeuis, capite laevi. *Geoff. Inf.* 1. 60. 2.

Lucanus Dorcas Müll. *Zool. Dan. Prodr.* 444.
Roef. Inf. 2. *Scarab.* 1. tab. 5. fig. 8.
Bergstraeff. Nomencl. 1. 25. 2. 3. tab. 4. fig. 2. 3.
Voet. Scarab. tab. 29. fig. 2. 4.

Habitat in Europae ligno quercino putrescente.

Feminam β multo minorem mandibulis haud exsertis pro distincta specie assumerunt *Geoffroy* et *O. F. Müller*.

Larva obesa, albida, capite pedibusque ferrugineis.

Elaphus. 3. *L.* mandibulis exsertis videntatis apice bifurcatis, labio deflexo conico. *Syst. Ent.* 2. 3. * *Voet. Scarab.* tab. 30. fig. 5.

Habitat in Virginia. *Mus. Brit.*

Capreolus. 4. *L.* mandibulis exsertis apice tantum bifurcatis, labio ruga transuersa eleuata interrupta. *Syst. Ent.* 2. 4. *Lucanus Capreolus scutellatus*, maxillis exsertis apice tantum furcatis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 560. 2. *Amoen. acad.* 6. 391. 4. *Mus. L. V.* 30.

Sulz. Hist. Inf. tab. 2. fig. 1.
Degeer Inf. 4. tab. 19. fig. 11. 12.

Habitat in America boreali.

Dens mandibularum lateralis omnino deest.

Dama. 5. *L.* mandibulis exsertis intus bidentatis longitudine capitis. *Syst. Ent.* 2. 5. *

Lucanus Capreolus β. *Linn. Mus. Lud. Vr.* 30.

Habitat in Virginia.

Feminam *L. Capreoli* *Linné* dicit, at distincta species videtur.

parallelepipedus. 6. *L.* mandibulis dente laterali eleuato, corpore depresso. *Syst. Ent.* 2. 6. *Linn. Syst. Nat.* 2. 561. 6.

Platycerus niger, elytris laeuis, capitis puncto duplici prominente. *Geoff. Inf.* 1. 62. 3.

Scarabaeus parallelepipedus Pont. Atl. Dan. 1. 666, °
tab. 29. fig. 1.

Voet. Scarab. tab. 29. fig. 7.

Bergstr. Nomencl. 1. 3. 3. tab. 1. fig. 3. 4.

Degeer Inf. 4. tab. 12. fig. 9.

Schaeff. Elem. tab. 101. fig. 1.

— — Icon. tab. 63. fig. 7.

Habitat in Daniae, Germaniae, Angliae fyluis.

Sexus alter minor, mandibulis minoribus punctoque
capitis duplici, prominente.

7. *L. exscutellatus*, antennis arcuatis, corpore oblongo *interru-*
depresso, vertice spina recumbente, thorace abdo- *ptus.*
mineque remotis. Syst. Ent. 3. 7. Linn. Syst. Nat.

2. 560. 2. Mus. Lud. Vlr. 53.

Dermestes Brown. Jamaica. 429. tab. 44. fig. 7.

Petiv. Gazoph. tab. 27. fig. 7.

Saltz. Hist. Inf. tab. 2. fig. 2.

Degeer Inf. 4. tab. 19. fig. 13.

Voet Scarab. tab. 29. fig. 1.

Habitat in America sub Saccharo putrescente.

Alter sexus maior spina capitis incumbente, mandibulis
truncato tridentatis, elytrorumque sulcis lateralibus
punctatis.

Alter spina capitis eleuata, arcuata, mandibulis acuto
tridentatis, elytrorumque sulcis omnibus laeuis.

8. *L. mandibulis tridentatis*, corpore viridi aeneo. Syst. *virescens.*
Ent. App. p. 817. *

Habitat in America.

9. *L. coerulefcens*, mandibulis lunatis, thorace marginato. *caraboi-*
Syst. Ent. 3. 8. Linn. Syst. Nat. 2. 501. 7. °Fn. Sv. *des.*
477. Scop. Ent. carn. 2.

Platycerus violaceo coeruleus elytris laeuis. Geoff.
Inf. 1. 63. 4.

Platycerus Schaeff. Icon. tab. 6. fig. 8. tab. 75. fig. 7.

Degeer Inf. 4. tab. 12. fig. 11.

Voet. Scarab. tab. 29. fig. 8.

Habitat in Europae locis suffocatis,

Variat colore viridi et coeruleo,

2. SCARABAEVS.

* Scutellati thorace cornuto.

Hercules. 1. Sc. scutellatus, thoracis cornu incuruo maximo subtus barbato vtrinque videntato, capitis recuruato dentato. *Syst. Ent.* 3. 1. *Linn. Syst. Nat.* 2. 541. *Muf. L. V.* 3.

Scarabaeus scutellatus niger, elytris griseis nigro maculatis, thorace incuruo cornu maximo, subtus bidentato, capitis recuruato, multidentato. *Degeer Inf.* 4. 304. 2. tab. 18. fig. 9.

Scarabaeus maximus indicus nitens piceus. *Roef. Inf.* 2. *Scarab.* 1. tab. A. fig. 1. et *Inf.* 4. tab. 5. fig. 3.

Taurus volans f. *Eruma*. *Margr. Brasf.* 247. fig. 3.

Rhinoceros americanus cinereus rostro nigro nitente.

Petiv. Gazoph. tab. 70. fig. 1.

Voet. Scarab. tab. 12. fig. 98.

Edw. Av. tab. 334.

Drury Inf. 1. tab. 30. fig. 1. 2.

Aubent. Miscell. tab. 41. fig. 2.

Habitat in America.

Thoracis cornu longissimum, subtus barbatum apice nudum, emarginatum. Femina mutica.

Variat elytris piceis et glaucis nigro punctatis.

Alcides. 2. Sc. scutellatus, thoracis cornu incuruo subtus barbato videntato, capitis recuruato mutico.

Habitat in India orientali. *Muf. Dom. Banks.*

Affinis Sc. *Herculis* et forte eius mera varietas.

Differt tamen magnitudine duplo minore, cornu capitis omnino inermi, thoracis haud emarginato dentibusque versus basin infertis.

Gideon. 3. Sc. scutellatus thoracis cornu incuruo maximo apice bifido, capitis recuruato bifido supra videntato. *Syst. Ent.* 4. 2. *Linn. Syst. Nat.* 2. 541. 2.

Rhinoceros minor cornubus duobus furcatis. *Roef.*

Inf. 2. *Scarab.* 1. tab. A. fig. 5.

Rhinoceros Swammerd. Bibl. Nat. tab. 30. f. 2. *Aubent. Miscell.* tab. 40. fig. 3.

Edw. Av. tab. 40.

Voet. Scarab. tab. 12. fig. 100.

Seligm. Av. 2. tab. 79.

Habitat in Indiis.

4. Sc. scutellatus, thoracis cornu incuruo basi bidentato *Centaurus*
apice bifido, capitis recurvato unidentato. *ruf.*

Scarabaeus Centaurus. Syst. Ent. 8. 19.

Scarabaeus Gideon. Drury Inf. 1. tab. 36. fig. 1.

Habitat in India orientali, Africa. *Mus. Dom. Banks.*

Magnitudo et statura Sc. Gideon, niger. Capitis clypeus emarginatus, cornu magno, erecto, apice recurvo, integro, intus dente valido obtuso notato. Thorax ater, nitidus utrinque dente transversali, obtuso. Cornu maximum, incurvum, basi utrinque unidentatum, apice bifidum. Elytra picea. Tibiae valde dentatae.

5. Sc. scutellatus thoracis cornu brevis emarginato, capitis *Oromedon*
recurvato bifido. *Syst. Ent. 4. 3. **

Scarabaeus Oromedon. Drur. Inf. 1. tab. 36. fig. 5.

Alubent. Miscell. 1. tab. 40. fig. 4.

Voet. Scarab. tab. 13. fig. 102.

Habitat in Indiis.

6. Sc. scutellatus rufus, thoracis cornu brevis incurvo *Aegeon*
subtus barbato, capitis recurvo subulato. *Syst. Ent.*

*4. 4. **

Scarabaeus Aegeon. Drur. Inf. 2. tab. 30. fig. 5.

Habitat in Indiis.

7. Sc. scutellatus, thoracis cornu subulato protensio, ca- *dispar*
pitis subulato subrecurvo, scutello cordato.

Scarabaeus Ammon. Pall. Iter. 3. 707.

Scarabaeus polyceros. Pall. Iter. 1. 461.

Habitat in Sibiria. *Mus. Dom. Banks.*

Magnitudo Sc. stercorarii, totus ater, nitidus. Maxillae dente elevato, thorax ciliatus, scutellum cordatum, elytra striata.

Mas capitis thoracisque cornu subulato.

Femina capitis medio antico denticulis duobus erectis acutis, thorace antice dentibus duobus elevatis, prominentibus.

6 CLASS. I. ELEVTERATA. Scarabaeus.

- Chorinae-us.* 8. Sc. scutellatus, thoracis cornu incuruo basi crassissimo apice bifido, capitis longiori recuruo bifido. *Syst. Ent.* 5. 5. *
Voet. Scarab. tab. 13. fig. 104.
 Habitat in Brasilia. *Mus. Dom. Tunstall.*
 Affinis Sc. Pan.
- dichotomus.* 9. Sc. scutellatus, thoracis cornu bidentato, capitis dichotomo, elytris rufis. *Syst. Ent.* 5. 6. *Linn. Mant.* 1. 529. *
Aubent. Miscell. tab. 40. fig. 5.
Voet. Scarab. tab. 14. fig. 107.
Sulz. Hist. Inf. tab. 1. fig. 1.
 Habitat in Indiis.
- claviger.* 10. Sc. scutellatus rufus, thoracis cornu elevato, capitis subulato recuruo. *Syst. Ent.* 5. 7. *Linn. Mant.* 1. 529.
Aubent. Miscell. 1. tab. 40. fig. 1.
Voet. Scar. tab. 14. fig. 108.
 Habitat in Indiis.
- hastatus.* 11. Sc. scutellatus, thoracis cornu breui fornicato hastato subtus hirto, capitis recuruo.
 Habitat in America meridionali. *Mus. Dom. Banks.*
 Medius. Capitis clypeus reflexus, dentatus cornu magno arcuato, acuto, inermi. Thorax punctatus cornu medio breui, incumbente; supra laevi, subtus fornicato hirto, apice hastato vel trilobo. Elytra punctata stria unica ad futuram. Color niger, elytris femoribusque testaceis.
- Pan.* 12. Sc. scutellatus thoracis cornu incuruo basi crassissimo apice bifido, capitis recuruo unidentato. *Syst. Ent.* 5. 8. *
 Habitat in Indiis. *Mus. Dom. Drury.*
 Elytra nigra, glabra, stria unica ad futuram.
- bilobus.* 13. Sc. scutellatus, thorace prominente bilobo, capitis cornu simplici, elytris striatis. *Syst. Ent.* 6. 9. * *Linn. Syst. Nat.* 2. 544. 12.
Edw. Av. tab. 105. fig. e.
Gronov. Zooph. 414. tab. 14. fig. 1. 2.

Aubent.

Aubent. Miscell. tab. 15. fig. 3.

Schaeff. Icon. tab. 63. fig. 2. 3.

Voet. Scar. tab. 14. fig. 106.

Habitat in Europa australi.

14. Sc. scutellatus, thoracis cornu crassissimo apice emarginato, capitis videntato bifido. *Syst. Ent.* 6. 10. * *Iafon.*
Rhinoceros. Swamm. Bibl. Nat. tab. 30. fig. 5.
Voet. Scar. tab. 13. fig. 103.

Habitat in China.

Affinis videtur Sc. Chorinaeo.

15. Sc. scutellatus, thorace antice retuso, cornu conico brevissimo, capite bituberculato. *Syst. Ent.* 6. 11. * *validus.*
 Habitat in Brasilia. *Mus. Dom. Banks.*
 Magnitudo Sc. Rhinocerotis.
 Pedis pilis elongatis ferrugineis ciliati.

16. Sc. scutellatus, thorace retuso, cornu breui truncato, capite mutico. *Syst. Ent.* 6. 12. * *truncatus.*
 Habitat in noua Zelandia. *Mus. Banks.*
 Magnitudo Sc. nasicornis.

17. Sc. scutellatus, thorace antice retuso, cornu breui incumbente emarginato, capite mutico. *Syst. Ent.* 7. 13. * *Eurytus.*
 Habitat in America. *Dr. Hunter.*
 Corpus nigrum, elytris stria vnica ad futuram.

18. Sc. scutellatus glaber, thorace bicorni, capitis cornu videntato apice bifido, elytris laeuibus. *Syst. Ent.* 7. 14. *Linn. Syst. Nat.* 2. 541. 3. *Mus. I. Vlr.* 4. *Actaeon.*
Rhinoceros maximus tricornis. Roef. Inf. 2. *Scarab.* 1. tab. A. fig. 2.
Enema Margv. Bras. 246.
Rhinoceros. Swammerd. Bibl. Nat. tab. A. fig. 2.
Aubent. Miscell. tab. 5. fig. infer.
Petiv. Gazoph. tab. 15. fig. 12.
Voet. Scar. tab. 16. fig. 111. 112.
Seb. Mus. 4. tab. 90. fig. 3. 4.
 tab. 91. fig. 3.

Habitat in America, Brasilia.

- Simfon.* 19. Sc. scutellatus thorace bicorni, capitis cornu apice bifido, clypeo denticulato. *Syst. Ent.* 7. 15.
Scarabaeus Simfon scutellatus, thorace bicorni, capitis cornu apice tantum bifurcato, labio denticulato. *Linn. Syst. Nat.* 2. 542. 4. *Mus. Lud. Vr.* 5.
 Habitat in Indiis.
 Affinis Sc. Actaeon. Synonyma a Linnaeo citata nullo modo huc pertinent. Certe figura Sloanei ad Titanum spectat.
- Elephas.* 20. Sc. scutellatus villosus, thorace gibbo bicorni, capitis cornu unidentato apiceque bifido. *Syst. Ent.* 7. 16. *
Olear. Mus. tab. 16. fig. 2.
 Habitat in Guinea. *Mus. Britannic.*
 Varietas forte Sc. Actaeonis, at totus villosus.
- Boas.* 21. Sc. scutellatus, thorace retuso excavato bidentato, capitis cornu recurvo simplici. *Syst. Ent.* 8. 17. *
 Habitat ad Sierra Leon. Africae. *D. Drury.*
- Coryphaeus.* 22. Sc. scutellatus, thorace bicorni, corpore ferrugineo. *Syst. Ent. App.* 817. *
 Habitat ad Cap. bon. sp. *Dom. Lee.*
 Magnitudo et statura Sc. vernalis,
- Tityus.* 23. Sc. scutellatus glaucus, thorace tricorni lateralibus brevissimis subulatis, medio subtus barbato, capitis recurvo. *Syst. Ent.* 8. 18.
Scarabaeus Tityus scutellatus, thorace tricorni: intermedio maximo simplicissimo, capitis cornu recurvato simplicissimo. *Linn. Syst. Nat.* 2. 542. 5. *Amoen. acad.* 6. 391. 1.
Scarabaeus thorace tricorni laevi: intermedio maximo incurvo subtus barbato, capitis cornu maximo recurvo. *Gnon. Zooph.* tab. 14. fig. 8.
Aubent. Miscell. 1. tab. 14. fig. 8.
Voet. Scar. tab. 12. fig. 99.
Degeer Inf. 4. tab. 18. fig. 10.
 Habitat in America.
 Variat colore elytrorum nigro glauco maculato et glauco nigro maculato.

24. Sc. scutellatus, thorace tricorni: intermedio breuissimo, capitis recuruo. *Syst. Ent.* 8. 20. * *Atlas.*
Scarabæus Atlas scutellatus, thorace tricorni: antico breuissimo, capitis cornu ascendente. *Linn. Syst. Nat.* 2. 542. 6. *Mus. L. Vlr.* 6.
Rhinoceros Swammerd. Bibl. Nat. tab. 30. fig. 3.
Edw. Av. 105. tab. 105. fig. 1.
Margraf. Brasil. 247. fig. 1.
Olear. Mus. tab. 16. fig. 3.
Voet. Scar. tab. 15. fig. 109. 110.
Sulz. Hist. Inf. tab. 1. fig. 1.
 Habitat in America australiori.
25. Sc. scutellatus, thorace excavato tricorni, lateralibus compressis videntatis, capitis recuruo simplici. *Syst. Ent.* 9. 21. * *Geryon.*
Scarabæus Geryon. *Drury Inf.* 2. tab. 30. fig. 6.
 Habitat in Indiis.
26. Sc. scutellatus, thorace tricorni, intermedio longiori simplici, capite submutico, elytris vnitatis. *Syst. Ent.* 9. 22. *Linn. Syst. Nat.* 2. 542. 7. *Mus. Lud. Vlr.* 7. *Aloeus.*
Scarabæus scutellatus niger, thorace tricorni, intermedio longiori truncato. *Degeer Inf.* 4. 302. 1.
Scarabæus tricornis, capite mutico. *Roef. Inf.* 2. *Scarab.* 1. tab. A. fig. 6.
Nasicornis Taurocerus Marianus castanei coloris. *Petiver. Gazoph.* tab. 24. fig. 10.
Aubent. Miscell. tab. 5. fig. 1.
Voet. Scar. tab. 18. fig. 122. Mas.
 tab. 19. fig. 128. Fem.
 Habitat in America.
27. Sc. scutellatus, thorace tricorni: intermedio longiori simplici, capite mutico, elytris laeuissimis. *Syst. Ent.* 9. 23. * *Antaeus.*
Scarabæus Antaeus. *Drury Inf.* 1. tab. 34. fig. 3.
 Habitat in Americae Insulis,
 Femina mutica.

- Syphax.* 28. Sc. scutellatus, thorace tricorni, intermedio longiori simplici, capite mutico, elytris punctatis. *Syst. Ent.* 9. 24. *
Habitat in America. *Mus. Banks.*
Praecedenti nimis affinis.
- Maimon.* 29. Sc. scutellatus, thorace tricorni, cornubus aequalibus brevissimis, elytris laevibus. *Syst. Ent.* 10. 25. *
Habitat in America. *Mus. Banks.*
- Typhoeus.* 30. Sc. scutellatus, thorace tricorni, intermedio minori, lateralibus porrectis longitudine capitis mutici. *Syst. Ent.* 10. 26. *Linn. Syst. Nat.* 2. 543. 9. *Mus. Lud. Vlr.* 8.
Copris niger, elytris striatis, thorace antrorsum tricorni. *Geoff. Inf.* 1. 72. tab. 1. fig. 3.
Scarabaeus ouinus 2. *Raj. Inf.* 103.
Scarabaeus thorace cornuto. *Frisch. Inf.* 4. tab. 8.
Taurocerus *Mouff. Inf.* 152. fig. 2.
Schaeff. Icon. tab. 26. fig. 4. ♂
— — — tab. 5. fig. 1. ♀
Bergstr. Nomencl. 1. 26. 6. tab. 4. fig. 6.
Petiv. Gazoph. tab. 23. fig. 3.
Degeer Inf. 4. tab. 10. fig. 5.
Voet. Scar. tab. 19. fig. 124. 125.
Habitat sub stercore bouino sub terra cuniculos profundos fodiens, nidulans.
Variat cornubus capite aequalibus et duplo longioribus.
- Titanus.* 31. Sc. scutellatus, thorace tricorni, intermedio longiori apice bifido, lateralibus subarcuatis acutis, capite mutico. *Syst. Ent.* 10. 27. *
Scarabaeus maior, niger, tricornis. *Sloan. Tom.* 2. 205. tab. 237. fig. 4. 5.
Scarabaeus *Simfon Drur. Inf.* 1. tab. 36. fig. 3. 4.
Habitat in Americae meridionalis Insulis.
- Aenobarbus.* 32. Sc. scutellatus, thorace tricorni, medio longiori emarginato, lateralibus obtusis, capite bituberculato. *Syst. Ent.* 10. 28. *
Habitat in America. *Mus. Dr. Hunter.*
Statura praecedentis, at minor.

33. Sc. scutellatus, thorace prominentia triplici, capitis cornu recuruo, clytris laeuibus. *Syst. Ent.* 11. 29. *Scarabaeus nasicornis* scutellatus, thorace prominentia triplici, capitis cornu incuruato, antennis heptaphyllis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 544. 15. *Fn. Sv.* 378. *Voet. Scar.* tab. 18. fig. 120. 121.
Scarabaeus capite vnicorni recuruo, thorace gibbo, abdomine hirsuto. *Geoff. Inf.* 1. 68. 1.
Scarabaeus nasicornis *Frijch. Inf.* 3. tab. 3. fig. 4.
Rhinoceros *Rocf. Inf.* 2. *Scar.* 1. tab. 6. 7.
Drur. Inf. 1. tab. 34. fig. 7. 8.
Olear. Mus. 27. tab. 16. fig. 4.
 Habitat in Europae finetis, vaporariis.
 Femina submutica.
 Larua grisea, capite, pedibus spiraculisque rufis, delectatur fimo, sed acidulo et subadstringenti.
 Inuentor speciei *Clusius*, qui illam *Mouffeto* communicauit.
34. Sc. scutellatus, thorace retuso prominentia triplici, intermedia obsoleta, capitis cornu recuruo. *Sylvanus, Syst. Ent.* 11. 30. *
 Habitat in Brasilia. *Mus. Dom. Banks.*
35. Sc. scutellatus, thorace bituberculato, capitis cornu breui emarginato. *Syst. Ent.* 11. 31. *
 Habitat in Newjork Americae. *Dom. Feats.*
 Paruus, clytris striatis, rufis. *Lazarus.*
36. Sc. scutellatus, thorace retuso prominentia quadruplici, capitis cornu recuruo. *quadri-spinosus.*
 Habitat in Indiis. *Mus. Dr. Hunter.*
 Magnus. Capitis clypeus reflexus, subemarginatus cornu magno, recuruo, simplici. Thorax in medio retusus postice tuberculo eleuato quadridentato: dentibus intermediis paullo maioribus. Elytra nigra stria vnica ad futuram. Pedes pilosi femoribus ferrugineis.
37. Sc. scutellatus, thorace quadridentato, capitis clypeo bidentato, corpore ferrugineo. *quadridens.*
 Habitat in India orientali. *Dr. Koenig. Mus. Dom. Banks.*

Corpus paruum, gibbum, ferrugineum. Capitis clypeus antice bidentatus posticeque linea transuersa eleuata. Thorax gibbus antice dentibus quatuor eleuatis, erectis lateralibus paullo minoribus. Elytra striata.

mobilicornis. 38. Sc. scutellatus, thorace quadridentato, capitis cornu recuruo mobili. *Syst. Ent.* 11. 32. *
Habitat Herfordiae Anglorum.

cylindricus. 39. Sc. scutellatus, thorace antice truncato quinquedentato, capite antice cornu erecto, corpore cylindrico. *Syst. Ent.* 12. 33. *Linn. Syst. Nat.* 2. 544. 11. *Fn. Sv.* 380.

Degeer Inf. 4. tab. 10. fig. 2.

Voet. Scar. tab. 20. fig. 131.

Habitat in Pruni Cerasi truncis Europae borealis.

** Scutellati, thorace inermi, capite cornuto.

Rhinoceros. 40. Sc. scutellatus, thorace retuso subbituberculato, capite cornu simplici, clypeo bifido, elytris punctatis. *Syst. Ent.* 12. 34. *Linn. Syst. Nat.* 2. 544. 14. *Muf. Lud. Vlr.* 10.

Rhinoceros Laconensis nigricans, capite vaginisque punctulatis. *Petiv. Gazoph.* tab. 44. fig. 9. et tab. 100. fig. 3.

Rhinoceros cornu unico. *Roef. Inf.* 2. *Scar.* 1. tab. A. fig. 7.

Barrel. Icon. tab. 163.

Voet. Scar. tab. 18. fig. 117. 118.

Habitat in Asia.

Barbarossa. 41. Sc. scutellatus, thorace inermi antice scabro, capitis cornu recuruo breui. *Syst. Ent.* 12. 35. *
Habitat in noua Hollandia. *Muf. Dom. Banks.*

Satyrus. 42. Sc. scutellatus, thorace inermi antice truncato, capitis cornu recuruo capite longiori. *Syst. Ent.* 12. 36. *
Habitat in America septentrionali. *Muf. Dom. Banks.*
Femina clypeo tuberculato, thorace plano.

43. Sc. scutellatus, thorace inermi antice retuso, capitis cornu recuruo, elytris striatis. *Syst. Ent.* 13. 37. * *iamaicensis.*
Scarabæus iamaicensis. Drur. Inf. 1. tab. 34. fig. 1. 2.
 Habitat in America meridionali. *
 Femina mutica.
44. Sc. scutellatus thorace inermi antice excavato, capitis cornu recuruo, elytris laeuissimis. *Syst. Ent.* 13. 38. * *Silenus.*
Scarabæus excavatus. Forst. Cent. Inf. 1. 1. 1. ?
Voigt. Scar. tab. 18. fig. 119.
 Habitat in Gallo Provincia.
45. Sc. scutellatus, thorace inermi rotundato, capitis cornu recuruo. *Syst. Ent.* 13. 39. * *Syrich-tus.*
 Habitat in America. *Mus. Dom. Banks.*
46. Sc. scutellatus, thorace inermi, capitis cornu breuissimo, elytris cinereis punctis eleuatis atris. *Apelles.*
 Habitat ad Cap. bon. Spei. *Mus. Dom. Banks.*
 Paruus. Clypeus rotundatus, integer futuris eleuatis cornuque medio eleuato, breui griseo fuscus, ante marginem flauus. Thorax inermis, inaequalis, griseo fuscus, margine punctisque duobus anticis flauis. Elytra griseo fusca lineis eleuatis striata et in his puncta eleuata, oblonga, atra. Pedes flauis, nigro maculati.
47. Sc. thorace inermi, capitis clypeo eleuato postice emarginato. *corona-tus.*
 Habitat in Iaua. *Mus. Dom. Banks.*
 Corpus piceum. Caput singulare clypeo vtriuque eleuato postice emarginato. Thorax punctatus. Elytra laeuia. Femora postica breuia, incrassata.
48. Sc. scutellatus, thorace inermi, capitis cornu emarginato, tibiis posticis breuissimis apice spinosis. *Syst. Ent. App.* 817. * *Hylax.*
 Habitat in Africa. *Dom. Lee.*
49. Sc. scutellatus depressus, thorace fossula exarato, capite tricuspidi, elytris striatis. *Syst. Ent.* 13. 40. *Linn. Syst. Nat.* 2. 545. 19. *Mus. L. V.* 14. *didymus.*

Scarabaeus didymus. Drur. Inf. 1. tab. 32. fig. 3.
Voet. Scar. tab. 19. fig. 126.

Habitat in America.

Alter sexus in antico thoracis mucrone paruo eleuato armatus. •

Polyphemus. 50. Sc. scutellatus thorace inermi, capite tricorni, antico porrecto bifido.

Habitat in Africa. *Mus. Dom. Banks.*

Affinis Sc. Goliato, at minor. Caput depressum, albo villosum, antennis nigris. Cornu tria, atra, nitida, antico apicis porrecto, longiori, recuruo, bido, laciniis arcuatis; lateralibus minoribus, subarcuatis. Thorax inermis, viridis lineis quinque albis, intermedia abbreviata. Elytra viridia, lineis tribus macularibus albis. Subtus albidus, sterno porrecto obtuso abdomineque viridibus nitidis. Pedes virides, femoribus vtrinque linea alba. Tibiae anticae vtrinque dentatae, posticae intus ciliatae. •

Goliatus. 51. Sc. scutellatus, thorace inermi, clypeo bifurco. *Syst. Ent.* 13. 41.

Scarabaeus goliatus scutellatus, thorace inermi, capite rostro bifurco. *Linn. Mant.* 530.

Drur. Inf. 1. tab. 31.

Sulz. Hist. Inf. tab. 1. fig. 2.

Voet. Scar. tab. 22. fig. 51.

Habitat in Africa, Guinea.

Hircus. 52. Sc. scutellatus, thorace inermi scabro, capite linea transuersa carinata, clypeo bidentato. *Syst. Ent.* 13. 42. *

Habitat Tranquebariae Indiae orientalis. *Koenig.*
An femina muti alius Scarabaei.

farctus. 53. Sc. scutellatus brunneus, capite subbicorni, elytris punctato-striatis apice nigris. *Syst. Ent.* 14. 43. *

Habitat in Pensyluania. *Mus. Brit.*

retusus. 54. Sc. scutellatus, thorace retuso, capitis cornu breui plano, femoribus posticis incrassatis.

Habitat ad promontorium bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*

Minor

Minor Sc. nasicorni. Caput antice eleuatum, planum, apice submarginatum. Thorax muticus, obscurus, niger, antice parum retufus. Elytra laeuia, nigra. Subtus hirtus, ferrugineus. Pedes rufi, femoribus posticis valde incrassatis.

55. Sc. scutellatus piceus, thorace inermi glabro, capite *piceus.*
subbicorni, elytris striatis. *Syst. Ent. 14. 44. **
Habitat in Indiis. *Dom. Drury.*
Magnitudo Sc. Fofforis.
56. Sc. scutellatus, thorace inermi quadripunctato, capite *Inuus.*
quadrituberculato, tarsis anticis nullis.
*Scarabaeus Splinx. Syst. Ent. 14. 45. **
Habitat in Sierra Leon. Africae. *Mus. Dom. Banks.*
Corpus supra viridiaeneum, obscurum.
57. Sc. scutellatus, thorace inermi quadripunctato, capite *Aygulus.*
tuberculato, elytris testaceis, tarsis anticis nullis.
Habitat in India. *Mus. Dom. Banks.*
Nimis praecedenti affinis, at duplo fere maior. Capitis clypeus integer, viridis, lineolis quinque transuersis tuberculoque postico eleuatis. Thorax inermis, aeneus, puncto vtrinque vnico et duobus dorsalibus approximatis ad marginem posticum. Scutellum paruum, virescens. Elytra striata, testacea. Femora et tibiae valde dentata. Tibiae anticae et intus dentatae, quod haud in Sc. Inuo.
58. Sc. scutellatus, thorace inermi, capite tuberculis tri- *subterra-*
bus, elytris striis crenatis. *Syst. Ent. 14. 46. Linn. neus.*
Syst. Nat. 2. 548. 28. Fn. Sv. 382.
Habitat in Europae stercore.
Affinis Sc. Foffori, at multo minor.
59. Sc. scutellatus, thorace inermi retuso, capite tuber- *Foffor.*
culis tribus, medio subcornuto. *Syst. Ent. 14. 47.*
Fn. Sv. 384.
Scarabaeus totus niger spinulis tribus capitis transuersim positis. *Geoff. Inf. 1. 82. 20.*

Scarabaeus atro rubens, corpore subcylindrico atro rubente. *Aët. Nidr.* 4. 266. 2. tab. 16. fig. 1.

Schaeff. Icon. tab. 144. fig. 78.

Degeer Inf. 4. tab. 10. fig. 7.

Voet. Scar. tab. 21. fig. 141.

Habitat in Europae fabulosis, stercoreatis.

scybalarius. 60. Sc. scutellatus, thorace inermi, capite tuberculis tribus, intermedio acuto, elytris striatis testaceis.

Habitat in Germania. *Mus. Dom. Banks.*

Minor Sc. fossore. Caput et thorax atra, nitida tuberculis capitis tribus intermedio acutiori. Elytra striata testacea macula marginali nigra.

terrestris. 61. Sc. scutellatus, thorace inermi, capite tuberculis tribus aequalibus, elytris striatis. *Syst. Ent.* 15. 48. *

Habitat in Anglia. *Mus. Dom. Banks.*

Sc. Fossori triplo minor.

maurus. 62. Sc. scutellatus, thorace inermi, capite mucronibus tribus, corpore violaceo, abdomine testaceo. *Syst. Ent.* 15. 49. *Linn. Syst. Nat.* 2. 548. 304.

Habitat in Mauritania.

Corpus oblongum, coerulescens, abdomine villosio testaceo.

testaceus. 63. Sc. scutellatus testaceus, capite bituberculato, elytris punctato striatis. *Syst. Ent.* 15. 50. *

Habitat in Angliae stercoreatis. *Dom. Lee.*

fimetarius. 64. Sc. scutellatus, ater, thorace inermi, capite tuberculato, elytris rubris. *Syst. Ent.* 15. 51. *Linn. Syst. Nat.* 2. 548. 32. *Fu. Sv.* 385.

Scarabaeus capite thoraceque nigro, antennis elytrisque rubris. *Geoff. Inf.* 1. 81. 18.

Scarabaeus pillularius nonus. *Raj. Inf.* 106. 9.

Scarabaeus equinus medius, coleoptris rubris, collari nigro. *Frisch. Inf.* 4. 35. tab. 19. fig. 3. *Scop. Ent. carn.* 20.

Schaeff. Icon. tab. 144. fig. 6.

Degeer Inf. 4. tab. 10. fig. 8.

Voet. Scar. tab. 21. fig. 147.

Habitat frequens in Europae stercore.

Tubercula capitis tria, eleuata.

65. Sc. scutellatus, thorace subinermi, capite tuberculo *bicolor*.
 vnico, elytris nigris, abdomine rufo. *Syst. Ent.*
 15. 52. *
- Habitat in Germania. *Dom. de Hattorf.*
66. Sc. scutellatus, thorace inermi laeui, capite tuberculo *erraticus*.
 vnico, elytris fuscis. *Syst. Ent.* 16. 53. *Linn. Syst.*
Nat. 2. 548. 29. *Fn. Sv.* 383.
Schaeff. Icon. tab. 26. fig. 9.
- Habitat in Europae stercore, viis.
67. Sc. scutellatus, thorace inermi, marginibus laterali- *conspur-*
 bus albidis, capite tuberculato, elytris griseis macu- *catus.*
 latis. *Syst. Ent.* 16. 54. *Linn. Syst. Nat.* 2. 549. 34.
Fn. Sv. 387. *
- Scarabaeus* capite thoraceque nigro glabro, elytris gri-
 seis, pedibus pallidis. *Geoff. Inf.* 1. 82. 19.
- Scarabaeus* pillularius decimus. *Raj. Inf.* 108.
Schaeff. Icon. tab. 26. fig. 8.
Pontop. Atl. Dan. tab. 1. fig. 82.
Voet. Scar. tab. 21. fig. 144.
- Habitat in Europae stercore frequens.
 Affinis sequenti, at minor.
68. Sc. scutellatus, capite tuberculato, thorace nigro, *sordidus*.
 margine pallido puncto nigro, elytris griseis. *Syst.*
Ent. 16. 55. *
- Habitat in Angliae stercore.
69. Sc. scutellatus, capite tuberculato ater, elytris griseis *luridus*.
 nigro striatis. *Syst. Ent.* 29. 69. *
- Habitat in Angliae. *Mus. Dom. Banks.*
 Caput tuberculo paruo.
70. Sc. scutellatus niger thorace mutico, clypeo tuberculo *grana-*
 solitario, elytris postice testaceis. *Syst. Ent.* 16. *rius.*
 56. *Linn. Syst. Nat.* 2. 547. 23.
- β. *Scarabaeus* haemorrhoidalis scutellatus thorace in-
 ermi, capite tuberculato, elytris apice rubris. *Linn.*
Syst. Nat. 2. 548. 33. *Fn. Sv.* 386.
- Fabr. Spec. Inf.* B Habi-

Habitat in Europae locis suffocatis.
Elytra interdum ultra dimidium testacea.

- maria-* 71. Sc. scutellatus, capite tuberculato, elytris laevibus
nus. glaucis fusco punctatis. *Syst. Ent.* 16. 57. *Linn. Syst.*
Nat. 2. 549. 35.
Habitat in America.
Magnitudo Sc. Aloeii. Abdomen et femora ferruginea,
Vix distincta species videtur, sed potius femina
mutica Sc. Herculis.

*** Scutellati mutici capite thoraceque
inermi.

- scaber.* 72. Sc. scutellatus, clypei centro prominulo, elytris an-
tice scabris. *Syst. Ent.* 17. 58.
Scarabaeus scaber scutellatus muticus, thorace elytris-
que antice scabris. *Linn. Syst. Nat.* 2. 549. 37. *Muf.*
Lud. Vlr. 17.
Habitat in America. *Muf. Dom. Banks.*
Elytra apice glauca. Affinis videtur Sc. Herculis fe-
minae.
- longima-* 73. Sc. scutellatus muticus, pedibus anticis arcuatis lon-
nus. gissimis. *Syst. Ent.* 17. 59. *Linn. Syst. Nat.* 2. 549.
39. *Muf. Lud. Vlr.* 18.
Aubent. Miscell. tab. 41. fig. 1.
Voet. Scar. tab. 11. fig. 97.
Habitat in India.
Femora antica dente valido armata.
- stercora-* 74. Sc. scutellatus muticus ater, clypeo rhombeo, verti-
rius. ce prominulo, elytris fulcatis. *Syst. Ent.* 17. 60. *Linn.*
Syst. Nat. 2. 551. 42. *Fn. Sv.* 388.
Scarabaeus ater dorso glabro, elytris fulcatis, capi-
tis clypeo rhomboide centro prominulo. *Geoff. Inf.*
1. 75. 9.
Scarabaeus magnus niger vulgatissimus, antennis ar-
ticulatis. *Raj. Inf.* 74. 1.
Scarabaeus magnus e purpura niger, tibiis omnium
pedum ferratis. *List. Scar. Angl.* 380. 4.

Scarabaeus stercorarius niger maior. *Frisch. Inf.* 4. 13. tab. 6.

Schaeff. Icon. tab. 23. fig. 9.

Voet. Scar. tab. 20. fig. 134.

Degeer Inf. 4. tab. 9. fig. 10. 11.

Habitat in Europa sub stercore.

Ab Aegyptiis soli consecratur, qui semper marem credebant absque copula ova ponentem.

Vesperum circumvolitat ingenti cum susurro, serenum diem annuntians. Infestatur Acaris, Ichneumone.

Alium simillimum, at subtile aeneum, nitidissimum ex Italia misit *Dom. Allioni.*

Varietatem vidi elytris sulcatis, obscure rufis.

75. *Sc. scutellatus muticus*, elytris glabris laevissimis, *cly-vernalis*.
 p. rhombico, vertice prominulo. *Syst. Ent.* 17. 61.
Linn. Syst. Nat. 2. 551. 43. *Fn. Sv.* 389.

Scarabaeus coeruleus, dorso elytris glabris laevissimisque, capitis clypeo rhombico, centro prominulo. *Geoff. Hist.* 77. 10.

Scarabaeus vernalis. *Scop. carn.* 27.

Sulz. Hist. Inf. tab. 1. fig. 6.

Voet. Scar. tab. 20. fig. 135.

Degeer Inf. 4. tab. 10. fig. 4.

Habitat sub Europae stercore.

Praecedenti simillimus, at minor, glaber et nitidus. Forte tamen eius mera varietas.

Variat colore coeruleo, virescente et obscuro.

76. *Sc. scutellatus muticus*, thorace antice impresso mucronato. *Syst. Ent.* 18. 62. *

Habitat in America. *Mus. Dom. Banks.*

77. *Sc. scutellatus muticus viridi nitens*, elytris striatis. *splendidus.*
Syst. Ent. 18. 63. *

Habitat in Americae meridionalis Insulis. *Drury.*

78. *Sc. scutellatus muticus rufus*, elytrorum sutura apicibusque nigris. *Cephus.*
Syst. Ent. 18. 64. *

Habitat - - - - - *Mus. Dom. Banks.*

- laborator.* 79. Sc. scutellatus muticus ater, thorace punctato, elytris striatis, clypeo emarginato. *Syst. Ent.* 18. 65. *
Habitat in Brasiliae stercore. *Mus. Dom. Banks.*
- globator.* 80. Sc. scutellatus muticus, thorace elytrisque obscure nigris punctatis.
Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*
Magnitudo Sc. fossoris. Capitis clypeus rotundatus margine reflexo et striga in medio eleuata. Thorax obscurus punctis plurimis impressus. Elytra itidem nigra obscura punctis plurimis impressa. Corpus subius hirtum, piceum.
- maculatus.* 81. Sc. scutellatus muticus, elytris striatis pallidis nigro maculatis.
Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*
Statura Sc. conspurcati, at paullo maior et omnino muticus. Capitis clypeus rotundatus, integer, pallescens macula media nigra. Thorax subpunctatus, obscure rufus maculis dorsalibus atris. Elytra striata, pallida maculis tribus atris. Corpus uti et pedes picea.
- arator.* 82. Sc. scutellatus muticus niger, thorace laeui, elytris punctato striatis. *Syst. Ent.* 18. 66. *
Habitat ad Cap. bon. sp.
- barbatus.* 83. Sc. scutellatus muticus laeuis niger, ano barbato. *Syst. Ent.* 19. 67. *
Habitat in India. *Mus. Tottianum.*
- rufipes.* 84. Sc. scutellatus muticus ater, thorace glabro nitido, elytris striatis. *Syst. Ent.* 19. 68.
Scarabaeus rufipes muticus ater, antennis pallidis, elytris laeuius. *Linn. Syst. Nat.* 2. 559. 86. *Fn. Sv.* 403.
Degeer Inf. 4. tab. 10. fig. 6.
Habitat in Europae borealis stercore.
Varietas duplo minor pedibus nigris vix specie differt.
- Blackburnii.* 85. Sc. scutellatus muticus, thorace nigro aeneo, elytris striatis atris.
Habitat in America boreali. *Mus. Blackburn.*

Præcedenti paullo maior. Clypeus rotundatus centro subprominulo. Thorax rotundatus puncto vtrinque impresso, nigro aeneus, obscure nitens. Elytra atra, striata.

86. Sc. scutellatus muticus oblongus niger, elytris maculis duabus rubris. *Syst. Ent.* 19. 70. * *Linn. Syst. Nat.* 2. 558. 84. *Fn. Sv.* 398. *amaculatus.*
Habitat in Angliae stercore.
87. Sc. scutellatus muticus niger, elytris plaga rufescente. *Syst. Ent.* 19. 71. *Linn. Syst. Nat.* 2. 539. 85. *plagiatus.*
Habitat in Vpſaliae.
Varietas forte Sc. subterranei.
88. Sc. scutellatus muticus niger, thoracis elytrorumque margine testaceo. *margineus.*
Habitat in Coromandel. *Mus. Dom. Banks.*
Paruus. Capitis clypeus rotundatus, integer, niger fascia media obscure rufa. Thorax niger, nitidus margine exteriori testaceo. Elytra crenato striata, nigra margine testaceo, qui color ante apicem extenditur. Pedes picei.
89. Sc. scutellatus muticus niger, elytris fulcatis piceis ferrugineo punctatis. *Syst. Ent.* 19. 72. * *testudinarius.*
Habitat in Anglia. *Dr. Solander.*
90. Sc. scutellatus muticus ater, elytris testaceis, futura nigra. *Syst. Ent.* 19. 73. * *merdarius.*
Habitat in Europae stercore.
91. Sc. scutellatus muticus ater, elytris liuidis. *Syst. Ent.* 20. 74. *quisquilius.*
Scarabaeus quisquilius exscutellatus ater glaber, elytris liuidis testaceis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 558. 83. *Fn. Sv.* 397.
Scarabaeus minimus. *Scop. Ent.* 29.
Habitat in Europae stercore.
Scutellum paruum, nigrum.
92. Sc. scutellatus muticus fuscus, elytris porcatis. *Syst. Ent.* 20. 75. * *porcatus.*
Habitat in Lipsiae stercore.

- stercorator.* 93. Sc. scutellatus muticus ater laevis, elytris striato crenatis, clypeo emarginato. *Syst. Ent.* 19. 76. *
Habitat in Brasilia. *Mus. Dom. Banks.*
- asper.* 94. Sc. scutellatus muticus, capite thoraceque transuersim fulcatis, elytris striatis. *Syst. Ent.* 19. 77. *
Habitat in Europae plantis putridis.
- unipunctatus.* 95. Sc. scutellatus muticus ater, coleoptris flavescentibus, puncto communi nigro. *Syst. Ent.* 19. 78.
Coccinella unipunctata coleoptris flavescentibus puncto communi nigro. *Linn. Syst. Nat.* 2. 579. 6. *Fn. Sv.* 470.
Habitat in Europa boreali.
Antennae lamellatae huius generis. Tempore sereno per aëra volitat.

**** Exscutellati thorace cornuto.

- nemestrius.* 96. Sc. exscutellatus, thoracis cornubus duobus porrectis acutis, capitis erecto subulato.
Scarabaeus tricornutus exscutellatus, niger splendens, capitis clypeo lunato, cornu erecto, thorace retuso, cornubus duobus porrectis. *Degeer Inf.* 7. 637. tab. 47. fig. 16.
Habitat in Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*
Affinis Sc. Iaccho. Capitis clypeus rotundatus, integer. Cornu erectum basi crassiusculum apice subulatum. Thorax antice retusus cornubus duobus dorsalibus porrectis, rotundatis, acutis. Punctum vtrinque impressum. Elytra striata. Corpus subtus hirtum.
- Iacchus.* 97. Sc. exscutellatus, thorace prominente bilobo, capitis cornu recuruo simplici. *Syst. Ent.* 20. 79. *
Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*
Femina capitis cornu brevissimo truncato, thoracisque tuberculo antico transuerso eleuato.
- Oedipus.* 98. Sc. exscutellatus, thoracis cornu plano, subtus dentato, capitis truncato tridentato. *Syst. Ent.* 21. 80. *
Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*

99. Sc. exscutellatus, thorace prominentia duplici, capitis cornu erecto simplici. *Sabaenus.*

Habitat in Coromandel. *Mus. Dom. Banks.*

Statura et magnitudo omnino Sc. Iacchi. Capitis clypeus porrectus, rotundatus margine parum reflexo vix emarginato. Cornu simplex, erectum. Thorax ater, nitidus in medio prominentia duplici obtusa punctoque laterali impresso. Elytra striata, atra nitida.

Femina tuberculis thoracis cornuque capitis minoribus.

100. Sc. exscutellatus, thorace aeneo, cornubus duobus compressis nigris, capitis cornu erecto apice compresso. *splendidus.*

Habitat in America meridionali. *Mus. D. Hunter.*

Magnitudo Sc. Carnificis. Clypeus rotundatus, vix emarginatus, niger lateribus aeneis, cornu magno, erecto, apice compresso, obtuso. Thorax margine angulato aeneus, nitidus, in medio cornubus duobus compressis, obtusis, subarcuatis, atris. Elytra fulcata, obscura, viridia. Pedes nigri femoribus aeneis.

101. Sc. exscutellatus, thorace gibbo bicorni, capitis cornu erecto, elytris rubro aeneis. *festivus.*

Scarabaeus festivus exscutellatus muticus, thorace nigro maculato, elytris rubro aeneis, sterno porrecto.

Syst. Ent. 28. 111. *Linn. Syst. Nat.* 2. 552. 52.

Roef. Inf. 2. *Scarab.* 1. tab. B. fig. 8.

Voet. Scar. tab. 23. fig. 5. 7.

Degeer Inf. 4. tab. 8. fig. 15.

Habitat in America meridionali.

Mas cornutus, femina mutica.

102. Sc. exscutellatus, thorace bicorni, cornubus brevissimis, capitis cornu erecto subulato. *Pithecius.*

Habitat in Indiis. *Mus. Britann.*

103. Sc. exscutellatus, thorace antice, clypeo postice bicorni. *Seniculus.*

Habitat in Coromandel. *Dr. Schulz.*

Statura omnino Sc. Bonasi. Clypeus niger, antice subacuminatus lateribus submarginatis, postice ater, cornubus duobus breuibus, erectis, compressis. Thorax gibbus, niger, aeneo colore tinctus margine flavescente, antice cornubus duobus, breuibus, diuergentibus, depressis, obtusis. Elytra substriata nigra strigis duabus baseos e punctis ferrugineis. Pedes breues, validi, ferruginei.

Variat puncto vno alteroue ferrugineo apicis.

Rosalius. 104. Sc. exscutellatus, thorace antice bicorni, postice eleuato tricorni, capitis cornu compresso ferrato. *Syst. Ent.* 21. 82.

Habitat in America meridionali.

Ammon. 105. Sc. exscutellatus, thorace tridentato, capitis cornu recuruo, elytris striatis.

Scarabaeus Siienus. *Syst. Ent.* 21. 83. *

Habitat in America. *Mus. Dom. Banks.*

Midas. 106. Sc. exscutellatus, thorace tricorni, clypeo sinuato bicorni. *Syst. Ent.* 21. 84. *

Habitat in America. *Mus. Dom. Banks.*

Hama-dryas. 107. Sc. exscutellatus, thorace tricorni, intermedio plano acuto bidentato, clypeo reflexo bicorni. *Syst. Ent.* 22. 85. *

Voet. Scar. tab. 27. fig. 38. ? at noster omnino niger.

Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*

lunaris. 108. Sc. exscutellatus, thorace tricorni, intermedio obtuso bifido, capitis cornu erecto, clypeo emarginato. *Syst. Ent.* 22. 86. *Linn. Syst. Nat.* 2. 543. 10. *Fn. Sv.* 379. *Scop. Ent. carn.* 22.

Copris capitis clypeo lunulato, margine eleuato, corniculo denticulato. *Geoff. Inf.* 1. 88. 1.

Scarabaeus ouinus tertius f. capite operculato. *Raj. Inf.* 103.

Scarabaeus nasicornis medius. *Frisch. Inf.* 4. 25. tab. 7.

Pet. Gazoph. tab. 138. fig. 4.

Schaeff. Icon. tab. 63. fig. 2. 3. ♂. ♀.

Bergstræff. Nomencl. 1. 5. 9. tab. 1. fig. 9. et
tab. 4. fig. 7.

Poda Mus. tab. 1. fig. 1.

Voet. Scar. tab. 25. fig. 24. 25.
tab. 26. fig. 26.

Habitat in Europae stercoretis.

Clypeus in utroque sexu cornutus, at femina thorace
mutico.

109. *Sc. exscutellatus*, thorace late foveolato antice cor- *Rhadami-*
nu recurvo, capite inermi, elytris rufis, futura *stus.*
punctisque duobus nigris. *Syst. Ent.* 22. 87. *

Habitat Tranquebariae. *Dr. Koenig.*

110. *Sc. exscutellatus*, thorace prominentia triplici, capi- *Belzebul.*
te tricorni, intermedio maiori. *Syst. Ent.* 23. 88. *

Habitat in America. *Mus. Dom. Drury.*

111. *Sc. exscutellatus*, thorace prominentia triplici, capi- *bifascia-*
tis cornu erecto, elytris nigris, fasciis duabus rufis. *tus.*

Habitat in Coromandel. *Mus. Dom. Banks.*

Magnitudo *Sc. nuchicornis*. Capitis clypeus rotunda-
tus, integer, niger, in medio cornu erecto, breui,
obtus. Thorax rotundatus, ater, nitidus antice
prominentia triplici. Elytra striata, atra fasciis dua-
bus rufis altera baseos, altera apicis, quae tamen fu-
turam haud attingunt.

112. *Sc. exscutellatus*, thorace quadricorni, intermediis *Faunus.*
breuissimis, capitis cornu recurvo serrato. *Syst.*
Ent. 23. 89. *

Voet. Scar. tab. 24. fig. 15.

Habitat Cajennae. *Dom. Mauduit.*

Femina simillima, at cornubus minoribus, lateralibus
haud truncatis, sed acutis, conicis, compressis.

113. *Sc. exscutellatus*, thorace quadridentato, capitis cor- *capuci-*
nu recumbente, utrinque videntato. *nus.*

Habitat in India orientali. *Mus. Dom. Banks.*

Magnitudo et statura *Sc. carolini*. Capitis clypeus ro-
tundatus, integer cornu elevato, recumbente in me-

dio vtrinque denticulo paruo. Thorax eleuatus, niger, antice quadridentatus punctoque vtrinque impresso. Elytra striata, nigra, interdum picea.

***** Exscutellati thorace inermi capite
cornuto.

Bonafus. 114. Sc. exscutellatus, thorace prominentia duplici, capite tricorni, lateralibus maioribus arcuatis. *Syst. Ent.* 23. 90. *

Habitat Tranquebariae. *Dr. Koenig.*

Bifon. 115. Sc. exscutellatus, thorace antice mucronato, capite cornibus duobus lunaribus. *Syst. Ent.* 23. 91. *Linn. Syst. Nat.* 2. 547. 27.

Habitat in Hispania.

Thorax postice punctis duobus impressis.

Femina thoracis margine antico carinato eleuato mucroneque capitis paruo distincta.

Sagittarius. 116. Sc. exscutellatus, thorace antice mucronato, capitis cornu solitario erecto. *Syst. Ent.* 24. 92. *

Habitat ad Cap. bon sp. *Mus. Dom. Banks.*

Bucephalus. 117. Sc. exscutellatus, thorace retuso quadridentato, capitis clypeo angulato vnicorni. *Syst. Ent.* 24. 93. *

Habitat in Indiis. *Mus. Britann.*

Moloffus. 118. Sc. exscutellatus, thorace retuso bidentato vtrinque impresso, clypeo vnicorni lunato integro, elytris laeuius. *Syst. Ent.* 24. 94. *Linn. Syst. Nat.* 2. 543. 8. *Mus. Lud. Vlr.* 11.

Linn. Amoenit. Acad. 6. 391.

Drury Inf. 1. tab. 32. fig. 2.

Schroet. Abh. 1. tab. 3. fig. 3.

Degeer Inf. 4. tab. 18. fig. 11.

Habitat in China in officinis introductus.

Lancifer. 119. Sc. exscutellatus violaceus, capitis cornu angulato, thorace dentato, elytris fulcatis. *Syst. Ent.* 24. 95.

Scarabaeus lancifer exscutellatus, violaceus, capite cornu angulato, thorace inaequali, elytris fulcatis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 544. 13.

Lancifer violaceus. *Voet. Scar.* tab. 23. fig. 1. 2.

Taurus. *Margr. Brasl.* 247.

Schroet. Abh. 1. tab. 3. fig. 4.

Habitat in Indiis.

Maior Sc. Mima et totus violaceus.

120. Sc. exscutellatus, thorace retuso elevato, capitis cornu recurvo, clypeo fisso. *Syst. Ent.* 24. 96. * *Paniscus*.

Scarabaeus valgus thorace mutico, capite cornuto, femoribus secundi paris remotis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 546. 20. *Mus. Lud. Vlr.* 15. 2.

Scarabaeus marianus. *Petiv. Gazoph.* tab. 27. fig. 8.

Roef. Inf. 2. *Scarab.* 1. tab. B. fig. 2.

Habitat in America.

121. Sc. exscutellatus, capitis cornu erecto brevissimo, *carolinus*, clypeo integro, elytris fulcatis. *Syst. Ent.* 25. 97. *

Scarabaeus carolinus exscutellatus, thorace retuso, capite ovali integro unicorni, elytris striatis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 545. 16.

Scarabaeus carolinus. *Drury Inf.* 1. tab. 35. fig. 2.

Voet. Scar. tab. 24. fig. 14.

Habitat in America boreali.

122. Sc. exscutellatus, thorace inermi, punctis quatuor *Sphinx*, impressis, capite subcornuto, tarsis anticis nullis.

Syst. Ent. 25. 98. *

Scarabaeus spinipes. *Drury Inf.* 1. tab. 35. fig. 8.

Act. Soc. Berolin. phys. 4. tab. 7. fig. 10.

Habitat in America meridionali.

123. Sc. exscutellatus, thorace inermi, punctis quatuor *Nicanor*, impressis, capitis cornu recurvo bidentato, elytris striatis.

Scarabaeus Sphinx β. *Syst. Ent.* 25. 98.

Scarabaeus fulcatus. *Drury Inf.* 1. tab. 35. fig. 1.

Habitat in America.

Marem Sc. *Sphinx* olim credidi, at vix iure. Clypeus porrectus antice emarginatus cornu brevi erecto basi vtrin-

vtrisque videntato. Thorax niger, antice truncatus puncto vtrisque impresso, postice rotundatus punctis duobus impressis, approximatis. Elytra striata nigra.

Mimas. 124. Sc. exscutellatus, thorace inermiti retuso angulato, capite obsolete bicorni, elytris inauratis striatis. *Syst. Ent.* 25. 99. *Linn. Syst. Nat.* 2. 545. 17. *Mus. Lud. Vlr.* 9.

Copris viridis splendens. *Voet. Scarab.* tab. 23. fig. 4.
Sulz. Hist. Inf. tab. 1. fig. 4.

Scarabaeus inaequalis fuscus viridi nitens, capite bicorni. *Roef. Inf.* 2. *Scarab.* 1. tab. B. fig. 1.

Habitat in America meridionali.

Clypeus omnino integer.

Taurus. 125. Sc. exscutellatus, thorace inermiti, occipite cornibus binis reclinatis arcuatis. *Syst. Ent.* 26. 100. *Linn. Syst. Nat.* 2. 547. 26.

Scarabaeus illyricus. *Scop. carn.* 25.

Scarabaeus ouinus 2. *Raj. Inf.* 103. 2.

Scarabaeus taurus capite cornibus duobus lunatis lateralibus. *Schreb. Inf.* tab. 1. fig. 6. 7.

Copris niger, capite pone bicorni, corniculis tenuibus arcuatis longitudine thoracis, thorace vtrisque sinuato. *Geoff. Inf.* 1. 92.

Voet. Scar. tab. 24. fig. 16.

Schaeff. Inf. tab. 73. fig. 2. 3. ♂. ♀.

Sulz. Hist. Inf. tab. 1. fig. 5.

Habitat in Europa australiori.

Vacca. 126. Sc. exscutellatus, thorace inermiti retuso, occipite spina erecta gemina. *Syst. Ent.* 26. 101. *Linn. Syst. Nat.* 2. 547. 25.

Copris obscure aeneus, capite pone bicorni, thorace antice prominente, elytris rufis nigro maculatis.

Geoff. Inf. 1. 90. 5.

Schaeff. Inf. tab. 73. fig. 4. 5. ♂. ♀.

Schroet. Miscell. 1. tab. 3. fig. 5.

Habitat in Europa australiori.

127. *Sc. exscutellatus*, thorace quadridentato, occipite *Vitulus*.
cornubus duobus erectis breuibus, corpore atro.
Gen. Inf. Mant. 209. *
Habitat in Austria. *Dr. Schulz.*
128. *Sc. exscutellatus*, thorace inermi angulato, capitis cornu erecto, corpore aeneo. *Syst. Ent.* 26. 102.
Scarabaeus Carnifex exscutellatus, thorace inermi plano angulato, capitis cornu reflexo, corpore aeneo. *Linn. Syst. Nat.* 2. 546. 22.
Scarabaeus Carnifex. *Drury Inf.* tab. 35. fig. 3—5.
Voet. Scar. tab. 26. fig. 31. 32.
Habitat in America.
Synonyma a Linnaeo citata pleraque falsa.
129. *Sc. exscutellatus*, thorace inermi cupreo, capite basi *tridens*.
tridentato, elytris nigris.
Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*
Magnitudo *Sc. Carnificis*. Clypeus rotundatus, integer antice niger, postice cupreus, in medio striga transversa, eleuata, integra et alia tridentata ad basin. Thorax cupreus punctis eleuatis scaber, antice subretusus. Elytra, vti et corpus, nigra vix striata.
130. *Sc. exscutellatus*, thorace inermi, clypeo cornuto *hispanus*.
emarginato, elytris striatis. *Syst. Ent.* 26. 103. *Linn.*
Syst. Nat. 2. 546. 21. *Mus. Lud. Vlr.* 12.
Rhinoceros lusitanicus, niger splendens vaginis striatis.
Petiv. Gazoph. tab. 8. fig. 4.
Habitat in Europa australiori.
131. *Sc. exscutellatus*, thorace retundato inermi, occipite *spinifex*.
spina recurua.
Habitat in Coromandel. *Mus. Dom. Banks.*
Statura et magnitudo omnino *Sc. nuchicornis*. Capitis clypeus rotundatus, integer occipite spina recurua longitudine thoracis. Thorax rotundatus, glaber, dorso planiusculo, niger, viridi nitidus. Elytra striata nigra viridi colore nitida. Pedes nigri femoribus incrassatis.

- nuchicornis.* 132. Sc. exscutellatus, thorace rotundato inermi, occipite spina erecta armato. *Syst. Ent.* 26. 104. *Linn. Syst. Nat.* 2. 547. 24. *Fn. Sv.* 381.
Copris fusco niger, capite clypeato angulato penecornuto, elytris ferrugineo nebulosis breuibis striatis. *Geoff. Inf.* 1. 89. 3. ♂.
Copris fusco niger, capite clypeato angulato non cornuto, elytris breuibis striatis. *Geoff. Inf.* 1. 89. 4. ♀.
Schaeff. Icon. tab. 96. fig. 1.
Voet. Scar. tab. 25. fig. 18.
Scarabaeus ouinus tertius s. capite aperto. *Raj. Inf.* 103. 2.
Scarabaeus capite thoraceque atro opaco, elytris cinereis nigro nebulosis. *Linn. It. Gotl.* 41.
Roef. Inf. 2. *Scarab.* 1. tab. A. fig. 4.
 Habitat in Europae stercore.
 Mas a tergo cornutus, femina mutica.
- scabrosus.* 133. Sc. exscutellatus, thorace inermi rugosa, capitis cornu erecto brevissimo, elytris testaceis nigro scabris. *Gen. Inf. Mant.* 209. *
Voet. Scar. tab. 25. fig. 23.
 Habitat in America meridionali. *Dr. Schulz.*
 Paulo maior Sc. nuchicorni.
- furcatus.* 134. Sc. exscutellatus, thorace inermi rotundato, capite cornubus tribus erectis approximatis, intermedio breviori.
 Habitat in Arabia. *Forskahl. Mus. Dom. Banks.*
 Minor Sc. nuchicorni. Clypeus antice emarginatus postice cornubus tribus basi approximatis erectis intermedio breviori. Thorax muticus, laevis, glaber, postice rotundatus. Elytra striata, fusca. Pedes nigri.
- verticicornis.* 135. Sc. exscutellatus, thorace inermi griseo nigro punctato, capitis cornu erecto brevissimo. *Syst. Ent.* 27. 105. *
 Habitat in Anglia. *Mus. Dom. Tunstall.*
 Nimis affinis Sc. nuchicorni.

136. *Sc. exscutellatus*, ater, capitis tuberculo unico, ely- *fulcator*,
tris striatis. *Syst. Ent.* 27. 106. *
Habitat Cajennae. *Dr. Mallet.*
137. *Sc. exscutellatus*, ater, thorace inermi, capite bitu- *apustula-*
berculato, elytris maculis duabus rubris. *Syst. Ent.* *tus.*
27. 107. *
Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
138. *Sc. exscutellatus niger*, thorace inermi crenato, ely- *crifatus*,
peo tuberculato quadridentato. *Syst. Ent.* 27. 108.
Habitat in Aegypto. *Dom. Prof. Forjkahl.*

***** Exscutellati mutici.

139. *Sc. exscutellatus*, clypeo sexdentato, thorace inermi *sacer.*
crenulato, tibiis posticis ciliatis, elytris laeuibus.
Syst. Ent. 28. 109. *Linn. Syst. Nat.* 2. 545. 18. *Mus.*
Lud. Vlr. 13. *Amoen. acad.* 6. tab. 3.
Scarabaeus cornutus exscutellatus niger, capitis cly-
peo lunato, margine antice denticulato, thorace
elytrisque laeuibus. *Degeer Inf.* 7. 638. 36. tab. 47.
fig. 18.
Scarabaeus laeuis, thorace inermi, capite antice sex-
dentato. *Osborne It.* 51.
Scarabaeus pilularius niger, clypeo antice ferrato, ely-
tris nebulose maculatis submollibus planiusculis.
Loefl. It. 20.
Petiv. Gazoph. tab. 42. fig. 2.
Sulz. Hist. Inf. tab. 1. fig. 3.
Voet. Scar. tab. 27. fig. 39. 40.
Habitat in regionibus australioribus.
140. *Sc. exscutellatus muticus niger*, clypeo sexdentato, *laticollis.*
elytris fulcatis. *Syst. Ent.* 28. 110. *Linn. Syst. Nat.*
2. 549. 38.
Copris niger capite clypeato, margine ferrato, thora-
ce lato laeui, elytris striatis. *Geoff. Inf.* 1. 89. 2.
Scarabaeus pilularius. *Raj. Inf.* 105. 4.
Voet. Scar. tab. 27. fig. 41.
Habitat in Europa australi, China.
Praecedenti nimis affinis videtur.

- miliaris.* 141. Sc. exscutellatus muticus, clypeo sexdentato, thorace elytrisque nigris, maculis eleuatis atris. *Syst. Ent. Append.* p. 817. *
Habitat in India. *Mus. Dr. Hunter.*
- Bacchus.* 142. Sc. exscutellatus muticus, clypeo quadridentato thorace gibbo elytrisque glabris.
Habitat ad Cap. bon. sp. *Dr. Schulz.*
Magnus gibbus. Capitis clypeus porrectus medio dentibus quatuor rotundatis obtusis. Thorax eleuatus valde gibbus, glaber, ater margine omni integro. Elytra laeuia, glabra, nigra. Tibiae omnes valde dentatae.
- gibbosus.* 143. Sc. exscutellatus muticus, clypeo quadridentato, elytris basi gibbere notatis. *Syst. Ent.* 28. 112. *
Habitat in America.
- Hollandiae.* 144. Sc. exscutellatus muticus, clypeo quadridentato, elytris fulcatis. *Syst. Ent.* 29. 113. *
Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
- Koenigii.* 145. Sc. exscutellatus muticus, clypeo bidentato, thorace scabro, elytris variolosis. *Syst. Ent.* 29. 114. *
Habitat Tranquebariae. *Koenig.*
- cupreus.* 146. Sc. exscutellatus muticus nigro cupreus, clypeo emarginato, thorace gibbo. *Syst. Ent.* 29. 115. *
Habitat in Africa. *Dom. Teats.*
- flagellatus.* 147. Sc. exscutellatus muticus niger opacus, clypeo emarginato, elytris scabris. *Syst. Ent.* 29. 116. *
Habitat ad Cap. bon. sp.
- Schaefferi.* 148. Sc. exscutellatus muticus, thorace rotundato, clypeo emarginato, elytris triangulis, femoribus posticis elongatis dentatis. *Syst. Ent.* 29. 117. *Linn. Syst. Nat.* 2. 550. 41.
Scarabaeus longipes. *Scop. carn.* 84.
Copris niger, pedibus longis femorum posteriorum basi denticulata, elytris postice gibbis. *Geoff. Inf.* 1. 92. 9.
Schaeff. Icon. tab. 3. fig. 8.
Voet. Scar. tab. 25. fig. 17.
Habitat in Germaniae collibus apricis, globulos e stercore ouino confectos voluens, sepeliens.

149. Sc. exscutellatus muticus niger opacus laevis subtus *pilulari-*
 aeneus, thorace postice rotundato. *Syst. Ent.* 29. *us.*
 118. *Linn. Syst. Nat.* 2. 550. 40. *Mus. Lud. Vlr.* 19.
Scarabaeus laevis. Drury Inf. 1. tab. 352. fig. 7.
Pilularius. Plin. nat. 11. 34.
Schaeff. Icon. tab. 3. fig. 7.
Degeer Inf. 4. tab. 18. fig. 14.
 Habitat in Europa australiori globulos e stercore confi-
 ciens, voluens.
 Niger, elytris laevibus.
150. Sc. exscutellatus muticus ater, clypeo emarginato, *squalidus.*
 elytris striatis. *Syst. Ent.* 30. 119. *
 Habitat in stercore bouino Brasiliae.
151. Sc. exscutellatus muticus ater glaber, elytris maculis *Schreberi,*
 duabus rubris. *Syst. Ent.* 30. 120. *Linn. Syst. Nat.*
 2. 551. 45.
Copris niger nitidus, thorace antice gibbo, elytro sin-
gulo macula duplici rubra. Geoff. Inf. 1. 91. 7.
Schaeff. Icon. tab. 73. fig. 6.
Voet. Scar. tab. 28. fig. 49.
 Habitat in Europa australiori.
152. Sc. exscutellatus muticus ater, elytris basi macula ru- *pustula-*
 fa. *Syst. Ent.* 30. 121. * *tus.*
 Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
153. Sc. exscutellatus muticus, capite thoraceque pallido *pallipes.*
 viridique variegatis, pedibus pallidis.
 Habitat in Coromandel. *Mus. Dom. Banks.*
 Paruus, capitis clypeus inaequalis, integer pallido vi-
 ridique variegatus. Thorax rotundatus, pallescens,
 maculis viridibus variegatus. Elytra substriata, ob-
 scura. Pedes omnes vti et antennae pallidi.
154. Sc. exscutellatus muticus niger, thoracis margine fe- *triangu-*
 moribusque pallidis, clypeo emarginato. *Syst. Ent.* *laris.*
 30. 122.
Scarabaeus triangularis. Drury Inf. 1. tab. 36. fig. 7.
 Habitat in America meridionali.
 Statura omnino Sc. nuchicornis.
Fabr. Spec. Inf. C 155. Sc.

- cinctus*. 155. Sc. exscutellatus muticus niger, elytrorum margine pallido, clypeo emarginato. *Syst. Ent.* 30. 123. *
Habitat in China. *Dom. Drury*.
- aeneus*. 156. Sc. exscutellatus muticus viridi aeneus, thorace bituberculato.
Habitat in Coromandel. *Mus. Dom. Banks*.
Corpus paruum, supra viridi aeneum, obscurum, subtus nigrum viridi nitidum. Clypeus rotundatus, integer, niger basi viridis lineis duabus elevatis abbreviatis. Thorax rotundatus, glaber antice tuberculis duobus approximatis. Elytra striata, obtusa.
- smaragdulus*. 157. Sc. exscutellatus muticus aeneus nitidus, clypeo bidentato.
Habitat in America meridionali. *Mus. Dr. Hunter*.
Corpus paruum totum aeneum, nitidum, glaberrimum. Capitis clypeus dentibus duobus obtusis. Elytra obtusa, laevissima.
- ovatus*. 158. Sc. exscutellatus muticus niger, thorace rotundato subaeneo, elytris abbreviatis. *Syst. Ent.* 30. 124.
Linn. Syst. Nat. 2. 551. 46.
Habitat in stercore bouino Germaniae, Angliae.
Sc. nuchicorni quadruplo minor.

3. T R O X.

- fabulosus*. 1. T. thorace elytrisque rugosis, thorace integerrimo.
Syst. Ent. 31. 1.
Scarabaeus fabulosus scutellatus muticus niger opacus, tuberculis rugosis, antennis basi pilosis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 551. 48. *Fn. Sv.* 390.
Scarabaeus rugosus. *Scop. Ent. carn.* 23.
Degeer Inf. 4. Tab. 10. fig. 12.
Habitat in Europae collibus fabulosis, apricis.
- suberosus*. 2. T. griseus, thorace marginato, margine postice dentato, elytris striatis. *Syst. Ent.* 31. 2. *
Habitat in Brasilia. *Mus. Dom. Banks*.
- horridus*. 3. T. ater, thorace elytrisque spinosis. *Syst. Ent., App.* p. 818. *
Habitat in India. *Mus. Dr. Hunter*.

4. *T. nigricans*, thorace postice vtrinque emarginato, *spinicornis*,
antennis spinosis. *Syst. Ent.* 31. 3. *
Habitat - - - - - *Mus. Dom. Tunstall.*

4. MELOLONTHA.

1. *M. testacea* albo maculata, scutello macula duplici, an- *Fullo.*
tennis heptaphyllis. *Syst. Ent.* 31. 1.
Scarabaeus Fullo scutellatus muticus, antennis hepta-
phyllis, corpore nigro pilis albis, scutello macula
duplici alba. *Linn. Syst. Nat.* 2. 553. 57. *Fu. Sv.*
394. *Scop. Ent. carn.* 12.
Scarabaeus antennarum lamellis maximis, corpore
nigro squamis albis varie maculato. *Geoff. Inf.* 1.
69. 2.
Scarabaeus Fullo. *Raj. Inf.* 93. 9.
Scarabaeus albo maculatus Iulii. *Frisch. Inf.* 11. tab.
1. fig. 1.
Scarabaeus variegatus. *Roef. Inf.* 4. tab. 30.
Ephem. Nat. Curios. Dec. 2. Ann. 6. obs. 239.
Aubent. Miscell. tab. 16. fig. med.
Schaeff. Icon. tab. 23. fig. 2.
Petiv. Gazoph. tab. 138. fig. 1.
Sulz. Hist. Inf. 1. 1.
Hoefn. Inf. 2. tab. 7.
Voet. Scarab. tab. 6. fig. 48. 49.
Habitat in Europae arenosis.
2. *M. obscure testacea*, clypeo emarginato, thoracis mar- *ferrata.*
gine ferrato.
Habitat in Coromandel. *Mus. Dom. Banks.*
Magnitudo *M. vulgaris*. Capitis clypeus fuscus, apice
elevatus, emarginatus. Thorax laevis obscure te-
staceus margine dentibus nigris ferrato. Elytra te-
stacea lineis aliquot elevatis, obsoletis. Varietatem
triplo minorem e Sibiria clypeo minus emarginato
in *Mus. Dom. Banks* vidimus.
3. *M. testacea*, thorace villoso, incisuris abdominis albis. *vulgaris.*
Syst. Ent. 32. 2.

Scarabaeus Melolontha scutellatus muticus testaceus, thorace villoso, cauda inflexa, incisuris abdominis albis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 554. 60. *Fn. Sv.* 392. *Geoff. Inf.* 1. 70. 1. *Scop. Ent. carn.* 16.

Scarabaeus arboreus vulgaris maior. *Raj. Inf.* 104. 1.

Scarabaeus maximus rufus vropygio deorsum inflexo. *List. Sc. Angl.* 379.

Scarabaeus maior arboreus castaneus. *Petiv. Gazoph.* 29. tab. 19. fig. 2.

Melolontha vulgaris. *Roef. Inf.* 2. *Scarab.* 1. tab. 1.

Schaeff. Icon. tab. 93. fig. 1. 2.

Elem. tab. 8. fig. 3.

tab. 109. fig. 4.

Voet. Scar. tab. 6. fig. 45. 46.

Degeer Inf. 4. tab. 10. fig. 14.

Habitat in Europae borealibus vulgarissimus.

Larua grisea capite pedibusque testaceis deuorat radices plantarum.

Imago vesperi volitans foliis arborum vicitat, tilia intacta.

Deuoratur a vespertilione murino, autumnalis morbos copiosior praenuntiat, oleum infusum cimicifugum reddit. *Scopoli.*

Variat thorace rufo et nigro et vtraque varietas alternat annuatim.

Mas cauda acuta, inflexa.

occidentalis. 4. *M.* testacea, thorace pubescente, elytris lineis quatuor niueis. *Syst. Ent.* 32. 3.

Scarabaeus occidentalis scutellatus muticus testaceus, thorace pubescente, elytris lineis quatuor niueis parallelis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 555. 62. *Drury Inf.* 2. tab. 32. fig. 2.

Habitat in Europa australiori.

M. vulgari simillima et forte eius mera varietas.

feruida. 5. *M.* testacea glabra, clypeo emarginato. *Syst. Ent.* 32. 4. *

Habitat in America septentrionali.

Corpus testaceum rore coerulescentè tectum.

6. *M. glabra testacea*, clypeo reflexo. *reflexa.*
 Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*
 Niniis praecedenti affinis, at paullo minor. Corpus totum testaceum glabrum punctatum. Clypeus haud emarginatus, at apice reflexus.
7. *M. testacea*, thorace villoso, elytris luteo pallidis, lineis tribus pallidioribus. *Syst. Ent.* 33. 5. *solstitialis.*
Scarabaeus solstitialis scutellatus muticus testaceus, thorace villoso, elytris luteo pallidis, lineis tribus albis parallelis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 554. 61. *Fn. Sv.* 397. *Geoff. Inf.* 1. 74. 7. *Scop. Ent. carn.* 3.
Scarabaeus secundus arboreus. *Raj. Inf.* 105. 2.
Scarabaeus ex flavo subcinereus. *List. Scar.* 301. 2.
Scarabaeus lanuginosus arboreus. *Mouff. Inf.* 160. fig. 3.
Scarabaeus pectinatus minor villosus. *Petiv. Gazoph.* 36. tab. 22. fig. 9.
Scarabaeus Iunii f. *solstitialis*, *Frisch. Inf.* 9. p. 30. tab. 15. fig. 3.
Schaeff. Icon. tab. 93. fig. 3.
Voet. Scarab. tab. 6. fig. 51. 52.
Degeer Inf. 4. tab. 10. fig. 15.
 Habitat in Europae arboretis praecedenti serior, ad solstitium aestivum frequentissima.
8. *M. villosa testacea*, abdomine albicante. *Syst. Ent.* 33. 6. *ruficornis.*
Voet. Scar. tab. 6. fig. 50.
 Habitat in Germania. *Dom. de Hattorff.*
 Forte praecedentis mera varietas.
9. *M. oblonga glabra nigra*, elytris obsolete striatis. *Gen. oblonga.*
Inf. Mantiff. 209. *
Scarabaeus oblongus. *Scop. Ent. carn.* 19.
 Habitat in Germania australiori.
10. *M. subtus lanata*, capite thoraceque aureis, elytris lanigera-luteis. *Syst. Ent.* 33. 7.
Scarabaeus lanigerus scutellatus muticus, subtus lanatus, capite thoraceque auratis, elytris luteis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 555. 67. *Mus. Lud. Vtr.* 20.
Drury Inf. 1. tab. 34. fig. 6.
 Habitat in India orientali.

- punctata*. 11. M. testacea, elytris punctis tribus fuscis distantibus.
Syst. Ent. 33. 8.
Scarabaeus punctatus scutellatus muticus testaceus,
 elytris punctis tribus subfuscis obsoletis distantibus.
Linn. Syst. Nat. 2. 557. 76. *Mus. Lud. Vlr.* 23.
Drur. Inf. 1. tab. 34. fig. 5.
Voet. Scarab. tab. 8. fig. 65.
Gronov. Zooph. 438.
 Habitat in America.
 Ungues arcuati, acutissimi.
- glabrata*. 12. M. testacea nitida, sterno antice porrecto obtuso. *Syst. Ent.* 34. 9. *
 Habitat in Indiis. *Mus. Britann.*
- viridis*. 13. M. glabra supra viridis, subtus aurea. *Syst. Ent.* 34. 10. *
 Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*
- aenea*. 14. M. glabra aenea, abdominis lateribus albis, elytris acuminatis. *Syst. Ent.* 34. 10. *
 Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
- futuralis*. 15. M. viridis, elytrorum futura flauescente. *Syst. Ent.* 34. 12. *
 Habitat in noua Zelandia. *Mus. Dom. Banks.*
- bicolor*. 16. M. glabra supra viridis subtus testacea, pedibus apice aureis. *Syst. Ent.* 34. 13. *
Voet. Scar. tab. 8. fig. 66.
 Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*
- dorsalis*. 17. M. glabra testacea, capite thoracis elytrorumque dorso nigris. *Syst. Ent.* 35. 14. *
 Habitat Tranquebariae. *Dr. Koenig.*
- glacialis*. 18. M. glabra picea, antennis pedibusque testaceis. *Syst. Ent.* 35. 15. *
 Habitat in Terra del Fuego. *Mus. Dom. Banks.* *
- lurida*. 19. M. thorace nigro, margine pallido, elytris griseis nigro punctatis. *Syst. Ent.* 35. 16. *
 Habitat - - - - *Mus. Dom. Tunstall.*

20. *M. glabra aenea*, elytris striatis, futura lineisque quatuor cupreis. *Syst. Ent.* 35. 17. *
 Habitat in Terra del Fuego. *Mus. Dom. Banks.*
21. *M. thorace villoso obscuro*, elytris laevibus testaceis, scutello albido. *tristis.*
 Habitat in America boreali. *Dom. Blackburn.*
 Affinis *M. testaceae*. Caput et thorax obscura, hirta. Scutellum rotundatum hirsutiae densa albidum. Elytra laevia, testacea. Corpus obscurum.
22. *M. glabra testacea*, capite obscuriore, elytris striatis. *testacea.*
Syst. Ent. 35. 18. *
 Habitat in Terra del Fuego. *Mus. Dom. Banks.*
23. *M. glabra testacea*, capite elytrorumque futura nigris. *pallida.*
Syst. Ent. 35. 19. *
 Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*
24. *M. glabra punctata ferruginea*, elytris testaceis. *ruficollis.*
 Habitat in Coromandel. *Mus. Dom. Banks.*
 Maior *M. brunnea*. Clypeus rotundatus, integer, obscure ferrugineus in medio lineis duabus elevatis transversis. Thorax glaber, valde punctatus rufus, immaculatus. Elytra glabra, punctata, testacea.
25. *M. glabra pallida*, thorace lineis duabus, elytris maculis tribus nigris. *signata.*
 Habitat in Iamaica Insula. *Mus. Dom. Banks.*
 Corpus magnitudine praecedentis. Capitis clypeus integer, pallidus, basi ater. Thorax pallidus lineis duabus atris, quae tamen nec basin, nec apicem attingunt. Elytra glabra, laevia, pallida, maculis tribus 2. I., quarum exterior reliquis minor. Subtus pallida abdomine nigro. Tibiae antice apice compressae, dentatae. Tarsi picei basi apiceque spinosi.
26. *M. glabra testacea*, elytris striatis, thorace vtrinque puncto notato. *brunnea.*
Syst. Ent. 36. 20.
Scarabaeus brunneus scutellatus muticus testaceus, elytris striatis, thorace vtrinque puncto notato. *Linn. Syst. Nat.* 2. 556. 72.

Scarabaeus fulvus oculis nigris thorace glabro. *Geoff. Inf.* 1. 83. 22.

Scarabaeus fulvus scutellatus flavo rufus, oculis nigris; thorace punctis binis nigris, pedibus longissimis. *Degeer Inf.* 4. 277. 23. tab. 10. fig. 17.

Scarabaeus pellucidus. *Sulz. Hist. Inf.* tab. 1. fig. 9.
Voet. Scar. tab. 7. fig. 53, 54.

Habitat in Europae arboretis.

Larvae deuorant radices plantarum, declaratae folia.

melanocephala. 27. *M.* glabra rufescens, capite nigro, elytris pallidis. *Syst. Ent.* 36. 21. *

Voet. Scar. tab. 9. fig. 80.

Habitat in Brasilia. *Mus. Dom. Banks.*

erythrocephala. 28. *M.* glabra pallida, capite rufo basi nigro. Habitat in Coromandel. *Mus. Dom. Banks.*

Affinis *M. melanocephalae* at duplo minor. Corpus totum glabrum, laeue, immaculatum capite solo obscure rufo basi nigro.

obscura. 29. *M.* obscure picea immaculata, pilis breuissimis erectis albis.

Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*

Corpus magnitudine *M. rufae* totum obscure rufum, at pilis breuissimis albis vix nudo oculo conspicuis tectum.

rufa. 30. *M.* glabra rufescens, elytris testaceis, clypeo quinquentato. *Syst. Ent.* 36. 22. *

Voet. Scar. tab. 9. fig. 76.

Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*

festiua. 31. *M.* supra glabra viridis, thorace linea dorsali, elytris futura nigris. *Syst. Ent.* 36. 23. *

Habitat in noua Zelandia. *Mus. Dom. Banks.*

laeta. 32. *M.* supra glabra aurea, thoracis linea dorsali scutelloque sanguineis. *Syst. Ent.* 36. 24. *

Habitat in noua Zelandia. *Mus. Dom. Banks.*

33. *M. nigro aenea*, elytris testaceis. *Syst. Ent.* 37. 25. * *Frischii.*
Scarabaeus Iulii f. *Vitis.* *Frisch. Inf.* 4. 29. tab. 14.
Voet. Scar. tab. 6. fig. 55.
 tab. 7. fig. 58.
 Habitat in Vite, Rosa Germaniae, in Brasilia. *Mus.*
Dom. Banks.
 Variat rarius elytris thorace concoloribus.
34. *M. viridis*, thoracis lateribus flavis. *Syst. Ent.* 37. *Vitis.*
 26. *
Scarabaeus dubius. *Scop. Ent. carn.* 4.
Voet. Scar. tab. 6. fig. 56. 57.
Sulz. Hist. Inf. tab. 1. fig. 11.
 Habitat in Europae, Americae Vite.
 Nimis praecedenti affinis.
 Aliam vidimus elytris testaceis, at huius mera varietas
 videtur.
35. *M. testacea*, thorace maculis duabus nigris, pedibus *errans.*
 rufis. *Syst. Ent.* 37. 27. *
 Habitat in - - - - - *Mus. Dom. Tunstall.*
36. *M. villosa virescens*, capite nigro. *Syst. Ent. Append. rupicola.*
 818. *
 Habitat ad Cap. bon. sp.
37. *M. clypeo reflexo*, thorace elytrisque punctatis nigro *rauca.*
 aeneis.
 Habitat in Coromandel. *Mus. Dom. Banks.*
 Clypeus punctatus niger margine reflexo. Thorax
 punctatus nigro aeneus obscure nitidus. Elytra pun-
 ctata nigro aenea linea vna alteraue elevata. Corpus
 subtus nigrum.
38. *M. rufa*, thorace elytrisque vage punctatis. *ferrugi-*
 Habitat in Coromandel. *Mus. Dom. Banks.* *nea.*
 Praecedentis affinis, at duplo minor et color rufus ni-
 tidus.
39. *M. atra*, elytris vitta abbreviata aurea. *splendida.*
 Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*

Parua. Capitis clypeus punctatus, ater apice emarginatus. Thorax punctatus ater immaculatus. Elytra punctata atra vitta vel potius macula oblonga aurea.

aulica. 40. M. cupreo nitida, clypeo emarginato.

Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*

Statura praecedentium. Caput cupreum, nitidum, late emarginatum. Thorax punctatus, cupreus, nitidus.

Elytra punctata, cuprea, nitida.

horticola. 41. M. capite thoraceque coeruleo pilosis, elytris testaceis, pedibus nigris. *Syst. Ent.* 37. 28.

Scarabaeus horticola scutellatus muticus, capite thoraceque coeruleo subpilosis, elytris griseis, pedibus nigris. *Linn. Syst. Nat.* 2. 554. 59. *Fn. Sv.* 391.

Scarabaeus capite thoraceque coeruleo pilosis, elytris rufis. *Geoff. Inf.* 1. 75. 8.

Scarabaeus ex nigro virefcens, pennarum thecis rufis. *List. Scar.* 380. 3.

Scarabaeus viridicollis scutellatus, elytris obscure flavis, capite thoraceque violaceis, pedibus nigris. *Degeer Inf.* 4. 278. 24. tab. 10. fig. 18.

Scarabaeus frisius. *It. Scan.* 116. 321.

Schaeff. Icon. tab. 23. fig. 4.

Habitat in Europae hortis.

Larua Radices Brassicae Botrydis et capitatae destruit, intactis viridis et Savoyen. Imago Pomonam deaustat, intacta pyro communi.

araicola. 42. M. capitis clypeo reflexo, corpore nigro immaculato.

Habitat in Sibiria. *Mus. Dom. Banks.*

Nimis affinis videtur M. horticolae at color totius corporis niger.

pratitola. 43. M. thorace nigro flauoque vario subpiloso, elytris testaceis.

Habitat in Sibiria. *Mus. Dom. Banks.*

Affinis M. agricolae, at clypeus haud reflexus.

Variat colore uti M. agricola. Thorax mox magis flavus, mox magis niger. Scutellum nigrum. Elytra pallide testacea interdum fascia media nigra.

44. M. capite thoraceque coeruleo pilosis, elytris liuidis, *agricola*.
 clypeo apice reflexo. *Syst. Ent.* 37. 29.
Scarabæus agricola scutellatus muticus, thorace vil-
 lofo, elytris liuidis, limbo fasciâque nigris. *Linn.*
Syst. Nat. 2. 553. 58.*
Scarabæus cyathiger. *Scop. carn.* 6.*
Scarabæus agricola. *Pod. Inf.* 21.
Schæff. Icon. tab. 65. fig. 1.
Voet. Scar. tab. 8. fig. 67.
 Habitat in spicis secalinis Germaniæ, Angliæ.
 Clypeus semper apice reflexus, at elytra mox maculata,
 mox immaculata.
45. M. atra sericea, elytris rufis, margine nigro. *Syst. ruricola*.
Ent. 38. 30.*
Scarabæus niger elytris croceis, margine niger. *Geoff.*
Inf 1. 80: 15.
 Habitat in Angliæ graminosis.
 Variat rarius elytris obscuris, margine tamen semper
 obscuriore.
46. M. albo farinosa, thorace canaliculato atro, elytris *atomaria*.
 fuscis, abdomine albo, punctis lateralibus atris.
 Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*
 Statura et magnitudo M. farinosæ. Caput et thorax atra
 atomis plurimis albis adspersa pilisque rarioribus
 erectis. Thorax canaliculatus. Elytra fusca atomis
 albis. Abdomen niueum linea laterali punctorum ni-
 grorum. Pedes nigri.
47. M. supra coeruleo, subtus argenteo squamosus nitens, *farinosa*.
 clypeo integro. *Syst. Ent.* 38. 31.*
Scarabæus farinosus scutellatus muticus niger, polline
 virescente, elytris abbreviatis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 555.
 64. *Fu. Sv.* 399.
Scarabæus violaceus et squamosus squamis subtus ar-
 genteis. *Geoff. Inf.* 1. 79. 13.
Scarabæus scutellatus niger, squamulis griseo viridi-
 bus, corpore depresso. *Degeer Inf.* 4. 302. 30. tab.
 10. fig. 23.
Scarabæus coeruleus. *Drury Inf.* 2. tab. 32. fig. 4.
Voet. Scarab. tab. 9. fig. 71.
 Habitat in Europa australiori.

- argentea.* 48. M. clypeo marginato niger subtus argenteo nitens, elytris testaceis. *Syst. Ent.* 38. 32. *
Scarabaeus argenteus. Scop. Ent. carn. 9.
Scarabaeus argenteus. Pod. Inf. 20.
Voet. Scar. tab. 8. fig. 68.
 Habitat frequens in Angliae floribus. *
 Distincta omnino species.
- proboscidea.* 49. M. clypeo porrecto subreflexo nigra hirta, elytris testaceis, margine nigro. *Syst. Ent. App.* p. 818. *
 Habitat in India. *Mus. Dr. Hunter.*
- spinipes.* 50. M. nigra immaculata, pedibus posticis elongatis, femoribus basi unispinosis.
 Habitat ad promontorium bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*
 Statura omnino M. crassipedis. Clypeus apice eleuatus, niger, obscurus. Thorax et elytra obscure nigra, minime nitida. Pedes postici elongati, incrassati femoribus ad basin anteriorem spina valida, acuta.
- dentipes.* 51. M. nigra, elytris testaceis, clypeo quadridentato, femoribus tibiisque posticis spinosis. *
 Habitat ad promontorium bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*
 Affinis praecedenti. Caput et thorax villosa, atra, elytra testacea, abdomen retusum, femora postica compressa, unispinosa, tibiae spinis duabus aequalibus.
- podagricca.* 52. M. nigra, clypeo tridentato, femoribus tibiisque posticis spinosis.
 Habitat in Coromandel. *Mus. Dom. Banks.*
 Statura praecedentium. Caput et thorax atra, vix hirta, immaculata clypeo apice denticulis tribus eleuatis. Thorax postice rotundatus. Elytra laeuis, atra, macula vna alteraue grisea. Pedes nigri femoribus posticis incrassatis, compressis apice interiori unispinosis. Tibiae breues, incuruae spina breui valida bases et altera elongata apicis.
- arthritica.* 53. M. nigra, elytris griseis, clypeo tridentato, femoribus tibiisque posticis incrassatis subinermibus.
 Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*

Præcedentibus paullo minor. Caput et thorax atra, immaculata. Abdomen atrum vtrinque albo maculatum.

54. *M. grisea*, pedibus rufis, femoribus posticis incrassatis muticis. *gonagra.*

Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*

Præcedentibus minor. Clypeus subdentatus. Abdomen retusum, atrum. Pedes omnes rufi femoribus posticis incrassatis, compressis, muticis. Tarsi nigri vngulis arcuatis.

55. *M. atra* albo maculata, pedibus posticis elongatis *crassipes.*
crassissimis. *Syst. Ent. Append. pag. 818. **

Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*

56. *M. corpore* polline virescenti argenteo, elytris pedibusque testaceis. *Syst. Ent. 39. 33. ** *puluerulenta.*

Sulz. Hist. Inf. tab. 1, fig. 8.

Habitat Strasburgi.

Duplo minor *M. argentea*.

57. *M. clypeo* inflexo integro, corpore nigro glabro. *Syst. syluicola.*
*Ent. 39. 34. **

Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

Variat interdum elytris fuscis.

58. *M. flauescens*, pedibus rufis, thorace subspinoso. *Syst. subspino-*
*Ent. 39. 35. ** *sa.*

Habitat in Iamaica, infulisque Americae meridionalis.

59. *M. villosa* nigra, clypeo tridentato, elytris abbreviatis testaceis. *abbreviata.*

Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*

Capitis clypeus brevis, niger, villosus, apice tridentatus. Thorax canaliculatus, pilosus, ater. Elytra abdomine multo breuiora, angustiora, laeuia, testacea. Corpus atrum pilis aliquot albis.

60. *M. atra*, tomento cinereo villosa. *Syst. Ent. 39. 36. ** *mutabilis.*
Voet. Scar. tab. 9. fig. 75.

Habitat Tranquebariae. *Dr. Koenig.*

- variabilis.* 61. *M. atra*, elytris auro nitentibus, antennis pedibusque testaceis. *Gen. Inf. Append.* 210. *
Habitat in America boreali, in Holsatia.
Variat nostra colore nigro et rufo tomento cinereo tecta.
- versicolor.* 62. *M. obscure aenea*, elytris tomento cinereo nitidulis. *Syst. Ent.* 39. 37. *
Habitat ad Sierra Leon Africae. *Mus. Dom. Banks.*
- capicola.* 63. *M. nigra hirta*, scutello abdomineque albidis.
Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*
Parua. Caput, thorax, elytra nigra, immaculata pilis erectis albis hirta. Scutellum vti abdomen subtus albo villosum. Pedes nigri. *
- picea.* 64. *M. glabra ferruginea*, elytris striatis.
Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*
Statura gibba praecedentium. Corpus totum ferrugineum, capite thoraceque tamen obscurioribus omnino glabrum. Pedes postici compressi tibiis ferratis.
- lineata.* 65. *M. obscure virescens*, elytris lineis duabus rufis.
Habitat in Sierra Leon Africae. *Mus. Dom. Banks.*
Corpus paruum, gibbum. Caput et thorax obscure viridia ore nigro. Elytra obscure viridia lineis duabus rufis ad basin coeuntibus, quae tamen apicem haud attingunt. Subtus nigra pedibus piceis.
- gibba.* 66. *M. gibbo testacea* tomento cinerascete nitidula.
Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*
Statura magis gibba. Capitis clypeus reflexus. Corpus totum testaceum cinereo tomento tenuissimo nitidulum. Tibiae posticae intus ferratae, extus videntatae, apice truncatae, spinosae.
- monticola.* 67. *M. clypeo integro reflexo testacea glabra*, capite atro. *Syst. Ent.* 39. 38. *
Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
- humeralis.* 68. *M. atra*, elytris basi punctoque medio pallidis. *Syst. Ent.* 40. 39. *
Habitat in Europae graminosis. *Mus. Dom. Tunstall.*

69. *M. atra hirsutissima*, pedibus quatuor anticis testaceis. *Syst. Ent. App.* pag. 818. *
Voet. Scar. tab. 9. fig. 74.
 Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*
 Variat pedibus omnibus nigris, an distincta species?

70. *M. nigra hirta*, elytrorum margine aureo. *Gen. Inf. Lynce.*
Mant. 210. *
 Habitat ad Cap. bon. sp. *Dom. Lee.*

71. *M. hirta supra viridis, subtus nigra.* *Gen. Inf. Mant. crinita.*
 210. *
Scarabaeus longipes scutellatus muticus atro cyaneus,
pedibus nigris, posticis elongatis uniuinguiculatis.
Linn. Syst. Nat. 2. 555. 66. *Mus. L. V.* 20.
 Habitat ad Cap. bon. sp. *Dom. Lee.*

72. *M. hirta*, capite thoraceque viridibus, elytris fuscis. *hirta.*
 Habitat in Sibiria. *Mus. Dom. Banks.*

Statura praecedentium. Caput et thorax viridia, nitida pilis albis elongatis hirta antennisque piceis. Scutellum viride. Elytra fusca pilis albis hirta margineque pilis erectis nigris ciliato. Sutura parum virefcit. Subtus pilis albis densioribus tecta. Pedes virides, nitidi.

73. *M. aurea fuluo hirta*, abdomine ferrugineo. *vulpes.*
 Habitat in Sibiria. *Mus. Dom. Banks.*

Clypeus brevis, integer, aureus margine nigricante.
 * Thorax aureus, pilis fulvis elongatis densissimis tectus. Elytra magis testacea, itidem pilis elongatis fulvis tecta. Abdomen rufum basi nigrum apice pube, forte maris, cornea, inflexa, bidentata. Pedes aurei.

74. *M. cyanea pilosa*, elytris testaceis lineis tribus albicantibus. *Syst. Ent.* 40. 40. *
Petiv. Gazoph. tab. 11. fig. 12.
Voet. Scarab. tab. 5. fig. 35.
 Habitat in Indiis. *Mus. Brit.*

5. TRICHIVS.

- fasciatus*. 1. *T. niger* tomentoso flavus, elytris fasciis tribus nigris abbreviatis. *Syst. Ent.* 40. 1.
Scarabaeus fasciatus scutellatus muticus niger tomentoso flavus, elytris fasciis duabus luteis coadunatis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 556. 70. *Fu. Sv.* 395.
Scarabaeus niger hirsuto flavus, elytris luteis, fasciis tribus nigris interruptis. *Geoff. Inf.* 1. 80. 16.
Drury Inf. 1. tab. 36. fig. 2.
Schaeff. Icon. tab. 1. fig. 4.
Atl. nidros. 4. tab. 16. fig. 2.
Voet. Scar. tab. 5. fig. 43.
Degeer Inf. 4. tab. 10. fig. 19.
 Habitat in Europa boreali in floribus umbellatarum frequens.
- indus*. 2. *T. thorace* hirsuto, elytris lividis fusco maculatis. *Syst. Ent.* 40. 2.
Scarabaeus Indus. *Linn. Syst. Nat.* 2. 556. 71. *Mus. Lud. Vlr.* 27.
 Habitat in Indiis.
 Cetoniis affinis videtur.
- bibens*. 3. *T. capite* thoraceque viridi aeneis pilosis, elytris testaceis viridi nitentibus. *Syst. Ent.* 40. 3. *
 Habitat in America. *Dom. Tunstall.*
- hemipterus*. 4. *T. thorace* tomentoso, rugis duabus longitudinalibus, elytris abbreviatis. *Syst. Ent.* 41. 4.
Scarabaeus hemipterus scutellatus muticus, thorace tomentoso rugis duabus longitudinalibus marginato, elytris abbreviatis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 555. 63.
Scarabaeus ater depressus et squamosus, maculis albis variegatus, elytris abbreviatis, femina aculeo ani. *Geoff. Inf.* 1. 78. 17.
Bergstr. Nomencl. 1. tab. 11. fig. 7.
Scarabaeus variegatus. *Scop. Ent. carn.* 28.
Voet. Scar. tab. 10. fig. 88 — 90.
 Habitat in Europa. Larva in ligno, imago in floribus. Femina aculeo brevis, rigido ani.

5. T. glaber cyaneus, elytris lunulis duabus albis. *Syst. lunulatus.*
*Ent. 41. 5. **
 Habitat in Carolina. *Mus. Brit.*
6. T. viridis pubescens, ano albo bimaculato. *Syst. Ent. viridulus.*
*Append. 820. **
 Habitat in India. *Mus. Dr. Hunter.*
7. T. capite thoraceque aeneis villosis, elytris testaceis *piger.*
 albo maculatis. *Syst. Ent. 41. 6. **
 Habitat in America boreali. *Mus. Britann.*
8. T. thorace nigro, triangulo albo, elytris testaceis, *Delta.*
 puncto fusco. *Syst. Ent. 41. 7. **
Scarabaeus Delta scutellatus muticus flavus, thorace
atro, triangulo flavo, elytris testaceo flavis nigro
maculatis. Forst. Cent. 1. 7. 7.
Scarabaeus Delta. Drury Inf. 2. tab. 30. fig. 1. 2.
 Habitat in Americae floribus.
9. T. pubescens, thorace fulvo nigro lineato, elytris te- *lineatus.*
 staceis, futura fulva. *Syst. Ent. App. 820. **
 Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*
10. T. hirtus fuscus, elytris subtetaceis. *nigripes,*
 Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*
 Statura omnino praecedentium. Caput et thorax nigra,
 hirta. Elytra testacea margine apicis interdum cine-
 reo. Abdomen cinereum pilis albidis hirtum. Pe-
 des nigri.
11. T. supra glaber cinereo maculatus, capite thoraceque *macula-*
 nigris, elytris piceis. *tus.*
 Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*
 Statura praecedentis. Caput nigrum, immaculatum
 clypeo apice emarginato. Thorax glaber, ater, mar-
 gine tenuissimo punctisque vtrinque duobus cinereis.
 Elytra picea cinereo maculata. Subtus cinereo pu-
 bescens abdominis apice flavescente. Pedes nigri ti-
 biis posticis brevibus, truncatis.

6. CETONIA.

- micans*. 1. *C. viridis nitens*, clypeo porrecto recurvo bifido, tibiis anticis ferratis. *Syst. Ent.* 42. 1. *
Scarabaeus micans. *Drury Inf.* tab. 32. fig. 3.
 Habitat in Africa, Sierra Leon.
- chinensis*. 2. *C. aenea*, clypeo emarginato subspinoso, thorace postice lobato, elytris acuminatis. *Syst. Ent.* 42. 2. *
Scarabaeus Chinensis. *Forst. Cent. Inf.* 2. 2.
Voet. Scar. tab. 5. fig. 40.
 Habitat in China. *Mus. Dom. Banks.*
- nigrita*. 3. *C. glabra atra*, clypeo emarginato subspinoso, thorace postice lobato. *Syst. Ent.* 43. 3. *
Hermann. Mus. pag. 17. 257.
Petiv. Gazoph. tab. 28. fig. 3.
 Habitat Ceylonae. *Mus. Britann.*
- aurata*. 4. *C. aurata*, segmento abdominis primo lateribus videntatis, elytris albo maculatis. *Syst. Ent.* 43. 4.
Scarabaeus auratus scutellatus muticus auratus, segmento abdominis primo lateribus videntatis, clypeo planiusculo. *Linn. Syst. Nat.* 2. 557. 78. *Fn. Sv.* 400.
Scop. carn. 17.
Scarabaeus viridi aeneus, thoracis parte prona antice prominente. *Geoff. Inf.* 1. 73. 5.
Scarabaeus arboxeus viridis f. *Scarabaeus auratus* dictus. *Frisch. Inf.* 12. 25. tab. 3. fig. 1.
Scarabaeus maior, corpore breuiore, alarum elytris et thoracis tegmine colore viridi splendidibus. *Raj. Inf.* 76. 7.
Scarabaeus auratus. *Roef. Inf.* 2. *Scarab.* 1. tab. 2.
Scarabaeus Smaragdus scutellatus viridi aureus, elytris glabris, lineis transversis albidis, pectore porrecto, lateribus videntato. *Degeer Inf.* 4. 279. 25. tab. 11. fig. 1.
Bergstraeff. Nomencl. 1. 14. 5. 6. 7. tab. 2. fig. 5. 6. 7.
Schaeff. Icon. tab. 26. fig. 2. 3. 7.
 tab. 50. fig. 8. 9.
Voet. Scar. tab. 1. fig. 1. 2. 3.
Drury Inf. 1. tab. 33. fig. 1.

Habitat in Europae lignis putrescentibus, formicarum aceruis larua, imago in floribus.

Imago tacta per anum eicit liquorem foetidissimum.

Variat magnitudine et colore.

5. *C. nigra* obscura, corpore subtus nitidiore. *Morio.*
Scarabaeus lugubris. Voet. *Scarab.* tab. 2. fig. 14.
 Habitat in Europa australi, Italia. *Dr. Allioni.*
 Nimis affinis videtur *C. auratae*, at tota nigra.
6. *C. aurata*, abdomine postice albo punctato, elytris rugosis. *Syst. Ent.* 43. 5. *nobilis.*
Scarabaeus nobilis scutellatus muticus auratus, abdomine postice albo punctato. *Linn. Syst. Nat.* 2. 558. 81. *Fn. Sv.* 401.
Scarabaeus viridis nitens, thorace infra aequali, non prominente. *Geoff. Inf.* 1. 73. 6.
Scarabaeus viridi aeneus, thorace fulcato, elytris rugosis. *Vdm. Diss.* 1.
Scarabaeus auratus secundus. *Roef. Inf.* 2. *Scarab.* 1. tab. 3. fig. 1 — 5.
Scarabaeus viridulus scutellatus aureo viridis nitidus, elytris rugosis, abdomine postice albedine maculato, pectore mutico. *Degeer Inf.* 4. 297. 26.
Schaeff. Icon. tab. 66. fig. 5.
Voet. Scar. tab. 4. fig. 28.
 Habitat larua in Europae ligno putrescente, imago in floribus praesertim umbellatis.
 Larua grisea, capite sanguineo, pedibus flavescentibus.
7. *C. nigra*, thorace vtrinque puncto baseos elytrisque duobus flavis. *Syst. Ent.* 44. 6. * *Spunctata.*
Scarabaeus variabilis scutellatus muticus laevis opacus ater, elytris albo punctatis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 558. 79. *Fn. Sv.* 402.
Scarabaeus albo punctatus scutellatus niger, corpore depresso. *Degeer Inf.* 4. 301. 29. tab. 10. fig. 22.
Roef. Inf. 2. *Scarab.* 1. tab. 2. fig. 8. 9. at nostra omnino nigra.
Schaeff. Icon. tab. 198. fig. 8.
Voet. Scar. tab. 5. fig. 42.
 Habitat in Germania.

- 4 puncta- 8. *C. nigra*, thorace punctis quatuor albis.
 ta. Habitat in agro Pedemontano. *Dr. Allioni*.
 Magnitudo et statura omnino *C. Morionis*, at puncta qua-
 tuor minutissima alba in thorace.
- nitida. 9. *C. thorace* postice lobato, capite spina recumbente,
 sterno cornuto. *Syst. Ent.* 44. 7.
Scarabaeus nitidus scutellatus muticus, thorace postice
 lobato, capite spina recumbente, sterno porrecto.
Linn. Syst. Nat. 2. 552. 51. *Mus. Lud. Vlr.* 20.
Scarabaeus scutello minimo, viridis obscurus, thora-
 ce angulato, elytrisque flavo marginatis, capite spi-
 na recumbente. *Degeer Inf.* 4. 321. 16. tab. 19.
 fig. 8. 9.
Scarabaeus nitidus. *Drury Inf.* 1. tab. 33. fig. 5. 6.
Roef. Inf. 2. *Scarab.* 1. tab. B. fig. 4.
Voet. Scar. tab. 3. fig. 23.
 Habitat in America, Carolina.
- Chrysis.* 10. *C. scutello* elytris dimidio brevior, sterno porrecto,
 corpore viridi. *Syst. Ent.* 44. 8.
Scarabaeus Chrysis scutellatus muticus, sterno porre-
 cto, scutello elytris dimidio brevior. *Linn. Syst.*
Nat. 2. 551. 49. *Mus. Lud. Vlr.* 21.
Scarabaeus scutello longissimo, corpore ovato conue-
 xo, supra viridi nitente, infra viridi aeneo, pecto-
 re porrecto. *Degeer Inf.* 4. 319. 12. tab. 19. fig. 4.
Gron. Zooph. 428. tab. 15. fig. 8.
Sulz. Hist. Inf. tab. 1. fig. 10.
Voet. Scar. tab. 8. fig. 63.
 Habitat in America australiori.
- Lanius.* 11. *C. exscutellata* livida nigro maculata, sterno antice cor-
 nuto. *Syst. Ent.* 44. 9. *
Scarabaeus Lanius exscutellatus muticus ruber, ad-
 spersus punctis nigris. *Linn. Syst. Nat.* 2. 557. 77.
Scarabaeus e rubro cinereus minor, maculis nigris
 notatus. *Sloane Jam.* 2. tab. 237. fig. 7. 8.
Drury Inf. 1. tab. 33. fig. 8.
Voet. Scar. tab. 5. fig. 44.
 Habitat in America meridionali.

12. *C. scutellata rubra*, elytris nigro maculatis. *Carnifex.*
Scarabaeus rufus, elytris nigro maculatis. *Roef. Inf.*
 2. *Scarab.* 1. tab. B. fig. 3.
Voet. Scar. tab. 2. fig. 16.
 Habitat - - - - *Muf. Dom. Banks.*
 Differt manifeste a *C. Lanio*. Caput rufum ore nigro.
 Thorax punctatus, rufus, vix maculatus margine
 baseos submarginato. Scutellum distinctum, trian-
 gulare nigrum. Elytra substriata, rubra nigro ma-
 culata. Subtus atra sterno vix porrecto, obtuso ru-
 fo. Abdomen lineis tribus punctorum rubrorum
 intermediis maioribus. Pedes antici nigri. Femora
 quatuor postica rufa nigro marginata. Tibiae ni-
 grae apice rufae.
13. *C. picea*, abdominis segmentis margine albis, clypeo *tristis.*
 emarginato, sterno cornuto. *Syst. Ent.* 45. 10. *
 Habitat in America boreali. *Muf. Dr. Hunter.*
14. *C. ferrugineo flavescens*, elytris virescentibus, ster- *smarag-*
 no cornuto. *Syst. Ent.* 45. 11. * *dula.*
 Habitat in America. *Muf. Dr. Hunter.*
15. *C. aeneo atra*, thorace inaequali, scutello fulco lon- *Eremita.*
 gitudinali. *Syst. Ent.* 45. 12.
Scarabaeus Eremita scutellatus muticus, aeneo ater,
 thorace inaequali, scutello fulco longitudinali. *Linn.*
Syst. Nat. 2. 556. 74. *Scop. Ent. carn.* 15.
Scarabaeus coriarius scutellatus aeneo niger nitidus,
 corpore planiusculo glabro, thorace futuris binis to-
 tidemque tuberculis, *Degeer Inf.* 4. 300. 28. tab.
 10. fig. 22.
Scarabaeus magnus piceus. *Roef. Inf.* 2. *Scarab.* 1.
 tab. 3. fig. 8.
Bergstr. Nomencl. 1. tab. 10. fig. 1.
Schaeff. Icon. tab. 26. fig. 1.
Scarabaeus lugubris. *Voet. Scar.* tab. 3. fig. 21.
 Habitat in truncis putridis Pyri, Salicis.
 Recens odorem spargit corii Ruffici.
16. *C. thorace lineis quatuor albis*, elytris viridibus, ab- *fascicula-*
 dominis incisuris barbatis. *Syst. Ent.* 45. 13. *ris.*

Scarabaeus fascicularis scutellatus muticus, thorace lineolis quatuor albis, elytris viridibus, abdominis incisuris barbatis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 557. 75. *Mus. Lud. Vlr.* 26.

Scarabaeus fascicularis. *Drury Inf.* 1. tab. 33. fig. 2.
Voet. Scar. tab. 3. fig. 17.

Habitat in Africa.

aulica. 17. *C. viridis nitida*, thoracis margine elytrorumque maculis albis.

Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*

Magna, caput viride punctis duobus parvis albis ante oculos. Clypeus emarginatus. Thorax viridis, nitidus margine tantum exteriori albo. Scutellum triangulare, immaculatum. Elytra obtusa, viridia, nitida, macula baseos, quinque marginalibus, duabus dorsalibus et unica apicis albis. Subtus viridis pectore villosa, albo. Abdomen lineis quatuor macularum albarum. Ultimum abdominis segmentum prominet maculis duabus magnis albis. Pedes virides femoribus posticis macula alba.

capensis. 18. *C. hirta rufa albo punctata.* *Syst. Ent.* 46. 14.

Scarabaeus capensis scutellatus muticus rufus, hirtus, adpersus punctis albis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 556. 73. *Mus. Lud. Vlr.* 30.

Scarabaeus albopunctatus scutellatus obscure rubro purpureus capite nigro, thorace linea alba marginali, elytrisque punctis albis. *Degeer Inf.* 7. 640. 40. tab. 48. fig. 2.

Scarabaeus capensis pilosus vaginis rubris plurimis punctulis albis adpersus. *Petiv. Gazoph.* tab. 8. fig. 6.

Scarabaeus rufus albo punctatus. *Roef. Inf.* 2. *Scarab.* 1. tab. B. fig. 6.

Drury Inf. 1. tab. 33. fig. 3.

Voet. Scar. tab. 2. fig. 11.

Habitat in Africa.

signata. 19. *C. thorace nigro, margine albo, elytris testaceis, sutura margineque nigris.* *Syst. Ent. App.* 818. *

Scarabaeus folium mortuum. Voet. Scarab. tab. 2.
fig. 13.

Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*

20. *C. glabra atra*, thoracis elytrorumque marginibus ru- *marginata.*
fis. *Syst. Ent.* 46. 15. *

Scarabaeus marginatus. Drury *Inf.* 2. tab. 32. fig. 1.

Voet. Scar. tab. 1. fig. 4.

Habitat in Sierra Leon Africae. *Mus. Dom. Banks.*

21. *C. viridis*, thoracis elytrorumque margine ferrugineo. *marginella.*
Syst. Ent. 46. 16. *

Habitat in Sierra Leon Africae. *Mus. Dom. Tunstall.*

22. *C. nigra*, lineola flava a capite ad scutellum ducta, *Syst. lineola.*
Ent. 46. 17.

Scarabaeus lineola. Linn. *Syst. Nat.* 2. 552. 53.

Scarabaeus parvus niger, lituris flavo brunneis. *Roef.*
Inf. 2. *Scarab.* 1. tab. B. fig. 7.

Scarabaeus scutellatus niger nitidus flavo maculatus,
capite thoraceque lineâ flava, thoracis margine fla-
uo. *Degeer Inf.* 4. 320. 13. tab. 19. fig. 5.

Voet. Scarab. tab. 9. fig. 81.

Habitat in America.

Variat rarius elytris albo maculatis.

23. *C. fusco viridis*, thorace elytrisque margine punctis- *sinuata.*
que duobus flavis. *Syst. Ent. App.* 818. *

Scarabaeus punctato marginatus. *Degeer Inf.* 7. 639.
38. tab. 47. fig. 20.

Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*

24. *C. nigra* thoracis margine elytrisque testaceis, elytris *fasciata.*
futura fasciaque dentata nigris. *Syst. Ent.* 46. 18. *

Habitat Alexandriae. *Dom. Prof. Forstkahl.*

25. *C. nigra*, thorace ferrugineo, elytris nigris subpur- *thoraci-*
purascentibus. *Syst. Ent.* 47. 19. * *ca.*

Habitat Alexandriae. *Prof. Forstkahl.*

26. *C. testacea*, thorace lineis punctisque duobus, elytris *oliuacea.*
maculis quatuor transuersis nigris. *Syst. Ent.* 47. 20. *

Habitat in Sierra Leon Africae. *Mus. Dom. Tunstall.*

- picca*. 27. *C. nigra*, thorace quinquelineato, elytris acuminatis albo maculatis. *Syst. Ent.* 47. 21. *
Habitat in Oriente. *Prof. Forskahl.*
- trilineata*. 28. *C. nigra*, thorace lineis tribus, elytris fascia flexuosa scutelloque albis. *Gen. Inf. Mant.* p. 210. *
Habitat ad Cap. bon. sp. *Dom. Lee.*
- 5lineata*. 29. *C. nigra*, thorace quinquelineato, elytris albo maculatis clypeo reflexo spinaque incumbente.
Habitat - - - - *Mus. Dom. Banks.*
Caput nigrum, immaculatum clypeo apice eleuato, erecto et in medio spina incumbente, acuta. Thorax niger lineis impressis, albis. Scutellum triangulum margine lineolaque baseos albis. Elytra fusca albo maculata futura lineisque duabus eleuatis rubris interiori abbreviata. Abdomen atrum vtrinque linea e punctis albis.
- limbata*, 30. *C. nigra*, thoracis margine ferrugineo. *Syst. Ent.* 47. 22. *
Habitat in Aegypto. *Dom. Prof. Forskahl.*
- splendida*, 31. *C. cyanea*, thoracis margine elytrisque testaceis. *Syst. Ent.* 47. 23. *
Voet. Scar. tab. 8. fig. 62.
Habitat in India.
- elegans*, 32. *C. viridis* nitidissima, elytrorum futura punctoque apicis atris.
Habitat in Coromandel. *Mus. Dom. Banks.*
Magnitudo omnino *C. auratae*. Capitis clypeus viridis nitidus apice subreflexo spinaque minutissima incumbente. Thorax viridis, nitidissimus, immaculatus. Scutellum triangulare, concolor. Elytra viridia, nitidissima futura punctoque apicis gibbo atris, ob coloris nitorem vix conspicuis. Subtus concolor primo abdominis segmento margine testaceo. Sternum prominens, subrecuruum, obtusum.
Variat rarius puncto adhuc baseos nigro.
- 4maculata*, 33. *C. viridis* fuluo micans, elytris maculis duabus nigris, sterno obtuso.
Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*
Capitis

Capitis clypeus obtusus, submarginatus, fulvus. Thorax, elytra, scutellum, viridia, laevia fulvo colore micantia. Punctum nigrum ad basin et alterum ad apicem elytrorum. Subtus viridis, nitens auro obscuro. Femora vtrinque linea fulva.

34. *C. cuprea nitida*, thorace scutello elytrisque viridibus. *Syst. Ent.* 48. 24. *
 Habitat - - - - *Mus. Dom. Tunstall.*
35. *C. aenea nitens* capitis spina incumbente, sterno porrecto, elytris punctis nigris striatis. *Syst. Ent.* 48. 25. *
Scarabaeus africanus. *Drury Inf.* 2. tab. 30. fig. 4.
 Habitat in Africa, Sierra Leon. *africana.*
36. *C. thorace nigro*, margine rufo, elytris aeneo nitidis, futura nigra. *Syst. Ent.* 48. 26. *
 Habitat in Africa. *Mus. Dom. Drury.* *futuralis.*
37. *C. viridi aenea hirta*, elytris testaceis, vitta media nigra futuraque aenea. *Syst. Ent. App.* p. 819. *
Voet. Scar. tab. 7. fig. 60.
 Habitat in America. *Mus. Dom. Banks.* *vittata.*
38. *C. aenea nitidissima*, abdominis ultimo segmento prominente quadripunctato. *Syst. Ent.* 48. 27. *
Scarabaeus tarchesinus. *Voet. Scarab.* tab. 3. fig. 24. ?
 Habitat - - - - *Mus. Dom. Banks.* *fulgida.*
39. *C. viridis nitidissima fusco micans immaculata*,
 Habitat Surinami. *Mus. Dom. Banks.* *Iris.*
 Corpus magnitudine praecedentis, totum viride, nitidissimum, at fusco colore micans. Capitis clypeus emarginatus, at absque vlla spina. Thorax elytraque subtilissime punctata. Sternum porrectum, breue, orbiculatum.
40. *C. atra nitida*, clypeo truncato reflexo, sterno obtuso. *Syst. Ent.* 49. 28. *
Scarabaeus gagates. *Forster, Cent. Inf.* 6. 6.
 Habitat ad Sierra Leon Africae. *Mus. Dom. Banks.* *gagates.*

- tetrada-* 41. *C. atra*, scutello elytris dimidio breuiore, pedibus
Æyla. triunguiculatis, pollice fixo. *Syst. Ent.* 49. 29.
Scarabæus tetradaÆylus scutellatus muticus niger, pe-
dibus triunguiculatis, pollice fixo. *Linn. Mant.* 530.
Scarabæus tetradaÆylus. *Drury Inf.* 1. tab. 33. fig. 7.
Scarabæus maior niger. *Sloan. Lam.* 2. 237. fig. 2.
Habitat in America meridionali.
- lurida.* 42. *C. nigro aenea*, elytris lineis duabus eleuatis albo-
que maculatis. *Syst. Ent.* 49. 30. *
Habitat in Brasilia. *Mus. Dom. Banks.*
- aurichal-* 43. *C. aenea opaca*, elytris acuminate albe maculatis.
cea. *Syst. Ent.* 49. 31. *
Habitat ad Suratte Indiae. *Mus. Britann.*
- philippen-* 44. *C. aenea nitida*, thorace margine punctisque duobus
sis. albis, elytris maculatis acuminatis. *Syst. Ent.* 49.
32. *
Petiv. Gazoph. tab. 26. fig. 7.
Habitat in Insulis Philippinis. *Mus. Britann.*
- stolata.* 45. *C. viridi fusca*, thorace margine punctisque, elytris
fascia media maculisque niueis postice acuminatis.
Syst. Ent. 50. 33. *
Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
- maculata.* 46. *C. aenea nitida*, thorace vtrinque macula, elytris
plurimis albis, sterno obtuso.
Antheus. Voet. Scarab. tab. 1. fig. 8.
Habitat in Coromandel. *Mus. Dom. Banks.*
Statura *C. acuminatae*. Caput aeneum, immaculatum.
Thorax aeneus, nitidus vtrinque macula magna si-
nuata alba. Elytra laeuia, aenea albo maculata, qua-
rum anterior maior fere fasciam constituit apice vix
acuminata. Subtus cuprea pectore vtrinque macula
magna alba. Abdomen lineis quatuor punctorum
alborum. Sternum vix prominet obtusum.
- acumina-* 47. *C. obscure aenea pallido maculata*, elytris acuminatis.
ta. *Syst. Ent.* 50. 34. *
Voet. Scar. tab. 4. fig. 37.
Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*

48. *C. nigra*, elytris viridibus nitidis, thoracis margine haemor-
 anoque rufis. *Syst. Ent. App.* 819. * *rhoidalis.*
 Habitat ad Cap. bon. sp. *Dr. Hunter.*
49. *C. nigra pubescens*, elytris disco rufo, *Syst. Ent.* *areata.*
 50. 35. *
 Habitat in Virginia. *Mus. Britann.*
50. *C. nigricans hirta*, elytris pallido maculatis, thorace *hirta.*
 carinato. *Syst. Ent.* 50. 36.
Scarabaeus hirtellus scutellatus muticus hirtus, testaceo
 nigricans, elytris pallido maculatis. *Linn. Syst. Nat.*
 2. 556. 69.
Scarabaeus hirtus. *Scop. Ent. carn.* 8.
Scarabaeus hirtus. *Pod. Inf.* 21.
Voet. Scar. tab. 4. fig. 34.
- β. *Scarabaeus squalidus* scutellatus muticus niger hir-
 tus, thorace subcarinato. *Linn. Syst. Nat.* 2. 556. 68.
Scarabaeus squalidus. *Scop. Ent. carn.* 13.
Voet. Scar. tab. 4. fig. 33.
 Habitat in Europa australiori.
51. *C. clypeo emarginato nigra albo maculata*, abdomine *stictica.*
 subtus punctis quatuor albis. *Syst. Ent.* 51. 37.
Scarabaeus sticticus scutellatus muticus nigroglaber,
 punctis albis sparsis, abdomine subtus punctis albis
 quaternis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 552. 54.
Scarabaeus nigro coeruleescens maculis albis sparsis, or-
 dine macularum abdominalium longitudinali. *Geoff.*
Inf. 1. 79. 14.
Raj. Inf. 104. 8.
Scarabaeus funestus. *Scop. Ent. carn.* 7.
 Habitat in Galliae Carduis.
52. *C. nigra*, thorace rufo nigro maculato, elytris nigris *versicolor.*
 albo punctatis, dorso rufo. *Syst. Ent.* 51. 38. *
Scarabaeus Thebanus. *Acta Societ. Berol. Phys.* 4.
 tab. 1. fig. 8.
 Habitat in Aegypto. *Prof. Forskahl.*
 Variat maculis atris thoracis albo pupillatis et coecis,
 53. C.

- lugubris.* 53. *C. glabra atra*, elytris macula laterali anoque albis.
Syst. Ent. Append. 819. *
 Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*
- histrion.* 54. *C. testacea*, capite thoracis lineis duabus elytrorum
 futura maculisque tribus nigris. *Syst. Ent.* 51. 39. *
 Habitat in Aegypto. *Dom. Prof. Forskahl.*
- variogata.* 55. *C. atra*, thorace margine elytrisque maculis sparsis al-
 bis. *Syst. Ent.* 51. 40. *
 Habitat Tranquebariae. *Dr. Koenig.*
- hottentotta.* 56. *C. atra glabra*, elytris postice punctis duobus albis.
Syst. Ent. 52. 47. *
 Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*

7. H I S T E R.

- maior.* 1. *H. ater*, elytris substriatis, thoracis marginibus ciliatis.
Syst. Ent. 52. 1. *Linn. Syst. Nat.* 2. 566. 2.
Voet. Scar. tab. 31. fig. 6.
 Habitat in Africa,
- unicolor.* 2. *H. ater*, elytris oblique striatis. *Syst. Ent.* 52. 1. *Linn.*
Syst. Nat. 2. 567. 3. *Fn. Sv.* 440.
Attelabus totus niger, elytris laevis nonnihil striatis. *Geoff. Inf.* 1. 94. tab. 1. fig. 4.
Scarabaeus antennis globulosis, media parte in anu-
 lum flexis, septimus. *Raj. Inf.* 91. 7.
Hister niger nitidus, elytris striatis. *Degeer Inf.* 4. 342.
 1. tab. 12. fig. 12.
Hister unicolor. *Scop. Ent. carn.* 30.
Aët. nidros. 4. tab. 16. fig. 4.
Schaeff. Icon. tab. 42. fig. 10.
Sulz. Hist. Inf. tab. 2. fig. 8.9.
 Habitat in Europae, Americae arena, stercore.
- cyaneus.* 3. *H. thorace aeneo*, elytris coerulescentibus. *Syst. Ent.*
 52. 3. *
 Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

4. *H. ferrugineus*, elytris substriatis. *Syst. Ent.* 52. 4. * *brunneus*.
Habitat in Sueciae stercore. *Mus. Dom. Banks.*
5. *H. ater*, elytris laeuissimis. *Syst. Ent.* 53. 5. *Linn. Syst. pygmaeus*.
Nat. 2. 567. 4. *Fn. Sv.* 441.
Hister nigro fuscus, elytris dimidio striatis. *Degeer*
Inf. 4. 344. 4.
Schaeff. Icon. tab. 42. fig. 10.
Habitat in Europa boreali.
Nimis affinis *H. vnicolori*.
6. *H. ater*, elytris crenato striatis, striis interioribus ab- *abbrevia-*
breuiatis. *Syst. Ent.* 53. 6. * *tus*.
Habitat in America boreali. *Dom. Drury*.
Statura omnino *H. pygmaei*.
7. *H. ater*, elytris postice rubris. *Syst. Ent.* 53. 7. *Linn. 2 macula-*
Syst. Nat. 2. 567. 5. *Fn. Sv.* 442. *tus*.
Attelabus niger, elytrō singulo macula rubra. *Geoff.*
Inf. 1. 95. 2.
Hister fimetarius. *Scop. Ent. carn.* 31.
Coccinella atra glabra, elytris abdomine breuioribus,
maculis duabus rubris. *Vdm. Diff.* 80.
Hister niger nitidus, elytris singulis macula obscura
rubra. *Degeer Inf.* 4. 343. 2.
Schaeff. Icon. tab. 3. fig. 9.
Elem. tab. 24. fig. 1.
Voet, Scar. tab. 31. fig. 1.
Habitat in Europae stercore bouino.
8. *H. ater*, elytris bimaculatis. *Syst. Ent.* 53. 8. *Linn. 4 macula-*
Syst. Nat. 2. 567. 6. *Fn. Sv.* 443. *tus*.
Scarabaeus ouatus niger glaber maculis duabus rubris
in singulo elytro. *Gad. satag.* 76.
Hister niger nitidus, elytris singulis maculis binis ob-
scure nitidis. *Degeer Inf.* 4. 344. 3.
Schaeff. Elem. tab. 24. fig. 2.
Voet, Scar. tab. 31. fig. 3.
Habitat in Europa boreali.
Maculae elytrorum interdum cohaerent in vnicam lu-
natam.

- aeneus.* 9. *H. aeneus*, elytris basi striatis apice punctatis. *Syst. Ent.* 53. 9. *
Attelabus nigro cupreus, capite nonnihil prominulo.
Geoff. Inf. 1. 95. 3.
 Habitat in Anglia, Gallia.
- detritus.* 10. *H. ater nitens*, elytris piceis apice obscuris. *Syst. Ent.* 53. 10. *
 Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

8. A P A T E.

- murica-*
tus. 1. *A. elytris reticulatis postice retusis dentatis*, thorace muricato gibbo. *Syst. Ent.* 54. 1. *
Dermestes muricatus niger, elytris postice retusis, dentatis, thorace muricato. *Linn. Syst. Nat.* 2. 562. 6.
Ligniperda terebrans. *Pall. Spicileg. Zoolog. fasc. IX.* tab. 1. fig. 3.
 Habitat in Americae meridionalis lignis.
- Monachus.* 2. *A. elytris obtusis*, thorace gibbo truncato. *Syst. Ent.* 54. 2. *
Ligniperda cornuta. *Pall. Spicil. Zoolog. fasc. IX.* 8. tab. 1. fig. 4.
 Habitat in Americae meridionalis lignis. *Dom. Drury.*
- Iesuita.* 3. *A. elytris integris variolosis*, thorace antice truncato. *Syst. Ent.* 54. 3. *
 Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
- capucinus.* 4. *A. elytris integris nigris*, thorace antice scabro. Habitat in Coromandel. *Mus. Dom. Banks.*
 Affinis *A. minuto* at paullo maior et elytra omnino nigra. Thorax ater antice denticulis eleuatis numerosis. Elytra laeuius, nigra, apice retusa.
- minutus.* 5. *A. niger*, elytris integris piceis, thorace antice scabro. *Syst. Ent.* 54. 4. *
 Habitat in noua Zelandia. *Mus. Dom. Banks.*

9. D E R M E S T E S.

1. *D. niger*, elytris antice cinereis. *Syst. Ent.* 55. 1. *Linn.* *lardarius*,
Syst. Nat. 2. 561. 1. *Fn. Sv.* 408. *Geoff. Inf.* 1. *rius*,
 101. 5.
Scarabaeus antennis clauatis, clavis in annulos diuifis.
Raj. Inf. 107. 1.
Scarabæus lardi paruus fascia transuersali elytrorum
 nigrofufcorum albida. *Frisch. Inf.* 5. 25. tab. 9.
Dermestes niger, elytris antice cinereis nigro puncta-
 tis. *Degeer Inf.* 4. 192. 1. tab. 7. fig. 15.
Schaeff. Elem. tab. 7. fig. 1. 2.
Icon. tab. 42. fig. 3.
 Habitat in Europa.
 Larua ouata, cinerea, hirsuta degit in animalibus diu
 asseruatis, lardo, carnibus, repositoriis culinariis et
 mufcis infesta.
 Imago scybala inter vorandum ex ano protrudit conca-
 tenata, pendula. Olea et pinguedines expetit reli-
 quis insectis letalia.
 Varietatem misit de Hattorf elytris antice ferrugineis;
 vix tamen distincta species videtur.
2. *D. niger*, elytris antice testaceis, abdomine albo. *Syst. carniuo-*
Ent. 55. 2. * *rus*.
 Habitat in noua Hollandia, Zelandia. *Muf. Dom. Banks.*
3. *D. niger*, ore ferrugineo. *Syst. Ent.* 55. 3. * *cadaueri-*
 Habitat in Infula St. Helenae. *Muf. Dom. Banks.* *rius*.
 Nimis praecedenti affinis.
4. *D. niger* glaber, pedibus piceis. *macella-*
 Habitat in Germania. *Dom. de Hattorf.* *rius*.
 Statura praecedentium, at totus niger glaber pedibus
 folis piceis.
5. *D. niger*, elytris puncto albo. *Syst. Ent.* 55. 4. *Pellio*.
Dermestes Pellio niger coleopteris punctis albis binis.
Linn. Syst. Nat. 2. 562. 4. *Fn. Sv.* 411. *Geoff. Inf.*
 1. 100. 4. *Scop. Ent. carn.* 37.
Dermestes 2punctatus ouatus niger, elytris singulis
 puncto albo. *Degeer Inf.* 4. 197. 3.

Scara-

Scarabæus parvus corpore breui fusco, elytris puncto albo notatis. *Raj. Inf.* 85. 35.

Scarabæus lardi, larua brunnea, cauda fetosa longiori. *Frijch. Inf.* 5. 22. tab. 8.

Schaeff. Icon. tab. 42. fig. 4.

Habitat in Pellitiis, Lardo.

Elytra colore variant, mox obscuriora, mox dilucidiora.

Larua oblonga pilosa, cauda fetosa.

vndatus. 6. *D. oblongus niger*, elytris fascia alba lineari duplici. *Syst. Ent.* 56. 5. *Linn. Syst. Nat.* 2. 562. 3. *Fn. Sv.* 410.

Dermestes oblongus niger, elytris fascia alba duplici transuersa vndata. *Degeer Inf.* 4. 199. 5.

Schaeff. Icon. tab. 157. fig. 7. a. b.

Habitat in Europae putridis, suffocatis.

zoguttatus. 7. *D. oblongus ater*, punctis viginti albis. *Syst. Ent.* 56. 6. *

Dermestes 4 punctatus. *Sulz. Hist. Inf.* tab. 2. fig. 3.

Habitat Halae Saxonum. *Schaller.*

bicolor. 8. *D. oblongus niger* subtus testaceus, elytris striatis.

Habitat in Germania. *Dom. de Hattorf.*

Statura omnino *D. murini*. Caput nigrum. Thorax niger, glaber margine subtestaceo. Elytra nigra, immaculata, striata. Pedes et abdomen testacea.

vulpinus. 9. *D. oblongus laevis niger*, thoracis lateribus cinereo villosis, subtus albidus.

Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*

Nimis affinis *D. carniuro* eiusdemque magnitudinis.

Corpus supra nigrum, capite thoracisque lateribus cinereo tomentosus. Scutellum testaceo villosum.

Elytra glabra, laeuis, nigra immaculata. Pectus et abdomen alba. Pedes nigri.

murinus. 10. *D. oblongus tomentosus*, nigro alboque nebulosus, abdomine niueo. *Syst. Ent.* 56. 7.

Dermestes murinus tomentosus oblongus fusco cinereoque nebulosus, scutello luteo. *Linn. Syst. Nat.* 2.

563. 18. *Fn. Sv.* 426. *Geoff. Inf.* 1. 102. 7.

Dermes-

Dermestes nebulosus niger cinereo nebulosus, corpore fuscus albido cinerascens, scutello hirsuto rufo. *Degeer Inf.* 4. 197. 2.

Scarabaeus Erucae nigrae glabrae pinguedinis. *Frisch. Inf.* 4. 34. tab. 18.

Schaeff. Icon. tab. 42. fig. 1. 2.

Voet. Scar. tab. 31. fig. 11.

Habitat in Europa frequens cadaveribus victitans.

Larva oblonga brunnea, ore atro.

11. *D. oblongus*, tomentosus fusco cinereoque nebulosus, abdomine fusco. *Syst. Ent.* 56. 8. * *tessellatus.*

Dermestes flavescens pilosus oculis nigris. *Geoff. Inf.* 1. 100. 8.

Habitat in Angliae, Galliae cadaveribus.

12. *D. elongatus* ferrugineo fuscus, oculis atris. *Syst. Ent.* *naualis.* 56. 9. *

Habitat in noua Zelandia. *Mus. Dom. Banks.*

D. murino quadruplo minor.

13. *D. nigro coeruleus*, thorace villosus, pedibus nigris. *violaceus.* *Syst. Ent.* 57. 10. *Linn. Syst. Nat.* 2. 56. 13. *Fn. Sv.* 422.

Dermestes violaceus thorace elytrisque villosis. *Scop. Ent. carn.* 67.

Clerus coeruleus oblongus nigro coeruleus nitidus, elytris punctis excavatis. *Degeer Inf.* 5. 163. 4. tab. 5. fig. 13.

Clerus nigro coeruleus. *Geoff. Inf.* 1. 304. 2.

Scarabaeus antennis clauatis 12. *Raj. Inf.* 100.

Habitat in Europae cadaveribus frequens.

14. *D. nigro coeruleus*, thorace villosus, pedibus rufis. *rufipes.* Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*

Nimis affinis *D. violaceo* et forte eius mera varietas.

Differt tantum pedibus rufis.

15. *D. violaceus*, thorace elytrorumque basi rufis. *Syst. ruficollis.* *Ent.* 57. 11. *

Habitat in India orientali. *Mus. Dom. Banks.*

Fabr. Spec. Inf.

E

16. D.

- fumatus.* 16. *D. oblongus testaceus oculis nigris.* *Syst. Ent.* 57. 12.
Linn. Syst. Nat. 2. 564. 22. *Fn. Sv.* 432. *Geoff. Inf.*
 1. 104. 12.
Dermestes Rosae. *Scop. Ent. carn.* 59.
Ips testaceo flavus, oculis nigris, elytris punctis exca-
uatis. *Degeer Inf.* 4. 195. 3.
 Habitat in Europae floribus.
- tomento-* 17. *D. oblongus villosus griseus, capite punctis duobus*
fus. *fuscis.* *Syst. Ent.* 57. 13. *
Dermestes tomentosus oblongus villosus griseo murinus,
oculis nigris, pedibus fulvis. *Degeer Inf.* 4. 199. 4.
 tab. 7. fig. 18.
 Habitat in Angliae, Sueciae floribus.
- paniceus.* 18. *D. oblongus ferrugineus, oculis rufis.* *Syst. Ent.* 57.
 14. *Linn. Syst. Nat.* 2. 564. 19. *Fn. Sv.* 431.
Scarabaeus parvus luteus panis. *Frisch. Inf.* 2. 36. tab. 8.
 Habitat in pane diutius asseruato.
 Larva ovata, alba, nitida.
- testaceus.* 19. *D. oblongus testaceus, oculis abdominis basi nigris.*
Syst. Ent. 57. 15. *
 Habitat in Belgio.
- scaber.* 20. *D. griseus, thorace elytrisque scabris.* *Syst. Ent.* 57.
 16. *
 Habitat in noua Zelandia. *Mus. Dom. Banks.*
- chinensis.* 21. *D. oblongus ferrugineus, elytris striatis.* *Syst. Ent.*
 58. 17. *
 Habitat in feminibus e China allatis.
- scanicus.* 22. *D. ater, thorace punctoque elytrorum testaceis.* *Syst.*
Ent. 58. 18. *
Dermestes scanicus fuscus, thorace testaceo. *Linn. Syst.*
Nat. 2. 564. 26. *Fn. Sv.* 437.
 Habitat in Suecia.
- limbatus.* 23. *D. fuscus, elytris punctatis, limbo cinereo.*
 Habitat in noua Zelandia. *Mus. Dom. Banks.*
 Corpus paruum, fuscum. Thorax rotundatus antice
 parum griseus. Elytra punctata, fusca limbo magno
 cinereo. Pedes nigri apice grisei.

24. *D. castaneus*, capite nigricante, thorace fusco. *Syst. fenestralis*.
Ent. 58. 19. *Linn. Syst. Nat.* 2. 563. 15. *Fn. Sv.* 423. *lis.*
Ips spinosus fusco castaneus, pedibus rufis, elytris pos-
 sice sex spinosis. *Degeer Inf.* 5. 197. 7.
Byrrhus fenestralis castaneus, elytris punctato striatis,
 oculis nigris. *Müll. Zool. Dan. prodr.* 57. 505.
 Habitat in Europa boreali, frequens in fenestris.

10. MELYRIS.

1. *M. viridis*, elytris lineis eleuatis tribus. *Syst. Ent. viridis.*
 58. 1. *
 Habitat ad Cap. bon. sp.
2. *M. niger*, elytris lineis eleuatis tribus. *niger.*
 Habitat - - - *Mus. Dom. Banks.*
 Statura omnino praecedentis, at triplo minor. Caput
 sub thorace inflexum, nigrum antennis perfoliatis.
 Thorax submarginatus margine subreflexo, niger
 antice parum prominens. Elytra nigra scabra lineis
 eleuatis tribus. Abdomen et pedes nigra.

11. BOSTRICHVS.

1. *B. niger*, elytris abdomineque rubris, thorace emargi- *Capuci-*
 nato retuso. *Syst. Ent.* 59. 1. *nus.*
Bostrichus niger, elytris rubris. *Geoff. Inf.* 1. 302. 1. tab.
 5. fig. 1.
Schaeff. Elem. tab. 28.
Sulz. Hist. Inf. tab. 2. fig. 5. 6. c.
Dermeftes capucinus niger, elytris abdomineque rubris,
 thorace emarginato retuso. *Linn. Syst. Nat.* 2. 562.
 5. *Fn. Sv.* 416.
 Habitat in Europae truncis emortuis rarius.
2. *B. piceus*, elytris apice spinoso-dentatis, antennis fla- *flavicor-*
 uis. *Gen. Inf. Mant.* 211. * *nis.*
 Habitat in America boreali.
3. *B. testaceus pilosus*, elytris striatis retusis praemorso *typogra-*
 dentatis. *Syst. Ent.* 59. 2. *phus.*

Dermestes typographus testaceus pilosus, elytris striatis retusis praemorfo dentatis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 562. 7. *Fn. Sv.* 418.

Scarabaeus antennis clauatis. *Raj. Inf.* 100. 10.

Ips pilosus fuscus, elytris postice oblique truncatis dentatis. *Degeer Inf.* 5. 193. 1. tab. 6. fig. 1. 2.

Sulz. Hist. Inf. tab. 2. fig. 4.

Aët. Holm. 14. pag. 163.

Habitat intra cortices truncorum labyrinthos pulvere repletos formans.

Variat colore testaceo et fusco.

calcographus. 4. *B. ater*, elytris praemorfo dentatis rufis. *Syst. Ent.* 59. 3.

Dermestes calcographus ater, elytris praemorfo dentatis rufis, lateribus basi que nigricantibus. *Linn. Syst. Nat.* 2. 562. 8. *Fn. Sv.* 417.

Habitat intra arborum cortices.

polygraphus. 5. *B. nigricans*, elytris glaucis obtusiusculis. *Gen. Inf. Mant.* 211. *

Dermestes polygraphus. *Linn. Syst. Nat.* 2. 562. 10. *Fn. Sv.* 420.

Ips rufo fuscus, elytris postice rotundatis. *Degeer Inf.* 5. 196. 5.

Habitat in Europa boreali sub arborum corticibus.

scolytus. 6. *B. glaber*, elytris truncatis integris, abdomine retuso. *Syst. Ent.* 59. 4. *

Scolytus. *Geoff. Inf.* 1. 310. 1. tab. 5. fig. 5. mal.

Sulz. Hist. Inf. tab. 2. fig. 13.

Schaeff. Icon. tab. 112.

Habitat sub corticibus vلمي Angliae, quas misere destruit. *Dom. Lee.*

piniperda. 7. *B. niger* subuillofus, elytris piceis integris, plantis rufis. *Syst. Ent.* 60. 5.

Dermestes piniperda niger subuillofus, elytris piceis integris, plantis rufis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 563. 11. *Fn. Sv.* 421.

Ips subuillofus niger nitidus, elytris punctis excavatis, antennis plantisque rufis. *Degeer Inf.* 5. 194. 2. tab. 6. fig. 8. 9.

Habi-

Habitat in ramulis inferioribus pini, quos perforat, efficit, destruit naturae hortulanus. Statura fere curculionis.

8. *B. subvillosus*, corpore nigro cinereoque vario. *Syst. varius.*
Ent. 60. 6. *

Habitat in Hafniae arboretis.

Antennarum clava acuminata.

9. *B. elytris integris glaber ater immaculatus.* *Gen. Inf. minutus.*
Mant. 211. *

Habitat Kiliae in boleto versicolore.

12. B Y R R H V S.

1. *B. fuscus*, elytris striis atris interruptis. *Syst. Ent.* 60. *pilula.*
1. *Linn. Syst. Nat.* 2. 568. 4.

Dermestes pilula tomentosus ouatus fusco nebulosus.
Linn. Fn. Sv. 427.

Cistela subuilloso viridescens, fasciis longitudinalibus fuscis interruptis. *Geoff. Inf.* 1. 116. 1. tab. 1. fig. 8.

Dermestes ouatus, supra nigro aeneus, subtus totus niger, elytris fasciis interruptis aeneis. *Degeer Inf.* 4. 213. 9. tab. 7. fig. 23.

Habitat in Europae sabulosis.

Variat colore nigro et fusco, striis tamen semper obscurioribus.

2. *B. niger immaculatus.* *ater.*

Cistela nigra nitens glabra. *Geoff. Inf.* 1. 117. 3.

Habitat in Germania. *Dom. de Hattorf.*

Statura et magnitudo *B. pilulae*, at totus ater. Caput et thorax atra, glabra, laevis, obscure nitida. Elytra obsolete striata.

3. *B. niger*, thorace aeneo, elytris fuscis, striis tribus abbreviatis viridibus nigro maculatis. *Syst. Ent.* 60. 2. *

Habitat in Anglia captus prope Henly die 28 Jun. *Mus. Dom. Banks.*

- aeneus.* 4. *B. totus aeneus. Syst. Ent. 60. 3. **
 Habitat Vpſaliae.
 Scutellum albidum.

13. ANTHRENV S.

- Pimpinellae.* 1. *A. niger, elytris fascia alba apice ferrugineus, litura alba. Syst. Ent. 61. 1. **
Anthrenus squamosus niger, fascia punctisque coleoptorum albis, futuris fuscis. Geoff. Inf. 1. 114. 1.
 Habitat in pimpinellae floribus Galliac.
- Scrophulariae.* 2. *A. niger, elytris albo maculatis, futura sanguinea. Syst. Ent. 61. 2.*
Byrrhus Scrophulariae niger, elytris albo maculatis, futura sanguinea. Linn. Syst. Nat. 2. 568. 1.
Dermestes tomentosus maculatus futura elytrorum rubra. Linn. Fn. Sv. 429.
Scarabaeus parvus corpore subrotundo, collo oblongo, alarum elytris nigris, binis punctis albicantibus notatis. Raj. Inf. 85. 37.
Dermestes ouatus niger, maculis squamosis albis, futura elytrorum rubra. Degeer Inf. 4. 200. 6. tab. 7. fig. 20.
Sulz. Hist. Inf. tab. 2. fig. 11. h.
Bergſtraeff. Nomencl. 1. tab. 11. fig. 9. 10.
Schaeff. Elem. tab. 17.
Icon. tab. 176. fig. 4.
 Habitat in Europae ſcrophulariis.
- muſeorum.* 3. *A. nebulosus, elytris ſubnebulosis. Syst. Ent. 61. 3.*
Byrrhus muſeorum nebulosus, elytris ſubnebulosis puncto albo. Linn. Syst. Nat. 2. 568. 2.
Dermestes tomentosus maculatus, elytris puncto albo. Linn. Fn. Sv. 430.
Dermestes ouatus fuscus obſcurus, maculis squamosis grifeis. Degeer Inf. 4. 203. 7. tab. 8. fig. 11. 12.
 Habitat in muſeis, animalia aſſeruata deſtruens.
- Verbaſci.* 4. *A. niger, elytris faſciis tribus vndatis albis. Syst. Ent. 61. 4.*

Anthrenus squamosus niger, elytris fuscis, fascia triplici undulata alba. *Geoff. Inf.* 1. 115. 2.

Byrrhus Verbasci fuscus, elytris fasciis tribus undulatis pallidis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 568. 3.

Bergstræff. Nomencl. 1. tab. 11. fig. 11. 12.

Habitat in Verbasco Galliae.

14. A N O B I V M.

1. *A. fuscum immaculatum*. *Syst. Ent.* 62. 1. *pertinax.*
Ptinus pertinax fuscus unicolor. *Linn. Syst. Nat.* 2. 565. 2.
Byrrhus totus nigro fuscus. *Geoff. Inf.* 1. 112. 4.
Dermestes pertinax. *Linn. Fn. Sv.* 414.
Byrrhus nigro fuscus, elytris striatis, thorace ad angulos macula fulva. *Degeer Inf.* 4. 227. 1. tab. 8. fig. 24. 25.
 Habitat in Europa frequens. Destruit e ligno confecta inprimis quercino. Deuoratur a Clero formicario. Captum se contrahit immobile.
2. *A. testaceum*, oculis nigris. *Syst. Ent.* 62. 2. *molle.*
Ptinus mollis testaceus, oculis fuscis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 565. 3.
Byrrhus testaceus glaber, oculis nigris. *Geoff. Inf.* 1. 112. 2.
Byrrhus rufo fuscus, oculis nigris, elytrorum apice rufo. *Degeer Inf.* 4. 230. 4. tab. 8. fig. 29.
Dermestes mollis. *Linn. Fn. Sv.* 415.
 Habitat in Europae quisquiliis.
3. *A. testaceum*, thorace ciliato, dorso plano carinato. *Syst. Ent.* 62. 3. * *frumentarium.*
 Habitat in pane diutius asseruato, captum in naue prope Brasiliam. *Mus. Dom. Banks.*
4. *A. villosum nigrum*, antennis pedibusque testaccis. *Gen. Inf. Mant.* 212. * *flauipes.*
 Habitat Hamburgi. *D. Schulz.*
5. *A. pilosum nigrum*, elytris molliusculis. *Syst. Ent.* *nigrum.* 62. 4.

Dermeftes niger oblongus pilofus niger, elytris molliufculis. *Linn. Syft. Nat.* 2. 564. 28. *Fn. Sv.* 439.
Cantharis pilofa nigra longis pilis vbique pubefcens, antennis extrorfum craffioribus. *Scop. Ent. carn.* 131.
 Habitat in Europae floribus.

- lineatum.* 6. A. pilofum nigrum, elytris lineis fefquitertiis rufis.
Syft. Ent. 62. 5. *
 Habitat in Brafilia. *Muf. Dom. Banks.*
 Statura exacte praecedentis.
- cyaneum.* 7. A. fubuillofum cyaneum, antennis nigris. *Syft. Ent.* 63. 6.
 Habitat in Europa australiori.
 Statura et magnitudo omnino A. nigri.
- minutum.* 8. A. fubuillofum nigrum, thorace elytris que cyaneis.
 Habitat in in noua Zelandia. *Muf. Dom. Banks.*
 Statura omnino A. cyanei, at duplo minus et corpus nigrum.
 Variat rarius elytris virefcentibus.

15. P T I N V S.

- Gigas.* 1. P. grifeis, elytris poftice cinereis. *Syft. Ent.* 63. 1. *
 Habitat in noua Hollandia. *Muf. Dom. Banks.*
 De genere adhuc haereo.
- germanus.* 2. P. fufcus, thorace quadridentato, elytris villofis cinereo variis,
Ptinus germanus fufcus, thorace transuerfim rugofa, pedibus ferrugineis. *Linn. Syft. Nat.* 2. 566. 6.
 Habitat in Europa, Anglia.
 Maior P. fure, cui affinis. Thorax eleuatus fufcus dentibus quatuor. Elytra villofa, fufca, cinereo varia. Pedes ferruginei.
- longicornis.* 3. P. ater nitidus, pedibus flauefcentibus,
 Habitat in Germania. *Dom. de Hattorf.*
 Magnitudo Pt. furis. Antennae filiformes corpore longiores. Corpus atrum, nitidum, immaculatum. Pedes flau plantis nigris.

4. *P. testaceus*, thorace quadridentato, elytris fasciis duabus albis. *Syst. Ent.* 63. 2. *Linn. Syst. Nat.* 2. 566. 2. *Fur.*
Bruchus testaceus, elytrorum fascia duplici alba. *Geoff. Inf.* 1. 164. 4. tab. 2. fig. 6. mal.
Byrrhus rapax ouatus rufo fuscus, albedine maculatus, thorace angulato, villis flavis, antennis longitudine corporis. *Degeer Inf.* 4. 231. 5. tab. 9. fig. 5. 6.
Buprestis Fur. Scop. Ent. carn. 210.
Cerambyx Fur. Linn. Fn. Sv. 651.
Sulz. Hist. Inf. tab. 2. fig. 8.
Schaeff. Elem. tab. 30.
Frisch. Inf. 13. tab. 15.
 Habitat in seminibus, in museis pessimus, destruens herbaria, insecta, aues, vix pellendus.
 Larva hexapoda obesa mollis pilosa segmentis dorsalibus prominulis.
 Puppa intra globum glutinosum.
 Mas alatus, femina aptera.
5. *P. fuscus*, thorace subcarinato, coleoptris macula alba imperialis aquilam expansam referente. *Syst. Ent.* 63. 3. *Linn. Syst. Nat.* 2. 565. 4. *imperialis.*
Bruchus imperialis subouatus cinereus, elytris fuscis, macula futurae alba pennata. *Müll. Zool. Dan. prodr.* 57. 507.
Sulz. Hist. Inf. tab. 2. fig. 7.
 Habitat in Europae borealis arboribus.
6. *P. thorace bidentato testaceus immaculatus.* *Syst. Ent.* *Latro.* 63. 4. *
 Habitat Strasburgi. *Mus. Dom. Prof. Hermann.*
7. *P. thorace quadrifuscato villosus, albidus, elytris con-* *fulcatus.*
 natis fusco testaceis nitidis.
 Habitat in plantis siccis ex Insulis Canariis missis.
 Animalculum singulare, at hoc genus evincunt statura, antennae, palpi, elytra connata, victus. Corpus *P. Fure* minus. Antennae porrectae longitudine corporis filiformis, albae. Caput paruum, sub thorace absconditum, pallidum. Thorax albidus fulcis quatuor
 E 5 pro-

profundis exaratus. Elytra gibba, laevissima, connata, nitida, obscure testacea, immaculata. Pedes albi.

Scotias. 8. P. thorace laevi piceo, elytris connatis fusco testaceis nitidis.

Scotias psylloides. *Czenpinski Differt.* 51. 155.

Bruchus totus testaceus, elytris coadunatis. *Geoff. Inf.* 1. 164. 2.

Gibbium. *Scopol. Introd. ad histor. natur.* 505. ?

Habitat in aedibus Europae australioris. *Mus. Dom. Banks.*

Statura omnino praecedentis, paullo maior. Antennae porrectae albo villosae. Caput parvum reconditum, eum thorace glabrum, laeve, piceum. Elytra connata, laevia, nitida, obscure testacea, immaculata. Pedes villoso albidis.

16. B R V C H V S.

spinofus. 1. B. griseus, thorace elytrisque spinosis. *Syst. Ent.* 64. 1. *

Habitat in Iamaica. *Dom. Drury.*

Gigas in hoc genere.

Pisi. 2. B. elytris nigris albo maculatis, podice albo, punctis binis nigris. *Syst. Ent.* 64. 2. *Linn. Syst. Nat.* 2. 604. 1. *Mus. Lud. Vlr.* 35.

Mylabris fusca cinereo nebulosa, abdominis apice cruce alba. *Geoff. Inf.* 1. 267. 1. tab. 4. fig. 9.

Bruchus nigro fuscus, maculis villosis sparsis albescens, abdominis apice albo maculis binis nigris. *Degeer Inf.* 5. 278. 1. tab. 16. fig. 3. 4.

Bruchus Americae septentrionalis. *Kalm. It.* 294.

Curculio Pisorum. *Linn. Amoen. acad.* 3. 347.

Laria Salicis. *Scop. Ent. carn.* 63.

Ledermüller Microsc. tab. 99. fig. 2.

Habitat in America septentrionali, nuperrime in Europa australi inceptit. Victitat Pisis, deuoratur a *Gracula Quiscalia*.

3. *B. griseo nitidulus*, elytris vix abdomine brevioribus. *Robiniae*.
 Habitat in Robiniae pseudacaciae, Americae feminibus.
Mus. Dom. Banks.
 Magnus in hoc genere. Corpus totum villis griseis nitidulum. Abdomen minus quam in reliquis prominent.
4. *B. thorace gibboso cupreo*, elytris nigris tuberculato *gibbosus*.
 spinosis. *Gen. Inf. Mant.* 212. *
 Habitat in America boreali.
5. *B. niger*, elytris rufis elevato striatis, punctis nigris *scabrosus*.
 sparsis. *Syst. Ent.* 64. 3. *
 Habitat in Anglia. *Mus. Britann.*
6. *B. corpore fusco griseo maculato*. *Syst. Ent.* 64. 4. * *Cacao*.
 Habitat in Theobromae feminibus.
7. *B. elytris griseis nigro maculatis*, pedibus rufis, scutello albo. *Syst. Ent.* 65. 5. *Linn. Syst. Nat.* 2. *Theobromae*.
 605. 2.
 Habitat in Theobromae feminibus.
8. *B. niger*, elytris cinereis, maculis tribus nigris *marginatis*.
 gine connexis. *Gen. Inf. Mant.* 212. *
 Habitat in Germania. *Dom. de Hattorf.*
9. *B. subferrugineus*, elytris apice atris, ano atro, linea *analis*.
 media alba.
 Habitat in India orientali. *Mus. Dom. Banks.*
 Corpus paruum. Caput testaceum supra tomento cinereo subvillosum. Thorax ferrugineus macula baseos alba. Elytra striata ferruginea apice late atra et ante apicem macula atra, quae cum apice iungitur. Abdomen ferrugineum ano prominente atro linea media alba.
10. *B. cinereus*, elytris fuscis, puncto baseos ocellari atro. *2punctatus*.
Bruchus 2punctatus. *Sulz. Hist. Inf.* tab. 4. fig. 2. *tus*.
 Habitat in Helvetiae plantis.
 Distinctus puncto magno ocellari nigro iride flava ad basin elytrorum.

- granarius.* 11. *B. elytris nigris, atomis albis, femoribus posticis vni-*
*dentatis. Syst. Ent. 65. 6. **
Bruchus granarius elytris nigris, atomis albis, pedi-
bus anticis rufis, posticis dentatis. Linn. Syst. Nat.
2. 605. 5.
Curculio atomarius. Linn. Fn. Sv. 628.
Habitat in feminibus plantarum.
- Cisti.* 12. *B. ater immaculatus, femoribus muticis. Syst. Ent.*
*65. 7. **
Habitat in floribus Cisti Helianthemi frequens. Mus.
Dom. Banks.
- abdomi-* 13. *B. niger, abdomine cinereo immaculato, pedibus an-*
nalis. ticis testaceis.
Habitat in India orientali. Mus. Dom. Banks.
Paruus. Caput et thorax nigra lateribus cinereo villo-
sis. Elytra striata, nigra, immaculata. Abdomen
cinereo villosum, immaculatum. Pedes quatuor an-
tici testacei.
- femina-* 14. *B. ater, antennarum basi pedibusque anticis testaceis,*
*rius. femoribus muticis. Syst. Ent. 65. 8. **
Bruchus feminarius ater, antennarum basi pedibusque
anticis testaceis. Linn. Syst. Nat. 2. 605. 6.
Mylabris nigra, abdomine albo sericeo. Geoff. Inf.
1. 268. 3.
Habitat in floribus, captus d. 28. Iun. prope Henly An-
glorum.
Pedes antici testacei.
- macula-* 15. *B. elytris punctatis testaceis nigro maculatis, podice*
*tus. griseo, punctis binis nigris. Syst. Ent. 659. **
Habitat in Americae feminibus. Dom. v. Rohr.
- Mimosae.* 16. *B. testaceus immaculatus, elytris substriatis, femoribus*
posticis acute dentatis.
Habitat in Mimosae feminibus Americae meridionalis.
Dom. Lund.
Paullo maior B. feminario. Corpus supra mox obscu-
rius, mox dilutius testaceum, immaculatum. Ely-
tra

CLASS. I. ELEVTERATA. Elophorus. 77

tra substriata, glabra. Subtus magis cinerascens. Femora postica acute dentata.

17. B. antennis pectinatis corpore longioribus, corpore griseo fusco maculato. *Syst. Ent.* 65. 10. *ferraticornis.*
Habitat in Oriente. *Dom. Prof. Forskahl.*

18. B. antennis pectinatis corpore ferrugineo longioribus. *Syst. Ent.* 66. 11. *pectinicornis.*

Bruchus pectinicornis antennis pectinatis corpore longioribus. *Linn. Syst. Nat.* 2. 605. 7.

Bruchus rufus rufo fuscus, elytris pedibusque rufis, corpore griseo maculato, antennis ferratis. *Degeer Inf.* 5. 201. 2.

Schaeff. Elem. tab. 86. fig. 1.

Habitat in feminibus e China allatis.

17. E L O P H O R V S.

1. E. fuscus, thorace rugoso elytrisque fusco aeneis. *Syst. Ent.* 66. 1. *aquaticus.*

Silpha aquatica cinerea, elytris substriatis, thorace emarginato longitudinaliter rugoso virescente. *Linn. Syst. Nat.* 2. 573. 25.

Dermestes viridi aeneus, thorace fasciis quatuor elevatis, elytris punctato striatis. *Geoff. Inf.* 1. 105. 15.

Hydrophilus aeneus viridi aeneus, thorace virescente sulcato, elytris punctato striatis, antennis pedibusque rufis. *Degeer Inf.* 4. 379. 5. tab. 15. fig. 5. 6.

Habitat frequens in Europae aquis stagnantibus.

2. E. griseus, thorace elytrisque sulcato rugosis. *Gen. Inf. Mant.* pag. 213. * *nubilus.*

Habitat Hamburgi. *Dr. Schultz.*

3. E. fuscus, thorace rugoso aeneo, elytris pallidis. *Syst. Ent.* 66. 2. * *minutus.*

Habitat in Angliae aquis stagnantibus.

Affinis E. aquatico, at triplo minor.

18. SPHAE-

18. SPHAERIDIUM.

- scarabaeoides.* 1. *S. ouatum atrum*, elytris maculis duabus ferrugineis. *Syst. Ent.* 66. 1.
Dermeſtes ſcarabaeoides ouatus ater glaber, elytris maculis duabus obſolete ferrugineis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 563. 17. *Fn. Sv.* 428.
Dermeſtes niger, coleoptris punctis rubris quaternis, elytris laeuibus ſubrotundis. *Geoff. Inf.* 1. 106. 17.
Scarabaeus ouatus, niger, glaber maculis duabus rubris in ſingulo elytro. *Gad. Satag.* 67.
Hifter teſtudinarius ouatus niger glaber, pedibus fufcis, elytris antice macula rubra poſtice fulua. *Degeer Inf.* 4. 345. tab. 12. fig. 17.
Scop. Ent. carn. 36.
 Habitat in Europae borealis ſtercore frequens.
- apustulatum.* 2. *S. atrum nitidum*, elytris macula apicis rubra, pedibus piceis.
 Habitat Kiliae in ſtercoribus.
 Affine praecedenti, at minus.
- dytiſcoides.* 3. *S. ferrugineum*, elytris atris. *Syst. Ent.* 67. 2. *
 Habitat in Infula St. Helenae. *Muf. Dom. Banks.*
- glabratum.* 4. *S. atrum*, antennis pedibusque rufis, elytris laeuibus.
 Habitat in Madera Infula. *Muf. Dom. Banks.*
 Statura omnino praecedentium, at paullo minus. Corpus totum atrum, laeue, nitidum antennis pedibusque ferrugineis.
- atomarium.* 5. *S. laeue atrum*, elytris crenato ſtriatis, pedibus pallidis. *Syst. Ent.* 67. 3. *
Silpha atomaria nigra ſubouata, elytris immarginatis, pedibus pallidis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 574. 35.
Dermeſtes niger ſubrotundus, elytris ſtriatis. *Geoff. Inf.* 1. 117. 19.
 Habitat in Europae ſtercoribus.
- melanoccephalum.* 6. *S. atrum glabrum*, elytris grifeis, macula communi baſeos nigra. *Syst. Ent.* 67. 4. *

Dermestes melanocephalus niger ouatus glaber, elytris griseis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 563. 16. *Fn. Sv.* 425.

Habitat in Europae stercore frequens.

7. *S. atrum*, elytris apice rufus, pedibus nigris. *Syst. Ent.* 67. 5. * *haemorrhoidale.*

Anthribus niger ouatus, elytris apice punctis duobus rubris. *Geoff. Inf.* 1. 308. 5.

Habitat in Europae stercore bouino. *Mus. Dom. Banks.*

8. *S. atrum nitidum*, thoracis margine elytrorumque macula fanguineis. *Syst. Ent.* 67. 6. * *apustulatum.*

Habitat in noua Hollandia.

9. *S. atrum immaculatum*, elytris laeuissimis. *Syst. Ent.* 68. 7. * *finetarium.*

Habitat in Angliae stercore. *Mus. Dom. Banks.*

10. *S. atrum*, abdomine pedibusque rufis. *Seminulum.*

Silpha seminulum ouata atra nitida immaculata, abdomine rubro. *Linn. Syst. Nat.* 2. 570. 8. *Fn. Sv.* 447.

Habitat in Europae hortis, floribus.

Parua, distincta abdomine pedibusque rufis.

11. *S. atrum*, elytris striatis, pedibus concoloribus. *Syst. Ent.* 68. 8. * *minutum.*

Habitat in Anglia. *Mus. Dom. Banks.*

12. *S. nigrum oblongum*, elytris abbreviatis, abdomine acuto. *Syst. Ent.* 68. 9. *pulicarium.*

Silpha pulicaria nigra oblonga, elytris abbreviatis, abdomine acuto. *Linn. Syst. Nat.* 2. 574. 33.

Dermestes pulicarius oblongus niger, elytris abbreviatis, abdomine acuto. *Linn. Syst. Nat.* 2. 564. 24. *Fn. Sv.* 370.

Anthribus niger, elytris abdomine breuioribus. *Geoff. Inf.* 1. 308. 4.

Scarabaeus antennis clauatis, clauis in annulos diuisis. *Raj. Inf.* 108. 29.

Habitat in Europae floribus frequens, cursitans.

19. TRITOMA.

- 2pustulata*. 1. *T. atra*, elytris macula laterali coccinea. *Syst. Ent.* 68. 1. *
Tritoma. *Geoff. Inf.* 1. 335. 1. tab. 6. fig. 2.?
 Habitat in Boletis arboreis Angliae, capt. d. 17. Aprilis ad Hamstead.
- rufipes*. 2. *T. atra*, capite thorace pedibusque ferrugineis.
 Habitat in Norwegiae fungis arboreis, capt. d. 15. Jun. prope Swinesund.
 Statura et magnitudo praecedentis tota glabra nitida.
 Antennae breves, perfoliatae, nigrae. Caput et thorax rufa, immaculata. Elytra et abdomen atra, nitida laeuissima. Pedes rufi.
 Varietatem finillimam, at duplo maiorem e Germania misit. *Dom. de Hattorf*.
- dubia*. 3. *T. nigra*, elytris pedibus testaceis. *Gen. Inf. Mant.* 213.
 Habitat Kiliae Holsatorum. *Dom. Lund*.
 De genere adhuc haereo.
- collaris*. 4. *T. nigra*, thoracis lateribus abdomineque rufis. *Syst. Ent.* 69. 2. *
 Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks*.

20. I P S.

- fasciata*. 1. *I. atra*, elytris fasciis duabus rufis, anteriori nigro maculata. *Gen. Inf. Mant.* 213. *
 Habitat in America boreali.
- 4pustulata*. 2. *I. oblonga nigra*, elytris punctis duobus ferrugineis.
Gen. Inf. Mant. 213. *
Tritoma 4pustulata. *Syst. Ent.* 69. 3.
Silpha 4pustulata oblonga nigra, elytris punctis duobus ferrugineis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 570. 5. *Fn. Sv.* 446.
Silpha nigra oblonga depressa, elytris singulis maculis duabus rubris. *Degeer Inf.* 4. 185. 12. tab. 6. fig. 20. 21.

Dermestes niger, coleoptris punctis rubris quaternis, elytris striatis, oblongus. *Geoff. Inf.* 1. 106. 16?

Scarabaeus parvus luteo maculatus, erucac lanigerac.
Frisch. Inf. 9. 36. tab. 19.

Habitat in Europae ligno putrescente.

Larua oblonga, hirsuta grisea.

Varietatem quadruplo maiorem ex America boreali habui, vix tamen distinctam.

De Synonymo *Geoffr.* dubito, quum in nostris elytra semper laeuissima.

3. I. picea, elytris nigris, basi fasciaque postica ferrugineis. *Gen. Inf. Mant.* 214. * *picea.*

Habitat in Germania. *Dom. de Hattorf.*

Minor I. 4pustulata.

4. I. oblonga nitida atra, elytris maculis duabus albis, *4guttata.*
antere sinuata. *Gen. Inf. Mant.* 214. *

Habitat Kiliae Holfatorum. *Dom. de Schestedt.*

5. I. oblonga nigra, thorace rugoso, elytris striato crenatis, maculis duabus rubris. *Gen. Inf. Mant.* 214. *crenata.*

Tritoma crenata. *Syst. Ent.* 69. 4. *

Habitat in Suecia.

Quadruplo minor I. quadripustulata et distincta.

6. I. oblonga glabra atra, fronte pedibus maculisque duabus elytrorum ferrugineis. *Gen. Inf. Mant.* 214. *rufifrons*

Tritoma rufifrons. *Syst. Ent.* 69. 5. *

Habitat in Anglia. *Mus. Dom. Banks.*

21. H I S P A.

1. H. antennis pectinatis, elytris testaceis albo punctatis. *mystacina.*
Syst. Ent. 70. 1. *

Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

Gigas in hoc genere.

2. H. antennis pectinatis, elytris laeuibus atris. *Syst. Ent.* *flabellicornis.*
70. 2. *

Habitat in Anglia. *Dom. Lee.*

- peñnicornis*. 3. H. antennis peñnicornatis fusca, pedibus luteis. *Syst. Ent.* 70. 3.
Ptinus peñnicornis fuscus, antennis luteis peñnicornatis.
Linn. Syst. Nat. 2. 565. 1.
Dermestes peñnicornis. *Fn. Sv.* 412.
Ptilinus atro fuscus, thorace conuexo, pedibus antennisque pallidis. *Geoff. Inf.* 1. 65. 2.
Sulz. Hist. Inf. tab. 2. fig. 6.
 Habitat in Europae quisquiliis, in Corylo. *Prof. Hermann.*
- bicornis*. 4. H. ? antennis peñnicornatis, thorace elytrisque viridi aeneis, capite bicorni. *Gen. Inf. Mant.* 215. *
 Habitat in America boreali. *Dom. Teats.*
 De genere adhuc dubium.
- cornigera*. 5. H. antennis ferratis, thorace rufo, elytris coeruleis, capite bicorni.
 Habitat in Anglia. *Mus. Dom. Banks.*
 Forte proprii generis. Antennae fere totae perfoliatae simillimae Diaperis *Geoffroy* nigrae basi ferrugineae. Caput nigrum, obscurum, antice emarginatum basi cornubus duobus, erectis, validis, atris. Thorax laevis, rufus, nitidus. Elytra striata, coerulea. Abdomen nigrum. Pedes ferruginei.
- hirta*. 6. H. antennis ferratis atra hirta. *Syst. Ent.* 70. 4. *
Dermestes hirtus ater hirtus. *Linn. Syst. Nat.* 2. 563. 14.
 Habitat in Europae australioris tritico.
- coerulea*. 7. H. antennis subferratis coerulea hirta. *Syst. Ent.* 70. 5. *
 Habitat in Germania. *Dom. de Hattorf.*
- 2pustulata*. 8. H. antennis ferratis atra hirta, elytris macula basaeo rufa.
 Habitat in Italia. *Dr. Allioni.*
 Minor H. hirta. Corpus atrum, nitidum, pilis erectis nigris. Macula magna marginalis, rufa ad basin elytrorum.
9. H.

CLASS. I. ELEVTERATA. Nicrophorus. 83

9. H. antennis pilosis nigra, elytris striatis. *Syst. Ent. mutica.*
71. 6.
Hippa mutica inermis, antennis pilosis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 604. 4.
Tenebrio hirticornis alatus niger, capite depresso, antennis pilosis, thorace bicarinato, elytris punctato striatis. *Degeer Inf.* 5. 47. tab. 3. fig. 1.
Dermestes clauicornis niger, antennis clauatis pilosis. *Linn. Fn. Sv.* 413.
Habitat in Europae quisquiliis, museis.
10. H. antennis fusiformibus, thorace elytrisque spinosis, *atra.*
corpore atro. *Syst. Ent.* 71. 7.
Hippa atra corpore toto atro. *Linn. Syst. Nat.* 2. 603. 1.
Hippa atra. *Act. Soc. Berol.* 4. tab. 7. fig. 6.
Crioceris atra spinis horrida. *Geoff. Inf.* 1. 243. 7.
Habitat in Europa australi ad radices graminum.
11. H. antennis fusiformibus, corpore testaceo, antennis *testacea.*
aculeisque nigris. *Syst. Ent.* 71. 8. *Linn. Syst. Nat.*
2. 603. 2.
Habitat in Africa.
Aculei elytrorum sparsi, nigri.
12. H. antennis fusiformibus, thorace elytrorumque basi *sanguini-*
rufis, elytris ferratis. *Syst. Ent.* 71. 9. * *collis.*
Hippa sanguinicornis inermis atra, thorace sanguineo.
Linn. Mantiss. 530.
Habitat in America meridionali.
Variat rarius elytris et basi nigris.

22 N I C R O P H O R U S.

1. N. ater, thorace obrotundo inaequali. *Syst. Ent.* 71. 1. *germani-*
Silpha germanica oblonga atra, clypeo obrotundo in- *cus.*
aequali marginato, elytris obtusissimis, margine la-
terali ferrugineo. *Linn. Syst. Nat.* 2. 569. 12.
Silpha tota atra elytris truncatis abdomine breviori-
bus. *Degeer Inf.* 4. 173. 2. tab. 6. fig. 4.
Dermestes thorace marginato, elytris abscessis, totus ni-
ger. *Geoff. Inf.* 1. 99. 2.

Scarabaeus antennis clauatis, clavis in annulos diuisis. *Raj. Inf.* 107. 1.

Scarabaeus maiusculus ex toto niger. *List.* 381.

Pollinctor niger. *Voet. Scar.* tab. 30. fig. 4. 5.

Sulz. Inf. tab. 2. fig. 10.

Habitat in Germania, cadauera ouo impraegnata sepeliens.

Varietates vidi plures maiores vno alteroue puncto elytrorum ferrugineo, vix tamen distinctas credo.

Conf. *Silpha speciosa* *Naturf.* 6. tab. 4.

Silpha humator. *Bergstr.* 1. tab. 10. fig. 9. vix distinctae.

Vespillo. 2. *N. ater*, elytris fascia duplici ferruginea. *Syst. Ent.* 72. 2.

Silpha Vespillo oblonga atra, clypeo orbiculato inaequali, elytris fascia duplici ferruginea. *Linn. Syst. Nat.* 2. 569. 2. *Fn. Sv.* 444.

Silpha nigra elytris truncatis abdomine breuioribus, fascia lata duplici ferruginea transuerse vndata. *Degeer Inf.* 4. 168. 1. tab. 6. fig. 1.

Dermeestes thorace marginato, elytris abscissis nigris, fasciis duabus transuersis undulatis luteis. *Geoff. Inf.* 1. 98. 1. tab. 1. fig. 5.

Scarabaeus foetidus primus. *Raj. Inf.* 106.

Scarabaeus maiusculus niger, duabus luteis fasciis undulatis transuersim ductis supra alarum thecas. *List. Loqu.* 381. 2.

Scarabaeus Moschi odore. *Frisch.* 12. 28. tab. 3. fig. 2.

Cantharis tertius. *Mouf. Inf.* 149. fig. 1.

Pollinctor vulgaris. *Voet. Scarab.* tab. 30. fig. 1. 2. 3.

Vespillo. *Roef. Inf.* 4. tab. 1. fig. 1. 2.

Bergstr. Nomencl. 1. 10. 14. tab. 1. fig. 14.

Schaeff. Icon. tab. 9. fig. 4.

Pet. Gazoph. tab. 13. fig. 6.

Habitat in Europa, America, cadauera ouo impraegnata sepeliens.

Moschum spirat, ocissime volitat elytris erectis approximatis. Acaris infestatur.

Varietates inprimis magnitudinis et Americanas et Europaeas vidi plures, at vix distingui merentur.

23. SILPHA.

1. *S. atra*, elytris fascia postica flava, femoribus posticis dentatis. *Syst. Ent.* 72. 1. *furina-*
menfis.
 Habitat in America meridionali.
2. *S. atra*, elytris laevibus, lineis elevatis tribus, thorace orbiculato nitido. *Syst. Ent.* 72. 2. *Linn. Syst. Nat.* 2. 570. 11. *Fn. Sv.* 450. *littoralis.*
Silpha rufa clauata oblonga nigra, thorace orbiculato nitido, elytris lineis elevatis tribus, clava antennarum rufa. *Degeer Inf.* 4. 176. 4.
Peltis nigra, elytris lineis tribus elevatis, prima et secunda gibbositate connexis, thorace laevi. *Geoff. Inf.* 1. 120. 3.
Bergstraeff. Nomencl. 1. 24. 6. tab. 3. fig. 6.
Scarabaeus campestris. *Frisch. Inf.* 6. 12. tab. 5.
Silpha littoralis. *Scop. Ent.* 55.
 Habitat in Europae cadaueribus.
 Larva ovata, depressa, fusca, voracissima.
 Conf. *Silpha clauipes* femoribus posticis incurvis crassissimis. *Sulz. Hist. Inf.* tab. 2. fig. 14. *Bergstr. Nomencl.* 1. tab. 11. fig. 3. an distincta species?
3. *S. nigra*, elytris fasciis duabus ferrugineis, thorace antice bidentato. *Syst. Ent.* 73. 3. *Linn. Syst. Nat.* 2. 570. 6. *Mus. Lud. Vlr.* 38. *indica.*
 Habitat in India.
4. *S. depressa nigra*, thorace flavo, centro nigro. *Syst. Ent.* 73. 4. * *americana-*
na.
Silpha americana ovata fusca, clypeo flavo, centro nigro intra annulum fulvum. *Linn. Syst. Nat.* 2. 570. 7.
Blatta americana. *Catesby Car.* 3. tab. 10. fig. 5.
Seligm. Av. 4. tab. 108. fig. 7.
 Habitat in Americae cadaueribus.
5. *S. oblonga rufa*, antennis, elytris pectoreque nigris. *Syst. Ent.* 73. 5. *Linn. Syst. Nat.* 2. 570. 10. *Fn. Sv.* 449. *russica.*

Anthrribus ruber ouato oblongus ruber nitidus, antennis elytris que nigris nitidis. *Degeer Inf.* 5. 283. 1. tab. 8. fig. 12.

Dermestes elytris nigris, capite clypeo et abdomine nigro. *Vdm. Diff.* 7.

Habitat in Europa boreali.

thoracica. 6. *S. nigra*, elytris linea eleuata vnica, thorace testaceo. *Syst. Ent.* 73. 6. *Linn. Syst. Nat.* 2. 571. 13. *Fn. Sv.* 452. *Stroem. Act. Nidrosf.* 3. tab. 6. fig. 1.

Silpha nigra thorace ferrugineo, elytris lineis tribus longitudinalibus, vnica eleuata. *Degeer Inf.* 4. 174. 3. tab. 6. fig. 7.

Peltis nigra, lineis tribus eleuatis acutis, thorace testaceo. *Geoff. Inf.* 1. 121. 6.

Scarabaeus primo similis parum canaliculatus scapulis croceis. *Raj. Inf.* 90. 10.

Cassida nigra, clypeo latissimo pallide rufo, maculata nigra nitida. *Gadd. Satag.* 25.

Silpha thoracea. *Scop. carn.* 54.

Bergstr. Nomencl. 1. 23. 5. tab. 3. fig. 5.

Schaeff. Icon. tab. 75. fig. 4.

Sulz. Inf. tab. 2. fig. 12.

Habitat in Europae cadaueribus.

laeuicollis. 7. *S. gibba nigra*, elytris rugosis, lineis eleuatis tribus, thorace laeuicollis emarginato. *Syst. Ent.* 73. 7. *

Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

marginalis. 8. *S. atra*, thoracis margine pallido, elytris fuscis. *Gen. Inf. Mant.* 215. *

Silpha noueboracensis. *Forst. Cent. Inf.* 1. 17. 17.

Habitat in America boreali.

rugosa. 9. *S. nigricans*, elytris rugosis, lineis eleuatis tribus, thorace rugoso postice sinuato. *Syst. Ent.* 74. 8. *Linn. Syst. Nat.* 2. 571. 16. *Fn. Sv.* 455. *Scop. carn.* 53.

Silpha nigra opaca, elytris tuberculatis lineis tribus eleuatis inaequalibus. *Degeer Inf.* 4. 182. 7.

Tenebrio rugosus alatus niger, corpore ouato, thorace rugoso, elytris tuberculis scabris. *Degeer Inf.* 5. 43. 5. tab. 2. fig. 21.

Bergstr.

Bergstr. Nomencl. 1. 23. 4. tab. 3. fig. 4.

Peltis nigra, elytris lineis eleuatis tribus acutis, spatio interiecto veluti complicato, thorace scabro. *Geoff. Inf. 1. 120. 4.*

Scarabaeus inter cadauera frequens. *Raj. Inf. 90. 9.*

Habitat in Europa frequentissime, cadauera, pices, carnes consumens.

Capta humorem foetidissimum euomit.

Conf. *S. pellaeocephalos. Bergstr. Nomencl. tab. 9. fig. 8.*

10. *S. atra*, elytris punctatis, lineis eleuatis tribus laeui- *atrata.*
bus, thorace integro. *Syst. Ent. 74. 9. Linn. Syst. Nat. 2. 571. 12. Fn. Sv. 451.*

Silpha punctata nigra nitida, elytris punctatis, lineis eleuatis tribus laeui-
bus, claua antennarum nigra. *Degeer Inf. 4. 177. 5. tab. 6. fig. 15.*

Peltis nigra, elytris lineis tribus eleuatis, spatio inter-
iecto punctato, thorace laeui. *Geoff. Inf. 1. 118. 1.*

Schaeff. Elem. tab. 96. fig. 1.

Icon. tab. 93. fig. 5.

Habitat in Europae agris et viis frequens.

11. *S. atra*, elytris laeui- *inaequalis.*
bus, lineis eleuatis tribus, thora-
ce inaequali emarginato.

Habitat in America septentrionali. *Mus. Dom. Banks.*

Affinis praecedentibus. Thorax antice late emarginatus haud punctatus, at lineis eleuatis irregularibus, eleuatis inaequalis. Elytra valde marginata vix punctata lineis eleuatis tribus, quarum exterior abbreviata.

12. *S. atra*, elytris punctatis, lineis eleuatis tribus laeui- *lunata.*
bus, thorace transuerso emarginato. *Gen. Inf. Mant. 215. **

Habitat in Austria. *Dr. Schulz.*

13. *S. atra*, elytris laeui-
bus subpunctatis. *Syst. Ent. 74. 10. laeuigata.*

Peltis nigra tota, elytris laeui-
bus, punctis minimis
excavatis. *Geoff. Inf. 1. 122. 8.*

Silpha polita. Sulz. Hist. Inf. tab. 2. fig. 16.

Habitat in Europae syluis.

- obscura.* 14. *S. nigra*, elytris punctatis, lineis eleuatis tribus, thorace antice truncato. *Syst. Ent.* 74. 11. *Linn. Syst. Nat.* 2. 572. 18. *Fn. Sv.* 457. *Scop. carn.* 57.
Cassida ouata nigra, lineis tribus eleuatis, media longissima. *Vdm. Diff.* 8.
 Habitat in Europa boreali rarius.
- opaca.* 15. *S. fusca*, elytris concoloribus, lineis eleuatis subternis, thorace antice truncato. *Syst. Ent.* 74. 12. *Linn. Syst. Nat.* 2. 571. 15. *Fn. Sv.* 454.
Peltis opaca nigra supra murina tomentosa, clypeo truncato, elytris lineis binis eleuatis subternis, vnguibus rubris. *Müll. Zool. Dan. prodr.* 63. 585.
Schaeff. Icon. tab. 93. fig. 6.
 Habitat in Europae viis.
- sinuata.* 16. *S. thorace emarginato scabro*, elytris lineis eleuatis tribus apice sinuatis. *Syst. Ent.* 75. 13. *
Peltis nigra, elytris lineis tribus eleuatis, spatio interiecto minutissime punctato, thorace scabro. *Geoff. Inf.* 1. 119. 2.
Silpha appendiculata. *Sulz. Hist. Inf.* tab. 2. fig. 15.
 Habitat in Anglia.
- 4punctata.* 17. *S. nigra*, elytris pallidis, puncto baseos medioque nigro, thorace emarginato. *Syst. Ent.* 75. 14. *Linn. Syst. Nat.* 2. 571. 14.
Silpha 4punctata nigra, elytris exalbidis, maculis quatuor nigris. *Schreb. Inf.* 2. fig. 5.
Silpha corpore nigro, thorace testaceo, macula magna nigra, elytris flauo testaceis, punctis duobus nigris. *Degeer Inf.* 4. 181. 6.
Silpha flauicans. *Lepech. Itin.* 1. 202. tab. 16. fig. 4.
Peltis nigra, thorace elytris que testaceis, thoracis macula coleoptorumque punctis quinque nigris. *Geoff. Inf.* 1. 122. 7.
 Habitat frequens in Quercu Angliae.
- pedemontana.* 18. *S. testacea*, antennis apice nigris. *Syst. Ent.* 75. 15. *
Peltis tota testacea. *Geoff. Inf.* 1. 123. 9.
 Habitat in agris Pedemontanis. *Dr. Allioni.*

19. *S. ferruginea*, elytris lineis eleuatissimis, thorace emarginato capite latiore. *Syst. Ent.* 75. 16. *Linn. Syst. Nat.* 2. 572. 19. *Scop. Ent. carn.* 60. *ferruginea.*
Silpha cimicoides supra fusco castanea rufo marginata subtus rufa, elytris lineis eleuatissimis, punctisque excavatis. *Degeer Inf.* 4. 183. 9.
Scarabaeus minor e rufo fordide nigricans, elytris striatis. *Raj. Inf.* 84. 33.
Schaeff. Icon. tab. 40. fig. 7.
 Habitat in Europa boreali.
20. *S. nigra*, elytris striato punctatis, lineis eleuatis fenis, *oblonga.* thorace emarginato. *Syst. Ent.* 75. 17. *Linn. Syst. Nat.* 2. 572. 22. *Fn. Sv.* 460.
Silpha oblonga fusco-nigra, elytris lineis octo eleuatis punctisque excavatis. *Degeer Inf.* 4. 185. 71.
 Habitat in Europa boreali.

21. *S. nigra*, thoracis elytrorumque margine subferrugineo, elytris lineis eleuatis plurimis obsoletis. *limbata.*
 Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*
 Statura *S. ferrugineae*, at paullo minor. Caput nigrum antennis perfoliatis. Thorax marginatus, laeuis, niger margine ferrugineo. Elytra nigra lineis eleuatis plurimis substriata margine subferrugineo. Pedes nigri.

24. O P A T R V M.

1. *O. cinereum*, thorace plano marginato, elytris striis *griseum.* tribus eleuatis postice dentatis.
 Habitat in Italia. *Dr. Allioni.*
 Maior *O. sabuloso.* Corpus supra cinereum, immaculatum, subtus fuscum. Thorax planus margine parum eleuato. Elytra striis tribus eleuatis, abbreviatis, postice dentatis.
2. *O. fuscum*, elytris lineis eleuatis tribus dentatis, thorace emarginato. *Syst. Ent.* 76. 1. *sabulosum.*
Silpha sabulosa fusca, elytris lineis eleuatis tribus vtriusque dentatis, thorace subemarginato. *Linn. Syst. Nat.* 2. 572. 17. *Fn. Sv.* 456.

Tenebrio atra, elytris striis quinque vtrinque dentatis.
Geoff. Inf. 1. 350. 7.

Dermestes niger inter elytrorum lineas quatuor eleuatis scrobiculis exaratus. *Vdm. Diff.* 5.

Habitat in Europae, Americae borealis campis apricis, sabulosis.

gibbum. 3. *O. nigrum*, elytris lineis eleuatis plurimis obsoletis.
Syst. Ent. 76. 2. *

Habitat in Sueciae collibus arenosis.

laeuigatum. 4. *O. nigrum*, clypeo antice piceo, elytris substriatis.
Habitat in noua Zelandia. *Mus. Dom. Banks.*

Statura omnino praecedentium. Caput et thorax laeuia, nigra, clypeo apice integro, piceo. Thorax antice posticeque truncatus, subfinuatus. Elytra nigra, immaculata, obsolete striata. Pedes nigri.

arenarium. 5. *O. griseum*, elytris striatis. *Syst. Ent.* 76. 3. *

Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*

orientale. 6. *O. cinereum*, thorace elytrisque rugosis, tibiis anticis dilatatis triangularibus. *Syst. Ent.* 76. 3. *

Silpha multistriata. *Forskahl Descript.* 77. 1.

Habitat in Orientis arenosis.

tibiale. 7. *O. nigrum*, elytris punctato subrugosis, tibiis anticis compresso triangularibus.

Habitat sub lapidibus Scaniae. *Mus. Dom. Banks.*

Corpus paruum. Capitis clypeus emarginatus. Caput et thorax laeuia, nigra, immaculata. Elytra lineis eleuatis, obsoletis rugosa. Tibiae antice basi bidentatae, apice triangulares, compressae.

minutum. 8. *O. cinereum*, thorace rugoso, elytris lineis eleuatis quatuor laeuibus. *Syst. Ent.* 77. 5. *

Habitat in Sueciae arenosis.

Praecedentibus quadruplo minus.

25. NITIDULA.

1. *N. ouata* nigra, elytris puncto rubro. *Syst. Ent.* 77. 1. *2pustulata*
Silpha 2pustulata oblonga nigra, elytris singulis puncto
 rubro. *Linn. Syst. Nat.* 2. 570. 4. *Fu.*
Sv. 445.
Silpha nigra, corpore obtuso, elytris singulis macula
 vnica rubra. *Degeer Inf.* 4. 186. 13. tab. 6. fig. 22. 23.
Dermestes niger, coleoptris punctis rubris binis. *Geoff.*
Inf. 1. 100. 3.
 Habitat in Europae cadaueribus.
2. *N. ouata* nigra obscura, pedibus piceis. *Gen. Inf. Man-* *obscura.*
tiff. 215. *
 Habitat in Germania. *Dom. de Hattorf.*
3. *N. ouata* nigra obscura, elytris laeuius obtusis abbreviatis. *abbreviatis.*
 Habitat in noua Zelandia. *Mus. Dom. Banks.*
 Statura et magnitudo praecedentis. Corpus totum ni-
 grum, subtomentosum, minime nitidum. Elytra
 valde obtusa et fere truncata abdomine multo bre-
 uiora.
 Variat pedibus flauis et nigris.
4. *N. ouata*, elytris fulcatis, margine punctisque disci *margina-*
 ferrugineis. *ta.*
 Habitat in Italia. *Dr. Allioni.*
 Statura *N. 2pustulatae*. Corpus subtus piceum. Tho-
 rax niger margine late ferrugineo. Elytra margina-
 ta, nigra margine punctisque aliquot disci ferru-
 gineis.
5. *N. testacea* subtomentosa, thorace emarginato, oculis *aestiuata.*
 nigris. *Syst. Ent.* 77. 2.
Silpha aestiuata testacea subtomentosa, thorace emargi-
 nato, oculis nigris. *Linn. Syst. Nat.* 2. 574. 32. *Fu.*
Sv. 465.
 Habitat in Europae floribus.
6. *N. ouata*, thorace marginato, ferruginea, capite fu- *ferrugi-*
 sco. *Syst. Ent.* 77. 3. * *nea.*

Dermestes ferrugineus oblongus ferrugineus semicylindricus, elytris abbreviatis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 564. 21. ? *Fn. Sv.* 433. ?

Habitat in Angliae Lycoperdis, capt. d. 9. Iul.

varia. 7. *N. ouata*, thorace elytrisque nigro ferrugineoque variis.

Habitat Kiliae in hortis.

Statura omnino praecedentis. Corpus fuscum. Thorax marginatus, variegatus margine ferrugineo. Elytra striata, marginata, variegata margine ferrugineo. Pedes ferruginei.

bicolor. 8. *N. ferruginea*, elytris nigris, fascia bascos punctoque apicis ferrugineis. *Gen. Inf. Mant.* 216. *

Habitat in aruis Kiloniensibus. *Dom. Lund.*

Colon. 9. *N. nigra*, elytris ferrugineo variis, thorace emarginato. *Syst. Ent.* 78. 4.

Silpha Colon nigra, elytris ferrugineo variis, thorace emarginato, tergo duplici puncto impresso. *Linn. Syst. Nat.* 2. 573. 27. *Fn. Sv.* 462.

Silpha Colon rufo fusca nigro maculata, thorace duplici puncto impresso, corpore subtus toto fusco. *Degeer Inf.* 4. 117. 14. tab. 6. fig. 24.

Habitat in Europae borealis graminosis.

haemor- rhoidalis. 10. *N. nigra*, elytris apice ferrugineis. *Gen. Inf. Mant.* 216. *

Habitat Hamburgi. *Dr. Schulz.*

discoidea. 11. *N. thorace marginato nigra*, elytrorum disco ferrugineo. *Syst. Ent.* 78. 5. *

Habitat in Anglia. *Mus. Dom. Banks.*

pedicularia. 12. *N. nigra*, elytris laevis, thorace marginato. *Syst. Ent.* 78. 6.

Silpha pedicularia nigra, elytris laevis, thorace marginato. *Linn. Syst. Nat.* 2. 574. 34. *Fn. Sv.* 466.

Dermestes psyllius ouatus niger, abdomine obtuso, thorace elytrisque marginatis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 564. 25. *Fn. Sv.* 436.

Habitat in Europae borealis hortis, floribus.

13. N. thorace marginato viridiaenea, antennis pedibus- *aenea.*
que nigris. *Syst. Ent.* 78. 7. *
Habitat in Anglia. *Mus. Dom. Banks.*
14. N. thorace elytris que griseis pubescentibus. *pubescens.*
Habitat in Germania. *Dom. de Hattorf.*
Antennae clava solida. Corpus paruum supra griseum
nitidum pilis erectis breuibus adpersum.
15. N. atra, thorace elytris que pubescentibus. *hirta.*
Habitat in Germania. *Dom. de Hattorf.*
Nimis praecedenti affinis, differt tamen colore toto
atro.
16. N. nigra nitida, pedibus pallidis. *Syst. Ent.* 78. 8. *rufipes.*
Silpha rufipes nigra laevis, thorace submarginato, pe-
dibus ferrugineis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 573. 24.
Habitat in Europae, Angliae hortis.

26. COCCINELLA.

1. C. coleoptris rubris, margine nigro, thorace vtrinque *marginata.*
puncto marginali albo. *Syst. Ent.* 79. 1.
Coccinella marginata coleoptris flauis immaculatis,
margine nigro, thoracis margine punctis duobus al-
bis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 579. 1.
Habitat in America meridionali.
2. C. coleoptris rubris immaculatis, thorace capiteque ni- *viridissima.*
gris. *Syst. Ent.* 79. 2. *Linn. Syst. Nat.* 2. 579. 2. *menfis.*
Amoen. acad. 6. 393. 12.
Habitat in America meridionali.
3. C. coleoptris sanguineis immaculatis, thorace maculis *sanguinea.*
nigris. *Syst. Ent.* 79. 3. *Linn. Syst. Nat.* 2. 579. 3. *na.*
Amoen. acad. 6. 393. 4.
Habitat in America meridionali.
Parua, subtus atra.
4. C. coleoptris rubris, puncto nullo. *Syst. Ent.* 79. 4. *impunctata.*
Linn. Syst. Nat. 2. 579. 4.
Degeer Inf. 5. 369. 1.
Habitat in Sueciae hortis.

- dimidiata*. 5. *C. coleoptris sanguineis apice atris.*
Habitat in Coromandel. *Mus. Dom. Banks.*
Magna. Caput et thorax rufa, immaculata. Elytra sanguinea futura apiceque late atris. Corpus et pedes flavescentes.
- lineola*. 6. *C. elytris rubris, lineola bascos apicisque nigra.* *Syst. Ent.* 79. 5. *
Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
- unifasciata*. 7. *C. coleoptris rubris, fascia media atra.* *Gen. Inf. Mant.* 217. *
Habitat Hamburgi. *Dr. Schulz.*
Variat punctis duobus capitis thoracisque margine albis.
- annulata*. 8. *C. coleoptris rubris, macula subannulari nigra.* *Linn. Syst. Nat.* 2. 579. 5.
Habitat in Germania.
- lineata*. 9. *C. coleoptris flauis, lineis sex punctisque tribus nigris.*
Habitat in Sibiria. *Pallas. Mus. Dom. Banks.*
Magna. Corpus nigrum. Caput punctis duobus bascos albis. Thorax ater punctis duobus bascos albis. Margo exterior albus macula nigra. Elytra flaua lineis tribus atris, quae tamen nec basin nec apicem attingunt, exterioribus duabus ante basin coeuntibus. Punctum praeterea oblongum versus apicem et commune bifidum.
- 2 punctata*. 10. *C. coleoptris rubris, punctis nigris duobus.* *Syst. Ent.* 79. 6. *Linn. Syst. Nat.* 2. 580. 7. *Geoff. Inf.* 1. 320.
Scarabaeus alter niger exiguus, pennarum crustis minutulis, in quibus duae tantum maculae nigrae. *List. Scarab. Angl.* 383. 8. *
Scarabaeus hemisphaericus minor, elytris e flauo rubentibus, singulis maculis seu punctis nigris media parte notatis. *Raj. Inf.* 86. 2.
Coccinella anglica bimaculata seu minor rubra. *Petiv. Gazoph.* 34. tab. 21. fig. 4.
Coccinella secundae magnitudinis, punctis coleoptorum duobus. *Frisch. Inf.* 9. 33. tab. 16. fig. 4.

Schaeff. Inf. tab. 9. fig. 9.
Sulz. Hist. Inf. tab. 3. fig. 3.
Atf. Nidros. 3. tab. 6. fig. 2.
Reaum. Inf. 3. tab. 31. fig. 16.
Degeer Inf. 5. 369. 2.

Habitat in Europae hortis frequens, victitans Aphidibus.

11. *C. coleoptris luteis*, maculis duabus nigris longitudinalibus sinuatis. *Syst. Ent.* 80. 7. * *Linn. Syst. Nat.* 2. 580. 14. *Fn. Sv.* 476. *hieroglyphica.*

Coccinella coleoptris flavo rubris, fasciis irregularibus sinuatis nigris. *Degeer Inf.* 4. 382. 15.

Sulz. Hist. Inf. tab. 3. fig. 4.

Habitat in Europae hortis.

12. *C. coleoptris luteis*, fascia flexuosa punctisque duobus nigris. *Gen. Inf. Mant.* 217. * *flexuosa.*

Habitat Hamburgi. *Dr. Schulz.*

13. *C. coleoptris flavis*, punctis anticis tribus, futura fasciisque apicis nigris. *Syst. Ent.* 80. 8. * *inaequalis.*

Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

14. *C. coleoptris rubris*, fasciis nigris tribus. *Syst. Ent.* 80. 9. *Linn. Syst. Nat.* 2. 580. 13. *Fn. Sv.* 475. *trifasciata.*

Scarabaeus hemisphaericus minor, elytris ex albo liuentibus, lineolis nigris in medio dorsi pictis. *Raj. Inf.* 87. 9.

Inf. 87. 9.

Habitat in Europae hortis.

15. *C. coleoptris ferrugineis*, fasciis duabus punctisque duobus nigris. *2fasciata.*

Habitat - - - - *Mus. Dom. Banks.*

Magna. Caput et thorax ferruginea, immaculata. Elytra ferruginea antice fasciis duabus inaequalibus postice punctis duobus magnis nigris. Corpus nigrum margine ferrugineo. Pedes ferruginei.

16. *C. coleoptris flavis*, punctis nigris quatuor. *Syst. Ent.* 80. 10. *Linn. Syst. Nat.* 2. 580. 9. *4punctata.*

Habitat in Europa: media.

- 5puncta- 17. *C. coleoptris fanguineis, punctis nigris quinque.* *Syst. Ent.* 80. 10. *Linn. Syst. Nat.* 2. 580. 4. *Fn. Sv.* 474. *Groff. Inf.* 1. 320. 2.
Coccinella coleoptris rubris, punctis tribus magnis, duobusque minimis. *Degeer Inf.* 5. 370. 7.
Schaeff. Icon. tab. 9. fig. 8.
Merian. Europ. tab. 69.
 Habitat in Europae arboribus.
- 6puncta- 18. *C. coleoptris rubris, punctis nigris sex.* *Linn. Syst. Nat.* 2. 580. 12.
 Habitat in Europae hortis.
 Parua. Caput atrum punctis duobus albis. Thorax ater nitidus margine punctisque duobus dorfalibus albis. Elytra rubra punctis duobus pone medium et vnico versus apicem nigris.
- glacialis. 19. *C. coleoptris rubris, punctis sex nigris, intermediis maioribus sinuatis.* *Syst. Ent.* 80. 12. *
 Habitat in America boreali. *Dom. Drury.*
- 6maculata. 20. *C. coleoptris rubris, punctis sex nigris, anticis quatuor transuersis sinuatis.*
 Habitat in India orientali. *Mus. Dom. Banks.*
 Media. Caput albidum. Thorax antice albus macula atra, postice ater. Elytra rubra futura atra maculisque tribus 1. 1. 1. quarum duae anteriores, maiores, transuersae, sinuatae. Corpus pallide flauescens.
- 7puncta- 21. *C. coleoptris rubris, punctis nigris septem.* *Syst. Ent.* 81. 13. *Linn. Syst. Nat.* 2. 581. 15. *Fn. Sv.* 477. *Geoff. Inf.* 1. 321. tab. 6. fig. 1.
Coccinella anglica vulgatissima rubra septem nigris maculis punctata. *Petiv. Gazoph.* tab. 21. fig. 3.
Coccinella maior. *Frisch. Inf.* 4. tab. 1. fig. 4.
Scarabaeus subrotundus s. *hemisphaerius rubens maior vulgatissimus.* *Raj. Inf.* 86. 1.
Scarabaeus alter niger. *List. Scar. Angl.* 382. 7. *Roef. Inf.* 2. *Scar.* 3. pag. 7. tab. 2.
Hollar tab. 4. fig. 8.

Schaeff. Icon. tab. 9. fig. 7.

Degeer Inf. 5. 370. 4. tab. 10. fig. 14.

Habitat in Europae plantis frequens.

Puncta elytrorum in triangulum posita.

22. *C. coleoptris rubris, punctis nigris septem, communi trilobo, corpore oblongo. Gen. Inf. Mant. 218. ** *7maculata.*

Habitat in Germania. *D. Schulz.*

Differt manifeste a praecedente.

23. *C. coleoptris rubris, punctis nigris octo. Syst. Ent. 81. 14. ** *8punctata.*

Habitat in Germania. *Dom. de Hattorf.*

Punctum unicum ad basin et tria in medio.

24. *C. coleoptris luteis, maculis octo nigris, anticis quatuor transuersis sinuatis. transuersalis.*

Habitat in Coromandel. *Mus. Dom. Banks.*

Media. Caput nigrum. Thorax ater, nitidus macula vtrinque apicis alba. Elytra flava, nitida maculis quatuor 1. 1. 2., quarum duae anteriores maiores, transuersae, sinuatae. Sutura nigra. Corpus nigrum.

25. *C. coleoptris luteis, punctis nigris octo, anticis sex transuersis sinuatis. 8maculata.*

Habitat - - - - *Mus. Dom. Banks.*

Magna. Caput obscure luteum oculis nigris. Thorax luteus macula baseos palmata nigra. Elytra flava sutura nigra. Puncta quatuor 1. 1. 1. 1., quorum tria anteriora maiora, transuersalia, sinuata, ultimum apicis. Corpus nigrum.

26. *C. coleoptris rubris, punctis nouem nigris, postico communi, thorace bipunctato. 9maculata.*

*Coccinella 9punctata. Syst. Ent. 81. 15. **

Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

27. *C. coleoptris rubris, punctis nigris nouem. Linn. Syst. Nat. 2. 581. 16. Fn. Sv. 478. 9punctata.*

Coccinella 10punctata. Syst. Ent. 81. 16.

Fabr. Spec. Inf.

G

Cocci-

Coccinella coleoptris rubris punctis nouem nigris, thorace nigro lateribus albis. *Geoff. Inf.* 1. 322. 4.

Coccinella nigra, elytris rubris punctis nouem nigris.
Vdm. Diff. 14.

Degeer Inf. 5. 373. 6.

Habitat in Europae hortis.

Puncta 2. 2. oblique posita et communi maiori.

10puncta-28. *C. coleoptris* fuluis, punctis nigris decem, thorace quadrimaculato. *Syst. Ent.* 82. 17. *Linn. Syst. Nat.* 2. 581. 17. *Fn. Sv.* 479. *Scop. carn.* 237.

Coccinella coleoptris flauo rubris, punctis nigris decem in cruce directis. *Degeer Inf.* 5. 374. 7.

Habitat in Europae plantis.

10maculata-29. *C. oblonga*, elytris fuluis, punctis nigris decem, duobus communibus.

Habitat in America boreali. *Mus. Dom. Banks.*

Statura oblonga *C. 13punctatae*. Caput atrum linea frontali sanguinea. Thorax niger margine sanguineo. Elytra sanguinea punctis quatuor 1. 1. 1. 1. et duobus communibus. Corpus atrum.

dilatata-30. *C. subrotunda*, coleoptris marginatis fuluis, punctis nigris decem, thorace bipunctato. *Syst. Ent.* 82. 18.*
Habitat in America. *Mus. Brit.*

11puncta-31. *C. coleoptris* rubris, punctis nigris vndecim. *Syst. Ent.* 82. 19. *Linn. Syst. Nat.* 2. 581. 18. *Fn. Sv.* 480.

Coccinella coleoptris rubris, punctis vndecim nigris, thorace rubro immaculato. *Geoff. Inf.* 1. 325. 9.

Stroem. Act. Nidr. 3. tab. 6. fig. 2.

Degeer Inf. 5. 375. 8.

Habitat in Europa boreali.

Puncta 1. 2. 2. obliqua et baseos communi.

12puncta-32. *C. coleoptris* flauis, punctis nigris duodecim, extremis linearibus repandis. *Syst. Ent.* 82. 20. *Linn. Syst. Nat.* 2. 581. 19.

Habitat in Europae hortis.

33. *C. coleoptris flavis*, punctis nigris duodecim fascia- *variegata*.
que media nigris.
- Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*
- Media. Caput flauum oculis nigris. Thorax flauus punctis quinque baseos nigris. Elytra flaua punctis duobus baseos, fascia in medio maculis tribus orta et versus apicem punctis 3. 1. atris.
34. *C. coleoptris rufis*, punctis nigris duodecim, thorace *chrysome-*
immaculato. *Syst. Ent.* 82. 21. * *lina.*
- Habitat in Infula St. Helenae. *Mus. Dom. Banks.*
- Puncta elytrorum 2. 2. 2.
35. *C. coleoptris flavis*, punctis nigris duodecim, duobus *borealis.*
communibus, vltimis orbiculatis. *Syst. Ent.* 82. 22. *
- Habitat in America boreali. *Dom. Drury.*
- Puncta elytrorum 3. 3. 1. vltimo maiore.
36. *C. oblonga rubra*, coleoptris punctis duodecim, tho- *castidea.*
race quatuor nigris. *Syst. Ent.* 82. 23. *
- Habitat in America boreali. *Mus. Brit.*
37. *C. coleoptris flavis*, punctis nigris tredecim corpore *13macu-*
orbiculato. *Syst. Ent.* 83. 24. * *ta.*
- Coccinella 13maculata* coleoptris luteis, punctis nigris tredecim, thorace albo nigro punctato. *Forst. nou. sp. Cent.* 1. 18. 18.
- Habitat in Europa boreali.
- Puncta elytrorum 1. 3. 2. et communi.
38. *C. coleoptris luteis*, punctis nigris tredecim corpore *13puncta-*
oblongo. *Syst. Ent.* 83. 25. *Linn. Syst. Nat.* 2. 582. *ta.*
20. *Geoff. Inf.* 1. 323. 6.
- Coccinella* coleoptris rubris, punctis nigris tredecim.
- Degeer Inf.* 5. 375. 9.
- Reaum. Inf.* 3. tab. 31. fig. 79.
- Schaeff. Icon.* tab. 48. fig. 6.
- Habitat in Europa frequens.
- Puncta elytrorum 1. 2. 2. 1. et communi baseos.
39. *C. coleoptris flavis*, punctis nigris quatuordecim, qui- *14puncta-*
busdam contiguis. *Syst. Ent.* 83. 26. *Linn. Syst. Nat.* *ta.*
2. 582. 21. *Fn. Sv.* 482.

Coccinella tessulata. Scop. carn. 243.

Schaeff. Icon. tab. 62. fig. 6.

Habitat in Europae hortis frequens.

ocellata. 40. *C. coleoptris luteis, punctis nigris quindecim subocellatis*. Syst. Ent. 83. 27. Linn. Syst. Nat. 2. 582. 23. Fn. Sv. 484.

Coccinella elytris flavo luteis, punctis 15 nigris, oculo flavo cinctis. Gad. Sat. 16.

Coccinella coleoptris rubris punctis quindecim nigris flavo marginatis. Degeer Inf. 5. 376. 10. tab. 11. fig. 1.

Schaeff. Icon. tab. 1. fig. 2.

Elem. tab. 47. fig. 1.

Merian. Inf. Europ. 48. fig. 5.

Habitat in Europae hortis.

Thorax ater margine albo puncto atro. Punctaque duo alba ad basin. Puncta elytrorum 1. 3. 3. posticis fere obsoletis.

16puncta- 41. *C. coleoptris luteis, punctis nigris sedecim*.
ta. Habitat in Italia. Dr. Allioni.

Maior, oblonga. Caput albidum punctis quatuor nigris. Thorax albidus punctis plurimis approximatis. Elytra lutea punctis 1. 3. 3. 1. distinctis nigris.

18puncta- 42. *C. coleoptris flavis, punctis nigris octodecim, ultimo*
ta. arcuato. Syst. Ent. 83. 28. Linn. Syst. Nat. 2. 582. 24.

Habitat in Europa boreali.

Thorax lateribus flavis.

19puncta- 43. *C. coleoptris flavis, punctis nigris nouendecim*. Syst.
ta. Ent. 83. 29. Linn. Syst. Nat. 2. 582. 25. Fn. Sv. 485.
Geoff. Inf. 1. 325. 10.

Coccinella lutea, thorace punctis sex elytris nouendecim nigris. Müll. Zool. Dan. prodr. 67. 632.

Habitat in Europae plantis.

Puncta elytrorum 2. 3. 3. 1. et vnico communi.

20puncta- 44. *C. coleoptris flavis, punctis nigris viginti*. Syst. Ent.
ta. 84. 30. * Geoff. Inf. 1. 329. 17.

Scopol. Carn. 242.

Habitat in Europa rarius.

Elytrorum puncta 3. 3. et quatuor apicis in quadrato.

45. *C. coleoptris flavis*, punctis nigris viginti duobus. *Syst. Ent.* 84. 31. *Linn. Syst. Nat.* 2. 582. 26. *Fn. Sv.* 486. *22 punctata.*

Coccinella coleoptris flavo citreis, punctis viginti duobus thoraceque quinque nigris. *Degeer Inf.* 5. 379. 12.

Scarabaeus hemisphaericus flavus maculis nigris crebris. *Raj. Inf.* 87. 6.
Schaeff. Icon. tab. 30. fig. 10.

Habitat in Europae hortis.

Parua. Puncta elytrorum 4. 4. 3.

46. *C. coleoptris rubris*, punctis nigris viginti tribus distinctis. *Syst. Ent.* 84. 32. *Linn. Syst. Nat.* 2. 582. 27. *23 punctata.*

Habitat in Germaniae plantis.

Thorax ruber punctis tribus nigris. Puncta elytrorum 3. 3. 3. 2. et communi baseos.

47. *C. coleoptris rubris*, punctis nigris viginti quatuor. *Syst. Ent.* 84. 33. *Linn. Syst. Nat.* 2. 583. 28. *Fn. Sv.* 487. *Geoff. Inf.* 1. 326. 11. *24 punctata.*

Coccinella coleoptris rufo fuscis, maculis quatuordecim quibusdam connexis punctisque decem nigris. *Degeer Inf.* 5. 381. 14.

Habitat in Europae hortis.

Puncta elytrorum 3. 4. 3. 2. vltimis obliquis.

48. *C. coleoptris rubris*, punctis nigris viginti octo. *Syst. Ent.* 84. 34. * *28 punctata.*

Habitat Tranquebariae. *Dr. Koenig.*

Puncta elytrorum 3. 4. 3. 2. 2.

49. *C. coleoptris flavescentibus*, punctis nigris plurimis contiguis. *Syst. Ent.* 84. 35. *Linn. Syst. Nat.* 2. 583. 31. *Fn. Sv.* 490. *conglomerata.*

Coccinella coleoptris rubris, punctis plurimis nigris quibusdam connexis futura longitudinali nigra. *Geoff. Inf.* 1. 316. 12.

Coccinella tessellata coleoptris pallide flavis, maculis plurimis quadratis nigris connexis. *Degeer Inf.* 5. 383. 17.

Scarabaeus hemisphaericus flavus, maculis nigris variae figurae depictus. *Raj. Inf.* 87. 5.

Scarabaeus luteus nigris maculis distinctus. *List. Loqu.* 383. 9.

Frisch. Inf. 9. 34. tab. 17. fig. 6.

Schaeff. Icon. tab. 171. fig. 1. a. b.

β. *Coccinella conglobata* coleoptris rubris, punctis nigris plurimis subcontiguis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 583. 30. *Geoff. Inf.* 1. 326. 12.

Coccinella rosea coleoptris rubris roseis, punctis sedecim nigris quibusdam connexis, thorace flavo punctis nigris. *Degeer Inf.* 5. 378. 11.

Habitat in Europae hortis frequens.

α. et β. vix distinctae species.

detrita. 50. *C. flava*, coleoptris immaculatis, thorace albo maculato. *Syst. Ent.* 85. 36. *

Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

10guttata. 51. *C. coleoptris* luteis, punctis albis decem. *Syst. Ent.* 85. 37. *Linn. Syst. Nat.* 2. 583. 33.

Habitat in Sueciae hortis.

Puncta elytrorum 2. 2. 1.

14guttata. 52. *C. coleoptris* rufis, punctis albis quatuordecim. *Syst. Ent.* 85. 38. *Linn. Syst. Nat.* 2. 34. *Fn. Sv.* 492. *Geoff. Inf.* 1. 327. 13.

Scarabaeus hemisphaericus, elytris fulvis maculis albis pictus. *Raj. Inf.* 86. 3.

Scarabaeus subrufus. *List. Scar. Angl.* 383.

Schaeff. Icon. tab. 9. fig. 11.

Degeer Inf. 5. 385. 20.

Habitat in Europae salicibus.

Puncta elytrorum 1. 3. 2. 1.

15guttata. 53. *C. coleoptris* luteis, punctis quindecim albis, communi medio, obsoleto. *Gen. Inf. Mant.* 219. *

Coccinella coleoptris rubris, punctis quatuordecim
limboque albis. *Geoff. Inf.* 1. 327. 14.

Habitat in Europa australiori. *D. Schulz.*

Puncta elytrorum 2. 2. 2. 1.

54. *C. coleoptris luteis*, punctis albis sedecim. *Syst. Ent.* 16guttata.
85. 39. *Linn. Syst. Nat.* 2. 584. 35. *Fn. Sv.* 493.

Coccinella 16guttata. *Scop. carn.* 240.

Degeer Inf. 5. 385. 21.

Sulz. Hist. Inf. tab. 3. fig. 5.

Habitat in Europa.

Puncta elytrorum 3. 3. 1. 1.

55. *C. coleoptris rubris*, punctis albis octodecim. *Syst.* 18guttata.
Ent. 85. 40. *Linn. Syst. Nat.* 2. 385. 37.

Scop. Ent. carn. 241.

Schaeff. Icon. tab. 9. fig. 12.

Habitat in Europa.

Puncta elytrorum 1. 2. 3. 2. 1.

56. *C. coleoptris rubris*, punctis albis viginti. *Syst. Ent.* 20guttata.
85. 41. *Linn. Syst. Nat.* 2. 584. 37. *Fn. Sv.* 495.

Coccinella flavo rubra seu nigra, coleoptris maculis
magnis albis viginti. *Degeer Inf.* 5. 386. 22.

Habitat in Europa.

Puncta elytrorum 2. 2. 3. 2. 1. anticis obliquis.

57. *C. coleoptris rubris*, lineis punctisque albis. *Syst.* oblongo-
Ent. 85. 42. *Linn. Syst. Nat.* 2. 584. 38. *Fn. Sv.* 496. guttata.

Coccinella coleoptris flavo rufis, lineis maculisque oblon-
gis fordide albis. *Degeer Inf.* 5. 384. 19.

Scop. Ent. carn. 242.

Schaeff. Icon. tab. 9. fig. 10.

Bergstr. Nomencl. 1. tab. 9. fig. 6.

Sulz. Hist. Inf. tab. 3. fig. 14.

Habitat in hortis rarius.

58. *C. coleoptris nigris*, puncto nullo. *Syst. Ent.* 85. 43. impustu-
Linn. Syst. Nat. 2. 584. 40. lata.

Habitat in Germaniae nemoribus.

Thoracis latera flava puncto nigro.

- haemor- rhoidalis*, 59. *C. coleoptris atris apice rubris, fascia nigra.* *Gen. Inf. Mant.* 219. *
 Habitat Hamburgi. *D. Schulz.*
 Variat frequens puncto communi sanguineo in medio dorfi.
- Cacti.* 60. *C. coleoptris atris, maculis duabus rubris.* *Syst. Ent.* 85. 44. *Linn. Syst. Nat.* 2. 584. 41.
Coccinella coleoptris marginatis nitidis atris, macula solitaria subrotunda vtriuque. *Gron. Zooph.* 609.
Scarabaeus hemisphaericus cochenillifer. *Petiv. Gazoph.* tab. 1. fig. 5.
Sloan. Jam. 2. tab. 237. fig. 31. 33.
 tab. 9. fig. 13.
 Habitat in Americae cactis, saepius inter coccus cacti lecta.
- apustulata.* 61. *C. coleoptris nigris, punctis rubris duobus compositis, abdomine sanguineo.* *Syst. Ent.* 86. 45. *Linn. Syst. Nat.* 2. 585. 42. *Fn. Sv.* 498.
Coccinella rotunda nigra, coleoptrorum margine reflexo, fascia transversa rufa. *Geoff. Inf.* 1. 334. 26.
Coccinella coleoptris nigris, maculis duabus ovatis rubris, abdomine sanguineo. *Degeer Inf.* 5. 387. 27.
 tab. 10. fig. 25.
Coccinella media nigra, punctis duobus rubris dorsalibus. *Frisch. Inf.* 9. 34. tab. 16. fig. 6.
Roef. Inf. 2. *Scarab.* 3. p. 10. tab. 3.
 Habitat in Europa hortis frequens.
- variabilis.* 62. *C. coleoptris nigris, punctis duobus rubris orbiculatis submarginalibus, corpore oblongo.* *Gen. Inf. Mant.* 219. *
 Habitat Hamburgi. *D. Schulz.*
 Variat minor elytris lutescentibus puncto flavescente, at aetate elytra nigra et puncta rubra eadunt.
- apustulata.* 63. *C. coleoptris nigris, punctis rubris quatuor, interioribus longioribus.* *Syst. Ent.* 86. 46. *Linn. Syst. Nat.* 2. 585. 43. *Fn. Sv.* 499.
Coccinella rotunda nigra, coleoptrorum margine reflexo, punctis quatuor rubris. *Geoff. Inf.* 1. 333. 25.

Coccinella coleoptris nigris, maculis quatuor rubris, anterioribus lunatis, posterioribus rotundis. *Degeer Inf.* 5. 389. 24.

Bergstraeff. Nomencl. 1. tab. 9. fig. 5.

Schaeff. Icon. tab. 30. fig. 16. 17.

Habitat in Europae hortis.

Saepius hanc cum *C. 2punctata* copula iunctam vidit.

64. *C. coleoptris nigris*, punctis rubris sex. *Syst. Ent.* 6pustulata. 86. 47. *Linn. Syst. Nat.* 2. 585. 44. *Fn. Sv.* 500.

Coccinella acuta coleoptris nigris, punctis rubris sex. *Geoff. Inf.* 1. 331. 10.

Coccinella coleoptris nigris maculis duabus magnis quatuor minoribus rubris. *Degeer Inf.* 5. 390. 25.

Scarabaeus hemisphaericus minor, elytris nigris rubris maculis pictis. *Raj. Inf.* 87. 4.

Schaeff. Icon. tab. 30. fig. 12.

Habitat in Europae hortis.

Puncta elytrorum 1. 1. 1.

Variat rarius puncto adhuc minutissimo ad futuram rubro.

Sulz. Hist. Inf. tab. 3. fig. 6.

Bergstr. Nomencl. 1. tab. 9. fig. 4.

65. *C. coleoptris nigris*, maculis decem rubris, sex lunatis. *Syst. Ent.* 86. 48. *

Habitat in Insula St. Helenae. *Mus. Dom. Banks.*

66. *C. coleoptris nigris*, punctis fulvis decem. *Syst. Ent.* 10pustulata. 87. 49. *Linn. Syst. Nat.* 2. 585. 35. *Fn. Sv.* 501.

Coccinella coleoptris nigris, punctis decem flavescentibus aut rubris. *Geoff. Inf.* 1. 330. 19.

Coccinella coleoptris nigris, maculis decem fulvis, anterioribus saepe connexis. *Degeer Inf.* 5. 391. 26.

Schaeff. Icon. tab. 30. fig. 10.

tab. 171. fig. 2.

Habitat in Europae hortis.

Variat punctis flavis et rubris.

Puncta elytrorum 2. 2. 1., duo baseos lunata interdum connata,

- 12pustulata.* 67. *C. coleoptris nigris*, punctis duodecim albis, exterioribus margine connexis. *Gen. Inf. Mant.* 219. *
Habitat Hamburgi. *D. Schulz.*
- 14pustulata.* 68. *C. coleoptris nigris*, punctis albis quatuordecim. *Syst. Ent.* 87. 50. *Linn. Syst. Nat.* 2. 585. 46. *Fn. Sv.* 502. *Geoff. Inf.* 1. 530. 18.
Coccinella coleoptris nigris, maculis quatuordecim aequalibus flavis. *Degeer Inf.* 5. 391. 27.
Coccinella 14maculata. *Pod. Musf.* 26.
Schaeff. Icon. tab. 30. fig. 10.
Habitat in Europae floribus.
Puncta elytrorum 2. 2. 2. 1. interdum flava, interdum rubra.
- guttato-pustulata.* 69. *C. coleoptris nigris*, punctis duobus flavis quatuor-que rufis. *Syst. Ent.* 87. 51. *
Habitat in noua Hollandia. *Musf. Dom. Banks.*
- felina.* 70. *C. coleoptris atris*, punctis sex albis, corpore globoso. *Syst. Ent.* 87. 52. *
Habitat in America boreali. *Dom. Drury.*
- pantherina.* 71. *C. coleoptris nigris*, punctis flavis octo. *Syst. Ent.* 87. 53. *Linn. Syst. Nat.* 2. 585. 48. *Fn. Sv.* 504.
Coccinella coleoptris nigro fuscis, maculis decem albo-flauescentibus. *Degeer Inf.* 5. 392. 28.
Habitat in Europa boreali.
Puncta elytrorum 1. 2. 1.
- pardalina.* 72. *C. coleoptris nigris*, punctis decem margineque sinuato albis.
Habitat - - - - *Musf. Dom. Banks.*
Magna. Caput atrum maculis duabus baseos albis. Thorax ater fascia media valde sinuata margineque laterali albis. Elytra margine sinubus tribus albo. Puncta in disco quinque 1. 2. 1. 1. Corpus atrum.
- leonina.* 73. *C. coleoptris atris*, punctis albis sedecim. *Syst. Ent.* 87. 54. *
Habitat in noua Hollandia. *Musf. Dom. Banks.*

74. *C. coleoptris nigris*, punctis albis viginti. *Syst. Ent. tigrina.*
88. 55. *Linn. Syst. Nat.* 2. 586. 49. *Fn. Sv.* 505.

Coccinella coleoptris nigris, punctis viginti albis. *Vdm.*
Diff. 11.

Schaeff. Icon. tab. 30. fig. 9.

Habitat in Europa boreali.

Varietatem *C. 2oguttatae* credit *Degeer*.

75. *C. coleoptris nigris*, punctis albis viginti, capite tho- *canina.*
raceque villosis immaculatis.

Habitat ad Cap. bon. sp. *Muf. Dom. Banks.*

Distincta sane a *C. tigrina*. Magna. Caput et thorax
nigra cinereo villosa, immaculata. Elytra nigra
punctis albis viginti intermedio lunato 2. 3. 2. 2. 1.
Corpus nigrum.

27. CASSIDA.

1. *C. viridis*, corpore nigro. *Syst. Ent.* 88. 1. *Linn. Syst. viridis.*
Nat. 2. 574. 1. *Fn. Sv.* 467. *Geoff. Inf.* 1. 313. 1.
Scop. carn. 117.

Cassida Cardui viridis, corpore nigro, pedibus flau-
escentibus. *Degeer Inf.* 5. 174. 2.

Scarabaeus antennis clauatis, clavis in annulos diuisis.
Raj. Inf. 107. 5.

Testudo viridis. *Goedart. Belg.* 1. 94. tab. 43.

Roef. Inf. 2. *Scarab.* 3. tab. 6.

Reaum. Inf. 3. tab. 18.

Merian. Europ. tab. 115.

Schaeff. Icon. tab. 27. fig. 5.

Habitat in Europae carduis frequens.

Larva depressa hexapoda spinis lateralibus acutis, cauda
bifeta, proprio stercore tecta obambulat.

2. *C. viridis*, elytris rarius, futura dorsali confertius nigro *maculata.*
maculatis. *Syst. Ent.* 88. 2. *Linn. Syst. Nat.* 2.
575. 6.

Cassida viridis maculis nigris variegata. *Geoff. Inf.* 1.
314. 5. tab. 5. fig. 6.

Cassida supra viridis, subtus nigra, elytris aliquot nigro maculatis, pedibus nigris. *Degeer Inf.* 5. 175. 3.
Habitat in Germaniae plantis.
Forte praecedentis mera varietas.

affinis. 3. *C.* elytris griseis nigro punctatis, thorace flavescente immaculato. *Syst. Ent.* 88. 3. *
Habitat in Germania. *Dom. de Hattorf.*
Praecedentibus nimis affinis.

vibex. 4. *C.* virens, futura dorsali sanguinolenta. *Syst. Ent.* 89. 4. *Linn. Syst. Nat.* 2. 575. 5.
Habitat in Germaniae plantis.

nebulosa. 5. *C.* pallido nebulosa fusco punctata. *Syst. Ent.* 89. 5. *Linn. Syst. Nat.* 2. 575. 3. *Fn. Sv.* 468.
Cassida nebulosa pallida, corpore nigro. *Geoff. Inf.* 1. 313. 2.
Scarabaeus minor fordide fuluus punctis et maculis aliquot nigris temere sparsis notatus. *Raj. Inf.* 88. 13.
Cassida viridis. *Frisch. Inf.* 4. 30. tab. 15.
Schaeff. Icon. tab. 27. fig. 4.
Habitat in Europae carduis.

murraea. 6. *C.* nigra, clypeo rubro, elytris sanguineis, punctis nigris sparsis. *Syst. Ent.* 90. 10. *Linn. Syst. Nat.* 2. 575. 2.
Cassida rubra maculis nigris variegata. *Geoff. Inf.* 1. 314. 5. β .
Habitat in Europae plantis.
Varietatem *C. maculatae* credit *Geoffroy*.

ferruginea. 7. *C.* nigra, thorace elytrisque ferrugineis immaculatis. *Cassida subferruginea.* *Schrank. Beytr.* 62. 3.
Habitat in Germania.
Paullo minor *C. viridis* supra tota ferruginea. Elytra punctata.
Forte omnes praecedentes merae varietates. Statura omnium simillima.

marginella. 8. *C.* viridis, thoracis elytrorumque marginibus flavis. *Syst. Ent.* 89. 6. *
Habitat in Brasilia. *Mus. Dom. Banks.*

9. *C. thorace elytrisque obscuris, margine flavescente, cincta.*
 elytris ante marginem macula albo hyalina.
 Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*
 Statura omnino *C. interruptae*. Thorax rotundatus,
 integer obscurus margine flavescente. Elytra obscura
 margine flavo et ante marginem macula magna
 albo hyalina.
 Variat rarius macula magna marginis ad basin et ante
 apicem.
10. *C. pallida, coleoptris lineolis numerosissimis difformi- hebraea.*
 bus nigris.
 Habitat Cajennae. *D. Schulz.*
 Parua. Corpus flavescens. Thoracis coleoptrorumque
 margo pallidus, immaculatus, discus lineolis nume-
 rosis, difformibus nigris. Pedes pallidi.
11. *C. ferruginea, coleoptrorum disco punctis impressis indaica.*
 maculisque nigris.
 Habitat Cajennae. *D. Schulz.*
 Praecedente minor. Thorax ferrugineus, immacula-
 tus margine pallidiore. Coleoptra ferruginea mar-
 gine pallidiore disco punctato maculisque nigris.
12. *C. flavescens, coleoptrorum disco fusco, annulo fla- annulus.*
 uescente.
 Habitat Cajennae. *D. Schulz.*
 Statura praecedentium. Thorax flavescens, immacula-
 tus. Coleoptra in medio dorsi annulo flavescente.
13. *C. flavescens, coleoptrorum disco ferrugineo, punctis 6puncta-*
 sex nigris. *ta.*
 Habitat Cajennae. *D. Schulz.*
 Margo omnis pallidus. Puncta elytrorum duo ad mar-
 ginem, tertium ad futuram.
14. *C. flavescens, thorace immaculato, elytris ante mar- inter-*
 ginem punctisque nigris. *Syst. Ent. 89. 7. ** *rupta.*
 Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
15. *C. rufescens, thorace punctis duobus, elytris nume- deusta.*
 rosis cyaneo nigris, clypeo integro. *Syst. Ent.*
*89. 8. **
 Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

- cribraria*. 16. *C. rufescens*, thorace punctis quatuor, elytris numerosis nigris, clypeo emarginato. *Syst. Ent.* 90. 9. *
Habitat in America. *Mus. Dom. Banks*.
- nobilis*. 17. *C. grisea*, elytris linea coerulea nitidissima. *Syst. Ent.* 90. 11. *Linn. Syst. Nat.* 2. 575. 4.
Cassida pallida, linea duplici longitudinali deaurata.
Geoff. Inf. 1. 313. 3.
Scarabaeus antennis clauatis, clavis in annulos diuisis.
Raj. Inf. 107. 7.
Schaeff. Icon. tab. 96. fig. 6.
Habitat in Europae plantis stellatis carduis.
Linea elytrorum cum vita perit, in aqua calida reuiuiscit.
- cruciata*. 18. *C. flauescens*, coleoptris disco nigro, maculis quatuor flauescens. *Syst. Ent.* 90. 12. *
Cassida cruciata pallida, elytris disco fusco cruciato.
Linn. Syst. Nat. 2. 576. 9.
Cassida hyalina pallide flaua, elytris disco macula magna fusca cruciata. *Degeer Inf.* 5. 187. 12. tab. 15. fig. 15.
Habitat in Europae plantis.
- Cruca*. 19. *C. flaua*, thoracis linea dorsali ferruginea, coleoptris disco ferrugineo maculis quatuor flauis.
Habitat Cajennae. *D. Schulz*.
Nimis praecedenti affinis. Thorax flauus linea media ferruginea. Coleoptra disco ferrugineo lineola bascos et apicis ad marginem excurrente, maculisque duabus flauis, anteriore maiore, posteriore margine connexa.
- impunctata*. 20. *C. flauescens*, thoracis puncto medio, coleoptris vndecim nigris.
Habitat in America meridionali. *Mus. D. Hunter*.
Corpus medium totum flauescens marginibus obscurioribus. Punctum nigrum in medio thoracis. Coleoptra punctis vndecim 2. 1. communi, 1. 2. Corpus subtile dilute ferrugineum.
- tuberculata*. 21. *C. testacea*, margine thoracis elytrorumque flauis, coleoptris basi trituberculatis. *Syst. Ent.* 90. 13. *
Cassida

Cassida marginata testacea, margine thoracis elytrorumque flauo. *Linn. Syst. Nat.* 2. 576. 14.

Cassida cincta ferruginea, thorace aeneo, elytris punctatis, margine flauo. *Degeer Inf.* 5. 186. 11. tab. 15. fig. 14.

Habitat in Sierra Leon Africae.

22. *C. brunnea*, elytris flauis, suturis brunneis. *Gen. Inf. futuralis.* *Mant.* 219. *

Habitat ad Cap. bon. sp. *Dom. Lee.*

23. *C. thorace flauo*, elytris rufescentibus, margine nigro, maculis duabus flauis. *Syst. Ent.* 91. 14. * *biguttata.*

Habitat Cajennae. *Dom. Mauduit.*

24. *C. flaua*, thorace immaculato, elytris nigro punctatis, margine bifasciato. *Syst. Ent.* 91. 15. * *miliaris.*

Habitat in Insula St. Helenae. *Mus. Dom. Banks.*

25. *C. cyaneo nigra*, elytris testaceis, margine nigro. *Syst. marginata.* *Ent.* 91. 16. * *Linn. Syst. Nat.* 2. 578. 23.

Cassida marginata. *Naturf.* 9. tab. 2.

Cassida thorace violaceo nigro, elytris testaceis, margine punctisque duobus nigris. *Degeer Inf.* 5. 185. 10.

Habitat in Indiis.

26. *C. thorace obscuro*, elytris sanguineis, margine cyaneo, maculis duabus rubris. *4pustulata.*

Habitat in America. *Mus. D. Hunter.*

Corpus medium, atrum. Thorax obscure rufus, immaculatus. Elytra rufa margine exteriori late cyaneo maculis duabus magnis rufis. Sutura nigra.

27. *C. luteo aenea*, elytris immaculatis excavato punctatis. *Syst. Ent.* 91. 17. *Linn. Syst. Nat.* 2. 577. 21. *iamaicentis.*

Sloan. Iam. 2. 208. tab. 233. fig. 27. 28.

Habitat in America meridionali.

E spiritu vini extracta colorem aeneum in triste testaceum mutat, aqua calida vero immissa naturalis color reuiuiscit.

28. *C. testacea*, elytris angulo antico spinoso basique perforatis. *Gen. Inf. Mant.* 219. * *perforata.*

Cassida

Cassida perforata. *Pall. spicil. Zool. fasc. 9. 3. tab. 1. fig. 1.*

Habitat in America meridionali.

bicornis. 29. *C. cyanea*, elytris angulo antico spina truncata. *Syst. Ent. 91. 18. Linn. Syst. Nat. 2. 576. 8. Amoen. acad. 6. pag. 193. 9.*

Habitat in Indiis.

cyanea. 30. *C. cyaneo aenea*, elytris immaculatis excavato punctatis. *Syst. Ent. 91. 19. Linn. Syst. Nat. 2. 577. 22. Mus. Lud. Vlr. 39.*

Degeer Inf. 5. 181. 5. tab. 15. fig. 9.

Petiv. Gazoph. tab. 57. fig. 6.

Habitat in America. *Mus. Brit.*

spinifex. 31. *C. ferruginea*, elytris angulo antico spina porrecta, thorace utrinque spina transversa. *Syst. Ent. 92. 20. Linn. Syst. Nat. 2. 576. 7. Amoen. acad. 392. 7.*

Habitat in India.

Linea nigra ad basin elytrorum.

hidens. 32. *C. atra*, elytris antice porrectis, spina futurali erecta. Habitat in Brasilia. *Mus. Dom. Banks.*

Magna. Thoracis clypeus rotundatus, submarginatus dorso carinato niger maculis duabus ferrugineis obsoletis. Elytra reticulata, atra, immaculata, basi ultra caput porrecta, carinata, spinaque in medio futurae elongata, acuta, atra nitida. Corpus atrum femoribus anticis intus pallidis.

gibbosa. 33. *C. atra*, thorace maculis duabus villoso aureis, elytris virescenti reticulatis, spina futurali obtusa.

Habitat in Brasilia. *Mus. Dom. Banks.*

Corpus magnum, atrum. Thoracis clypeus rotundatus, emarginatus maculis duabus magnis villoso aureis. Elytra atra viridi villoso reticulata margine nigro. Sutura in medio elevata in spinam obtusam. Pedes nigri plantis fuscis.

truncata. 34. *C. rufa*, elytris subreticulatis nigro maculatis dorso gibbis.

Habitat - - - - *Mus. Dom. Banks.*

Magna

Magna. Antennae nigrae. Thorax rufus maculis duabus dorsalibus nigris. Elytra basi truncata, gibba, rufa, subreticulata, nigro maculata. Margo rufus maculis simplicibus limboque ipso tenuissime nigro. Corpus nigrum.

35. *C. flava immaculata*, corpore testaceo, puncto scutellari nigro. *Syst. Ent.* 92. 21. *Linn. Syst. Nat.* 2. 276. 11. *flava.*

Cassida pallide flava immaculata, corpore subtus pedibusque rufis. *Degeer Inf.* 5. 184. tab. 15. fig. 13.

Habitat in America australi.

36. *C. testacea*, margine punctisque flavis. *Syst. Ent.* 92. 22. * *Linn. Syst. Nat.* 2. 576. 13. *Amoen. acad.* 6. 393. 10. *leuco-phaea.*

Habitat in America.

37. *C. flava*, elytris coeruleo variegatis, lateribus unifasciatis. *Syst. Ent.* 92. 23. *Linn. Syst. Nat.* 2. 576. 15. *reticularis.*

Cassida pellucida albo flavesceus, elytrorum disco nigro reticulato. *Degeer Inf.* 5. 188. 14. tab. 15. fig. 17.

Habitat in America meridionali.

38. *C. rufa*, elytris coeruleo variegatis, lateribus bifasciatis. *Syst. Ent.* 92. 24. *Linn. Syst. Nat.* 2. 576. 16. *variiegata.*

Cassida fusco rubra, elytris scabris, nigro variegatis, thorace angulato. *Degeer Inf.* 5. 178. 2. tab. 15. fig. 6.

Habitat in America.

39. *C. coerulea*, thorace maculis duabus, elytris annulis *annulata*, rufis.

Cassida annulata. Naturforsch. 9. tab. 2. fig. 6.

Habitat in Indiis. *D. Schulz.*

Magna. Thorax obscurus, minime nitens maculis duabus latis obscure rufis. Elytra gibba obscure coerulea annulis sex rufis, quibusdam flexuosis. Subtus nigra abdominis segmentis vtrinque puncto rufo.

40. *C. sanguinea*, elytris disco punctis nigris sparsis, margine lineis ramosis nigris. *Syst. Ent.* 92. 25. *Linn. Syst. Nat.* 2. 577. 17. *grossa.*

Fabr. Spec. Inf.

H

Cassida

Cassida grossa. *Naturforsch.* 6. tab. 4. fig. 1.

Sulz. Hist. Inf. tab. 3. fig. 1.

Degeer Inf. 5. tab. 15. fig. 5.

Habitat in America meridionali.

exclamationis. 41. *C. elytris lineis ternis nigris, intermedia signum !*
referente. *Syst. Ent.* 92. 27. *Linn. Syst. Nat.* 2.
577. 20.

Habitat in America meridionali.

inaequalis. 42. *C. ferrugineo aenea, elytris macula flava subouata*
disci. *Syst. Ent.* 93. 28. *Linn. Syst. Nat.* 2. 578. 24.

Cassida bimaculata supra fusco aenea, subtus viridis
nitens, elytrorum disco macula magna flava. *Degeer*
Inf. 5. 182. 6. tab. 16. fig. 10.

Naturforsch. 9. tab. 2. fig. 5.

Mus. Petropol. 650. n. 130.

Habitat in America meridionali.

lateralis. 43. *C. fusco aenea, elytris macula flava laterali.* *Syst. Ent.*
93. 29. *Linn. Syst. Nat.* 2. 578. 26.

Cassida fusco aenea, abdomine nigro nitido, elytrorum
marginem exteriorem macula magna flava. *Degeer*
Inf. 5. 184. 8. tab. 15. fig. 12.

Sulz. Hist. Inf. tab. 3. fig. 2.

Habitat in America meridionali.

Praecedenti duplo minor.

discoidea. 44. *C. viridi aenea, elytris macula didyma flava disci.*
Syst. Ent. 93. 30. *Linn. Syst. Nat.* 2. 578. 27.

Cassida 4maculata viridi aenea, nitida, abdomine ni-
gro, elytrorum disco maculis binis magnis flavis.
Degeer Inf. 183. 7. tab. 15. fig. 11.

Habitat in America meridionali.

2pustulata. 45. *C. elytris viridi aeneis, maculis duabus fanguineis.*
Syst. Ent. 93. 31. * *Linn. Syst. Nat.* 2. 578. 30.
Amoen. acad. 6. 392. 8.

Cassida 2pustulata. *Naturforsch.* 6. tab. 4.

Habitat Caiennae.

6pustulata. 46. *C. cyanea, elytris maculis tribus rubris.*
Habitat in Brasilia. *Mus. Dom. Banks.*

Media.

Media. Thoracis clypeus transuersus, cyaneus, immaculatus, antice submarginatus. Elytra medio gibba, cyanea maculis tribus rubris, prima baseos, secunda in margine et tertia versus marginem.

47. *C. nigra*, thorace punctis duobus, elytris septem *16pustulata*
rubris. *ta.*

Habitat in America meridionali. *Mus. Dr. Hunter.*

Medius. Clypeus vtrinque depressus, niger punctis duobus, apicis magnis rubris. Elytra nigra punctis septem magnis rubris 1. 2. 3. 1. Corpus et pedes nigra.

48. *C. nigro coertulescens*, elytris flavo maculatis, maculis dorsalibus reticulatis, lateralibus distinctis, *decurcata*
Syst.
Ent. 93. 32. *

Habitat in Iamaica. *Mus. Brit.*

49. *C. flauescens*, elytris punctis duobus nigris. *Syst.* *2punctata*
Ent. 93. 33. *Linn. Syst. Nat.* 2. 578: 29. *ta.*

Habitat in India orientali.

Variat elytrorum punctis tribus.

28. A L V R N V S.

1. *A. ater*, thorace coccineo, elytris flavis. *Syst. Ent. grossus*
94. 1. *

Habitat in Indiis.

2. *A. viridi aeneus*, femoribus tibiisque posticis dentatis. *femoratus*
Tenebrio femoratus. Drury Inf. 2. tab. 34. fig. 5. *tus.*
Tenebrio viridis. Sulz. Hist. Inf. tab. 7. fig. 8.

Habitat in India orientali. *Mus. Dom. Banks.*

Corpus magnum, laeve, viridi aeneum, nitidum antennae corpore dimidio brevioribus filiformibus articulis ultimis nigris. Femora postica incrassata, bidentata dente anteriori maiori. Tibiae elongatae, obscurioris apice sinuatae, unidentatae.

29. CHRYSOMELA.

- tenebriosa*. 1. *C. aptera* ouata atra antennis pedibusque violaceis.
Syst. Ent. 94. 1.
Chrysomela atro purpurea, elytris coadunatis, alis nullis. *Geoff. Inf.* 1. 295. 19.
Tenebrio laeuigatus apterus niger laeuis, elytris laeuibus, thorace lunato, subtus coeruleus. *Linn. Syst. Nat.* 2. 678. 29.
 Habitat in Europa australiori.
 Larua gibba violacea, ano rufo, plantis victitans, polyphaga.
- goettigenfis*. 2. *C. ouata* atra, pedibus violaceis. *Syst. Ent.* 94. 2.
Linn. Syst. Nat. 2. 586. 4. *Fn. Sv.* 506.
Chrysomela violaceo nigra ouata, thorace corporeque conuexis. *Degeer Inf.* 5. 298. 8.
Roef. Inf. 2. *Scarab.* 3. tab. 5.
 Habitat in Germaniae gramine.
 Plantae rufae.
- vittata*. 3. *C. ouata*, cyanea, elytris margine vittaque media flauis.
 Habitat in America. *D. Schulz.*
 Magna, crassa, ouata. Corpus totum cyaneo nitidum.
 Elytra laeuia margine vittaque lata media flauis, quae antice posticeque coeunt.
- bicolor*. 4. *C. ouata* viridi aenea, subtus violacea. *Syst. Ent.* 95. 3. *
Chrysomela viridi coerulea. *Forsk. Descript.* 77. 2.
 Habitat Alexandriae.
- lusitanica*. 5. *C. ouata*, thorace cupreo, elytris aeneis, subtus violacea.
 Habitat in Lusitania. *Mus. Dom. Banks.*
 Maior *C. Bankii*. Caput nigrum primo antennarum articulo violaceo. Thorax cupreus, obscure nitidus.
 Elytra vage punctata, aenea. Corpus subtus cum pedibus violaceum.
 Differt manifeste a *C. bicolor* elytris haud punctato striatis.

6. *C. ouata*, ferruginea, fubtus nigra. *ferrugi-*
 Habitat in Africa aequinoctiali. *Muf. Dom. Banks.* *nea.*
 Magna. Caput ferrugineum antennis nigris bafi ferru-
 gineis. Thorax et elytra laeua, glabra, obscure
 ferruginea, immaculata. Corpus fubtus atrum.
7. *C. ouata*, fupra aenea, fubtus testacea. *Syft. Ent. Bankii.*
 95. 4. *
 Habitat in Lufitania. *Muf. Dom. Banks.*
8. *C. ouata nigra*, elytris flauis, fasciis duabus punctis- *gibbosa.*
 que baseos nigris. *Syft. Ent. 95. 5. **
Chryfomela gibbosa ouata nigra, elytris testaceis nigro
 punctatis, fascia media posticaque nigris. *Linn. Syft.*
Nat. 2. 586. 2. Amoen. acad. 6. 393. 13.
Gron. Zooph. 606. tab. 14. fig. 5.
 Habitat in America meridionali.
9. *C. cyanea*, coleoptris flauis, fascia maculisque duabus *trimacu-*
 nigris. *Syft. Ent. 95. 6. ** *lata.*
Chryfomela trimaculata ouata nigra, elytris flauis,
 maculis tribus oblongis nigris, intermedia futurae
 communi. *Linn. Syft. Nat. 2. 592. 45.*
 Habitat in America.
10. *C. atra*, thoracis margine flauo, puncto nigro, elytris *Adonidis.*
 flauis, futura vittaque nigris. *Gen. Inf. Mant. 220. **
Chryfomela Adonidis. *Pall. It. 1. 463. 29.*
 Habitat in Austria. *D. Schulz*, in Adonide Sibiriae.
11. *C. atra*, thoracis margine testaceo, puncto nigro, ely- *dorsalis.*
 tris testaceis, futura abbreviata atra. *Gen. Inf. Mant.*
 220. *
 Habitat in Austria. *D. Schulz.*
12. *C. aenea*, elytris flauis, futura vittaque aeneis. *Syft. futuralis.*
*Ent. 95. 7. **
 Habitat in America boreali. *Muf. Dom. Banks.*
13. *C. ouata testacea*, coleoptris flauis, punctis sedecim *14 puncta-*
 nigris, duobus communibus. *ta.*

Chrysomela 14punctata cylindrica, femoribus posticis
 incrassatis dentatis, thorace rufo, coleoptris flavis,
 punctis 14 nigris. *Linn. Syst. Nat.* 2. 599. 94.

Habitat in India.

Corpus testaceum, immaculatum. [Femora postica cras-
 siora, videntata.

furina- 14. *C. cyanea* glaberrima, antennis plantisque fuscis.
mensis, *Syst. Ent.* 96. 8. *

Chrysomela americana. *Sulz. Hist. Inf.* tab 3. fig. 16.

Habitat Surinami, in Europa boreali rarius,

Variat corpore toto aeneo.

asiatica. 15. *C. ouata* viridi aenea nitidissima, elytris cyaneis,

Chrysomela asiatica. *Pall. It.* 1. 463. 30.

Habitat in Sibiria. *Mus. Dom. Banks.*

Maior *C. furinamensi*, Caput, thorax, corpus viridia
 nitidissima, glabra, Elytra cyanea, nitida.

grami- 16. *C. ouata* viridi coerulea nitida, antennis pedibusque
nis, concoloribus. *Syst. Ent.* 96. 9. *Linn. Syst. Nat.* 2.
 587. 7. *Fn. Sv.* 509.

Chrysomela viridi coerulea. *Geoff. Inf.* 1. 260. 10.

Chrysomela ouata viridi coerulea, aurata, antennis
dimidio fuscis, pedibus viridibus. *Degeer Inf.* 5.
 304. 16.

Coccinella graminis. *Scop. carn.* 220.

Schaeff. Inf. tab. 21. fig. 10.

Habitat in Europae plantis, gramine,

cuprea. 17. *C. ouata*, capite thoraceque aeneis, elytris cupreis,
 corpore atro. *Syst. Ent.* 96. 10. *

Chrysomela supra rubro cuprea, infra nigro nitens,
Geoff. Inf. 1. 263. 15.

Habitat in Germania. *Dom. de Hattorf.*

haemopte- 18. *C. ouata* violacea, plantis alisque rubris. *Syst. Ent.*
ra, 96. 11. *Linn. Syst. Nat.* 2. 587. 11. *Fn. Sv.* 572.

Chrysomela tota violacea. *Geoff. Inf.* 1. 258. 5.

Chrysomela Hyperici ouata subglobosa violaceo coerulea,
 thorace amplo, *Degeer Inf.* 5. 312. 20. tab.
 9. fig. 13.

Chrysomela graminis. *Pod. Inf.* 26,
Habitat in Europae hyperico.

19. *C. ouata nigra*, elytris flavis, fascia media nigra, an- *semistria-*
tice posticeque nigro striatis. *Syst. Ent.* 96. 12. * *ta.*
Habitat in Brasilia. *Mus. Dom. Banks.*

20. *C. ouata*, thorace coerulefcente, elytris rubris apice *Populi,*
nigris. *Syst. Ent.* 96. 13. *Linn. Syst. Nat.* 2. 590. 30.
Fn. Sv. 523.

Chrysomela nigro coerulea, elytris rubris apice nigris. *Geoff. Inf.* 1. 256. 1.

Chrysomela ouata obscure coerulea nitida, elytris flavo
rubris, puncto terminali nigro. *Degeer Inf.* 5. 290,
1. tab. 8. fig. 16.

Scarabaeus viridis, alarum thecis miniatis. *List. Scar,*
Angl. 381. 6.

Coccinella Populi. *Scop. Ent.* 228,

Merian. Inf. 14. tab. 27,

Albin Inf. 63. fig. 6.

Schaeff. Icon. tab. 21. fig. 9.

tab. 47. fig. 4. 5.

Habitat in populo tremula, folia saepius deustans.

Larva hexapoda albo nigroque varia, duplici serie tu-
berculorum, e quibus humoris lactei guttulas fun-
dunt. Odorem spargunt grauem et ingratum.

Varietas rarior elytris apice concoloribus.

21. *C. ouata* obscure testacea. *Syst. Ent.* 97. 14. *Linn. staphy-*
Syst. Nat. 2. 590. 26. *Fn. Sv.* 518. *laea.*

Chrysomela supra rubro cuprea, infra nigro nitens.
Geoff. Inf. 1. 263. 15.

Chrysomela cuprea ouata rubro cuprea, nitida oculis
nigris. *Degeer Inf.* 5. 294. 3. tab. 8. fig. 24.

Habitat in Europae pratis.

22. *C. ouata* testacea, elytris aeneis, margine testaceo. *feruida.*
Syst. Ent. 97. 15. *

Habitat in Insula Iava. *Dr. Mauduit.*

23. *C. ouata*, thorace aurato, elytris testaceis. *Syst. Ent. polita.*
97. *Linn. Syst. Nat.* 2. 590. 27.

Chrysomela viridi aenea, elytris rubicundis, punctis sparsis. *Geoff. Inf.* 1. 257. 2.

Chrysomela ovata viridi aurata nitida, elytris flavo rubris. *Degeer Inf.* 5. 294. 2. tab. 8. fig. 2. 3.

Coccinella polita. *Scop. Ent. carn.* 229.

Schaeff. Icon. tab. 65. fig. 9.

Habitat in falice, populo.

lurida. 24. *C. ovata nigra*, elytris castaneis. *Syst. Ent.* 97. 17. *Linn. Syst. Nat.* 2. 590. 28.

Chrysomela nigra, elytris rubris striatis, striis punctatis. *Geoff. Inf.* 1. 258. 3.

Habitat in Galliae vite.

Boleti. 25. *C. ovata nigra*, elytris fasciis tribus flavis repandis. *Syst. Ent.* 97. 18. *Linn. Syst. Nat.* 2. 591. 36. *Fri. Sv.* 52. 7. *Sulz. Hist. Inf.* tab. 3. fig. 9.

Diaperis. *Geoff. Inf.* 1. 337. tab. 6. fig. 3. mal.

Diaperis. *Schaeff. Elem.* tab. 58.

Icon. tab. 77. fig. 6.

Dermeestes ater nitens, elytris nigris, fasciis duabus flavis undulatis. *Vdm. Diff.* 4. fig. 3.

Tenebrio Boleti alatus ovatus gibbus niger nitidus elytris fasciis tribus transversis undatis fulvis. *Degeer Inf.* 5. 49. 9. tab. 3. fig. 3.

Coccinella fasciata. *Scop. Ent.* 247.

Habitat in boletis arboreis.

ovittata. 26. *C. ovata*, thorace nigro aeneo, coleoptris flavis, vittis novem fuscis.

Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*

Magnitudo *C. Boleti*. Caput et thorax nigro aenea, obscura, immaculata. Elytra flava sutura vittisque quatuor fuscis, quarum 2. 4. longiores apice coeunt. Vittae hae fuscae utrinque stria punctorum impressorum. Corpus subtile fuscum.

stolida. 27. *C. ovata ferruginea*, capite thoraceque flavis, elytris variegatis. *Syst. Ent.* 98. 19. *

Habitat in America.

28. *C. ouata* nigro aenea, capite thoracis lateribus elytrorumque macula duplici bascos ferrugineis. *Syst. Ent.* 98. 20. * *nigricornis.*
Ent. 98. 20. *
 Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
 Varietatem vidimus duplicem, alteram macula ferruginea in apice elytrorum, alteram punctis duobus in medio et maiori ad apicem ferrugineis.
29. *C. ouata* violacea, thoracis marginibus albis, puncto nigro. *Syst. Ent.* 97. 21. *Linn. Syst. Nat.* 2. 591. 37. *collaris.*
Fn. Sv. 528.
Chrysomela ouata violacea, thorace marginibus rubro, puncto nigro. *Degeer Inf.* 5. 302. 13.
Schaeff. Icon. tab. 52. fig. 11. 12.
 Habitat in Europae, Americae borealis falice.
30. *C. ouata* nigra, thorace rufo bimaculato, elytris rufis. *Syst. Ent.* 98. 22. *viminalis.*
Syst. Ent. 98. 22.
Chrysomela viminalis ouata nigra, thorace bimaculato, elytris testaceis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 590. 31. *Fn. Sv.* 524.
Chrysomela rubra, thorace punctis duobus nigris, coleoptrorum futura nigra. *Geoff. Inf.* 1. 265. 18.
Degeer Inf. 5. 297. 6.
Coccinella signata. *Scop. Ent. carn.* 233.
 Habitat in Europae falice.
 Hanc cum *C. haemorrhoidali* copula connexam vidit *Degeer.*
31. *C. ouata* rufa, elytris punctis posticeque cyaneis. *Syst. Ent.* 98. 23. * *cyanipes.*
Ent. 98. 23. *
 Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
32. *C. ouata* rufa, thorace macula dorsali punctisque duobus, coleoptris maculis octo cyaneis. *Syst. Ent.* 99. 24. * *cyanicornis.*
Syst. Ent. 99. 24. *
 Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
33. *C. ouata*, thorace rubro postice nigro, elytris rufis, punctis subquinis nigris. *Syst. Ent.* 99. 25. *Linn. Syst. Nat.* 2. 590. 32. *Fn. Sv.* 525. *10 punctata.*
Syst. Nat. 2. 590. 32. *Fn. Sv.* 525.
Chrysomela rubra, elytro singulo maculis quinque nigris. *Geoff. Inf.* 1. 258. 4.

Chrysomela rufipes ovata supra rufa, subtus nigra, elytris punctis subquinis nigris, pedibus rufis. *Degeer Inf.* 5. 294. 4. tab. 8. fig. 25.

Schaeff. Icon. tab. 21. fig. 13.

Habitat in Europae populo.

Elytrorum puncta mox plura, mox pauciora.

pallida. 34. *C. ovata* flavescens, oculis nigris. *Syst. Ent.* 99. 26.

Linn. Syst. Nat. 2. 589. 25. *Fn. Sv.* 521.

Crioceris pallida oculis nigris. *Geoff. Inf.* 1. 243.

Habitat in Europae falice.

friata. 35. *C. ovata* atra nitida, elytris striatis testaceis, futura atra.

Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*

Media, gibba. Caput, thorax, corpus atra, nitida, immaculata. Elytra testacea futura nigra punctato striata, striis apice per paria coeuntibus.

notata. 36. *C. ovata*, thorace fulvo, punctis quatuor nigris, elytris pallidis nigro variis.

Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*

Statura *C. pallidae*. Caput fulvum basi nigrum. Thorax fulvus, nitidus punctis quatuor nigris transversim positus. Elytra glabra, laevia, nitida, pallida fasciis duabus anticis valde vndatis punctoque postico nigris. Corpus pallidum abdomine basi nigro.

vulpina. 37. *C. ovata* atra, elytris margine punctis quatuor apiceque nigro maculato albis.

Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*

Statura omnino praecedentis. Caput, thorax, corpus nigra, obscure nitida, immaculata. Elytra nigra margine punctisque quatuor anticis flavis. Apex late flavus maculis tribus nigris.

erassicornis. 38. *C. ovata* flavescens, elytris maculis duabus nigris, *Syst. Ent.* 99. 27. *

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

variolosa. 39. *C. ovata* nigra, elytris rubris, punctis sparsis impressis coeruleis. *Syst. Ent.* 99, 28, *Linn. Syst. Nat.* 2. 591. 33.

Habitat in Africa,

40. *C. ouata*, thorace viridi, elytris rubris, fascia inter punctum maculamque lunatam coerulea. *Syst. Ent. lapponica.*
99. 29. *Linn. Syst. Nat.* 2. 591. 34. *Fn. Sv.* 526.
Chrysomela curvilinea ouata viridi aenea nitida, elytris fasciis curvis testaceis. *Degeer Inf.* 5. 302. 12. tab. 9. fig. 3.
Schaeff. Icon. tab. 44. fig. 2.
Habitat in Europa boreali.
Elytrorum sutura coerulea.
41. *C. ouata* rufa, elytris fasciis tribus atro coeruleis vndulatis. *Syst. Ent.* 100. 30. *Linn. Syst. Nat.* 2. 591. 35. *Amoen. acad.* 6. 393. 14. *undulata.*
Habitat in India.
42. *C. ouata*, elytris fuscis, punctis octo pallidis quibusdam connexis. *Syst. Ent.* 100. 31. * *18guttata.*
Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
43. *C. ouata* coerulea, thorace femoribus anoque rufis. *Polygoni.*
Syst. Ent. 100. 32. *Linn. Syst. Nat.* 2. 589. 24. *Fn. Sv.* 520.
Chrysomela nigra, elytris coeruleo viridibus, thorace pedibus antennarumque basi rufis. *Geoff. Inf.* 1. 283. 4.
Chrysomela ouata violacea, thorace lato pedibusque rufo flauis. *Degeer Inf.* 5. 322. 26.
Reaum. Inf. 3. tab. 17. fig. 14. 15.
Schaeff. Icon. tab. 51. fig. 5.
tab. 161. fig. 4.
tab. 173. fig. 4.
Habitat in polygono aruensi.
Femina grauida ultra coleoptra ventricosa euadit.
Pedes interdum rufi plantis folis nigris.
44. *C. ouata* testacea, elytris sutura lineolaque media fuscis. *brunnea.*
Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
Parua. Corpus totum obscure testaceum. Thorax laeuis, nitidus punctis duobus nigris. Elytra punctata sutura lineolaque media fuscis, quae mox longior, mox breuior,

- cerealis.* 45. *C. ouata aurata*, thorace lineis tribus coleoptrisque quinque coeruleis. *Syst. Ent.* 100. 33. *Linn. Syst. Nat.* 2. 588. 17.
Chrysomela aurea fasciis coeruleis cupreisque alternis, punctis inordinatis. *Geoff. Inf.* 1. 262. 14.
Schaeff. Icon. tab. 1. fig. 3.
 Habitat in Europae australioris segete, in spartio scopario. *D. Prof. Herniann.*
 Variat rarius colore purpureo loco aurei.
- americana-na.* 46. *C. ouata viridi aenea*, elytris striis quinque fanguineis. *Syst. Ent.* 100. 34.
 Habitat in America.
 Caput aeneum macula verticis coccinea.
- festiua.* 47. *C. ouata nigro aenea*, elytris lineis tribus futuraque antica flauis. *Syst. Ent.* 100. 35.*
 Habitat in America. *Mus. Brit.*
- fastuosa.* 48. *C. ouata aurca*, coleoptris lineis tribus coeruleis. *Syst. Ent.* 101. 36. *Linn. Syst. Nat.* 2. 588. 18.
Chrysomela viridis nitida, thorace antice excauato, fasciis elytrorum longitudinalibus coeruleis. *Geoff. Inf.* 1. 261. 11.
Coccinella fastuosa. *Scop. Ent. carn.* 232.
 Habitat in Europae lamio albo.
- speciosa.* 49. *C. ouata viridi sericea*, elytris lineis duabus aureis. *Syst. Ent.* 101. 37. *Linn. Syst. Nat.* 2. 588. 19.
Coccinella speciosissima. *Scop. Ent. carn.* 231.
Hollar. Inf. tab. 6. fig. 2.
 Habitat in Germaniae syluis.
 Lineae elytrorum antice posticeque coeunt.
- cyanea.* 50. *C. ouata*, thorace rotundato cylindrico, corpore cyaneo nitido, pedibus nigris.
 Habitat in Americae meridionalis insulis. *Dom. Lund.*
 Manifeste differt a *C. Surinamensi* thorace omnino cylindrico minime marginato, vti in *C. aurata*.
- aurata.* 51. *C. ouata*, thorace rotundato cyaneo, elytris aureis, margine cyanco. *Syst. Ent.* 101. 38.*
 Habitat in America boreali.

52. *C. ouata atra*, coleoptrorum limbo sanguineo. *Syst. limbata*.
Ent. 101. 39. *
- Chrysomela nigro coerulea*, elytris luridis, punctatis, margine exteriori et anteriori rubris. *Geoff. Inf.* 1. 260. 9.
Schaeff. Icon. tab. 21. fig. 20.
 Habitat in Europa australiori.
53. *C. ouata atra*, elytris margine exteriori sanguineis. *Sanguino-*
Syst. Ent. 101. 40. *Linn. Syst. Nat.* 2. 591. 38. *Fn. lenta*.
Sv. 529.
- Chrysomela nigro coerulea*, elytris atris punctatis, margine exteriori rubro. *Geoff. Inf.* 1. 259. 8. tab. 4. fig. 8.
- Chrysomela rubro marginata* ouata supra nigra subtus violacea nitida, elytris scabris rubro marginatis. *Degeer Inf.* 5. 298. 7. tab. 8. fig. 26.
- Buprestis sanguinolenta*. *Scop. carn.* 203.
Schaeff. Icon. tab. 21. fig. 15.
Sulz. Hist. Inf. tab. 3. fig. 10.
 Habitat in Europa.
54. *C. ouata nigro aenea*, elytris margine luteis. *Syst. marginata*.
Ent. 101. 41. *Linn. Syst. Nat.* 2. 591. 39. *Fn. Sv.* 529. ta.
- Chrysomela ouata* supra viridi aenea, obscura nitida, subtus nigra, elytris margine luteo rubris. *Degeer Inf.* 5. 303. 14.
Schaeff. Icon. tab. 21. fig. 19.
Sulz. Hist. Inf. tab. 3. fig. 10.
 Habitat in Europae pratis apricis.
 Elytra striato punctata.
55. *C. ouata nigro coerulea*, thorace elytrisque margine *marginel-*
 luteis. *Syst. Ent.* 102. 42. *Linn. Syst. Nat.* 2. 591. 40. la.
Fn. Sv. 531.
- Chrysomela Ranunculi* oblongo ouata viridi aenea, obscura, nitida, thorace elytrisque margine luteis. *Degeer Inf.* 5. 304. 15.
- Scarabaeus antennis clauatis tertius*. *Raj. Inf.* 99.
 Habitat in Europae ranunculis.

- hannou-riana.* 56. *C. ouata cyanea*, thorace margine, elytris margine vittaque ferrugineis. *Syst. Ent.* 102. 43. *
Habitat in Germania. *Dom. de Hattorf.*
- litura.* 57. *C. ouata rufescens*, elytris futura lineaque longitudinali nigris. *Syst. Ent.* 102. 44. *
Habitat in Anglia, capta in fabuletis Richmondensibus die VI. Maji.
- lineola.* 58. *C. ouata flava*, coleoptris punctis vndecim lineisque duabus nigris. *Syst. Ent.* 102. 45. * *Linn. Syst. Nat.* 2. 593. 47.
Habitat in America.
- sacra.* 59. *C. ouata supra rufa*, thoracis linea punctisque duobus, elytrorumque futura nigris. *Syst. Ent.* 102. 46. *Linn. Syst. Nat.* 2. 593. 49. *Muf. Lud. Vlr.* 40.
Habitat in Palaestina.
Alae fanguineae.
- haemorrhoidalis.* 60. *C. ouata nigra nitida*, antennis basi flavescentibus, ano supra rubro. *Syst. Ent.* 102. 47. *Linn. Syst. Nat.* 2. 587. 6. *Fn. Sv.* 508.
Chryfomela ouata nigra seu rufa, thorace punctis duobus nigris, antennarum basi subflava. *Degeer Inf.* 5. 287. 6.
Coccinella haemorrhoidalis. *Scop. Ent. carn.* 225.
Habitat in betula, alno.
Elytra striato-punctata.
- fucata.* 61. *C. ouata atra*, thorace elytrisque viridi aeneis,
Habitat in Italia. *Dom. Allioni.*
Statura et magnitudo *C. haemorrhoidalis*. Caput vti corpus subtus pedisque atra, immaculata. Thorax viridis, glaber, nitens. Elytra obscuriora vage punctata.
- fuscicornis.* 62. *C. ouata viridi aenea*, antennis tibiisque nigris.
Habitat in Russia. *Muf. Dom. Banks.*
Magnitudo et statura *C. haemorrhoidalis*. Caput, thorax, elytra viridi aenea, immaculata, glabra, nitida. Corpus subtus magis obscurum. Antennae et pedes nigri.

63. *C. ouata nigra*, thorace rotundato angustiori, pedibus posticis elongatis. *Syst. Ent.* 203. 48. * *obscura.*
Chrysomela obscura subcylindrica, thorace pedibusque nigris. *Linn. Syst. Nat.* 299. 96.
Chrysomela nigro quadrata subcylindrica nigra, abdomine subquadrato, thorace globoso, antennis longis. *Degeer Inf.* 5. 336. 40.
 Habitat in Europae plantis.
 Thorax valde gibbus, elytris angustior.
64. *C. ouata testacea*, elytris macula fusca. *2punctata.*
 Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*
 Statura *C. philadelphicae*, at maior. Antennae fuscae basi testacea. Caput et thorax laevis, testacea, immaculata. Elytra laevis, testacea macula magna fusca pone medium. Pedes testacei apice fusci.
65. *C. ouata viridis*, elytris flavis viridi maculatis, antennis pedibusque ferrugineis. *Syst. Ent.* 103. 49. *philadelphica.*
Chrysomela philadelphica ouata viridis, elytris flavis, punctis virescentibus oblongiusculis, antennis pedibusque ferrugineis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 592. 44.
Chrysomela ouata viridi aenea obscura, elytris flavis punctis virescenti aeneis oblongiusculis, antennis pedibusque rufis. *Degeer Inf.* 5. 353. 6. tab. 16. fig. 13.
Petiv. Gazoph. tab. 26. fig. 11.
 Habitat in Pensylvania.
 Variat futura viridi et flava.
66. *C. ouata coerulescens nitida subtus nigra.* *Syst. Ent.* *Armoraciae.*
 103. 50. *Linn. Syst. Nat.* 2. 588. 16. *Fn. Sv.* 515.
Chrysomela Plantaginis subglobosa supra violacea nitida, subtus nigra punctis excauatis striatis. *Degeer Inf.* 5. 322. 25.
 Habitat in cochlearia armoracia, ranunculo aquatili, flammula, plantagine.
67. *C. oblonga atra*, elytris testaceis, macula atra. *Syst.* *2maculata.*
Ent. App. 820. *
 Habitat in America. *Dom. Drury.*

- fasciata*. 68. *C. oblonga atra*, elytris fasciis tribus flavis. *Syst. Ent. App.* 820. *
Habitat in America. *Dom. Drury.*
- ruficollis*. 69. *C. oblonga viridi aenea*, thorace pedibusque rufis.
Syst. Ent. App. 820. *
Chrysomela nigra, elytris coeruleo viridibus, thorace pedibus antennarumque basi rufis. *Geoff. Inf.* 1. 263. 16.
Habitat in Europa australiori. *Dom. Lee.*
- Tanaceti*. 70. *C. oblonga nigra punctata*, elytris coriaceis. *Syst. Ent.* 103. 51.
Chrysomela Tanaceti ovata atra punctata, antennis pedibusque nigris. *Linn. Syst. Nat.* 2. 587. 5. *Fn. Sv.* 507.
Chrysomela ovata atra opaca punctata. *Degeer Inf.* 5. 299. 4. tab. 8. fig. 27.
Galleruca atro fusca, elytris lineis tribus elevatis punctis numerosis. *Geoff. Inf.* 1. 252. 1. tab. 4. fig. 6.
Merian. Inj. tab. 68.
Schaeff. Icon. tab. 21. fig. 14.
Habitat in Europae tanaceto.
Variat rarius colore toto obscure griseo.
- 12punctata*. 71. *C. oblonga*, thorace flavescente, elytris viridibus, punctis sex nigris. *Syst. Ent.* 103. 52. *
Habitat - - -
- Alni*. 72. *C. oblonga violacea*, elytris vage punctatis, pedibus antennisque nigris. *Syst. Ent.* 103. 53. *Linn. Syst. Nat.* 2. 587. 9. *Fn. Sv.* 511.
Chrysomela ovata supra violacea subtus nigra, punctis excavatis sparsis, thorace minuto, antennis longis nigris. *Degeer Inf.* 5. 314. 21. tab. 9. fig. 18.
Cryptocephalus violaceus punctis inordinatis. *Geoff. Inf.* 1. 332. 1.
Scarabaeus Alni coeruleus. *Frisch. Inf.* 7. 13. tab. 8.
Sulz. Hist. Inf. tab. 3. fig. 13.
Schaeff. Elem. tab. 53. fig. 1. 2.
Habitat in betula, alno.

73. *C. oblonga pallida*, thorace macula, elytris lineis tri- *Abfinthii.*
bus nigris.

Chrysomela Abfinthii. *Pall. It. 2.* 725. 70.

Habitat in Sibiria. *Muf. Dom. Banks.*

Corpus magnitudine *C. Tanaceti*. Caput pallidum, basi nigrum. Thorax pallidus macula media nigra. Elytra pallida lineis tribus atris, quae tamen nec basin nec apicem attingunt, exteriores apice coeunt. Pedes ferruginei geniculis nigris.

74. *C. oblonga flavescens nitida*, oculis fuscis. *concolor.*

Habitat in Africa aequinoctiali. *Muf. Dom. Banks.*

Paullo maior *C. Tanaceti*. Corpus totum pallide flavescens omnino concolor, glabrum, nitidum.

75. *C. oblonga picea*, pedibus testaceis. *picea.*

Habitat in Africa aequinoctiali. *Muf. Dom. Banks.*

Corpus magnum, piceum siue obscure ferrugineum, glabrum, nitidum. Thorax puncto vtrinque impresso. Pedes pallide testacei.

76. *C. oblonga violacea*, elytris punctato striatis. *Syst. Betulae.*

Ent. 104. 54. *Linn. Syst. Nat. 2.* 587. 10. *Fn. Sv.* 514.

Chrysomela nigro purpurea, punctis excauatis striata. *Geoff. Inf. 1.* 264. 17.

Chrysomela coerulea salicis subglobosa viridi coerulea nitida obscura punctis excauatis sparsis. *Degeer Inf. 5.* 318. 24. tab. 9. fig. 24. a. b.

Coccinella Betulae. *Scop. Ent. carn.* 221.

Roef. Inf. 2. Scar. 3. tab. 1.

Habitat in betulae albae foliis paginam inferiorem exedens.

77. *C. oblonga*, thorace fuluo viridi punctato, elytris *tricolor.*
viridibus nitidis, abdomine nigro.

Habitat - - - - *Muf. Dom. Banks.*

Maior *C. Betulae*. Caput viride nitens, ore fuluo antennisque fuscis. Thorax laevis, nitens, fuluus punctis quinque viridibus ad basin 4. 1. Elytra glabra, laevis, nitida, viridia, immaculata. Pectus fuluum, abdomen nigrum cinereo subtomentosum. Pedes fului.

Fabr. Spec. Inf.

I

78. *C.*

Vitellinae. 78. *C. oblonga viridi aenea.* *Syst. Ent.* 104. 55. *
Chrysomela Vitellinae ouata viridi coerulea. *Linn. Syst. Nat.* 2. 589. 23. *Fn. Sv.* 519.

Chrysomela oblongo ouata aenea nitida, abdomine supra nigro, apice flavescente, elytris striato punctatis. *Degeer Inf.* 5. 323. 27.

Coccinella Vitellinae. *Scop. carn.* 224.

Roef. Inf. 2. *Scarab.* 3. p. 5. tab. 1.

Habitat in Europae falice.

vulgatissima. 79. *C. oblonga coerulea*, antennis basi ferrugineis. *Syst. Ent.* 104. 56. *Linn. Syst. Nat.* 2. 589. 22. *Fn. Sv.* 517.

Chrysomela coerulea Betulae oblongo ouata, supra coeruleo violacea, subtus virescens, punctis excavatis striatis, thorace amplo, antennis longis. *Degeer Inf.* 5. 317. 23.

Coccinella vulgatissima. *Scop. carn.* 222.

Habitat in Europae falice.

Praecedenti paullo maior.

aenea. 80. *C. oblonga viridis nitida*, elytris aeneis. *Syst. Ent.* 104. 57.

Chrysomela aenea ouata viridis nitida, abdomine postice ferrugineo. *Linn. Syst. Nat.* 2. 587. 8. *Fn. Sv.* 510.

Chrysomela viridis Alni ouata viridi aurata nitida, thorace antice excavato, abdomine supra nigro apice testaceo, elytris punctis sparsis. *Degeer Inf.* 5. 305. 18. tab. 9. fig. 4.

Habitat in betula, alno.

analis. 81. *C. oblonga atra*, elytris fuscis, margine exteriori testaceo. *Syst. Ent.* 104. 58. *Linn. Syst. Nat.* 2. 582. 42.

Habitat ad praedium ill. Archiatri à Linné, Hammarby.

cruenta. 82. *C. oblonga sanguinea*, thorace immaculato, elytris punctis tribus nigris.

Habitat in India orientali. *Mus. Dom. Banks.*

Statura omnino C. coccineae. Caput et thorax fanguinea, immaculata, nitida. Elytra, laevia, fanguinea, nitida puncto vnico baseos duobusque paribus in medio nigris. Corpus pallidius fanguineum, immaculatum.

83. C. oblonga, thorace marginato fanguineo, macula nigra, elytris fanguineis, maculis duabus nigris. *Syst. Ent.* 105. 59. *Linn. Syst. Nat.* 2. 592. 43. *Fn. Sv.* 532. *coccinea.*

Chryfomela 4maculata ouata, thorace quadrato rufo macula nigra, elytris rubris, maculis duabus nigris, capite pedibus antennisque nigris. *Degeer Inf.* 5. 301. 10. tab. 9. fig. 1.

Coccinella coleoptris rubris maculis 4 nigris. *Vdm. Diff.* 13.

Habitat in Europae borealis corylo.

84. C. oblonga, thorace testaceo immaculato, elytris testaceis, maculis duabus nigris. *Gen. Inj. Mant.* 221. * *4maculata.*

Habitat in nemoribus Kiloniensibus. *Dom. Lund.*

85. C. oblonga nigra, coleoptris rubris, punctis decem nigris, duobus communibus. *Syst. Ent.* 105. 60. * *10maculata.*

Habitat in America. *Mus. Dr. Hunter.*

86. C. oblonga viridi aenea, thoracis marginibus albis, elytris albis, maculis decem aeneis. *Syst. Ent.* 105. 61. * *20punctata.*

Chryfomela vicies maculata elytris pallidis, maculis decem nigris. *Bergstr. Nomencl.* 1. 87. tab. 13. fig. 10. *Pet. Gazoph.* tab. 29. fig. 5.

Habitat in Anglia. *Mus. Brit.*

** *Altica faltatoriae* femoribus posticis infrastatis.

87. C. faltatoria flaua, thorace nigro punctato, elytris thoracica, violaceis.

Altica thoracica. *Syst. Ent. App.* 821. *

Habitat in America boreali. *Dom. Lee.*

- 2guttata*. 88. *C. faltatoria ferruginea*, thorace elytrorumque maculis duabus albis.
Altica 2guttata. *Syst. Ent. App.* 821. *
 Habitat in America. *Dom. Drury*.
- 4guttata*. 89. *C. faltatoria ferruginea*, thorace elytrorumque punctis quatuor albis.
 Habitat Cajennæ. *D. Schulz*.
 Nimis affinis videtur *C. 2guttata*, at puncta elytrorum quatuor magna distincta. Pedes femoribus posticis incrassatis.
- cincta*. 90. *C. faltatoria nigra*, elytris viridi aeneis, margine punctisque duobus albis.
 Habitat in Lusitania. *Dr. Gray. Mus. Dom. Banks*.
 Magna inter *C. faltatorias*. Caput nigrum. Thorax obscure aeneus margine albo. Margo et anticus et posticus in medio albus. Elytra viridi aenea margine punctisque duobus dorsalibus albis. Corpus atrum. Femora postica valde incrassata.
- marginata*. 91. *C. faltatoria flavescens*, elytris viridibus, margine pallido.
Altica marginata. *Syst. Ent. App.* 822. *
 Habitat in America boreali. *Dom. Drury*.
- bicolor*. 92. *C. faltatoria rufa*, elytris femoribusque posticis coeruleis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 593. 52.
Chrysomela faltatoria rubra, elytris coeruleis nitidissimis. *Degeer Inf.* 5. 357. 12. tab. 16. fig. 20.
Altica bicolor. *Syst. Ent.* 112. 1.
 Habitat in America.
- aequinoctialis*. 93. *C. faltatoria*, thorace rubro, elytris violaceis, maculis quatuor albis alternis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 596. 71.
Chrysomela faltatoria, thorace carneo elytris violaceis nitidis, singulo maculis quatuor albis. *Degeer Inf.* 5. 356. 11. tab. 16. fig. 19.
Altica aequinoctialis. *Syst. Ent.* 112. 2.
 Habitat in America meridionali.

94. *C. faltatoria viridi coerulea.* Linn. *Syft. Nat.* 2. 593. *oleraced.*
51. *Fn. Sv.* 534.

Chryfomela faltatoria ouata tota viridi coerulea, antennis nigris. Degeer *Inf.* 5. 344. 49.

Altica oleracea. *Syft. Ent.* 112. 3. Geoff. *Inf.* 1. 245. 1.
Scop. Ent. carn. 212.

Habitat in Cotyledonibus plantarum, inprimis tetradynamistarum, brafficae, rapae, raphani, quas mifere destruit. Immerfione feminum ante feminationem celerius crefcunt et magnitudinem attingunt, qua damnum inferre haud amplius valent.

Pellitur cineribus vegetabilium, inprimis tabaci.

95. *C. faltatoria, thorace pallido, elytris aeneis, maculis albicollis.*
duabus fasciaque aureis.

Altica albicollis. *Syft. Ent.* 112. 4. *

Habitat in noua Hollandia. *Muf. Dom. Banks.*

96. *C. faltatoria, thorace rufefcente, elytris pallidis, fufuluicollis.*
tura maculisque duabus nigris.

Habitat - - - *Dr. Forfter. Muf. Dom. Banks.*

Media. Caput atrum, nitidum. Thorax rufefcens immaculatus margine tamen pallidiore. Elytra laeuiam, nitida, pallida; futura, quae poftice puncto maiori terminatur, maculisque duabus, altera bafeos, altera medii magnis, atris. Subtus pallida geniculis pedum nigris. Femora poftica incralfata, rufa.

97. *C. faltatoria viridis nitida, pedibus testaceis, femoribus pofticis violaceis.* Linn. *Syft. Nat.* 2. 594. 94. *Hyofcyami.*
Fn. Sv. 536.

Chryfomela ouata faltatoria viridi coerulefcenti aenea, elytris punctatis, pedibus rufis, femoribus pofticis viridi aeneis. Degeer *Inf.* 5. 345. 51.

Altica Hyofcyami. *Syft. Ent.* 113. 5.

Altica coerulea, elytris ftriatas, tibiis ferrugineis.
Geoff. Inf. 1. 248. 11.

Capricornus exiguus faltatorius. *Raj. Inf.* 98. 9.

Habitat in Europae hyofcyamo, braffica.

98. *C. faltatoria viridi aenea, pedibus nigris.* *nigripes.*

Altica nigripes. *Syft. Ent.* 113. 6. *

Habitat in Anglia. *Muf. Dr. Hunter.*

- nitidula.* 99. *C. saltatoria viridis nitens*, capite thoraceque aureis, pedibus ferrugineis.
Chrysomela nitidula saltatoria, elytris coeruleis, capite thoraceque aureis, pedibus ferrugineis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 594. 60. *Fn. Sv.* 542.
Chrysomela saltatoria ovata, elytris coeruleis, thorace aureo, antennis pedibusque rufis, femoribus posticis coeruleis. *Degeer Inf.* 5. 346. 54.
Altica nitidula. *Syst. Ent.* 113. 7.
Altica nigra aurata, thorace aureo femoribus ferrugineis. *Geoff. Inf.* 1. 249. 13.
Schaeff. Icon. tab. 87. fig. 5.
 Habitat in Europae falice.
- Helxines.* 100. *C. saltatoria viridi aenea*, antennis fuscis, pedibus testaceis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 594. 58. *Fn. Sv.* 543.
Chrysomela viridi aurata saltatoria ovata nitidissima, pedibus antennisque rufis, elytris punctatis. *Degeer Inf.* 5. 345. 52.
Chrysomela Helxines. *Sulz. Hist. Inf.* tab. 3. fig. 12.
Altica Helxines. *Syst. Ent.* 113. 8.
Altica aurea, pedibus flavis. *Geoff. Inf.* 1. 249. 14.
 Habitat in polygono fagopyro aliisque.
- trifasciata.* 101. *C. saltatoria supra albida*, fasciis tribus fuscis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 594. 61.
Altica trifasciata. *Syst. Ent.* 113. 9.
 Habitat in Europae plantis.
 Fascia vnica capitis, duae elytrorum. Femora rufa.
- Modeeri.* 102. *C. saltatoria viridi aenea*, elytris macula postica pedibusque anticis flavis.
Chrysomela Modeeri saltatoria aenea nitida, elytris apice flavis, pedibus anterioribus tibiisque posticis luteis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 594. 57. *Fn. Sv.* 539.
 Habitat in Europae plantis.
- erythrocephala.* 103. *C. saltatoria atro coerulea*, capite geniculisque pedum rufis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 594. 56. *Fn. Sv.* 538.
Altica erythrocephala. *Syst. Ent.* 114. 10.
Altica nigro aenea, elytris striatis, pedibus ferrugineis. *Geoff. Inf.* 1. 246. 4.
 Habitat in Europae plantis.

104. *C. saltatoria nigra*, thorace elytrisque cinereis. *atricilla*.
Chrysomela atricilla nigra, thorace elytris tibiisque testaceis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 594. 55. *Fn. Sv.* 537.
Altica atricilla. Syst. Ent. 114. 11.
Altica elytris pallido flavis, capite nigro. *Geoff. Inf.* 1. 251. 19.
 Habitat in Europae plantis.
105. *C. saltatoria nigra*, thorace elytrorumque margine dorsalis pallidis.
 Habitat in Anglia. *Mus. Dom. Banks.*
 Statura omnino *C. atricillae* et forte eius mera varietas. Differt tantum dorso coleopterorum nigro.
106. *C. saltatoria atra*, elytris tibiisque pallidis. *anglica*.
Altica anglica. Syst. Ent. 114. 12. *
 Habitat in Angliae plantis. *Mus. Dr. Hunter.*
107. *C. saltatoria nigra*, coleoptris punctis quatuor rufis. *apustulata*.
Altica apustulata. Syst. Ent. 114. 13. * *Geoff. Inf.* 1. 250. 15. *ta.*
 Habitat in Angliae, Galliae hortis.
108. *C. saltatoria coerulea*, capite thorace pedibus antennarumque basi rufis. *rufipes*.
Linn. Syst. Nat. 2. 595. 65. *Fn. Sv.* 545.
Chrysomela saltatoria ovata coerulea, capite thorace pedibusque rufis, antennis dimidio rufis fuscisque, elytris laevibus. *Degeer Inf.* 5. 343. 47. tab. 10. fig. 11.
Altica rufipes. Syst. Ent. 114. 14.
Altica nigra, elytris coeruleis, thorace pedibusque rufis. *Geoff. Inf.* 1. 245. 2.
Schaeff. Icon. tab. 166. fig. 5.
 Habitat in Europae plantis.
 Simillimam, at maiorem, ex Africa aequinoctiali, in *Mus. Dom. Banks* vidi.
109. *C. saltatoria violacea*, capite thoraceque rufis, pedibus nigris. *fuscipes*.

Altica fuscipes. *Syst. Ent.* 114. 15. *

Habitat in Angliae maluis.

Forte praecedentis varietas.

testacea. 110. *C. saltatoria testacea gibba*, elytris laeuissimis.

Altica ouata ferruginea, elytris punctis sparsis. *Geoff.*

Inf. 1. 250. 17.

Altica testacea. *Syst. Ent.* 114. 16. *

Habitat in Angliae plantis. *Mus. Dom. Banks.*

exoleta. 111. *C. saltatoria ferruginea*, elytris striatis.

Chrysomela exoleta saltatoria liuida, pedibus testaceis, capite abdomineque fuscis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 594. 59. *Fn. Sv.* 541. ?

Chrysomela cylindrica flauo testacea, abdomine nigro elytris punctatis. *Degeer Inf.* 5. 338. 42. at haud saltatoria.

Altica exoleta. *Syst. Ent.* 115. 17.

Altica oblonga ferruginea, elytris striatis. *Geoff. Inf.* 1. 250. 16.

Habitat in Echii floribus.

holfatica. 112. *C. saltatoria nigra nitida*, elytris apice puncto rubro. *Linn. Syst. Nat.* 2. 995. 67. *Fn. Sv.* 544.

Altica holfatica. *Syst. Ent.* 115. 18.

Habitat apud nos frequens, olera depascens.

tabida. 113. *C. saltatoria pallida*, oculis nigris.

Altica tabida. *Syst. Ent.* 115. 19. *

Habitat in Angliae plantis. *Mus. Dom. Banks.*

nemorum. 114. *C. saltatoria atra*, elytris flauis, margine omni nigro.

Chrysomela nemorum saltatoria, elytris linea flaua, pedibus pallidis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 995. 62. *Fn. Sv.* 543.

Chrysomela fasciata saltatoria ouata nigra nitida, elytris fascia flaua longitudinali. *Degeer Inf.* 5. 347. 55.

Altica nemorum. *Syst. Ent.* 115. 20.

Altica atra, elytris longitudinali in medio flauescentibus. *Geoff. Inf.* 1. 247. 9.

Sulz. Hist. Inf. tab. 3. fig. 11.

Habitat

CLASS. I. ELEVTERATA. Cryptocephalus. 137

Habitat in pulmonaria, dentaria, et cardamine, polyphaga.

Varietates duae magnitudine tantum differunt.

115. *C. saltatoria atra nitida*, antennarum basi plantisque piceis. *atra.*
Altica atra. *Syst. Ent.* 115. 21. *
Altica nigra subrotunda, tibiis ferrugineis. *Geoff. Inf.* 1. 247. 8.
Habitat Hafniae.
116. *C. saltatoria suborbiculata depressa nigra.* *Linn. Syst. hemisphaerica.*
Nat. 2. 595. 68.
Chrysomela saltatoria subglobosa obscure fusca nitida.
Degeer Inf. 5. 348. 8.
Altica hemisphaerica. *Syst. Ent.* 115. 22.
Habitat in Saxoniae corylo.
117. *C. saltatoria flavescens*, elytris margine fasciaque sanguineis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 595. 69. *surinamensis.*
Chrysomela saltatoria, thorace rubro pallido, elytris rufis, fascia transuersali coccinea, antennis pedibusque griseis. *Degeer Inf.* 5. 355. 10. tab. 16. fig. 17.
Altica surinamensis. *Syst. Ent.* 116. 23.
Habitat Surinami.
118. *C. saltatoria pallida*, elytris nigris, linea longitudinali flexuosa alba. *S. littera.*
Linn. Syst. Nat. 2. 595. 70.
Chrysomela saltatoria griseo flava, elytris fuscis, fascia longitudinali flexuosa albida. *Degeer Inf.* 5. 357. 13. tab. 16. fig. 21.
Altica S. littera. *Syst. Ent.* 116. 24.
Habitat Surinami.

30. CRYPTOCEPHALVS.

1. *C. niger obscurus*, elytris pallidis, maculis tribus nigris, pedibus anticis elongatis. *Syst. Ent.* 105. 1. * *longipes.*
Schaeff. Icon. tab. 6. fig. 3.
Habitat in Germaniae corylo, falice

- 6maculatus*-2. *C. niger*, thorace rubro immaculato, elytris rubris, punctis tribus nigris.
 Habitat in Italia. *Dr. Allioni*.
 Paulo maior *C. 4punctato*. Antennae breues, ferratae, nigrae. Thorax rufus, nitidus, immaculatus. Elytra glabra, rufa, nitida puncto vnico ad basin et duobus in medio nigris.
- 4punctatus*-3. *C. niger*, elytris rubris, punctis duobus nigris, antennis breuibus ferratis. *Syst. Ent.* 106. 2.
Chrysomela 4punctata cylindrica, thorace nigro, elytris rubris, punctis duobus nigris, antennis breuibus. *Linn. Syst. Nat.* 2. 596. 76. *Fn. Sv.* 432.
Chrysomela 4punctata thorace nigro, elytris rubris, maculis duabus rubris, antennis ferratis. *Degeer Inf.* 5. 32. tab. 10. fig. 7.
Melolontha coleoptris rubris maculis quatuor nigris, thorace nigro. *Geoff. Inf.* 1. 195. tab. 3. fig. 4.
Buprestis 4punctata. *Scop. Ent. carn.* 206.
Schaeff. Elem. tab. 83. fig. 1.
Icon. tab. 6. fig. 1. 2. 3.
 Habitat in Europae corylo frequens.
- Atraphaxidis*-4. *C. niger*, thorace rubro trimaculato, elytris testaceis, maculis tribus nigris, tibiis rufis.
Chrysomela Atraphaxidis. *Pallas It.* 2. 725. 68.
 Habitat in Sibiriae atraphaxide. *Mus. Dom. Banks*.
 Magnitudo *C. 4punctati*. Caput atrum, antennis ferratis cinereis. Thorax rufus maculis tribus approximatis nigris ad basin. Elytra pallidiora maculis tribus posteriori maiori, transuersa. Pedes rufi femoribus nigris. Abdomen nigrum, cinereo villosum.
- lunulatus*. 5. *C. ater* nitidus, elytris flauis, lunula fascia punctoque apicis nigris.
 Habitat - - - - *Mus. Dom. Banks*.
 Paulo minor *C. 4punctato*. Antennae ferratae. Caput et thorax atra, immaculata. Scutellum atrum. Elytra flaua macula antica lunata fasciaque pone medium atris.

6. *C. niger*, thorace elytrisque rubris, punctis quatuor nigris. *Syst. Ent.* 106. 3. * *12maculatus.*
 Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*
 Magnitudo et statura praecedentis.
7. *C. testaceus*, antennis elytrorumque margine nigris. *Syst. Ent.* 106. 4. * *obsitus.*
 Habitat in America meridionali. *Dom. Drury.*
8. *C. coerulescens*, elytris testaceis. *Syst. Ent.* 106. 5. *tridentatus.*
Chrysomela tridentata cylindrica, thorace coeruleo, elytris testaceis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 596. 73. *Fn. Sv.* 546.
Chrysomela coerulea nitida, elytris testaceis, thorace angulato gibbo. *Degeer Inf.* 5. 333. 36. tab. 10. fig. 10.
Melolontha nigro viridis, elytris luteo pallidis. *Geoff. Inf.* 1. 196. 3.
Schaeff. Icon. tab. 77. fig. 5.
 Habitat in Lonicera xylosteo, corylo.
 Pedes antici in altero sexu elongati.
9. *C. rufescens*, thorace maculis, elytris lineis duabus nigris. *Syst. Ent.* 106. 6. * *lineatus.*
 Habitat in Brasilia. *Mus. Dom. Banks.*
10. *C. ater glaber*, thorace elytrisque punctis quatuor flavescentibus. *Syst. Ent.* 107. 7. * *Gorteriae.*
Chrysomela Gorteriae. *Linn. Syst. Nat.* 2. 596. 74.
Amoen. acad. 6. 394. 16.
 Habitat in Cap. bon. sp. gorteriis.
11. *C. capite thoraceque fulvis*, elytris flavis, puncto bascos scutelloque nigris. *maxillosus.*
 Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*
 Medius. Antennae ferratae nigrae, basi fulvae. Caput et thorax glabra, laevia, fulva, immaculata. Scutellum atrum. Elytra glabra, laevia, flava puncto bascos atro. Abdomen cinereo villosum. Pedes fulvi geniculis nigris.
12. *C. ater*, thorace vtrinque macula lutea, tibiis flavis. *auritus.*
Syst. Ent. 107. 8.

Chrysomela aurita subcylindrica nigra, thorace vtrinque macula lutea, tibiis flavis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 596. 75.

Habitat in Saxoniae corylo.

didymus. 13. *C. rufus*, elytris maculis tribus nigris, anteriore postice didyma. *Syst. Ent.* 107. 9. *

Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

4maculatus. 14. *C. thorace* pedibusque luteis, elytris luteis, maculis duabus coerulescenti nigris. *Syst. Ent.* 107. 10.

Chrysomela 4maculata. *Linn. Syst. Nat.* 2. 596. 77.

Schaeff. Icon. tab. 6. fig. 6. 7.

Pontopp. Atl. Dan. 1. tab. 29.

Habitat in Saxonia.

flauicollis. 15. *C. niger*, thorace fuluo, punctis sex nigris, elytris pallidis, punctis duobus.

Habitat in Sibiria. *Pallas. Mus. Dom. Banks.*

Nimis affinis videtur *C. 4maculato*. Caput nigrum lineola inter antennas punctis duobus in oculorum orbita fuluis. Antennae nigrae basi fuluae. Thorax glaber, nitidus, fuluus punctis sex nigris in strigam digestis. Elytra pallida puncto baseos apicisque nigris. Pedes rufi geniculis nigris. Punctum apicis elytrorum interdum deest.

longimana. 16. *C. obscure* aeneus, elytris testaceis. *Syst. Ent.* 107. 11.

nus.

Chrysomela longimana subcylindrica obscure aenea elytris liuido flavis, pedibus anticis longissimis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 599. 95.

Habitat in trifolio montano, euphorbia cyparissia et Europae borealis.

Affinis videtur *C. tridentato* at minor. Pedes in altero sexu elongati.

marginata. 17. *C. nigro* aeneus, elytris flavis, margine nigro.

tus.

Habitat in Germania.
Nimis praecedenti affinis, cuius forte mera varietas. Corpus totum nigro aeneum. Punctum flavum ad os. Elytra flaua margine omni nigro.

18. *C. thorace elytrisque obscure aeneis pubescentibus, pubescens.*
Gen. Inf. Mant. 221. *
 Habitat in America boreali.

19. *C. niger nitidus, elytris rubris, punctis duobus nigris* antennis longitudine corporis. *Syst. Ent.* 108. 12. *2punctatus.*

Cryptocephalus niger, elytris rubris striatis, maculis quatuor limboque nigris. Geoff. Inf. 1. 234. 1.

Chrysomela 2punctata cylindrica, thorace nigro nitido, elytris rubris, punctis duobus nigris, antennis longis. Linn. Syst. Nat. 2. 597. 78. *Fn. Sv.* 548.

Chrysomela atra elytris rubris, punctis quatuor nigris. Vdm. Diff. 21. 22.

Petiv. Gazoph. tab. 31. fig. 4.

Degeer Inf. 5. 332. 35.

Habitat in Europae borealis corylo.

Variat rarius linea longitudinali loco punctorum, vti et interdum puncto elytrorum posteriori duplici.

20. *C. niger obscurus, thorace fuluo, elytris testaceis, punctis duobus nigris.* *2maculatus.*

Habitat in Italia. *Dr. Allioni.*

Nimis praecedenti affinis et forte mera eius varietas.

Differt tantum thorace haud atro sed fuluo.

21. *C. thorace variegato, elytris rubris, punctis duobus nigris.* *Syst. Ent.* 108. 13. *cordiger.*

Cryptocephalus niger, thoracis lineis flavis, elytris rubris punctatis, maculisque quatuor limboque nigris. Geoff. Inf. 1. 235. 7.

Chrysomela cordigera. Linn. Syst. Nat. 2. 598. 91. *Fn. Sv.* 558.

Chrysomela cylindrica, thorace nigro maculis flavis, elytris rubris punctis duobus nigris, antennis filiformibus flavis nigrisque. Degeer Inf. 5. 330. 33.

Chrysomela nigra, elytris subflavis, punctis quatuor nigris. Vdm. Diff. 23.

Schaeff. Icon. tab. 30. fig. 1.

Habitat in Europae corylo, salice.

Macula thoracis intermedia interdum cordata,

bothnicus. 22. *C. ater*, thorace linea longitudinali rubra. *Syst. Ent.* 108. 14.

Chrysomela bothnica. *Linn. Syst. Nat.* 2. 598. 90. *Fn. Sv.* 557.

Chrysomela cylindrica nigra, pedibus testaceis, thorace linea longitudinali capiteque macula irregulari flavis. *Degeer Inf.* 5. 335. 39.

Habitat in Suecia.

Frons macula quadrata rufa.

Vitis. 23. *C. niger glaber*, elytris rufis. *Syst. Ent.* 108. 15. *Geoff. Inf.* 1. 233. 2.

Habitat in vite vinifera Europae australis, quam misere saepius depascit.

An a sequenti fati distinctus?

Coryli. 24. *C. niger*, thorace elytrisque testaceis immaculatis. *Syst. Ent.* 109. 16.

Chrysomela Coryli cylindrica, thorace elytrisque testaceis, pedibus nigris. *Linn. Syst. Nat.* 2. 598. 88. *Fn. Sv.* 555.

Habitat in Europae corylo.

ruficollis. 25. *C. niger*, thorace rufo, elytris testaceis. *Syst. Ent.* 109. 17. *

Habitat in Insula St. Helenae. *Mus. Dom. Banks.*

Variat thoracis margine pallido et concolore, femoribusque basi rufis atrisque.

nigripes. 26. *C. capite thoraceque rufis*, elytris pallidis, pedibus apice nigris. *Gen. Inf. Mant.* 221. *

Habitat in America boreali.

6punctatus. 27. *C. niger*, thorace variegato, elytris rubris, maculis tribus nigris. *Syst. Ent.* 109. 18.

Chrysomela 6punctata. *Linn. Syst. Nat.* 2. 599. 92. *Fn. Sv.* 559.

Chrysomela rubra, elytris maculis tribus nigris, thorace maculis, magnis binis nigris rubro cinctis. *Degeer Inf.* 5. 331. 34. tab. 10. fig. 9.

Buprestis 6punctata. Scop. Ent. carn. 208.

Sulz. Hist. Inf. tab. 3. fig. 18.

Schaeff. Icon. tab. 90. fig. 1—3.

Habitat in Europae borealis corylo.

Genicula tiliarum puncto albo notata.

28. *C. cyaneus nitidus*, antennis fuscis. *coerulans*.

Habitat in Africa aequinoctiali. Mus. Dom. Banks.

Statura oblonga. Corpus totum cyaneum, nitidum,
immaculatum antennis ferratis solis fuscis.

29. *C. violaceus*, capite thorace femoribusque dentatis *calcaratus*.
rufis. Syst. Ent. 109. 19. *

Habitat in Sierra Leon Africae. Mus. Dom. Banks.

30. *C. cyaneus*, thorace pedibusque rufis. Syst. Ent. *cyaneus*.
109. 20. *

Melolontha coerulea, thorace pedibusque ferrugineis.

Geoff. Inf. 1. 197. 4.

Habitat in Gallia. Dr. Mallet.

31. *C. cyaneus nitidus*, thoracis lateribus elytrorum apicibus femoribusque rufis. *collaris*.

Habitat in Sibiria. Dr. Pallas. Mus. Dom. Banks.

Maior *C. fericeo*. Caput cyaneum antennis basi rufis.

Thorax glaber nitidus, medio cyaneus lateribus rufis.

Elytra cyanea macula magna apicis rufa. Corpus
nigrum. Pedes nigri femoribus rufis.

32. *C. viridi coeruleus*, antennis nigris. Syst. Ent. 109. 21. *fericeus*.

Cryptocephalus viridi auratus fericeus. Geoff. Inf. 1.
233. 3.

Chrysomela fericea cylindrica, thorace coeruleo, elytris
pedibusque coeruleis. Linn. Syst. Nat. 2. 598. 86.

Fn. Sv. 554.

Chrysomela cylindrica viridi aurata, thorace gibbo, an-
tennis longis nigris, elytris scabris dehiscentibus.

Degeer Inf. 5. 334. 37.

Sulz. Hist. Inf. tab. 3. fig. 13.

Habitat in Europae salicibus.

Variat rarius corpore toto aeneo.

- nitens*. 33. *C. viridis nitens*, ore pedibusque testaceis. *Syst. Ent.* 110. 22.
Chrysomela nitens cylindrica, thorace coerulesco nitido, elytris coeruleis, pedibus testaceis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 598. 84. *Fn. Sv.* 551.
Chrysomela cylindrica coerulesco violacea nitida, capite antice pedibusque flavis. *Degeer Inf.* 5. 334. 38.
 Habitat in Europae falice.
- glabratus*. 34. *C. violaceus*, thorace elytrisque viridi aeneis, antennis fuscis. *Syst. Ent.* 110. 23. *
 Habitat in Brasilia. *Mus. Dom. Banks.*
- quadrum*. 35. *C. ater*, elytris flavis, vitta media abbreviata atra. *Gen. Inf. Mant.* 221. *
 Habitat in Germania. *Dom. de Hattorf.*
- vittatus*. 36. *C. niger*, elytris margine striaque abbreviata flava. *Syst. Ent.* 110. 24. *
Cryptocephalus elytro singulo duplici linea longitudinali flava. *Geoff. Inf.* 1. 233. 4.
 Habitat in Europae australioris graminosis.
- Moraei*. 37. *C. ater*, elytris maculis duabus flavis marginalibus. *Syst. Ent.* 110. 25.
Cryptocephalus niger, capite thoraceque antice luteis, elytro singulo externe macula duplici flava. *Geoff. Inf.* 1. 234. 5.
Chrysomela Moraei cylindrica, thorace nigro, elytris nigris, maculis duabus rubris marginalibus. *Linn. Syst. Nat.* 2. 597. 82. *Fn. Sv.* 550.
Buprestis Moraei. *Scop. Ent. carn.* 202.
Cassida nigra nitida, clypeo caput fere integrum tegente, macula ad apicem et basin elytrorum lutea. *Vdm. Diff.* 28.
Schaeff. Icon. tab. 30. fig. 5.
 Habitat in Europae hypericis. *Dom. Lund.*
 Caput et thorax interdum albo maculata.
- 15guttatus*. 38. *C. rufus*, thorace maculis tribus, elytris sex flavis. *Syst. Ent.* 110. 26. *
 Habitat in Brasilia, *Mus. Dom. Banks.*

39. *C. capite thoraceque variegatis, coleoptris flavis punctis decem nigris.* *Syst. Ent.* III. 27. * *10punctatus.*
Chrysomela 10punctata cylindrica, thorace variegato, elytris flavis, punctis quinque nigris. *Linn. Syst. Nat.* 2. 597. 79. *Fn. Sv.* 560.
 Habitat in Italia. *Dr. Allioni.*
40. *C. ater, elytris macula apicis rufa.* *Syst. Ent. App.* 2 *pustulatus.*
 821. *
 Habitat in Heluetia. *Dom. Lee.*
41. *C. rufus, thorace maculis duabus, elytris fasciis duabus nigris.* *2fasciatus.*
 Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*
 Caput rufum oculis reniformibus fuscis. Thorax gibbus, nitidus, laevis, rufus maculis duabus dorsalibus atris. Elytra punctato striata fascia baseos alteraque pone medium nigris.
42. *C. niger, elytris rufo bimaculatis.* *Syst. Ent.* III. 28. * *4pustulatus.*
Chrysomela 14punctata. *Linn. Syst. Nat.* 2. 597. 80. *Fn. Sv.* 549.
 Habitat in Sueciae nemoribus.
 Maculae elytrorum remotae, altera maior ad basin, altera minor ad apicem.
43. *C. niger, thorace elytrisque ferrugineo variegatis, pedibus ferrugineis, geniculis nigris.* *Histrion.*
 Habitat in Italia. *Dr. Allioni.*
 Magnitudo *C. Scopolini.* Caput nigrum orbita oculorum rufa. Thorax niger margine lineolisque tribus abbreviatis ferrugineis. Elytra punctata nigra maculis apiceque ferrugineo. Pedes ferruginei geniculis femorumque posticorum fascia fusca.
44. *C. niger, thorace rufo, elytris rufis, fasciis duabus cyaneis, pedibus nigris.* *Syst. Ent.* III. 30. *Scopolinus.*
Chrysomela Scopolina cylindrica, thorace rufo, elytris rufis, fasciis duabus nigris. *Linn. Syst. Nat.* 2. 597. 81.
 Habitat in Europa australi, America.
 Fasciae elytrorum nec marginem, nec suturam attingunt.
Fabr. Spec. Inf. K 45. C.

- Koenigii*. 45. *C. rufus*, elytris punctis duobus coerulefcentibus.
Syst. Ent. 111. 29. *
 Habitat Tranquebariae. *Dr. Koenig*.
 Praecedenti nimis affinis, forte eius mera varietas.
- paracenthesis*. 46. *C. elytris flauis*, lineola punctisque tribus nigris. *Syst. Ent.* 111. 31.
Chryfomela paracenthesis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1066. 1.
 Habitat in Europa australi.
 Supra flauus thorace nigro variegato.
- Pini*. 47. *C. testaceus*, elytris pallidis, antennis fufcis. *Syst. Ent.* 112. 32.
Chryfomela Pini cylindrica testacea, elytris pallidioribus, pedibus concoloribus, antennis fufcis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 598. 89. *Fn. Sv.* 556.
 Habitat in Sueciae pino.
- pufillus*. 48. *C. thorace fuluo*, elytris testaceis nigro maculatis.
Gen. Inf. Mant. 221. *
 Habitat Hamburgi. *D. Schulz*.
- labiatus*. 49. *C. ater nitidus*, ore pedibus bafique antennarum lutefcentibus. *Syst. Ent.* 112. 33.
Chryfomela labiata. *Linn. Syst. Nat.* 2. 598. 87. *Fn. Sv.* 553.
 Habitat in Europae rofis. Minutus.
- flauipes*. 50. *C. ater nitidus*, capite pedibusque luteis.
 Habitat in Italia. *Dr. Allioni*.
 Praecedenti affinis, at quadruplo maior.

31. C I S T E L A.

- ceruina*. 1. *C. liuida*, pedibus fufcis. *Syst. Ent.* 116. 1.
Chryfomela ceruina oblonga liuida, thorace poftice transuerfo. *Linn. Syst. Nat.* 2. 602. 115. *Fn. Sv.* 575.
 Habitat in Europa boreali.
- cinerea*. 2. *C. liuida*, elytris pedibusque fufcis.
 Habitat in Italia. *Dr. Allioni*.
 Statura et fumma affinitas praecedentis. Differt folis elytris obfcurioribus. Forte mera varietas.

3. *C. livida*, antennis fuscis. *Syst. Ent.* 116. 2. * *livida.*
 Habitat in Terra del Fuego. *Mus. Dom. Banks.*
 Affinis praecedenti, at duplo minor.
4. *C. atra*, elytris striatis testaceis. *Syst. Ent.* 116. 3. *ceramboi-*
Chrysomela ceramboides oblonga nigra, elytris testa- *des.*
 ceis, antennis ferratis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 602. 117.
Fn. Sv. 576.
Mordella nigra, elytris fulvis striatis. *Geoff. Inf.* 1.
 354. 3.
 Habitat in Europa boreali.
5. *C. nigra*, thorace elytris abdomineque testaceis. *Syst. testacea,*
Ent. 116. 4. *
 Habitat in Oriente. *Prof. Forskahl.*
6. *C. flava*, elytris sulphureis. *Syst. Ent.* 117. 5. *sulphu-*
Chrysomela sulphurea oblonga flava tota. *Linn. Syst.* *rea.*
Nat. 2. 602. 114.
Tenebrio luteus. *Geoff. Inf.* 1. 351. 11.
 Habitat in floribus umbellatarum Europae.
 Antennae fuscae.
7. *C. atra*, thorace ferrugineo, elytris striatis. *ruficollis.*
 Habitat in Lusitania. *D. Gray. Mus. Dom. Banks.*
 Corpus statura et magnitudine *C. sulphureae*. Anten-
 nae filiformes nigrae. Caput atrum, immaculatum,
 nitidum. Thorax ferrugineus, nitens. Elytra striata.
8. *C. rufescens*, antennis macula elytrorum anoque ni- *analis.*
 gris. *Syst. Ent.* 117. 6. *
 Habitat Tranquebariae. *Dr. Koenig.*
 Variat elytris maculis duabus nigris, altera baseos, alte-
 ra apicis.
9. *C. nigra*, elytris pedibusque testaceis. *Syst. Ent.* 117. 7. *murina.*
Chrysomela murina oblonga nigra, elytris pedibusque
 testaceis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 602. 118. *Fn. Sv.* 577.
Mordella nigra, elytris fulvis laevibus. *Geoff. Inf.* 1.
 355. 4.
 Habitat in Europa boreali.

- angusta*. 10. *C. thorace elytris que obscure rufis medio nigris.*
Habitat in Anglia. *Mus. Dom. Banks.*
Statura omnino *C. murinae*, at angustior. Caput nigrum antennis fuscis. Thorax obscure rufus, medio niger. Elytra ferruginea futura nigra. Abdomen ferrugineum linea media et laterali fuscis. Pedes ferruginei.
- pallida*. 11. *C. pallida, capite elytrorumque apicibus fuscis.* *Syst. Ent. 117. 8. **
Habitat in Anglia. *Mus. D. Hunter.*
- aerugi-
nea*. 12. *C. flava, capite pectoreque nigris, elytris viridibus.*
*Syst. Ent. 117. 9. **
Habitat in Africae plantis.
- festiva*. 13. *C. ferruginea, elytris cyaneo viridibus, margine ferrugineo.*
Habitat ad Cap. bon. sp. *Forster. Mus. Dom. Banks.*
Parua. Antennae fuscae basi ferrugineae. Caput rufum, basi nigrum. Thorax glaber, subpunctatus, nitidus, ferrugineus, immaculatus. Elytra glabra, viridia, nitida. Corpus ferrugineum pedibus apice nigris.
- aulica*. 14. *C. atra, thorace rufo, elytris cyaneis.*
Habitat ad Cap. bon. sp. *D. Forster. Mus. Dom. Banks.*
Caput atrum. Thorax suborbiculatus, glaber, nitidus, rufus, immaculatus. Elytra cyanea, nitida. Abdomen atrum segmentorum marginibus rufis.
- innuba*. 15. *C. nigra, thorace rufo, elytris nigris, margine vitta-
que luteis.* *Syst. Ent. 117. 10. **
Habitat in America. *Dom. Drury.*
- melanoce-
phala*. 16. *C. thorace flavo, elytris pallidis, vitta media nigra.*
*Syst. Ent. 118. 11. **
Habitat in America septentrionali. *Mus. Dom. Banks.*
- quinque-
vittata*. 17. *C. testacea, elytrorum marginibus vittaque media ni-
gris.* *Syst. Ent. 118. 12. **
Habitat in America boreali. *Mus. Monson.*

18. *C. hirta*, capite thoraceque rufis, elytris cyaneis. *hirta.*
 Habitat ad Cap. bon. sp. *D. Forster. Mus. Dom. Banks.*
 Statura omnino oblonga hirsuta Lagriae, at palpi antennaeque huius generis. Caput ferrugineum antennis valde ferratis apice fuscis. Thorax hirtus, ferrugineus, punctis duobus in medio nigris. Elytra hirta, cyanea, nitida. Corpus cyaneum pedibus rufis.
19. *C. ferruginea*, elytris flavis, lineolis tribus nigris. *sexlineata.*
 Habitat - - - - *Mus. Dom. Banks.*
 Antennae filiformes, extrorsum subcrassiores, articulo primo basi vltimisque tribus ferrugineis. Caput ferrugineum. Thorax laevis, nitidus, pallidior, immaculatus. Elytra laevia, nitida, flava lineolis tribus nigris, exterioribus duobus basi coeuntibus, interiori breviori. Subtus ferruginea pectore pedumque geniculis nigris.
20. *C. nigra*, elytris pubescentibus pedibusque griseis. *minuta.*
Syst. Ent. 118. 13.
Chrysomela minuta ovata nigra, elytris pedibus thoracisque lateribus griseis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 593.
 50. *Fn. Sv.* 533.
 Habitat in Europae plantis aquaticis.
 Facies Dytisci, at huius generis.

32. C R I O C E R I S.

1. *C. capite thoraceque flavescentibus nigro maculatis, elytris griseis, corpore nigro. triloba.*
 Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*
 Magna. Caput flavescens macula baseos antennisque nigris. Thorax flavescens maculis tribus nigris, intermedia triloba. Elytra subpubescentia, grisea, immaculata. Corpus nigrum minime nitidum.
2. *C. grisea, thorace lineola dorsali, elytris puncto baseos nigris. lineola.*
 Habitat in Italia. *Dr. Allioni.*
 Statura sequentis. Caput griseum antennis nigris. Thorax griseus linea media nigra lateribusque subangulatis

latis. Elytra grisea puncto baseos nigro. Corpus subtus fuscum cinereo pubescens.

Nymphæae. 3. *C. fusca*, elytrorum margine prominulo flavescente. *Syst. Ent.* 118. 1.

Chrysomela Nymphæae oblonga fusca, elytris margine prominulo flavescentibus. *Linn. Syst. Nat.* 2. 600. 99. *Fn. Sv.* 565.

Chrysomela ovata nigro fusca, thorace angusto, maculis duabus nigris, elytris margine flavis, antennis fuscis. *Degeer Inf.* 5. 326. 31. tab. 20. fig. 1. 2.

Galleruca pallida, thorace nigro variegato, elytris unicoloribus pallidis. *Geoff. Inf.* 1. 254. 4.

Habitat in Europae Nymphæis tarda.

Capreæ. 4. *C. thorace nigro maculato elytrisque griseis*, antennis nigris. *Syst. Ent.* 118. 2.

Chrysomela Capreæ oblonga, thorace nigro punctato elytrisque griseis, antennis nigris longis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 600. 100. *Fn. Sv.* 516.

Chrysomela grisea Alni ovata grisea opaca, thorace angusto, puncto nigro, antennis variegatis. *Degeer Inf.* 5. 325. 30.

Galleruca nigra, thorace elytrisque luteo lividis. *Geoff. Inf.* 1. 254. 5.

Habitat in Europae salicibus.

Abdomen nigrum.

cinæa. 5. *C. pallida*, elytrorum margine omni atro. *Syst. Ent.* 119. 3. *

Habitat Tranquebariæ. *Dr. Koenig.*

calmariensis. 6. *C. ovata cinerea*, elytris vitta lineolaque baseos nigris. *Syst. Ent.* 119. 4.

Chrysomela calmariensis oblongiuscula ferruginea, elytris macula longitudinali nigricante. *Linn. Syst. Nat.* 2. 600. 101.

Galleruca pallida, thorace nigro variegato, elytris fasciis duabus longitudinalibus nigris. *Geoff. Inf.* 1. 253. 3.

Habitat in Europae salice, alno.

7. *C. flava*, antennis abdomineque fuscis, ano flavo. *abdomi-*
 Habitat in Insulis Oceani pacifici. *Dr. Forster.* *nalis.*
 Antennae fuscae basi flavescentes. Caput et thorax gla-
 bra, flavescentia maxillis nigris. Elytra laevia, fla-
 ua, immaculata. Subtus flava abdomine fusco, ano
 flavo.
8. *C. nigra obscura*, pedibus ferrugineis. *Morio.*
 Habitat ad Cap. bon. sp. *Dr. Forster. Mus. Dom.*
Banks.
 Corpus minus, totum nigrum, obscurum, minime niti-
 dum. Antennarum basis pedesque ferrugini.
9. *C. ovata rufa*, antennis oculisque nigris. *Syst. Ent. sangui-*
 119. 5. * *nea.*
 Habitat Halae Saxonum. *Dom. Schaller.*
 Pedes cinerei, rarius sanguinei.
10. *C. ferruginea*, thorace elytrorumque margine flavis. *tenella.*
Syst. Ent. 119. 6.
Chrysomela tenella oblongiuscula ferruginea, elytris
 margine thoraceque flavis. *Linn. Syst. Nat. 2. 600.*
 102. *Fn. Sv. 564.*
 Habitat in Europae falice.
11. *C. ferruginea*, elytris violaceis, antennis nigris. *Syst. nigricor-*
*Ent. 119. 7. ** *nis.*
 Habitat in Germania. *Dom. de Hattorf.*
12. *C. fulva*, elytris pallidis, margine omni fulvo. *2tubercu-*
 Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.* *lata.*
 Statura omnino *C. melanocephalae*. Caput et thorax
 pallide fulva oculis nigris. Scutellum fuscum. Elytra
 pallida margine omni fulvo. Pedes fulvi plantis
 fuscis. Specimina quaedam vidi tuberculis coleoptro-
 rum duobus versus apicem approximatis, elevatis
 fulvis.
13. *C. flava*, elytris nigris apice rufescentibus. *bidentata.*
 Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*
 Statura omnino praecedentis. Caput, thorax, abdo-
 men, pedes flava. Elytra nigra apice rufescentia
 tuber-

tuberculo paruo eleuato ad futuram. Plantae omnino nigrae.

- melanocephala.* 14. *C. rufa*, capite nigro, elytris violaceis. *Syst. Ent.* 119. 8. *
Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
- cantharoides.* 15. *C. violacea*, capite thorace pedibusque rufis. *Syst. Ent.* 120. 9. *
Habitat in Anglia. *Mus. Brit.*
Statura omnino *C. Nymphæae*.
- amaculata.* 16. *C. pallida*, elytrorum maculis duabus abdomineque atris.
Habitat ad Cap. bon. sp. *Dr. Forst. Mus. Dom. Banks.*
Caput pallidum antennis fuscis. Thorax laeuis, nitidus, pallidus, immaculatus linea transuersa, impressa. Elytra laeuis, pallida maculis duabus atro coeruleis, altera ad basin, altera pone medium. Subtus pallida abdomine atro.
- minuta.* 17. *C. nigra*, thorace elytrisque pallidis immaculatis.
Habitat ad Cap. bon. sp. *Dr. Forster. Mus. Dom. Banks.*
Caput nigrum puncto baseos pallido. Thorax et elytra glabra, pallida, immaculata. Corpus nigrum.
- erythrocephala.* 18. *C. nigra*, capite thoraceque ferrugineis, elytris viridibus.
Habitat ad Cap. bon. sp. *Dr. Forster. Mus. Dom. Banks.*
Statura omnino praecedentium. Antennae filiformes nigrae. Caput obscure ferrugineum puncto baseos nigro. Thorax obscure ferrugineus laeuis puncto medio nigro. Elytra laeuis, viridia, nitida. Corpus et pedes atra.
- merdigera.* 19. *C. rubra*, thorace cylindrico vtrinque impresso. *Syst. Ent.* 120. 10.
Chrysomela merdigera oblonga rubra, thorace cylindrico vtrinque impresso. *Linn. Syst. Nat.* 2. 599. 97. *Fn. Sv.* 563.

Chrysomela rubra Liliorum, thorace tereti, capite, antennis, pedibus abdomineque subtus nigris. *Degeer Inf.* 5. 338. 43.

Crioceris rubra. *Geoff. Inf.* 1. 239. 1.

Attelabus Lilii. *Scop. Ent. carn.* 112.

Sulz. Hist. Inf. tab. 3. fig. 14.

Schaeff. Elem. tab. 52. fig. 1.

Icon. tab. 4. fig. 4.

Reaum. Inf. 3. tab. 17. fig. 12.

Merian. Europ. 3. tab. 21.

Habitat in Conuallaria maiali.

Habitus ab hoc genere alienus, vix tamen distinctum.

20. *C.* thorace cylindrico rubra, elytris punctis sex nigris. *12puncta-*

Chrysomela 12punctata oblonga rufa, elytris punctis *ta.*

sex, pectore pedumque geniculis nigris. *Linn. Syst.*

Nat. 2. 601. 110. *Fn. Sv.* 568.

Crioceris rubra, punctis tredecim nigris. *Geoff. Inf.* 1.

241. 2. tab. 4. fig. 5.

Attelabus 12punctatus. *Scop. Ent. carn.* 114.

Frisch. Inf. 13. tab. 28.

Schaeff. Icon. tab. 4. fig. 5.

Habitat in Asparago frequens.

21. *C.* thorace cylindrico fuluo, punctis quinque nigris, *14puncta-*

elytris flauis, punctis septem. *Gen. Inf. Mant.* *ta.*

222. *

Attelabus 14punctatus. *Scop. Ent. carn.* 116.

Habitat in Germania australiori.

22. *C.* thorace cylindrico rufa, elytris fasciis duabus atris. *2fasciata.*

Syst. Ent. 120. 12. *

Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

23. *C.* thorace cylindrico rufa, elytris fascia atra. *Syst. unifasciata-*

Ent. 120. 13. *

ta.

Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

Forte praecedentis mera varietas.

24. *C.* thorace cylindrico flaua, antennis pectore pedibus- *nigripes.*

que nigris. *Syst. Ent.* 120. 14. *

Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

- grisea*. 25. *C. pallida*, capite femoribusque ferrugineis, antennis tibiisque nigris.
Habitat ad Cap. bon. sp. *Muf. Dom. Banks.*
Media. Caput ferrugineum antennis nigris. Thorax obscure pallidus. Elytra laeua, pallida. Corpus pallidum, nigro mixtum. Pedes nigri femoribus rufis.
- oculata*. 26. *C. thorace cylindrico flava*, elytris basi nigris, puncto flavo. *Syst. Ent.* 121. 15. *
Habitat in noua Hollandia. *Muf. Dom. Banks.*
- bioculata*. 27. *C. testacea*, thorace immaculato, elytris maculis duabus ocellaribus albis.
Habitat - - - - *Muf. Dom. Banks.*
Statura omnino *C. ocellatae*. Antennae nigrae basi ferrugineae. Caput et thorax glabra, nitida, testacea, immaculata. Elytra testacea maculis duabus magnis albis, quarum anterior puncto antico nigro, posterior pone medium annulo nigro cineta. Tibiae fuscae.
- pallens*. 28. *C. thorace subcylindrico pallida*, antennis nigris.
Habitat - - - - *Muf. Dom. Banks.*
Praecedentibus paullo minor. Corpus totum glabrum, pallidum, laeue. Caput magis obscurum antennis elongatis nigris. Pedes pallidi.
- aulica*. 29. *C. viridi aenea nitida*, elytris testaceis, maculis duabus cyaneis.
Habitat ad Cap. bon. sp. *Dr. Forster. Muf. Dom. Banks.*
Antennae filiformes fuscae. Caput et thorax viridi aenea, nitidissima ore testaceo. Elytra glabra, laeua, testacea maculis duabus cyaneis posteriori maiori. Corpus viridi aeneum. Pedes testacei femoribus posticis aeneis.
- cyanella*. 30. *C. coerulea*, thorace cylindrico, lateribus gibbis.
Syst. Ent. 121. 16.
Chrysomela cyanella oblonga coerulea, thorace cylindrico, lateribus gibbis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 600. 104.
Fn. Sv. 572.

Chrysomela coeruleo violacea, thorace tereti, lateribus gibbis *Degeer Inf.* 5. 340. 44.

Crioceris tota coeruleo viridis. *Geoff. Inf.* 1. 243. 5.

Habitat in Europae plantis.

31. *C. oblonga* coerulea, thorace pedibusque rufis. *Syst. melanopa.*
Ent. 121. 17.

Chrysomela melanopa. *Linn. Syst. Nat.* 2. 601. 105.
Fn. Sv. 573.

Chrysomela oblonga viridi coerulea nitida, thorace tereti pedibusque flavo rufis. *Degeer Inf.* 5. 342. 46.

Sulz. Hist. Inf. tab. 3. fig. 19.

Habitat in Europa.

32. *C. oblonga* nigra, thorace pedibusque flavis. *flavipes.*

Chrysomela flavipes. *Linn. Syst. Nat.* 2. 601. 106.

Habitat in Germania frequens.

Praecedenti nimis affinis, at nigra.

33. *C. oblonga* nigra, capite thorace pedibusque rufis, thorace spinoso. *subspinosa.*

Habitat in Anglia. *Mus. Dom. Banks.*

Statura praecedentis. Caput rufum antennis filiformibus nigris, basi rufis. Thorax vtrinque unispinosus, subpunctatus, rufus, immaculatus. Elytra punctata obscure nigra. Abdomen nigrum. Pedes rufi.

34. *C. cyanea*, thorace rufo, antennis pedibusque fuscis. *cyanocephala.*
Syst. Ent. 121. 18. *

Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

35. *C. oblonga*, thorace rubro, punctis duobus nigris, elytris obscure cyaneis, maculis quatuor albis. *Asparagi.*

Crioceris Asparagi, thorace rubro, punctis duobus nigris, coleoptris flavis, cruce punctoque quatuor nigris. *Syst. Ent.* 121. 19. *Linn. Syst. Nat.* 2. 601. 112.
Fn. Sv. 567.

Crioceris thorace rubro, punctis duobus nigris, coleoptris flavis, cruce nigra. *Geoff. Inf.* 1. 241. 3.

Attelabus Asparagi. *Scop. Ent. carn.* 113.

Roef. Inf. 2. *Scarab.* 3. tab. 4.

Frisch. Inf. 1. p. 27. tab. 6.

Schaeff. Icon. tab. 52. fig. 9. 10.

Habitat in Europa, asparagos depascens.

Varietatem rariorem elytrorum maculis duabus bascos
connatis ex Italia misit *Dr. Allioni*.

Phellandrii. 36. *C. oblonga nigra*, thorace elytrisque lineis duabus
flavis. *Syst. Ent.* 122. 20.

Chrysomela Phellandrii oblonga nigra, thorace elytris-
que lineis duabus luteis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 601. 111.
Fn. Sv. 569.

Chrysomela oblonga nigra, elytrorum lineis duabus
longitudinalibus luteis. *Geoff. Inf.* 1. 266. 20.

Chrysomela oblonga nigro aenea, obscure nitida, tho-
race marginibus flavis, elytris fasciis duabus longi-
tudinalibus flavis. *Degeer Inf.* 5. 324. 28. tab. 9.
fig. 34.

Habitat ad phellandrii aquatici radices.

elongata. 37. *C. elongata nigra*, elytris vitta flava.
Habitat ad Cap. bon. sp. *Dr. Forster. Mus. Dom.*
Banks.

Statura magis elongata quam in reliquis. Caput, tho-
rax, corpus nigra viridi colore paullo nitentia.
Elytra nigra in medio vitta lata flava. Corpus et pe-
des atra.

caroliniana. 38. *C. oblonga flava*, thorace punctis duobus, coleoptris-
que vittis quinque nigris. *Syst. Ent.* 122. 21.
Habitat in America boreali. *Dom. Drury.*

glabrata. 39. *C. oblonga*, thorace pallido, punctis tribus nigris,
elytris nigris, vittis duabus albis. *Syst. Ent.* 122. 22. *
Chrysomela tomentosa oblonga, elytris subtomentosis
nigris, linea longitudinali margineque pallidis. *Linn.*
Syst. Nat. 2. 601. 107. ?
Habitat in Africa aequinoctiali.

vittata. 40. *C. oblonga*, thorace rufo, elytris flavis, vitta nigra.
Syst. Ent. 122. 23. *
Habitat in Carolina. *Mus. Dom. Monson.*
Pedes flavescentes geniculis nigris.

33. E R O T Y L V S.

1. E. onatus niger, coleoptris punctis fulvis numerosissimis. *Syst. Ent.* 123. 1. giganteus.
Chrysomela gigantea. Linn. *Syst. Nat.* 2. 586. 1.
Chrysomela oblonga nigra, thorace depresso, abdomine gibbo, elytris maculis subrotundis rubris numerosissimis. *Degeer Inf.* 5. 349. tab. 16. fig. 8.
Coccinella gigantea. Sulz. *Hist. Inf.* tab. 3. fig. 15.
Hist. Inf. tab. 3. fig. 8.
 Habitat in India.
2. E. testaceus, antennis tibiisque nigris. *Syst. Ent. App.* testaceus. 822. *
 Habitat in America. *Dom. Drury.*
3. E. niger, elytris flavescentibus nigro punctatis, fascia media posticaque nigris. gibbosus.
Chrysomela gibbosa. Linn. *Syst. Nat.* 2. 586. 2. *Amoen. acad.* 6. 393. 13.
Coccinella. Gron. *Zooph.* 606. tab. 14. fig. 5.
 Habitat in America meridionali.
 Magna. Thorax vtrinque impressus. Coleoptra in medio valde gibba.
4. E. ouatus, elytris nigris, punctis quinque rubris. *Syst. Ent.* 123. 2. 5punctatus.
Chrysomela 5punctata. Linn. *Syst. Nat.* 2. 586. 3.
Coccinella coleoptris nigris punctato impressis, maculis decem rubris. Gron. *Zooph.* 613. tab. 16. fig. 7.
 Habitat in America.
5. E. niger, elytris flavis, punctis numerosissimis nigris. *Syst. Ent.* 123. 3. * punctatissimus.
 Habitat in America. *Mus. Dr. Hunter.*
6. E. ater, elytris punctatis medio fuluo maculatis. variegatus.
 Habitat Surinami. *Mus. Dom. Banks.*
 Statura omnino praecedentium, at minor. Corpus totum atrum, haud gibbosum, elytris punctatis atris, in medio fuluo variegatis.

- fasciatus*. 7. *E. ater*, elytris fasciis tribus flavescentibus.
Habitat - - - *Muf. Dom. Banks.*
Medius. Corpus, caput, thorax laeuia, atra, obscura, immaculata. Elytra fasciis tribus flauis atrisque alternis, e quibus flaua baseos, nigra apicis.
- Morio*. 8. *E. oblongus ater immaculatus*. *Syst. Ent.* 123. 4. *
Habitat in noua Hollandia. *Muf. Dom. Banks.*
- cupreus*. 9. *E. oblongus ater*, thorace elytrisque cupreis. *Syst. Ent.* 123. 5. *
Habitat in noua Hollandia. *Muf. Dom. Banks.*
- nebulosus*. 10. *E. ater*, thorace elytrisque ferrugineo variis.
Habitat in Americae meridionalis insulis. *Muf. D. Hunter.*
Medius. Caput cum antennis nigrum. Thorax glaber rufus margine tenuissimo maculisque tribus dorsalibus, difformibus, connexis nigris. Elytra laeuia, atra fasciis tribus vndatis punctoque apicis ferrugineis. Fascia baseos nigro punctata. Corpus et pedes atra.
- dilatatus*. 11. *E. oblongus ater*, thorace elytrisque ferrugineis. *Gen. Inf. Mant.* 223. *
Habitat ad Cap. bon. sp. *Dom. Lee.*
- smaragdulus*. 12. *E. oblongus ater*, elytris viridibus striatis. *Syst. Ent.* 123. 6. *
Habitat in noua Hollandia. *Muf. Dom. Banks.*
- amethystinus*. 13. *E. oblongus ater*, thorace elytrisque cyaneis. *Syst. Ent.* 124. 7. *
Habitat in noua Hollandia. *Muf. Dom. Banks.*
- bicolor*. 14. *E. oblongus ater supra aeneus*. *Syst. Ent.* 124. 8. *
Habitat in noua Hollandia. *Muf. Dom. Banks.*
- rufipes*. 15. *E. oblongus niger*, pedibus piceis. *Gen. Inf. Mant.* p. 222. *
Habitat Kiliae Holsatorum. *Dom. Lund.*

16. *E. oblongus viridis nitidus punctatus, antennis pedibusque flavescentibus.*

Habitat in Iamaica. *Muf. Dom. Banks.*

Caput viride nitidum ore piceo. Antennae elongatae, filiformes, flavescentes. Thorax viridi nitens punctis plurimis impressis. Elytra viridia, nitida, striata punctata. Abdomen obscurius. Pedes flavescentes.

34. L A G R I A.

1. *L. obscura aenea immaculata. Syst. Ent. 124. 1. ** *aenea.*

Habitat in Americae meridionalis insulis. *Muf. Dom. Banks.*

2. *L. liuida, oculis nigris. Syst. Ent. 124. 2. ** *liuida.*

Habitat in Insula Otaheiti maris australis. *Muf. Dom. Banks.*

3. *L. liuida, thorace lineis elytris vitta fuscis. Syst. Ent. 124. 3. ** *lineata.*

Habitat in noua Zelandia. *Muf. Dom. Banks.*

4. *L. coerulea, antennis fuscis. Syst. Ent. 125. 4. ** *cyanea.*

Habitat in noua Hollandia. *Muf. Dom. Banks.*

5. *L. rufa, elytris fuscis, marginibus lineaque media rufis. Syst. Ent. 125. 5. ** *marginata.*

Habitat in America meridionali. *Muf. D. Hunter.*

Statura *L. vittatae*, at duplo maior. Caput rufum antennis nigris oculisque globosis coerulescentibus. Thorax glaber, rufus, immaculatus. Scutellum rufum. Elytra laeuia, fusca margine omni lineaque media nec basin nec apicem attingente rufis. Pedes nigri femoribus rufis.

6. *L. rufa, elytris vitta abdomineque apice fuscis. Syst. Ent. 125. 5. ** *vittata.*

Habitat in America meridionali. *Dom. v. Rohr.*

7. *L. cyanea, capite thoraceque rufis. Gen. Inf. Mant. rufifrons. p. 223. **

Habitat in America boreali.

- elongata*. 8. *L. atra*, thorace rufo villoso. *Syst. Ent.* 125. 6.
Chrysomela elongata atra, thorace rubro subvilloso.
Linn. Syst. Nat. 2. 603. 122.
 Habitat in Europa, Anglia.
- villosa*. 9. *L. villosa atra*, thorace elytrisque viridibus.
 Habitat ad Cap. bon. sp. *Forster. Mus. Dom. Banks.*
 Statura et summa affinitas *L. hirtae*, at thorax et elytra
 viridia. Abdomen pedesque atra.
- pubescens*. 10. *L. nigra*, thorace marginato villoso, elytris glabris
 testaceis. *Syst. Ent.* 125. 7.
Chrysomela pubescens elongata, thorace nigro villoso,
 elytris plantisque testaceis. *Linn. Syst. Nat.* 2.
 603. 120.
 Habitat in Germania.
 Affinis *L. hirtae*, at paullo maior.
- hirta*. 11. *L. villosa nigra*, thorace tereti, elytris testaceis. *Syst.*
Ent. 125. 8.
Chrysomela hirta oblonga villosa nigra, thorace tere-
 tiusculo, elytris testaceis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 602.
 119. *Fn. Sv.* 578.
Tenebrio alatus villosus niger, elytris villosis fulvis,
 thorace teretiusculo. *Degeer Inf.* 5. 446. tab. 2.
 fig. 23. 24.
 Habitat in Europae Saponariis.
- tomento-* 12. *L. villosa cyanea*, abdomine femoribusque rufis. *Syst.*
sa. Ent. 125. 9. *
 Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
 Variat rarius elytris fuscis.
- glabrata*. 13. *L. glabra*, thorace rufescente, elytris flauis. *Syst.*
Ent. 125. 10. *
 Habitat in Anglia. *Mus. Dom. Banks.*
- antheri-* 14. *L. nigra*, elytris fasciis duabus ferrugineis. *Syst. Ent.*
na. 126. 11.
Meloe antherinus alatus niger, elytris fasciis duabus
 ferrugineis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 681. 16. *Fn. Sv.* 829.
 Habitat frequens in floribus, agilis, cursitans, vix pedic-
 culo maior, at certe huius generis.

15. *L. nigra*, thorace ferrugineo. *Syst. Ent.* 126. 12. *floralis.*
Meloe floralis alatus niger, elytris maculis duabus pal-
 lidis obsoletis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 681. 15. *Fn.*
Sv. 829.?
 Habitat in Europae plantis.

35. Z Y G I A.

1. *Zygia*. *Syst. Ent.* 126. 1. * *oblonga.*
 Habitat in Oriente. *Forskahl.*
 Corpus oblongum rufum, capite elytrisque obscure
 cyaneis.

36. Z O N I T I S.

1. *Z. flava*, elytris puncto medio apiceque nigris. *Syst. chrysome-*
Ent. 126. 1. * *lina.*
 Habitat in Oriente, Aegypto. *Prof. Forskahl.*
 Corpus subtus atrum ano rufescente.
2. *Z. rufescens*, elytris flavis apice nigris. *Syst. Ent.* *flava.*
 127. 2. *
 Habitat in Oriente. *Prof. Forskahl.*

37. A P A L V S.

1. *Apalus*. *Syst. Ent.* 127. 1. *2maculatus.*
Meloe bimaculatus alatus niger, elytris luteis, macula
 nigra postica. *Linn. Syst. Nat.* 2. 680. 9. *Fn. Sv.*
 828. *Vdm. Diff.* 82.
Pyrochroa 2maculata nigra, thorace orbiculato, de-
 presso, elytris fulvis puncto nigro, antennis sim-
 plicibus. *Degeer Inf.* 5. tab. 1. fig. 18.
 Habitat primo vere in Sueciae arenosis.

38. C V R C V L I O.

* Longirostres femoribus simplicibus.

1. *C. longirostris*, thorace elytrisque scabris, antennis *gigas.*
 apice albis. *Syst. Ent.* 127. 1. *
 Habitat in Japonia. *Mus. Brit.*
Fabr. Spec. Inf. I. 2. C.

- Palmarum.* 2. *C. longirostris ater*, thorace supra plano, elytris abbreviatis striatis. *Syst. Ent.* 128. 2. *Linn. Syst. Nat.* 2. 506. 1. *Mus. Lud. Vlr.* 42.
Curculio longirostris, antennis fractis clava truncata, femoribus muticis, corpore nigro depresso, thorace ovato planiusculo, elytris abbreviatis striatis. *Degeer Inf.* 5. 269. 4. tab. 15. fig. 26.
Coffus saguarius. *Rumph. Amb.* 1. 79. tab. 17. fig. 9.
Scopol. Ann. Histor. nat. 5. 89. 40.
Petiv. Gazoph. tab. 35. fig. 5.
Gron. Zooph. 578. tab. 16. fig. 4.
Merian. Surin. tab. 48. fig. 3.
Sulz. Hist. Inf. tab. 3. fig. 20.
 Habitat in Indiae palmis.
- cruenta-tus.* 3. *C. longirostris ater*, thorace lineis elytrisque punctis duobus sanguineis. *Syst. Ent.* 128. 3. *.
 Habitat in Carolina. *Mus. Dom. Banks.*
 Praecedente minor.
- longipes.* 4. *C. longirostris nigricans*, elytris ferrugineis, rostro emarginato, pedibus anticis longioribus. *Syst. Ent. App.* 822. *.
Curculio longipes. *Drury Inf.* 2. tab. 33. fig. 3.
 Habitat ad Cap. bon. sp. *Dom. Lee.*
- indus.* 5. *C. longirostris ater*, thorace subovato excavato punctato, elytris rugoso fulcatis, tibiis spinosis. *Syst. Ent.* 128. 4. *Linn. Syst. Nat.* 2. 506. 2. *Mus. Lud. Vlr.* 43.
Curculio longirostris antennis fractis, femoribus dentatis, corpore nigro depresso, thoracis lateribus tuberculo villoso, elytris rugoso fulcatis. *Degeer Inf.* 5. 265. 1. tab. 15. fig. 22.
 Habitat in India.
- paganus.* 6. *C. longirostris griseus*, thoracis dorso fusco, arcubus cinereis, rostro bifurcato. *Syst. Ent.* 128. 6. *.
 Habitat in Indiis. *D. Torstenfou.*
- Elephas.* 7. *C. longirostris fuscus*, thorace elytrisque variolosis, elytris postice spinosis.
 Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*

Magnus. Caput basi atrum rostro cylindrico fusco. Thorax dorso plano valde variolosus, fuscus maculis indistinctis obscurioribus. Elytra itidem variolosa fusca maculis obscurioribus apice spinis plurimis eleuatis breuibibus acutis. Pedes inermes, fusci.

Variat colore mox obscuriore, mox magis ferrugineo.

8. *C. longirostris* obscure purpurascens, elytris abbreviatis maculatis. *Syst. Ent.* 128. 5. *Linn. Syst. Nat.* 2. 506. 3. *Mus. Lud. Vlr.* 44. *hemipterus.*

Curculio rufo fasciatus longirostris antennis fractis, femoribus muticis, corpore oblongo rufo, thorace magno fasciis longitudinalibus nigris. *Degeer Inf.* 5. 271. 5. tab. 15. fig. 25.

Sulz. Hist. Inf. tab. 4. fig. 5.

Habitat in India.

9. *C. longirostris* rufo nigroque varius, rostro apice nigro. *Gen. Inf. Mant.* 223. *

Habitat ad Cap. bon. sp. *Dom. Lee.*

10. *C. longirostris* cinereus, coleoptris macula communi cordata fusca. *Syst. Ent.* 129. 7. *melanocardius.*

Curculio melanocardius longirostris cinereus, coleoptris fascia cordata fusca. *Linn. Syst. Nat.* 2. 608. 18. *Mus. Lud. Vlr.* 18.

Sulz. Hist. Inf. 40. tab. 4. fig. 11.

Habitat in India.

11. *C. longirostris* niger, thorace subspinoso, lineis elytris postice cruce albis. *Syst. Ent.* 129. 8. * *cruciatus.*

Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

12. *C. longirostris* niger, elytris holosericeo striatis. *Syst. striatulus.* *Ent.* 129. 9. *

Habitat in Insula Terre neuve Americae. *Banks.*

13. *C. longirostris*, elytris rufescentibus, fasciis nebulis. *Syst. Ent.* 129. 10. *Linn. Syst. Nat.* 2. 608. 19. *Fn. Sv.* 589. *Pini.*

Curculio longirostris, antennis fractis, femoribus muticis, corpore oblongo testaceo, maculis lineisque

transuersis flauis, elytris gibbosis. *Degeer Inf.* 5. 222. 15.

Frisch. Inf. 11. tab. 23. fig. 5.

Habitat in pini syluestris cortice.

Affinis *C. abietis* et ambos copula iunctos vidit a *Linneé*, at femora simplicia.

vittatus. 14. *C. longirostris* ferrugineo fuscus albo lineatus, rostro nigro vtrinque fulco abbreviato baseos.

Habitat in Italia. *D. Allioni.*

Corpus maiusculum. Rostrum cylindricum, nigrum, inter oculos fulcis duobus abbreviatis. Thorax ferrugineo fuscus lineis quinque albidis. Elytra laeuia margine lineaque media albidis.

Iaceae. 15. *C. longirostris* niger cinereo irroratus, elytris puncto baseos distincto. *Syst. Ent.* 129. 11. *

Habitat in Centaurea Iacea. *Prof. Hermann.*

Iunior atomis plurimis e villo cinereo conflatis, adultior vero magis glaber et niger.

Colon. 16. *C. longirostris* griseus, elytris puncto albo. *Syst. Ent.* 130. 12. *

Curculio oblongus fuscus, thoracis lateribus albis, elytris striatis, puncto albo. *Geoff. Inf.* 1. 280. 6.

Curculio palustris. *Scop. Ent. carn.* 104.

Curculio Colon longirostris canescens, femoribus anticis subdentatis, thorace vtrinque lineae, elytris puncto albo. *Linn. Mant.* 531.

Schaeff. Icon. tab. 155. fig. 2.

Habitat in Germania.

biguttatus. 17. *C. longirostris* niger, elytris puncto eleuato, abdomine pedibusque posticis flauis. *Syst. Ent.* 130. 13. *

Habitat in America. *Mus. D. Hunter.*

bilineatus. 18. *C. longirostris* fuscus, elytris lineis duabus punctorum alborum.

Habitat in Germania. *Dom. de Hattorf.*

Medius. Rostrum breuius, crassiusculum nigrum. Thorax niger lineis tribus albis. Elytra striata nigra lineis

neis duabus e punctis quadratis albis, quarum altera ad marginem, altera ad futuram. Pedes simplices, nigri.

19. *C. longirostris cinereus*, elytris apice striis albis nigro punctatis. *tessellatus.*
 Habitat in Germania. *Dom. de Hattorf.*
 Medius. Caput et antennae fusca. Thorax et elytra grisea, at elytra apice striis quinque albis et in his puncta distincta atra.
20. *C. longirostris*, thorace laevi, elytris muricatis nigris, punctis duobus apiceque albis. *Syst. Ent.* 130. 14. * *Equiseti.*
 Habitat in equifeto aruenfi Angliae.
21. *C. longirostris supra fuscus*, elytris fascia media alba, subtus candidus. *Bufo.*
 Habitat in Sibiria. *D. Pallas. Mus. Dom. Banks.*
 Rostrum elongatum, inflexum fuscum litura dorsali cinerea antennisque piceis. Thorax fuscus dorso plano punctis duobus minutissimis albis. Latera scutellumque alba. Elytra plana fusca rufo subvillosa fascia in medio lata communi alba. Litura alba ad apicem.
22. *C. longirostris aureus*, rostro plantisque nigris. *Syst. Ent.* 130. 15. *Linn. Syst. Nat.* 2. 611. 38. *Bachus.*
Rhinomacer niger, elytris rubris, capite thoraceque aureis, proboscide longitudine corporis. *Geoff. Inf.* 1. 270. 4.
Sulz. Hist. Inf. tab. 4. fig. 4.
Schaeff. Icon. tab. 37. fig. 13.
 Habitat in Europae australioris vite, corylo.
23. *C. longirostris*, corpore viridi aurato subtus concolore. *Syst. Ent.* 130. 16. *Linn. Syst. Nat.* 2. 611. 39. *Betulae.*
Fn. Sv. 605.
Curculio longirostris antennis rectis nigris, corpore subquadrato viridi aurato nitidissimo, pedibus purpureo aeneis. *Degeer Inf.* 5. 248. 5. tab. 7. fig. 25.

Rhinomacer totus viridi coeruleus. *Geoff. Inf.* 1. 270. 2.

Frisch. Inf. 12. 17. tab. 8. fig. 2.

Suiz. Hist. Inf. tab. 4. fig. 5.

Schaeff. Icon. tab. 6. fig. 4.

Habitat in betula alba, et vite, folia contorquens.

Variat saepius colore omnino coeruleo, Alter sexus thoracem antrorsum spinosum gerit.

Populi. 24. *C. longirostris*, corpore viridi ignito subtus atro coerulefcente. *Syst. Ent.* 131. 17. *Linn. Syst. Nat.* 2. 511. 40. *Fn. Sv.* 606.

Curculio longirostris antennis rectis nigris, corpore subquadrato, supra viridi aurato, nitido, subtus violaceo, pedibus violaceis. *Degeer Inf.* 5. 249. 37.

Rhinomacer viridi auratus, subtus nigro violaceus. *Geoff. Inf.* 1. 270. 3.

Habitat in betula, populo.

Thorax in altero sexu antrorsum spinosus.

bicolor. 25. *C. longirostris* niger, thorace elytrisque rufis. *Syst. Ent.* 131. 18. *

Habitat in America, *Mus. Dom. Hunter.*

cupreus. 26. *C. longirostris* obscure aeneus subtus obscurior. *Syst. Ent.* 131. 20. *Linn. Syst. Nat.* 2. 608. 21. *Fn. Sv.* 593.

Habitat in Europae hortis.

Tragiae. 27. *C. longirostris* aeneus, rostro pedibusque nigris. *Syst. Ent.* 131. 21. *

Habitat in tragiae volubilis feminibus e Brasilia allatis,

aeneus. 28. *C. longirostris* niger, elytris aeneis. *Syst. Ent.* 131. 22. *

Habitat in Angliae nemoribus. *D. Hunter.*

curuiro-
fris. 29. *C. longirostris* ater nitidus, rostro arcuato. Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.* Corpus paruum totum atrum, immaculatum. Rostrum elongatum, cylindricum, arcuatum. Thorax punctatus, clytra striata, femora mutica,

30. *C. longirostris ater*, antennis ferrugineis, thorace bituberculato. *Gen. Inf. Mant.* 223. *Linn. Syst. Nat.* 2. 507. 12. *Pruni*
 Habitat in pruni, cerasi foliis.
 Tuberculo thoracis vtrinque eleuato distinguitur.
31. *C. longirostris niger ouatus*, elytris striatis obtusis. *Campanulae*.
Gen. Inf. Mant. 224. * *Linn. Syst. Nat.* 2. 506. 7.
Curculio longirostris, antennis fractis fuscis, corpore subglobofo cinereo nigro, elytris lincis griseis. *Degeer Inf.* 5. 226. 23.
 Habitat in campanulae rotundifoliae pericarpis.
32. *C. longirostris griseus*, pedibus rufis, rostro femoribusque basi nigris. *fuscirostris*.
Syst. Ent. 131. 23. *
 Habitat in Germaniae plantis. *Dom. de Hattorf*.
33. *C. longirostris viridis*, rostro atro. *Syst. Ent.* 131. 24. * *nigrirostris*.
 Habitat in Angliae aruis. *Mus. Dom. Banks*.
34. *C. longirostris subtestaceus*, thorace viridi lineato, rostro apice fusco. *variabilis*.
Gen. Inf. Mant. 224. *
 Habitat Hamburgi. *Mus. D. Schulz*.
35. *C. longirostris niger*, rostro dimidiato pedibusque rufis. *rufirostris*.
Syst. Ent. 132. 25. *
 Habitat in Anglia. *Mus. Dom. Banks*.
36. *C. longirostris niger*, antennarum basi, coleoptro-faliculariarum disco pedibusque pallide testaceis. *faliculariae*.
 Habitat in lythro falicaria Angliae. *Mus. Dom. Banks*.
 Corpus paruum, nigrum. Antennae clauatae nigrae basi testaceae. Rostrum elongatum, striatum et thorax nigra immaculata. Coleoptra striata disco testaceo margine omni nigro. Pedes testacci femoribus apice fuscis.
37. *C. longirostris subglobofus nebulosus*, clytrorum sutura basi alba. *pericarpis*.
Syst. Ent. 132. 26. *
Curculio pericarpis longirostris subglobofus, coleoptris macula cordata alba. *Linn. Syst. Nat.* 2. 609. 31. *Fn. Sv.* 602.
 Habitat in scrophulariae pericarpis.

- Sisymbrii.* 38. *C. longirostris* albo fuscoque varius, elytris puncto
bafcos eleuato atro, rostro nigro. *Gen. Inf. Mant.*
224. *
Habitat in sisymbrio amphibio, Kiliae captus d. xx.
Maji.
- Caprae.* 39. *C. longirostris*, coleoptris fasciis duabus abbreviatis
vndatis albis.
Habitat in salice capraea Angliae. *Mus. Dom. Banks.*
Parsus. Caput, thorax, corpus atra. Thorax linea
dorsali cinerascens. Elytra striata, atra fasciis dua-
bus sinuatis albis, quae tamen marginem exteriorem
haud attingunt, Pedes inermes, nigri.
- Alliariae.* 40. *C. longirostris* violaceus totus. *Syst. Ent.* 132. 27.
Linn. Syst. Nat. 2. 506. 4. *Fn. Sv.* 581.
Curculio coeruleus longirostris, antennis rectis, corpo-
re obtuso villoso, coeruleo violaceo nitido. *Degeer*
Inf. 5. 251. 39.
Frisch. Inf. 9. 35. tab. 18.
Habitat in eryfimi alliariae caulibus.
- Cyaneus.* 41. *C. longirostris* ater, elytris violaceis. *Syst. Ent.* 132.
28. *Linn. Syst. Nat.* 2. 506. 5. *Fn. Sv.* 581.
Curculio longirostris antennis rectis, corpore oblongo
nigro, elytris nigro coeruleis. *Degeer Inf.* 5. 252. 41.
Habitat in Europae borealis salicibus.
- Craccae.* 42. *C. longirostris* gibbus supra ater subtus cinereus. *Syst.*
Ent. 132. 29.
Curculio Craccae longirostris niger ouatus, rostro su-
bulato, abdomine pallido. *Linn. Syst. Nat.* 2. 506. 6.
Curculio Viciae longirostris, antennis rectis, corpore
oblongo villoso cinereo nigro, elytris sulcatis. *De-
geer Inf.* 5. tab. 6. fig. 31. 32. ?
Habitat in Europae viciis.
- Maluae.* 43. *C. longirostris* griseus, elytris pedibusque testaceis.
Syst. Ent. 132. 30. *
Habitat in Angliae maluis. *Mus. Dom. Banks.*

44. *C. longirostris nigricans*, coleoptris maculis quatuor albidis. *Syst. Ent.* 133. 31. *Linn. Syst. Nat.* 2. 609. 29. *Fn. Sv.* 600. *amaculatus.*
Curculio cinereus, elytrorum puncto quadruplici albo, proboscide thorace longiori. *Geoff. Inf.* 1. 287. 22.
 Habitat in Europa.
45. *C. longirostris niger*, elytris fasciis duabus cinereis, baseos maiore vndata. *Gen. Inf. Mant.* 225. *bifasciatus.*
 Habitat in Kiliae plantis. *Dom. Lund.*
46. *C. longirostris piceus*, abdomine ouato. *Syst. Ent.* 133. 32. *Linn. Syst. Nat.* 2. 507. 13. *Fn. Sv.* 584. *acridulus.*
Curculio pyriformis nigro coerulefcens, abdomine ouato. *Geoff. Inf.* 1. 291.
Curculio longirostris, antennis fractis fuscis, femoribus muticis, corpore ouato nigro fusco, tibiis pallidis. *Degeer Inf.* 5. 235. 22.
 Habitat frequens in floribus tetradynamis Europae borealis.
47. *C. longirostris ater*, femoribus luteis. *Syst. Ent.* 133. 33. * *flauipes.*
Rhinomacer subglobosus niger striatus, femoribus rufis. *Geoff. Inf.* 1. 272. 8.
 Habitat frequens primo vere in Europae locis apricis calidis.
48. *C. longirostris purpureus nitens*, rostro longissimo. *Linn. Syst. Nat.* 2. 607. 14. *Fn. Sv.* 585. *purpureus.*
Curculio rostro longissimo, antennis rectis, corpore villoso subquadrato purpureo aurato nitidissimo. *Degeer Inf.* 5. 250. 38.
Scarabaeus miniatus minimus. *Petiv. Gazoph.* tab. 22. fig. 5. *Bergstr. Nomencl.* 1. 16. 12. tab. 2. fig. 12.
 Habitat in Europae plantis.
 Sequenti nimis affinis,
49. *C. longirostris sanguineus*. *Syst. Ent.* 133. 34. *Linn. Syst. Nat.* 2. 608. 15. *Fn. Sv.* 586. *frumentarius.*
Rhinomacer sanguineus. elytris striato punctatis. *Aët. Nidros.* 3. 391.

Curculio sanguineus longirostris antennis rectis, corpore oblongo sanguineo. *Degeer Inf.* 5. 251. 40.
Act. Holm. 1750. p. 186. 1.
Leuwenh. arc. 168. aug. 6. p. 83. fig. 3.
 Habitat in frumento diutius asseruato.

dorsalis. 50. *C. longirostris*, elytris rubris, futura nigra. *Syst. Ent.* 133. 35. *Linn. Syst. Nat.* 2. 608. 17. *Fn. Sv.* 588.
 Habitat in ranunculo ficaria Europae borealis.
 Tibiae flavae.

futuralis. 51. *C. longirostris* ovatus fuscus, linea longitudinali alba. *Syst. Ent.* 133. 36. *
 Habitat in Germaniae falice.

crux. 52. *C. longirostris* ater, thorace punctis duobus baseos, elytris futura punctisque spariis albis. *Gen. Inf. Mont.* 225. *
 Habitat Hamburgi. *Mus. D. Schulz.*

exclamationis. 53. *C. longirostris* ater, elytris puncto lineolaque apicis albis. *Syst. Ent.* 133. 37. *
 Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

venustus. 54. *C. longirostris* fuscus thorace elytrisque albo lineatis, pedibus testaceis.
 Habitat in Anglia. *Mus. Dom. Banks.*
 Paruus. Caput fuscum antennis testaceis lineaque dorsali albida. Thorax fuscus lineis tribus albidis. Elytra punctato striata, dilutiora lineis duabus subinterruptis, albis. Pedes testacei femoribus muticis.

Rumicis. 55. *C. longirostris* griseus nigro nebulosus, antennis fuscis. *Syst. Ent.* 134. 38. *Linn. Syst. Nat.* 2. 614. 60. *Fn. Sv.* 590.

Curculio longirostris femoribus muticis, antennis fractis, corpore oblongo griseo fusco nebuloso, thorace fasciis duabus nigricantibus. *Degeer Inf.* 5. 231. 20. tab. 7. fig. 10, 11.

Scarabaeus paruus, corpore sublongo totus obscure rufus seu fuscus, punctis nigricantibus adpersus. *Raj. Inf.* 85. 36.

Habitat in Europae rumice,

56. *C. longirostris piceus*, thorace punctato longitudine *granari-*
 elytrorum. *Syst. Ent.* 134. 39. *Linn. Syst. Nat.* 2. us.
 608. 16. *Fn. Sv.* 587.
Curculio rufo testaceus oblongus, thorace elytrorum
 fere longitudine. *Geoff. Inf.* 1. 285. 18.
Curculio longirostris, antennis fractis, corpore oblon-
 go fusco castaneo. *Degeer Inf.* 5. 239. 25.
Scarabaeus parvus fordide fulvus, proboscide longa
 deorsum arcuata. *Raj. Inf.* 88.
Ioblot. Obs. microsc. 1754. tab. 7. fig. 1.
 Habitat in frumento diutius asseruato in granariis pes-
 simus. Pellitur isatide, hyoscyamo, sambuco, thla-
 spide.
57. *C. longirostris piceus*, thorace punctato longitudine *Oryzae.*
 elytrorum, elytris punctis duobus rufis. *Syst. Ent.*
 134. 40. *
Curculio Oryzae longirostris oblongus niger, elytris
 maculis quatuor ferrugineis, femoribus muticis.
Linn. Amoen. acad. 6. 395. 19.
 Habitat in *Oryza* diutius asseruata.
58. *C. longirostris ferrugineus*, thorace longitudine ely- *atubercu-*
 trorum punctisque duobus dorsalibus eleuatis. *latus.*
 Habitat in noua Zelandia. *Mus. Dom. Banks.*
 Statura et summa affinitas *C. granarii*. Corpus totum
 obscure ferrugineum. Thorax punctatus et praeter-
 rea punctis duobus dorsalibus eleuatis. Elytra pun-
 ctato striata. Femora simplicia.
59. *C. longirostris cylindricus*, rostro longissimo subtus *barbicor-*
 barbato, elytris elongato clauatis. *Syst. Ent.* 134. 41. * *nis.*
 Habitat in noua Zelandia. *Mus. Dom. Banks.*
60. *C. longirostris cylindricus*, rostro apice glabro, atro *assimilis.*
 elytris ferrugineo subfasciatis. *Syst. Ent.* 134. 42. *
 Habitat in noua Zelandia. *Mus. Dom. Banks.*
61. *C. longirostris cylindricus*, thorace lineis, elytris pun- *semipun-*
 ctis albis. *Syst. Ent.* 135. 43. * *ctatus.*
 Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

paraplecticus. 62. *C. longirostris cylindricus subcinereus*, elytris mucronatis. *Syst. Ent.* 135. 44. *Linn. Syst. Nat.* 2. 610. 34. *Fn. Sv.* 604. *It. Scan.* 184.

Curculio oblongus, elytris villosis cinereis, futura nigra. *Geoff. Inf.* 1. 279.

Curculio Phellandrii longirostris, antennis fractis, corpore oblongo cylindrico griseo viridi flavescente, elytris acuminatis remotis. *Degeer Inf.* 5. 224. 18. tab. 7. fig. 8.

Schreb. Sammlung 11. 336. tab. 4.

Sulz. Hist. Inf. tab. 4. fig. 7.

Schaeff. Icon. tab. 44. fig. 1.

Habitat larva intra caulem umbellatarum aquaticarum, imprimis phellandrii. Paraplegiam equorum causare fertur.

filiformis. 63. *C. longirostris cylindricus subcinereus*, thorace lineis tribus fuscis.

Habitat in Italia. *Dr. Allioni.*

Statura omnino *C. paraplectici*, at quadruplo minor. Rostrum cylindricum, fuscum. Thorax cinereus lineis tribus fuscis. Elytra cinerea, immaculata, minime punctata, obtusa. Pedes fuscis.

cylindrus. 64. *C. longirostris cylindricus supra niger*, elytris acuminatis, fascia pallida.

Habitat in Sibiria. *D. Pallas. Mus. Dom. Banks.*

Statura oblonga *C. paraplectici*, at minor. Rostrum cylindricum, atrum antennarum clava acuminata. Thorax supra fuscus, subtus albus. Elytra substriata, acuminata, nigra fascia pone medium lata alba, quae antice ad futuram extenditur. Abdomen nigrum apice album. Pedes breves, simplices.

barbifrons. 65. *C. longirostris niger*, rostro barbato, tibiis anticis tridentatis. *Syst. Ent.* 135. 45. *

Seb. Mus. 4. tab. 95. fig. 5.

Habitat in Indiis. *Mus. Dom. Kramer.*

angustatus. 66. *C. longirostris cylindricus ater*, elytris obtusis punctatis. *Syst. Ent.* 135. 46. *

Habitat in Anglia rarius.

67. *C. longirostris cylindricus ater*, lateribus subcoerulescentibus. *Syst. Ent.* 135. 47. * *Linn. Syst. Nat.* 2. 610. 36.
Habitat in Europa australiori.
68. *C. longirostris cylindricus niger*, elytris vitta testacea. *lineola*.
Syst. Ent. 136. 48. *
Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
69. *C. longirostris elongatus niger*, antennis pedibusque piceis, rostro basi attenuato. *Syst. Ent.* 136. 49. * *linearis*.
Habitat Strasburgi. *Mus. Prof. Hermann.*
Variat rarior totus ferrugineus.
70. *C. longirostris*, femoribus anticis subclauatis, corpore atro. *Syst. Ent.* 136. 50. * *crassipes*.
Habitat Strasburgi. *Mus. Prof. Hermann.*
71. *C. longirostris elongatus ater*, thorace nitido, elytris striatis obtusis. *Gen. Inf. Mant.* 225. * *Atriplicis*.
Habitat in atriplici littorali florae Kiloniensis *Dom. Lund.* Norwegiensis.
- ** Longirostres, femoribus dentatis.
72. *C. longirostris*, femoribus posticis dentatis niger, elytris vnispinosis. *Syst. Ent.* 136. 51. * *bidens*.
Habitat in noua Zelandia. *Mus. Dom. Banks.*
73. *C. longirostris obscurus scaber*, thorace vtrinque fasciculato tuberculato, elytris striatis. *famaicensis*.
Habitat in America meridionali. *Mus. D. Hunter.*
Corpus magnum. Rostrum elongatum, cylindricum, incuruum, nigrum antennis capitatis cinereis. Thorax planus obscure griseus, punctis plurimis, eleuatis, atris, nitidis irroratus, lateribus vtrinque tuberculo e pilis ferrugineis angulatis. Elytra striata, obscure grisea punctis itidem eleuatis atris irrorata. Femora acute dentata, tibiae apice dentatae.
74. *C. longirostris*, femoribus quatuor anticis dentatis, elytris polline flavescentibus, supra apicem gibbosis. *mucoreus*.
Syst.

Syst. Ent. 136. 52. *Linn. Syst. Nat.* 2. 612. 49. *Musf. Lud. Vlr.* 53.

Habitat in Indiis.

pufio. 75. *C. longirostris*, femoribus quatuor posterioribus dentatis, elytris striatis nigris, linea repanda grisea. *Syst. Ent.* 136. 53. *Linn. Syst. Nat.* 2. 612. 50. *Musf. Lud. Vlr.* 46.

Habitat in Indiis.

spinipes. 76. *C. longirostris*, femoribus dentatis niger, thorace lineis duabus, elytris strigis quatuor albis, tibiis anticis spinosis.

Habitat in Americae meridionalis insulis. *Musf. D. Hunter.*

Magnus. Rostrum elongatum, cylindricum, incuruum atrum. Thorax antice attenuatus, punctatus, ater, linea vtrinque alba. Elytra punctis eleuatis scabra strigis tribus albis, quarum bases arcuata cum secunda ad marginem exteriorem coit. Pedes nigri. Femora omnia acute dentata. Tibiae antice in medio videntatae.

scaber. 77. *C. longirostris*, femoribus dentatis, thorace carinato, elytris fulcatis tuberculato spinosis. *Syst. Ent.* 137. 54. *

Habitat Caiennae. *D. Mallet.*

cylindrirostris. 78. *C. longirostris*, femoribus dentatis, thorace scabro, elytris postice bituberculatis. *Syst. Ent.* 137. 55. *

Habitat in noua Hollandia. *Musf. Dom. Banks.*

stigma. 79. *C. longirostris*, femoribus dentatis, elytris macula magna ferruginea. *Syst. Ent.* 137. 56. *Linn. Syst. Nat.* 2. 612. 52. *Musf. Lud. Vlr.* 48.

Habitat in Indiis.

Macula magna in medio elytrorum.

habes. 80. *C. longirostris*, femoribus subdentatis, thorace scabro, elytris fulcatis tuberculatis, ore barbato.

Habitat in Bengal. *Musf. Dom. Banks.*

Medius. Rostrum mediocre, scabrum, atrum ore pilis fasciculatis, ferrugineis. Thorax rotundatus punctis eleuatis scaber, immaculatus. Elytra fulcata sulcis per paria apice coëuntibus tuberculisque nouem. 3. 3. 3. oblique positis, atra maculis duabus cinereis, altera ad marginem exteriorem, altera ad apicem. Pedes scabri atri, femoribus subdentatis.

81. *C. longirostris pallidus*, femoribus dentatis, thorace elytrisque strigis nigris. *Syst. Ent.* 137. 57. *annulatus.*
Curculio annulatus longirostris, femoribus dentatis, thorace elytrisque fasciis linearibus nigris. *Linn. Syst. Nat.* 2. 613. 54. *Mus. Lud. Vlr.* 51.
 Habitat in Indiis.
 Striga vnica in thorace et duae in elytris.
82. *C. longirostris oblongus*, femoribus dentatis, elytrorum striis punctatis approximatis. *Syst. Ent.* 137. 58.* *caliginosus.*
 Habitat in Anglia rarius. *Mus. Brit.*
83. *C. longirostris femoribus dentatis brunneus*, rostro fusco, elytris testaceis punctato striatis. *brunneus.*
 Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*
 Magnus. Caput brunneum rostro fusco basi vtrinque sulcato. Antennae fuscae primo articulo longiori, reliquis breuib. pilosis, vltimis clauatis cinereis. Thorax punctatus, brunneus. Elytra striato punctata striis per paria apice coëuntibus, testacea apice puncto eleuato gibboso. Pedes testacei femoribus omnibus acute dentatis.
84. *C. longirostris*, femoribus dentatis, elytris fuscis, fasciis duabus linearibus interruptis albidis. *Abietis.*
Syst. Ent. 138. 59. *Linn. Syst. Nat.* 2. 613. 57. *Fu. Sv.* 615.
Curculio subfuscus. *Linn. It. Oeland.* 26.
Curculio longirostris antennis fractis, corpore oblongo nigro, maculis griseo flauis. *Degeer Inf.* 5. 205. 1. tab. 6. fig. 11.
Curculio Noruegicus. *Petiv. Gazoph.* 14. tab. 8. fig. 9. *Schaeff. Icon.* tab. 25. fig. 1.
 Habitat in pini syluettris cortice et resina.
 Forte varietas sexus *C. pini.*

- reticulatus.* 85. *C. longirostris oblongus piceus*, femoribus dentatis, elytris reticulatis, fasciis obliquis pallidis, tibiis anticis spinosis. *Syst. Ent.* 138. 60. *
Habitat Tranquebariae. *D. Koenig.*
- Lapathi.* 86. *C. longirostris femoribus bidentatis albo nigroque varius*, thorace elytrisq. muricatis. *Syst. Ent.* 138. 61. *
Curculio Lapathi longirostris albido nigroque varius muricatus. *Linn. Syst. Nat.* 2. 608. 20. *Fn. Sc.* 591.
Curculio albicaudis longirostris, antennis fractis, femoribus muticis, corpore ovato nigro, fasciculis pilis pilosis, elytris postice albis. *Degeer Inf.* 5. 223. 16. tab. 7. fig. 1. 2.
Habitat in Europae salice.
Descriptio *Linnaei* conuenit, at femora in nostris specimenibus omnia bidentata.
- 6guttatus.* 87. *C. longirostris, femoribus dentatis niger, elytris maculis tribus albis.* *Syst. Ent.* 138. 62. *
Habitat in America. *Mus. D. Hunter.*
- luridus.* 88. *C. longirostris femoribus dentatis ovatus obscure niger, elytris punctato striatis.* *Syst. Ent.* 138. 63. *
Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
- stolidus.* 89. *C. longirostris, femoribus dentatis fuscus, tibiis posticis incuruis dentatis.*
Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*
Medius. Caput rostro cylindrico nigrum basi ferrugineum. Antennae fractae, nigrae. Thorax punctis eleuatis numerosissimis scaber, niger maculis aliquot indistinctis, ferrugineis. Elytra striato punctata, fusca ferrugineo subfasciata. Pedes obscuri femoribus dentatis, posticis annulo cinereo. Tibiae posticae breues, incuruae apice denticulis duobus obtusis altero latere interiori, altero exteriori.
- meditabundus.* 90. *C. longirostris femoribus dentatis, elytris striatis postice acuminatis.* *Syst. Ent.* 139. 64. *
Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

91. *C. longirostris femoribus dentatis niger, thoracis lateribus rotundatis, elytris subspinosis.* *stupidus.*
 Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
92. *C. longirostris femoribus dentatis griseus, thorace lineata punctisque duobus dorsalibus albis.* *Mangiferae.* *Syst. Ent. rae.*
 139. 66. *
 Habitat in nucleis mangiferae. *D. Koenig.*
93. *C. longirostris femoribus dentatis villosus griseus, rostro testaceo.* *squalidus.*
 Habitat Surinami. *Mus. Dom. Banks.*
 Medius. Rostrum elongatum, cylindricum, glabrum, testaceum. Thorax griseus lineis tribus cinereis. Elytra brevia, striata, grisea. Femora acute dentata.
94. *C. longirostris femoribus dentatis ater, thorace utrinque punctis duobus testaceis.* *Syst. Ent. 139. 67. ** *germanus.*
Curculio germanus longirostris femoribus subdentatis corpore ovato nigro punctis testaceis adsperso. *Linn. Syst. Nat. 2. 613. 58.*
Scopol. Ann. Hist. nat. 5. 91. 44.
Sulz. Hist. Inf. 39. tab. 4. fig. 8.
Schaeff. Icon. tab. 25. fig. 2.
Frisch. Inf. 13. 28. tab. 26.
 Habitat in Europa, frequens in Germania.
95. *C. longirostris femoribus dentatis, coleoptris maculis duobus dorsalibus atris.* *Scrophulariae.* *Syst. Ent. 140. 68.*
Curculio Scrophulariae longirostris subglobosus coleoptris maculis duobus dorsalibus atris. *Linn. Syst. Nat. 2. 614. 61. Fn. Sv. 603.*
Curculio subglobosus niger, punctis duobus atris suturae longitudinalis coleoptrorum, thorace exalbido. *Geoff. Inf. 1. 296. 44.*
Curculio longirostris antennis fractis, corpore subgloboso fusco griseo, coleoptris maculis duobus rotundis nigris. *Degeer Inf. 5. 208. 3. tab. 6. fig. 17. 18. 19. 20.*
Scarabaeus exiguus cinereus, duabus maculis nigris in alarum thecis insignitus. *List. Scarab. Angl. 395. 35.*
Fabr. Spec. Inf. M Reaum.

Reaum. Inf. 3. tab. 2. fig. 12.

Habitat in scrophularia, verbasco.

Folliculus ouatus, operculatus, fuscus.

- gravis.* 96. *C. longirostris* femoribus dentatis niger, elytris ferrugineo variis, femoribus canaliculatis. *Syst. Ent.* 140. 69. *
- Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*
- 5punctatus.* 97. *C. longirostris* femoribus dentatis, elytris futura punctisque duobus albis. *Syst. Ent.* 140. 70. *
- Curculio 5punctatus* longirostris femoribus dentatis, elytris futura alba maculisque duabus. *Linn. Syst. Nat.* 2. 614. 64. *Fn. Sv.* 618.
- Habitat in Europa boreali.
- didymus.* 98. *C. longirostris* femoribus dentatis supra fuscis, elytris striatis, macula laterali transversa alba.
- Habitat in Germania. *Dom. de Hattorf.*
- Paruus. Corpus supra fuscum subtus griseum. Rostrum elongatum, atrum. Elytra obscura, valde striata macula transversa laterali alba e punctis tribus composita. Femora acute dentata.
- haemorhoidalis.* 99. *C. longirostris* femoribus dentatis, thorace fusco, lateribus cinerascens, elytrorum futura apice ferruginea. *Syst. Ent.* 140. 71. *
- Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
- trimaculatus.* 100. *C. longirostris* femoribus dentatis, coleoptris nigris, maculis tribus cinereis, postica communi lunata. *Syst. Ent.* 141. 72. *
- Habitat in Alsatia. *Prof. Hermann.*
- Femora fusca annulo albo.
- litura.* 101. *C. longirostris* femoribus dentatis albo nigroque variis, rostro vario. *Syst. Ent.* 141. 73. *
- Habitat in Europa.
- villosus.* 102. *C. longirostris* femoribus dentatis villosus griseus, scutello fasciaque, elytrorum postica albis.
- Habitat in Germania. *Dom. de Hattorf.*

Magnitudo praecedentium. Rostrum porrectum, cylindricum, atrum. Thorax griseus linea longitudinali albicante. Scutellum album. Elytra grisea postice fuscia obliqua alba, quae tamen marginem anteriorem haud attingit. Pedes grisei femoribus omnibus dentatis.

103. *C. longirostris* femoribus dentatis ater, elytris nitidis. *Syst. Ent.* 141. 74. *Linn. Syst. Nat.* 2. 607. 10. *aterri-*
Fn. Sv. 582. *mus.*

Habitat in Europae plantis frequentissimus.

Statura et magnitudo omnino *C. Alliariae*, at color ater.

104. *C. longirostris* femoribus dentatis ater, elytris opacis oblongis. *Syst. Ent.* 141. 75. *Linn. Syst. Nat.* 2. 607. 11. *Fn. Sv.* 583. *Cerasi.*

Curculio niger thorace vtrinque dentato. *Geoff. Inf.* 1. 299. 48.

Curculio Cerasi. *Scop. Ent. carn.* 84.

Frisch. Inf. 11. 31. tab. 23. fig. 1. 3.

Habitat in pruni, cerasi foliis.

Variat sexu thorace antice subspinoso.

105. *C. longirostris* femoribus dentatis violaceus totus. *violaceus.*
Syst. Ent. 141. 76. *Linn. Syst. Nat.* 2. 614. 63. *Fr.*
Sv. 579.

Curculio longirostris antennis fractis, corpore oblongo nigro coerulecente nitido, elytris striatis. *Degeer Inf.* 5. 213. 5.

Bergstr. Nomencl. 1. 16. 13. tab. 2. fig. 13.

Rhinomacer subuillofus coeruleus. *Geoff. Inf.* 1. 271. 5.

Habitat in Europae pinetis.

106. *C. longirostris* femoribus dentatis, corpore griseo *Nucum.*
longitudine rostri. *Syst. Ent.* 141. 77. *Linn. Syst.*
Nat. 2. 673. 59. *Fn. Sv.* 616.

Curculio rufo marmoratus, scutello cordato albo, proboscide subulata longissima. *Geoff. Inf.* 1. 295. 42.

Curculio longirostris antennis fractis, corpore oblongo nigro, pilis viridi flauis. *Degeer Inf.* 5. 205. 2. tab. 6. fig. 14. 15. 16.

Curculio ouatus griseus rostro filiformi longitudine corporis. *Vdm. Diff.* 24.

Roef. Inf. 3. tab. 67. fig. 6. 7.

Schaeff. Elem. tab. 55. fig. 1.

Icon. tab. 50. fig. 4.

Sulz. Hist. Inf. tab. 3. fig. 22.

Habitat in coryli auellanae nucibus frequens.

- proboscideus.* 107. *C. longirostris* femoribus dentatis griseus, rostro corpore duplo longiore. *Syst. Ent.* 142. 78. *
Habitat in America boreali. *Mus. Dom. Banks.*
Affinis forte varietas *C. Nucum.*
- varius.* 108. *C. longirostris* femoribus omnibus dentatis, griseo nigroque varius, rostro pedibusque rufis. *Syst. Ent.* 142. 79. *
Habitat Caiennae. *D. Mallet.*
- Ceraforum.* 109. *C. longirostris* femoribus dentatis fuscus, scutello elytrorumque fasciis obsoletis cinereis. *Syst. Ent.* 142. 80. *
Habitat in Anglia. *Dom. Lee.*
Triplō minor *C. Nucum.*
- amoenus.* 110. *C. longirostris* femoribus dentatis ater, thorace punctis duobus, coleoptris quinque niueis. *Syst. Ent.* 142. 81. *
Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
- bicornis.* 111. *C. longirostris*, femoribus acute dentatis, capite bidentato.
Habitat in noua Zelandia. *Mus. Dom. Banks.*
Corpus griseum siue fusco cinereoque mixtum. Rostrium cylindricum, fuscum. Denticuli duo breues, erecti in fronte. Pedes fusci femoribus acute dentatis. Elytra substriata.
- tenuirostris.* 112. *C. longirostris*, femoribus dentatis niger, elytris albo subfasciatis, antennis rufis.
Habitat in Anglia. *Mus. Dom. Banks.*
Statura *C. ceraforum*, at minor. Caput nigrum rostro porrecto, tenui, glabro, atro. Antennae rufae claua cinerea. Thorax niger pilis breuissimis, cinereis.

reis. Scutellum cinereum. Elytra nigra fasciis plurimis, vndatis, pallidioribus.

113. *C. longirostris* femoribus dentatis, elytris testaceis obsolete fasciatis. *Syst. Ent.* 143. 82. *Linn. Syst. Nat.* 2. 614. 62. *Fn. Sv.* 617. *Druparum.*
Curculio flavescens, elytris luteo et rufo tessellatis. *Geoff. Inf.* 1. 296. 43.
Curculio longirostris antennis fractis, corpore oblongo rufo fusco, elytris obsolete fasciatis. *Degeer Inf.* 5. 214. 7.
Schaeff. Icon. tab. 1. fig. 11.
Sulz. Hist. Inf. tab. 3. fig. 21.
 Habitat in cerasi padi nucleis.
114. *C. longirostris* femoribus dentatis, thorace depresso, lateribus obtuse angulatis. *Syst. Ent.* 143. 83. *Linn. Syst. Nat.* 2. 612. 53. *Mus. Lud. Vlr.* 49. *depressus.*
Seb. Mus. 4. tab. 95. fig. 4.
 Habitat in America meridionali.
115. *C. longirostris* femoribus anticis dentatis, corpore griseo nebuloso. *Syst. Ent.* 143. 84. *Linn. Syst. Nat.* 2. 612. 46. *Fn. Sv.* 612. *Pomorum.*
Curculio in floribus arborum. *Frisch. Inf.* 1. 32. tab. 8.
 Habitat in Pomonae floribus
116. *C. longirostris*, femoribus dentatis, corpore testaceo, pectore fusco. *Syst. Ent.* 143. 85. *Linn. Syst. Nat.* 2. 615. 67. *Fn. Sv.* 622. *Tortrix.*
Curculio ferrugineus, elytris striatis, oculis nigris. *Geoff. Inf.* 1. 300. 51.
Curculio fulvus longirostris antennis fractis corpore oblongo flavo testaceo. *Degeer Inf.* 5. 214. 16.
 Habitat in populo tremula folia contorquens.
118. *C. longirostris* femoribus dentatis, thorace nigro, margine antico posticoque rufis, elytris pallidis nigro maculatis. *taeniatus.*
 Habitat in Anglia. *Mus. Dom. Banks.*
 Minor *C. tortrice*. Rostrum nigrum ore sanguineo. Antennae testaceae clava cinerea. Thorax laevis, niger.

ger, margine antice posticeque rufis. Elytra subvillosa, substriata, pallida nigro maculata.

- anchora-* 118. *C. longirostris* femoribus dentatis, elytris flavo striatis, thorace elongato. *Syst. Ent.* 143. 85. *Linn. Syst. Nat.* 2. 613. 56. *Mus. Lud. Vr.* 52.

Curculio longicollis longirostris antennis rectis femoribus dentatis, corpore longissimo nigro, thorace elongato cylindrico, elytris flavo striatis. *Degeer Inf.* 5. 273. 8. tab. 15. fig. 28.

Gron. Zooph. 583. tab. 15. fig. 4.

Sulz. Hist. Inf. tab. 4. fig. 6.

Habitat in Indiis.

Antennae moniliformes et statura depressa elongata proprium genus indicare videntur. Mihi haud rite examinatus.

- nasutus.* 119. *C. longirostris* femoribus omnibus tibiisque anticis dentatis, thorace elongato aeneo, elytris acuminatis.

Habitat in Iamaica. *Mus. Dom. Banks.*

Affinis *C. anchoragini* paullo maior. Antennae omnes filiformes, articulis rotundatis, nigrae longitudine capitis. Caput cylindricum, viridi aeneum rostro longissimo apice depresso crassiori. Thorax elongatus, subcylindricus, canaliculatus, viridi aeneus. Elytra plana, punctato striata nigra lineis variis abbreviatis ferrugineis apice valde acuminatis. Pedes nigri femoribus omnibus dentatis tibiisque anticis videntur.

- dispar.* 120. *C. longirostris* femoribus dentatis elongatus niger, elytris maculis quatuor rufescentibus. *Syst. Ent.* 143. 87. *

Curculio dispar longirostris femoribus dentatis, elytris emarginatis rubro striatis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 613. 55. *Mus. Lud. Vr.* 50.

Curculio minutus. *Drury Inf.* 1. tab. 42. fig. 37.?

Habitat in America. *Dom. Drury.*

Aliud

Aliud vidimus insectum simillimum, at loco rostri maxillis duabus prominentibus videntatis. An varietas sexus?

Antennae moniliformes, vti in C. anchoragine. Ad Atte-labos refert *Geoffroy*, at vix iure.

121. C. longirostris femoribus dentatis niger, elytris maculis duabus ferrugineis. *Syst. Ent.* 144. 88. * 4pustulatus

Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*

Statura praecedentis, at antennae clauatae nigrae claua apice albida.

122. C. longirostris femoribus dentatis, thorace elongato, tibiis anticis bidentatis. *Syst. Ent.* 144. 89. *

Habitat in Insula Iamaica. *Dom. Drury.*

*** Longirostres, femoribus posticis incrassatis saltatoriis.

123. C. pedibus saltatoriis niger, colcoptis testaceis, maculis duabus obscuris. *Syst. Ent.* 144. 90. * Alni.

Curculio Alni longirostris, elytris liuidis, maculis duabus obscuris. *Linn. Syst. Nat.* 2. 611. 42. *Fn. Sv.* 608.

Curculio rufus femoribus posticis crassioribus, elytris maculis quatuor nigris. *Geoff. Inf.* 1. 286. 20.

Curculio Alni saltator longirostris, corpore ovato testaceo elytris maculis binis fuscis, capite nigro. *Degeer Inf.* 5. 262. 49.

Habitat in Europae alno.

124. C. longirostris, pedibus saltatoriis niger cinereo variegatus. pilosus.

Habitat in Anglia. *Mus. Dom. Banks.*

Corpus paruum hirtum nigro cinereoque variegatum.

Antennae testaceae. Femora postica incrassata.

125. C. longirostris pedibus saltatoriis, elytris atris, fasciis duabus albis. *Syst. Ent.* 144. 91. *Linn. Syst. Nat.* 2. 611. 43. *Fn. Sv.* 610. fasciis.

Curculio longirostris, corpore subglobofo atro, elytris fasciis duabus albis maculaque fulua, *Degeer Inf.* 5. 264. 51.

Habitat in falicis floribus.

viminalis. 126. *C. longirostris* pedibus saltatoriis, corpore testaceo. *Syst. Ent.* 145. 92. *

Curculio Quercus longirostris pallide flauus, oculis nigris. *Linn. Syst. Nat.* 2. 609. 25. *Fn. Sv.* 596.

Curculio Ulmi longirostris saltator, corpore ouato flauo testaceo, oculis nigris. *Degeer Inf.* 5. 260. 48. tab. 8. fig. 5.

Curculio rufus saltator, elytris rufis. *Geoff. Inf.* 1. 286. 19.

Reaum. Inf. 3. 31. tab. 3. fig. 17. 18.

Habitat in falice, quercu, vlmo Europae.

Fagi. 127. *C. longirostris* pedibus saltatoriis, corpore atro, femoribus pallidis. *Syst. Ent.* 145. 93. *Linn. Syst. Nat.* 2. 611. 44. *Fn. Sv.* 609. *Iter Scan.* 111. *Scop. carn.* 73.

Habitat in foliis fagi syluaticae.

**** Breuiroftres femoribus muticis.

argyreus. 128. *C. breuirostris* femoribus submuticis, corpore toto viridi argenteo aureoque maculato. *Syst. Ent.* 145. 94. *Linn. Syst. Nat.* 2. 615. 74. *Muf. Lud. Vlr.* 54. Habitat in Indiis,

imperialis. 129. *C. breuirostris*, elytris striis eleuatis atris fulcisque punctatis viridi aureis alternis, basi gibbis apice acuminatis,

Curculio imperialis. *Drury Inf.* 2. tab. 33. fig. 1.

Naturforsch. 10. tab. 2. fig. 1.

Habitat in America meridionali. *Muf. Dom. Banks.*

Corpus maximum, pulcherrimum. Antennae fractae nigrae. Rostrum atrum pills viridibus. Thorax dorso atro in medio canaliculato viridi. Pectus et latera viridi aurea, nitida. Elytra basi gibba constant lineis eleuatis atris, glabris et fulcis punctatis squamoso aureis, nitidissimis, quae postice per paria coeunt. Pedes squamosi virides, inermes.

130. *C. breuirostris*, corpore viridi sericeo, fasciis aureis repandis. *Syst. Ent.* 145. 95. *Linn. Syst. Nat.* 2. 616. 75.
 Habitat in America meridionali.
 Femora fusca annulo aureo.
131. *C. breuirostris* fuscus, elytrorum futura, abdominisque marginibus aureis. *Syst. Ent.* 145. 96. * *marginatus.*
 Habitat in America. *Mus. D. Hunter.*
132. *C. breuirostris* canescens, thorace punctis nigris quatuor, coleoptris nouendecim. *Syst. Ent.* 145. 97. * *19punctatus.*
 Habitat Caiennae. *D. Mauduit.*
 Puncta elytrorum 1. 2. 2. 2. 2. et unico communi.
133. *C. breuirostris* coerulefcens, thorace punctis nigris quatuor, coleoptris sedecim. *Syst. Ent.* 146. 98. *Linn. Syst. Nat.* 2. 618. 92. *Mus. Lud. Vlr.* 58. *16punctatus.*
 Habitat in Brasilia.
 Thoracis latera aurea. Punctum elytrorum posticum geminatum.
134. *C. breuirostris* supra fuscus, thorace coleoptrisque vittis duabus viridi aureis. *Syst. Ent.* 146. 99. * *decorus.*
 Habitat in America meridionali. *Mus. Dom. Banks.*
135. *C. breuirostris* femoribus muticis viridi tomentosus, elytris punctatis. *Syst. Ent.* 146. 100. * *nitidulus.*
 Habitat Caiennae.
136. *C. breuirostris*, elytris spinosis albis, macula laterali fusca. *Syst. Ent.* 146. 101. * *candidus.*
 Habitat Caiennae. *D. Mallet.*
137. *C. breuirostris* albus auro nitidulus, elytris fulcatis acuminatis. *lacteus.*
 Habitat in Iamaica. *Mus. D. Hunter.*

Medius. Caput album rostro breui emarginato. Thorax rotundatus albus aureo colore paullo splendens linea laterali fusco aurea. Elytra fulcata fulcis punctatis alba postice acuminata. Pedes albi tibiis coerulefcentibus.

- modestus*. 138. *C. breuirostris cinereus*, thorace elytrisque fusco maculatis.
 Habitat in noua Zelandia. *Mus. Dom. Banks.*
 Medius cinereus. Thorax latior, quam in reliquis, planus punctis dorsalibus fuscis. Elytra striata fusco maculata.
- viridis*. 139. *C. breuirostris virefcens*, thoracis elytrorumque lateribus flauis. *Syst. Ent.* 146. 102.
Curculio viridis breuirostris femoribus muticis, corpore viridi, supra obscuro, subtus fluidiore. *Linn. Syst. Nat.* 2. 616. 76.
Curculio flauo cinclis breuirostris, antennis rectis, corpore oblongo viridi, fascia laterali flaua. *Degeer Inf.* 5. 256. 45.
Sulz. Hist. Inf. tab. 3. fig. 24.
Schaeff. Flent. tab. 108.
Icon. tab. 53. fig. 6.
 Habitat in Europae Pomona.
- aurifer*. 140. *C. breuirostris*, corpore ferrugineo aureo maculato. *Syst. Ent.* 147. 103. *
Curculio aurifer. *Drury Inf.* 1. tab. 32. fig. 1.
 Habitat in America.
 Pedes anteriores clongati.
- splendida*. 141. *C. breuirostris viridi nitens*, coleoptrorum disco cinereo cupreo nigro fasciato.
 Habitat in Sibiria. *D. Pallas. Mus. Dom. Banks.*
 Statura omnino *C. argentati*, at minor et femora inermia. Caput cinereum rostro apice subtestaceo. Thorax viridis nitens dorso cinerascete lineis duabus atris. Coleoptra limbo viridi nitente, disco cinereo cupreo, fascia media angulata lituraque postica nigris. Corpus viridi nitens. Femora inermia.
- nebulosus*. 142. *C. breuirostris canus*, elytris fasciis obliquis nigris. *Syst. Ent.* 147. 104. *Linn. Syst. Nat.* 2. 617. 84. *Fn. Sv.* 635.
Curculio albo nigroque varius, proboscide planiuscula carinata thoracis longitudine. *Geoff. Inf.* 1. 278. 1. tab. 4. fig. 8.

Curculio carinatus antennis fractis, corpore oblongo nigro, maculis fasciisque albidis, elytris gibbosis.

Degeer Inf. 5. 241. 27.

Frijsh. Inf. 11. 32. tab. 23. fig. 5.

Schaeff. Icon. tab. 25. fig. 3.

Habitat in Europae campis frequens.

143. *C. breuirostris* oblongus cinereus subnebulosus, rostro trifurcato. *Lin. Syst. Nat.* 2. 617. 85. *fulcirostris.*

Habitat in Europae plantis.

Statura et magnitudo omnino *C. nebulosi*, at rostrum trifurcatum.

144. *C. breuirostris* oblongus supra fuscus, elytris macula basaeos alba. *lusitanicus.*

Habitat in Lusitania. *Dom. D. Gray.*

Statura et magnitudo *C. incani*. Corpus supra fuscum, subtus squamoso aureum. Elytra macula oblonga basaeos alba.

145. *C. breuirostris* cinereus, elytris lineis eleuatis tribus crenulatis atris. *Syst. Ent.* 147. 105. * *crenulatus.*

Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

146. *C. breuirostris* niger, elytris punctis nigris albisque alternis holosericeis striatis. *punctatus.*

Habitat in Terra noua Americae. *Mus. Dom. Banks.*

Magnitudo *C. Ligustici*. Caput nigrum griseo pubescens. Thorax rotundatus niger griseo pubescens. Elytra nigra striis plurimis e punctis albis nigrisque alternis villosis exarata. Pedes simplices nigri.

147. *C. breuirostris* oblongus fuscus, thoracis dorso plano. *Syst. Ent.* 147. 106. *incanus.*

Curculio incanus breuirostris cinereus oblongus, elytris obtusiusculis. *Lin. Syst. Nat.* 2. 616. 81. *Fu. Sv.* 631.

Curculio cinereo squamosus, alis carens, elytris striatis. *Geoff. Inf.* 1. 282. 10.

Curculio griseo apterus breuirostris antennis fractis longissimis rufis, corpore oblongo nigro fusco, pilis nitidis griseis. *Degeer Inf.* 5. 242. 28.

Scarabaeus fuscus lanugine incanus. *List, Scar. Angl.*
394. 30.

Habitat in Europae pinetis.

inter- 148. *C. breuirostris obscurus*, coleoptrorum fascia inter-
rruptus. rupta alba.

Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

Medius ruficus. Antennae fractae. Orbita oculorum
alba. Thorax fuscus scutello albo, Elytra striata
albo irrorata et pone medium fascia albida obliqua
futura interrupta. Pedes cinerei femoribus iner-
mibus.

longima- 149. *C. breuirostris fuscus*, thoracis margine punctisque
nus. duobus ferrugineis, pedibus anticis elongatis. *Syst.*
Ent. 147. 107. *

Habitat in Brasilia. *Mus. Dom. Banks.*

Variat thorace elytrisque ferrugineis, linea nigra,
thoracis dorsali, elytrorum ad marginem crassio-
rem. Pedes nigri.

raucus. 150. *C. breuirostris nigricans*, elytris griseis cinereo pun-
ctatis. *Gen. Inf. Mant.* 226.

Habitat in Germania. *Dom. de Hattorf.*

Polygoni. 151. *C. breuirostris*, thorace lineato, elytris cinereis, li-
neolis fuscis futuraque nigro punctata.

Curculio Polygoni longirostris testaceis, coleoptrorum
futura nigra. *Linn. Syst. Nat.* 2. 609. 26. *Fn. Sv.*
597.

Habitat in Europae polygono.

Medius. Rostrum griseum linea longitudinali alba.
Thorax griseus lineis tribus albidis, Elytra cinerea
lineola baseos duabusque aliis in medio fuscis. Su-
tura punctis distinctis fuscis. Pedes grisei femori-
bus inermibus.

griseus. 152. *C. breuirostris supra griseo fuscus subtus cinereus*,
rostro canaliculato. *Syst. Ent.* 148. 108. *

Habitat in Anglia. *Dom. Lee.*

3guttatus, 153. *C. breuirostris nigricans*, elytris griseis, maculis dua-
bus albis, posteriori maiori communi. *Syst. Ent.*
148. 109. *

Sulz. Hist. Inf. tab. 4. fig. 11.

Habitat in Anglia, captus d. VI. Maii in fabuletis Richmondensibus.

154. *C. breuirostris cinereo fuscoque varius, elytrorum futura dimidiata atra. Syst. Ent. 148. 110. ** *coryli.*
 Habitat in Angliae corylo, captus d. XX. Maii in nemoribus Richmondensibus.
155. *C. breuirostris fuscus, thorace striis tribus pallidioribus. Syst. Ent. 148. 111. Linn. Syst. Nat. 2. 616. 80. Fn. Sv. 630. lineatus.*
Curculio breuirostris, antennis fractis, corpore oblongo griseo, thorace striis tribus pallidioribus. Degeer Inf. 5. 247. 35.
Curculio rostro thoracis longitudine, thorace striis tribus pallidioribus. Geoff. Inf. 1. 283. Schaeff. Icon. tab. 103. fig. 8.
 Habitat in Europae plantis variis.
156. *C. breuirostris, coleoptris eleuato striatis, fascia semicirculari maculaque postica albis, lunula nigra. Syst. Ent. 148. 112. ** *lunatus.*
 Habitat in Anglia, captus die VI. Maii in fabuletis Richmondensibus.
157. *C. breuirostris fuscus, elytris apice pallidis, striga vndata fusca. vndata fusca.* *undatus.*
 Habitat in Germania. *Dom. de Hattorf.*
 Paruus statura omnino *C. lunati*.
158. *C. breuirostris fuscus, thorace cinereo lineata, elytris hispidis, punctis obscurioribus striatis. Gen. Inf. Mant. 226. ** *hispidulus.*
 Habitat Kiliae in plantis aquaticis. *Dom. Lund.*
159. *C. breuirostris, corpore cinereo hispido. Syst. Ent. 149. 113. ** *scabriculus.*
Curculio scabriculus breuirostris, femoribus muticis cinereis, elytris hispidis. Linn. Mant. 531.
 Habitat in Sueciae arenosis,

- ceruinus.* 160. *C. breuirostris* griseus, antennis basi rufescentibus. *Syst. Ent.* 149. 114. * *Linn. Syst. Nat.* 2. 615. 70. *Fn. Sv.* 627.
Curculio griseo aeneus antennis fractis rufis, corpore oblongo griseo aeneo nitido. *Degeer Inf.* 5. 220. 13.
 Habitat in Europa.
 In nostris femora omnino inermia.
- lacerta,* 161. *C. breuirostris* griseus, elytris striatis, antennis apice nigris.
 Habitat in India orientali. *Mus. Dom. Banks.*
 Statura omnino *C. ceruini*, at triplo maior. Rostrum breue, crassum, apice emarginatum. Antennae fractae, griseae claua apice nigra. Thorax rotundatus griseus lateribus obscurioribus. Elytra striata, striis crenatis postice coeuntibus. Pedes inermes.
- ruficornis.* 162. *C. breuirostris* ater, antennis rubris, thorace vtrinque bituberculato. *Syst. Ent.* 149. 115. *Linn. Syst. Nat.* 2. 616. 78. *Fn. Sv.* 636.
 Habitat in Europa.
 Thorace vtrinque tuberculato distinctus.
- cloropus.* 163. *C. breuirostris* niger, antennis pedibusque rufis. *Syst. Ent.* 149. 116. *Linn. Syst. Nat.* 2. 617. 82. *Fn. Sv.* 635.
 Habitat in Europae plantis.
 Paruus et valde oblongus.
- tristis.* 164. *C. breuirostris* niger, elytris striatis cinereis. *Syst. Ent.* 149. 117. *
 Habitat in Anglia, Suecia.
- adpersus.* 165. *C. breuirostris* ater, elytris postice albo maculatis. *Syst. Ent.* 149. 118. *
 Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
- punctatus.* 166. *C. breuirostris* fuscus, elytris punctis holosericeis eleuatis margineque flauo. *Syst. Ent.* 150. 119. *
 Habitat in Europa boreali.
 Elytra striato punctata et praeterea punctis eleuatis holosericeis atris albisque alternis adpersa.

167. *C. breuirostris* ouatus ferrugineo fuscus. *Syst. Ent. obscurus.*
150. 120. *
Habitat in Europa boreali.
168. *C. breuirostris* ouatus scaber niger, pedibus rufis. *niger.*
Syst. Ent. 150. 121. *
Habitat in Germania. *Dom. de Hattorf.*
169. *C. breuirostris* niger, thorace carinato varioloso, *variolo-*
elytris striatis. *Syst. Ent.* 150. 122. * *fusus.*
Habitat in Saxoniae campis.
170. *C. breuirostris*, thorace elytrisque variolosis nigris *sticticus.*
albo punctatis. *Gen. Inf. Mant.* 226. *
Habitat ad Cap. bon. sp.
171. *C. breuirostris* ater nitens, elytris punctato striatis, *valgus.*
femoribus annulo cinereo. *Syst. Ent.* 150. 123. *
Habitat in America meridionali. *Mus. Tottianum.*
172. *C. breuirostris* ater, elytris margine lineolisque dua- *succin-*
bus albis. *Gen. Inf. Mant.* 226. * *ctus.*
Habitat ad Cap. bon. sp.
173. *C. breuirostris* ater, elytris striis albis rubrisque ab- *vittatus.*
breuiatis. *Syst. Ent.* 150. 124. *
Curculio vittatus longirostris, elytris lineis albis lu-
teisque. *Linn. Syst. Nat.* 2. 610. 33.
Scarabaeus Curculio proboscide longa, dorsum arcua-
tum, elytris fasciis albis et luteis variegatis. *Sloan.*
Iam. 2. p. 210.
Habitat in America meridionali.
174. *C. breuirostris*, elytris flauis, lineis atris glaberrimis abbreviatis. *Spengleri.*
Syst. Ent. 151. 125. *
Curculio Spengleri longirostris fuscus, elytris flauis,
lineis atris glaberrimis abbreviatis inaequalibus, pe-
dibus ferrugineis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 609. 3.
Curculio Spengleri. *Acta Soc. Berol. phys.* 4. tab. 7. fig. 7.
Habitat in America.
175. *C. breuirostris* griseus, thorace elytrisque cinereo *lividus.*
atroque maculatis.

Curculio lividus. *Brown. Illust.* 129. tab. 49. fig. 8.
Habitat in America meridionali.

Magnus. Rostrum cylindricum, crassum, laeve, ferrugineo griseum. Thorax griseus lineis tribus cinereis maculisque eleuatis atris. Elytra concolora maculis cinereis eleuatisque atris numerosis. Femora inermita.

pulcher. 176. *C. breuirostris*, coleoptris atris, striis sex dorsalibus approximatis abbreviatis albis.

Curculio pulcher. *Brown. Illust.* 126. tab. 49. fig. 6.
Habitat in Iamaica insula. *Mus. Dom. Banks.*

Statura omnino *C. vittati*. Caput et thorax punctata, atra, nitida. Elytra punctata, atra striis tribus approximatis, abbreviatis albis et parua marginali rubra. Apex fere obtusus parum cinerascit. Pedes attri.

histrionicus. 177. *C. breuirostris* griseus, thorace lineis lateralibus fuluis, elytris albis, maculis atris fulvisque. *Gen. Inf. Mant.* 227. *

Habitat ad Cap. bon. sp. *Dom. Lee.*

Rohrii. 178. *C. breuirostris*, elytris acuminatis griseis, margine baseos flavescente. *Syst. Ent.* 151. 125. *

Habitat in Americae insulis. *Dom. v. Rohr.*

impressus. 179. *C. breuirostris* niger, thorace elytrisque punctis impressis albis.

Habitat in Iamaica insula. *Mus. Dom. Banks.*

Statura praecedentium. Rostrum breue, crassiusculum, atrum vtrinque linea alba. Thorax ater punctis vtrinque duobus lateralibus, duobusque maioribus dorsalibus baseos impressis albis. Elytra punctato striata, atra lineis duabus punctorum alborum impressis. Pedes nigri.

albinus. 180. *C. breuirostris* niger fronte anoque albis, thorace tuberculato. *Syst. Ent.* 151. 127. *Linn. Syst. Nat.* 2. 616. 79. *Fn. Sv.* 632.

Curculio breuirostris antennis longis rectis, corpore oblongo nigro hispido, capite elytrorumque apice albis, rostro planiusculo lato. *Degeer Inf.* 5. 255. 44. tab. 8. fig. 1.

Curculio niger, aculeis thoracis tribus, elytrorum sex. *Vdm. Diff.* 27.

Curculio albinus. *Scop. Ent. carn.* 66.

Habitat in Europa borealiori.

181. *C. breuirostris* rostro latissimo plano, elytris apice albis, punctis duobus nigris. *Syst. Ent.* 151. 128. * *latirostris.*

Habitat Halae Saxonum.

Affinis *C. albino* et forte eius mera varietas.

182. *C. breuirostris niger*, thoracis elytrorumque margine albis. *marginellus.*

Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*

Statura cylindrica *C. vernicosi*, at paullo minor. Caput nigrum rostro breui, fulcato. Thorax punctis eleuatis maioribus scaber, niger margine laterali albo. Elytra connata, scabra, nigra margine postice duplicato albo. Pedes nigri femoribus inermibus.

183. *C. breuirostris aeneo niger* eleuato punctatus, elytris verrucosissime verrucosis. *Syst. Ent.* 152. 129. * *Linn. Syst. Nat.* 2. 618. 90. *Mus. Lud. Vlr.* 60. *verrucosus.*

Curculio verrucosus. *Drury Inf.* 1. tab. 32. fig. 5.

Habitat in Aethiopia.

184. *C. breuirostris ater*, thorace eleuato punctato, elytris striis crenatis. *Syst. Ent.* 152. 130. *Linn. Syst. Nat.* 2. 618. 82. *Mus. Lud. Vlr.* 59. *capensis.*

Habitat ad Cap. bon. sp.

185. *C. breuirostris niger*, fronte bidentato, elytris vni-spinosis. *Syst. Ent.* 152. 131. * *vitulus.*

Habitat in Terra del Fuego. *Mus. Dom. Banks.*

186. *C. breuirostris griseus*, thorace inaequali antice prominulo, elytris sulcatis postice bidentatis, rostro trifulco. *inaequalis.*

Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*

Medius. Rostrum breue, crassum fulcis tribus latioribus exaratum. Thorax canaliculatus, inaequalis mucrone paruo obtuso antice prominens. Elytra fulcata fulcis subdentatis dentibus duobus posticis maioribus, distinctis.

rostratus. 187. *C. breuirostris fuscus*, capite thoraceque cylindricis angustioribus, elytris postice spinosis.

Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*

Medius. Antennae mihi desunt, sub antennis vtrinque spina breuis, acuta. Caput cylindricum, canaliculatum, griseo fuscum ore atro. Thorax cylindricus, vix capite latior, sulcatus, griseo fuscus. Elytra griseo fusca, immaculata, postice lineis duabus spinarum erectarum. Pedes fusci, inermes.

spectrum. 188. *C. breuirostris fuscus*, thorace coleoptrisque globosis.

Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*

Corpus paruum singularis staturae. Rostrum breue, crassum, inaequale. Thorax breuis, elytris angustior, globosus. Coleoptra connata, striata punctisque eleuatis, acutis subspinosa, fere globosa. Pedes grisei.

acuminatus. 189. *C. breuirostris cylindricus fuscus*, elytris apice acuminatis. *Syst. Ent.* 152. 132. *

Habitat in noua Zelandia. *Mus. Dom. Banks.*

emeritus. 190. *C. breuirostris niger*, thorace elytrisque spinosis, fronte excauata. *Syst. Ent.* 152. 133. *Linn. Syst. Nat.* 2. 617. 87. *Mus. Lud. Vlr.* 35.

Habitat in Indiis.

barbarus. 191. *C. breuirostris*, thorace subspinoso, elytris angulo duplici crispato. *Syst. Ent.* 152. 134. *Linn. Syst. Nat.* 2. 617. 88.

Habitat in Africa, in Gallia duplo minor.

crispatus. 192. *C. breuirostris*, thorace mutico scabro, elytris lineis tribus eleuatis dentatis.

Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*

Rostrum

Rostrum fulcatum. Thorax punctis magnis eleuatis scaber. Stria punctorum eleuatorum inter lineas eleuatas elytrorum.

193. *C. breuirostris*, thorace spinoso quinquefulcato, *globosus*.
 elytris laeuis. *Syst. Ent.* 153. 135. *
Curculio globosus. *Drury Inf.* 1. tab. 32. fig. 4.
 Habitat in India. *Dom. Drury*.
194. *C. breuirostris ater*, thorace spinoso inaequali, elytris rubris, punctis nigris confertis. *obesus*.
Syst. Ent. App. 822.
 Habitat ad Cap. bon. sp.
195. *C. breuirostris*, thorace spinoso inaequali ater, elytris striis rufis denticulatis. *scalaris*.
Gen. Inf. Mant. 228. *
 Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. D. Schulz*.
196. *C. breuirostris* thorace tuberculis duobus compressis, *ultratus*.
 elytris tuberculatis postice cinereis. *Syst. Ent.* 153. 136. *
 Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks*.
197. *C. breuirostris cinereus*, thorace elytrisque subspinosus, capite spinis fasciculato pilosis. *cornutus*.
Syst. Ent. 153. 137. * *Linn. Syst. Nat.* 2. 618. 91. *Mus. Lud. Vir.* 57.
 Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks*.
198. *C. breuirostris cinereus*, thorace scabro antice impresso, elytris spinosis. *tribulus*.
Syst. Ent. 153. 138. *
 Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks*.
 Rostrum longitudine fere thoracis apice incrassatum.
199. *C. breuirostris griseo fuscus*, elytris postice retusis *retusus*.
 dentatis.
 Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks*.
 Statura praecedentium. Rostrum breue, crassum, inaequale, apice emarginatum. Thorax inermis, inaequalis. Coleoptra striis subeleuatis, dentatis fere obsoletis, griseo fusca macula communi dorsali fusca, postice vtrinque retusa dentibus acutis prominulis. Pedes grisei.

- 4dens.* 200. *C. breuirostris cinereus* thorace scabro, elytris spinosis, spinis quatuor posticis longioribus. *Syst. Ent.* 153. 139. *
Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
- 4spinosus.* 201. *C. breuirostris albidus*, elytris quadrispinosis, rostro fusco. *Gen. Inf. Mant.* 128. *
Habitat ad Cap. bon. sp.
- Clauus.* 202. *C. breuirostris albicans*, thorace canaliculato, coleoptris spinosis, lineolis tribus baseos rubris. *Syst. Ent.* 154. 140. *
Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
- nodulosus.* 203. *C. breuirostris*, thorace lineis sex nodulosis, elytris spinosis. *Syst. Ent.* 154. 141. *
Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*
- rubifer.* 204. *C. breuirostris cinereus*, thorace scabro, elytris spinis eleuatis sanguineis. *Syst. Ent. App.* 822. *
Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*
- globifer.* 205. *C. breuirostris*, thorace scabro, elytris spinosis, postice acuminatis. *Syst. Ent. App.* 823. *
Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*
- apterus.* 206. *C. breuirostris*, thorace spinoso, cruce impresso, elytris ferrugineo punctatis. *Syst. Ent.* 154. 142. *
Curculio apterus breuirostris, pedibus muticis, corpore atro, thorace spinoso, elytris coadunatis, abdomine punctato. *Linn. Syst. Nat.* 2. 619. 95.
Curculio cruciatus apterus, breuirostris carinatus, antennis rectis, corpore ouato atro subtus maculis rubris, thorace spinoso crucigero. *Degeer Inf.* 5. 275. tab. 16. fig. 1.
Habitat in India.
- ocellatus.* 207. *C. breuirostris*, thorace spinoso antice excauato, elytris cinereis, punctis atris subspinosis. *Syst. Ent.* 154. 143. *
Habitat in Insula Madagascar. *Mus. Brit.*

***** Breuiroftres femoribus dentatis.

208. *C. breuirostris femoribus dentatis*, corpore viridi *ſpectabilis*
 nigroque variegato. *Syſt. Ent.* 155. 144. *
 Habitat in noua Hollandia. *Muſ. Dom. Banks.*
209. *C. breuirostris femoribus dentatis*, corpore obſcuro. *Liguſtici*.
Syſt. Ent. 155. 145.
Curculio Liguſtici breuirostris femoribus dentatis, ab-
 domine ſubouato murino. *Linn. Syſt. Nat.* 2. 615. 68.
Fn. Sv. 621.
Curculio apterus antennis fractis, corpore oblongo ni-
 gro fulco, ſquamulis grifeis nitidis. *Degeer Inf.* 5.
 218. 10.
Schaeff. Icon. tab. 2. fig. 12.
 Habitat in Liguſtico leuiſtico.
210. *C. breuirostris femoribus dentatis grifeus*, elytris *nubilus*.
 punctis obſcurioribus numerofis. *Gen. Inf. Mant.*
 228. *
 Habitat Hamburgi. *D. Schulz.*
211. *C. breuirostris*, femoribus dentatis niger obſcurus, *nigrita*.
 thorace ſcabro, elytris crenato ſtriatis.
 Habitat in Italia. *Dr. Allioni.*
 Statura et magnitudo *C. fulcati*, at elytra immaculata.
212. *C. breuirostris femoribus dentatis ater*, elytris ſtria- *fulcatus*.
 tis ferrugineo maculatis. *Syſt. Ent.* 155. 146. *
 Habitat in Saxoniae nemoribus.
213. *C. breuirostris femoribus dentatis ater*, elytris pun- *gemma-*
 ctis viridibus. *Gen. Inf. Mant.* 229. *
Curculio gemmatus. Scop. Ent. carn. 90.
Curculio gemmatus. Naturforſch. 6. tab. 4.
 Habitat in Europa.
214. *C. breuirostris femoribus dentatis grifeus*, elytris *picipes*.
 nebulofis, femoribus poſticis rufis. *Gen. Inf. Mant.*
 229. *
 Habitat in Kiliae plantis. *Dom. Lund.*

Morio. 215. *C. breuirostris femoribus dentatis ater nitens, elytris glabris.*

Habitat in Germania. *Dom. de Hattorf.*

Magnus totus ater, glaber nitidus. Thorax rotundatus, immaculatus. Femora dentata.

2fulcatus. 216. *C. breuirostris, femoribus dentatis niger, coleopterorum limbo cinereo, rostro bifulcato.*

Habitat in Italia. *Dr. Allioni.*

Statura *C. fulcati.* Rostrum breue sulcis duobus dorsalibus impressis, apice incrassatum. Thorax supra niger, lateribus cinereis. Elytra obsolete striata nigra margine antico et laterali cinereis. Pedes nigri femoribus dentatis.

Pyri. 217. *C. breuirostris femoribus dentatis aeneo fuscus. Syst. Ent. 155. 147. Linn. Syst. Nat. 2. 615. 72. Fn. Sv. 623.*

Curculio squamoso viridis rostro thorace breuiore, pedibus rufis. Geoff. Inf. 1. 282.

Curculio breuirostris, antennis fractis rufis, corpore oblongo aeneo nitido, pedibus rufis. Degeer Inf. 5. 246. 34.

Curculio viridis opacus, pedibus antennisque magis fuscis. Linn. It. Scan. 355.

Schaeff. Icon. tab. 2. fig. 11.

Sulz. Hist. Inf. tab. 3. fig. 23.

Habitat in pyri foliis, in corollis declaratus.

Variat pedibus rufis et nigris.

argenta- 218. *C. breuirostris femoribus dentatis, corpore viridi*
tus. *argenteo. Syst. Ent. 155. 148. Linn. Syst. Nat. 2.*
615. 75.

Curculio squamosus, viridi auratus. Geoff. Inf. 1. 293. 38.

Curculio Vrticae breuirostris, antennis fractis femoribus dentatis, corpore oblongo viridi nitido, pedibus viridibus. Degeer Inf. 5. 219. 12.

Sulz. Hist. Inf. tab. 4. fig. 9.

Habitat in Europae vrtica, betula, quercu.

virida- 219. *C. breuirostris femoribus dentatis viridis, ore anten-*
nis. *nisque nigris, oculis atris. Syst. Ent. 155. 149.**

Habitat Tranquebariae. *D. Koenig.*

CLASS. I. ELEVTERATA. Rhinomacer. 199

220. *C. breuirostris femoribus dentatis, antennis elytris oblongus.*
pedibusque ferrugineis. *Syst. Ent.* 156. 150. *Linn.*
Syst. Nat. 2. 615. 21. *Fn. Sv.* 625.

Curculio oblongus niger, elytris pedibusque testaceis.
Geoff. Inf. 1. 294. 39.

Habitat in Europa.

221. *C. breuirostris femoribus dentatis, corpore nigro, ouatus.*
pedibus antennisque rufis. *Syst. Ent.* 156. 151. *Linn.*
Syst. Nat. 2. 615. 69. *Fn. Sv.* 626.

Curculio Rosae apterus breuirostris pedibus antennis-
que fractis rufis, corpore oblongo nigro fusco. De-
geer Inf. 5. 219. 11.

Habitat in Europae Pomona.

222. *C. breuirostris femoribus dentatis, rostro elytrisque attelaboi-*
vnituberculatis. Syst. Ent. 156. 152. *

Habitat in Brasilia. *Mus. Dom. Banks.*

39. RHINOMACER.

1. Rhinomacer.

Habitat in Italia. *Dr. Allioni.*

curculioi-
des.

Statura omnino curculionis, at distinctum genus. Pal-
pis quatuor extrorsum crassioribus articulo ultimo
oblique truncato, antennisque setaceis rostro infi-
dentibus thoracis longitudine. Rostrum crassiuscu-
lum, planum in medio impressum. Thorax elytra-
que laeua, grisea, immaculata. Corpus subtus ci-
nereum pedibus nigris.

40. ATTELABVS.

1. *A. niger, elytris rufis reticulatis. Syst. Ent.* 156. 1. *Coryli.*

Attelabus Coryli niger, elytris rubris. Linn. Syst. Nat.
2. 619. 1. *Fn. Sv.* 638.

Curculio niger, elytris rubris, capite postice elongato.
Linn. It. Oel. 153.

Curculio excoriato ruber breuirostris, antennis rectis,
corpore breui subquadrato nigro, elytris rubris, ca-

pite ovato postice attenuato. *Degeer Inf.* 5. 257. 46. tab. 8. fig. 3.

Sulz. Hist. Inf. tab. 4. fig. 1.

Pontop. Atl. Dan. 205. 1. tab. 16.

Schaeff. Icon. tab. 75. fig. 8.

β. *Attelabus Auellanae* niger, elytris thorace pedibusque rubris. *Linn. Syst. Nat.* 2. 619. 2.

Rhinomacer thorace elytrisque rubris, capite parce elongato. *Geoff. Inf.* 1. 273. 11.

Curculio collaris. *Scop. Ent. carn.* 71.

Schaeff. Icon. tab. 56. fig. 5. 6.

Habitat in Coryli foliis, quae in cylindrum conuoluit et vtrinque claudit.

apustulatus. 2. *A. ater*, elytris macula basaeos rufa. *Gen. Inf. Mant.* 229. *

Habitat in America septentrionali. *Dom. Yeats.*

curculionoides. 3. *A. niger*, thorace elytrisque rubris. *Syst. Ent.* 157. 2.

Attelabus Curculionoides niger, thorace elytrisque rubris. *Linn. Syst. Nat.* 2. 619. 3.

Rhinomacer niger, thorace elytrisque rubris proboscide longitudine capitis. *Geoff. Inf.* 1. 273. 10.

Curculio nitens. *Scop. Ent. carn.* 72.

Sulz. Hist. Inf. tab. 4. fig. 12.

Schaeff. Icon. tab. 75. fig. 8.

Habitat in Europae corylo, falice.

ruficollis. 4. *A. rufus*, capitis vertice nigro, elytris coeruleis nitidis.

Habitat in Sibiria. *D. Pallas. Mus. Dom. Banks.*

Statura *A. Coryli*. Caput rufum vertice late nigro.

Antennae apice cinereae. Thorax gibbus, rufus,

immaculatus. Elytra cyanea, nitida, immaculata. Ab-

domen rufum subtus nigrum margine tamen rufo.

Pedes rufi.

pubescens. 5. *A. violaceus hirtus*, rostro atro.

Curculio pubescens. *Syst. Ent.* 131. 19. *

Habitat in Germania. *Dom. de Hattorf.*

Antennae et caput omnino huius generis. Corpus totum violaceum, hirtum rostro solo nigro, magis, quam in reliquis elongato.

6. *A. ater*, pedibus saltatoriis. *Syst. Ent.* 157. 3. *Betulae.*
Attelabus Betulae pedibus saltatoriis, corpore toto atro. *Linn. Syst. Nat.* 2. 620. 7. *Fn. Sv.* 640.
Curculio excoriato niger breuirostris, antennis rectis, corpore breui subquadrato nigro nitido, capite ouato postice attenuato, femoribus posticis maximis. *Degeer Inf.* 5. 259. 47.
 Habitat in *Betulae* foliis, quae rodendo pulcre crispa reddit. Ocissime falit.

41. CLERVS.

1. *C. niger*, elytris fascia triplici alba. *Syst. Ent.* 157. 1. * *mutillarius.*
 Habitat *Halae Saxonum.* *Dom. Schaller.*
2. *C. rufus*, elytris nigris, fascia duplici alba basique rufis. *Gen. Inf. Mant.* 229. * *dubius.*
 Habitat in *America boreali.* *Dom. Teats.*
3. *C. capite thoraceque rufis*, elytris nigris, fascia media ichneumomina rufa strigaque apicis alba. *Gen. Inf. Mant.* 230. * *ichneumomina.*
 Habitat in *America boreali.* *Dom. Teats.*
4. *C. niger*, elytris fascia duplici alba basique rubris. *Syst. Ent.* 157. 2. *formicarius.*
Attelabus formicarius niger, elytris fascia duplici alba basique rubris. *Linn. Syst. Nat.* 2. 620. 8. *Fn. Sv.* 641.
Clerus formicarius niger, thorace elytris antice abdomineque rubris, elytris fasciis binis albis. *Degeer Inf.* 5. 160. 3. tab. 5. fig. 8.
Cantharis XXIX. *Raj. Inf.* 103. 29.
Sulz. Hist. Inf. tab. 4. fig. 8.
 Habitat in *Europa, America boreali.*
5. *C. niger*, fronte cinerascete, elytris maculis tribus albis. *Syst. Ent. App.* 823. *sexguttatus.*
 Habitat in *America meridionali.* *Dom. Drury.*

- tricolor.* 6. *C. rufus*, capite nigro, elytris basi coeruleis medio rufis apice violaceis.
 Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*
 Minor *C. formicario*. Caput atrum, immaculatum antennis extrorsum crassioribus piceis. Thorax glaber laevis, obscure rufus. Elytra striato punctata basi coerulea, nitida, in medio rufa, apice violacea, nitida. Pedes fusci femoribus basi rufis.
- 2fasciatus.* 7. *C. viridi aeneus pubescens*, elytris cyaneis, fasciis duabus coccineis.
 Habitat in Sibiria. *D. Pallas. Mus. Dom. Banks.*
 Magnitudo *C. formicarii*. Caput et thorax virescenti coerulea pubescentia immaculata. Elytra glabra, nitida, cyanea fasciis duabus coccineis, altera in medio, altera ante apicem. Corpus pubescens, viridi aeneum.
- sipylus.* 8. *C. viridis*, elytris fascia duplici flava interrupta, thorace hirsuto. *Syst. Ent.* 158. 3.
Attelabus sipylus. *Linn. Syst. Nat.* 2. 620. 9. *Mus. Lud. Vlr.* 63.
 Habitat in Africa.
- apiarius.* 9. *C. elytris rubris*, fasciis tribus coeruleis. *Syst. Ent.* 158. 4.
Clerus nigro violaceus hirsutus, elytris fascia triplici coccinea. *Geoff. Inf.* 1. 304. 1. tab. 5. fig. 4.
Clerus coeruleo violaceus, elytris rubris fasciis tribus transuersis violaceis. *Degeer Inf.* 5. 157. 1. tab. 5. fig. 3.
Attelabus apiarius coeruleus, elytris rubris fasciis tribus nigris. *Linn. Syst. Nat.* 2. 620. 10.
Sulz. Hist. Inf. tab. 4. fig. 6.
 tab. 4. fig. 14.
Schaeff. Elem. tab. 46.
Icon. tab. 48. fig. 11.
 Habitat larua frequens in Europae, et Americae apum alueariis, declarata in floribus.

42. NOTOXUS.

1. N. pubescens, elytris nigris, fasciis tribus pallidis. *Syst. Ent. mollis.*
Ent. 158. 1.

Attelabus mollis griseus pubescens, elytris fasciis tribus pallidis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 621. 11. *Fn. Sv.* 642.

Clerus fuscus villosus, elytris flauis, cruce fusca. *Geoff. Inf.* 1. 305. 3.

Clerus fusco fasciatus elytris flauo griseis fasciis duabus transuersis fuscis, abdomine rubro. *Degeer Inf.* 5. 159. 2. tab. 5. fig. 6.

Curculio oblongus ruber, elytris nigris, fascia triplici albicante. *Vdm. Diff.* 28. tab. 1. fig. 9.

Habitat in Europae floribus.

2. N. thorace in cornu supra caput protenso. *Syst. Ent. monoceros.*
 158. 2.

Notoxus. *Geoff. Inf.* 1. 356. 1. tab. 6. fig. 8.

Meloe monoceros alatus, thorace in cornu supra caput protenso. *Linn. Syst. Nat.* 2. 681. 14.

Attelabus monoceros. *Linn. Fn. Sv.* 638.

Habitat in Europae floribus.

43. SPONDYLIS.

1. S. atra, thorace subglobofo. *Syst. Ent.* 159. 1. *buprestoides.*

Attelabus buprestoides ater, elytris neruosis, thorace subglobofo. *Linn. Syst. Nat.* 2. 621. 3.

Cerambyx maxillofus niger, thorace mutico subglobofo, antennis longitudine thoracis, articulis compressis, dentibus maximis. *Degeer Inf.* 5. 84. 21. tab. 3. fig. 21.

Scarabaeus arboreus collo crasso. *Frisch. Inf.* 13. pag. 23. tab. 19.

Habitat in Europae fyluis.

Metamorphosis adhuc omnino latet.

2. S. atra, elytris rugosis thorace latioribus. *Syst. Ent. ceramboi-*
 159. 2. *des.*

Attelabus ceramboides ater, elytris rugosis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 621. 12. *Fn. Sv.* 643.

Curcu-

Curculio maximus ater oblongus, elytris irregulariter reticulatis. *Vdm. Diff.* 26. tab. 1. fig. 1.

Tenebrio variolosus alatus ater, elytris rugosis. *Degeer Inf.* 5. 32. 2.

Habitat in Boleto fomentario.

44. P R I O N U S.

longimanus. 1. P. thorace spinis mobilibus, elytris basi videntatis apiceque bidentatis, antennis longis. *Syst. Ent.* 159. 1.

Cerambyx longimanus. *Linn. Syst. Nat.* 2. 621. 1. *Mus. Lud. Vlr.* 64.

Cerambyx thorace spinoso, pedibus anticis longissimis, elytris basi videntatis apiceque bidentatis, antennis longissimis. *Degeer Inf.* 5. 102. 6.

Scarabaeus capricornus maximus nigricans fasciis elytrorum coccineis et flavis. *Sloan. Iam.* 2. 209.

Nocoonaca. *Grew. Mus.* 161. tab. 13.

Roef. Inf. 2. p. 11. tab. 1. fig. 2.

Aubert. Miscell. tab. 64. fig. 1.

Habitat in America meridionali.

In altero sexu tibiae anticae longissimae.

fuliginosus. 2. P. thorace marginato crenato videntato ater, elytris apice crenato dentatis. *Syst. Ent.* 160. 2. *

Habitat in America meridionali. *Mus. Brit.*

lineatus. 3. P. thorace marginato crenato videntato niger, albo vittatus, elytris apice crenato dentatis. *Syst. Ent.* 160. 3. *

Cerambyx lineatus thorace marginato ferrato dentato, elytris nigris, linea alba, antennis compressis brevioribus. *Linn. Syst. Nat.* 2. 624. 14.

Sloan. Iam. 2. 209. tab. 237. fig. 34.

Brown Iam. 430. tab. 43. fig. 7.

Habitat in America meridionali. *Mus. Brit.*

Faber. 4. P. thorace marginato vtrinque videntato rugoso, elytris piceis, antennis mediocribus.

Cerambyx Faber. *Linn. Syst. Nat.* 2. 622. 6. *Fn. Sv.* 646.

Bergstraeff. Nomencl. 1. tab. 13. fig. 1.

Frijch. Inf. 13. pag. 2. tab. 17.

Schaeff. Icon. tab. 72. fig. 3.

tab. 111. fig. 1.

Habitat in Europae ligno rarius.

5. P. thorace marginato bidentato, elytris rufis mucrona- *mucrona-*
tis. *Syst. Ent.* 160. 4. *

tus.

Habitat in America meridionali. *Dom. Drury.*

6. P. thorace marginato multispinoso, mandibulis, por- *luzonum.*
rectis vndentatis apice bifidis, pedibus anticis elon-
gatis. *Syst. Ent.* 160. 5. *

Petiv. Gazoph. tab. 47. fig. 1.

Habitat in Insulis Luzonum. *Mus. Brit.*

7. P. thorace marginato multispinoso, mandibulis porre- *ferripes.*
ctis apice tridentatis, pedibus spinoso ferratis.

Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*

Summa affinitas praecedentis. Caput canaliculatum, ni-
grum ore intus barbato. Mandibulae validae basi
vndentatae apice tridentatae. Antennae mediocres
longitudine corporis secundo articulo subtus scabro.
Thorax margine spinis duodecim, ater, immacula-
tus. Elytra subferruginea. Pedes omnes spinis acu-
tis validis ferrati.

8. P. thorace marginato vtrinque tridentato, mandibulis *cervicornis.*
porrectis extus unispinosis, antennis brevibus. *Syst.*
Ent. 161. 6. *

Cerambyx cervicornis thorace marginato dentato, ma-
xillis porrectis corniformibus vtrinque spinosis, an-
tennis brevibus. *Linn. Syst. Nat.* 2. 622. 3. *Mus.*
Lud. Vlr. 65.

Cerambyx fasciis longitudinalibus vndulatis ferrugi-
neis, thorace depresso dentato, maxillis porrectis
corniformibus dentatis, antennis brevibus. *Degeer*
Inf. 5. 94. 1.

Sloan. Jam. 2. tab. 237. fig. 6.

Merian. Surin. tab. 48.

Roef. Inf. 2. *Scar.* 2. p. 12. tab. 1. fig. 8.

Brown.

Brown. Jam. 249. tab. 44. fig. 8.

Aubent. Misc. tab. 90. fig. 3.

Habitat in Americae lingno bombacis.

Larua Americanis in deliciis.

coriarius. 9. P. thorace marginato tridentato, corpore piceo, antennis breuibus. *Syst. Ent.* 161. 7.

Prionus. Geoff. Inf. 1. 198. 1. tab. 3. fig. 9.

Cerambyx coriarius. Linn. Syst. Nat. 2. 622. 7. *Fn. Sv.* 647.

Cerambyx maximus cornubus magnis articulatis. Raj. Inf. 95. 1.

Cerambyx cinereo nigricans antennis et pedibus rufis. Gad. Satag. 79.

Cerambyx niger antennis ferratis. Frisch. Inf. 13. tab. 9.

Cerambyx Prionus fusco castaneus obscurus nitidus, thorace depresso dentato, corpore lato, antennis breuioribus. Degeer Inf. 5. 59. 1. tab. 3. fig. 5.

Sulz. Hist. Inf. tab. 4. fig. 26.

Roef. Inf. 2. *Scar.* 2. tab. 1. fig. 1. 2.

Schaeff. Elem. tab. 103.

Icon. tab. 67. fig. 3.

Bergstr. Nomencl. 1. tab. 13. fig. 3. 4. 5. 6.

Voet. Scar. 2. tab. 3. fig. 9.

β. *Cerambyx imbricornis* thorace marginato bidentato, corpore ferrugineo, elytris mucronatis, antennis perfoliato imbricatis breuioribus. *Linn. Syst. Nat.* 2. 622. 5. huius mera varietas.

Habitat in Europae, Americae borealis betulis putridis. Oua magna, oblonga, flauescencia.

Lucanus tridentatus. Linn. Syst. Nat. 2. 560. 3. huius specimen mutilatum mihi videtur.

giganteus. 10. P. thorace vtrinque tridentato, corpore nigro, elytris ferrugineis, antennis breuibus. *Syst. Ent.* 161. 8.

Cerambyx giganteus. Linn. Mant. 1. 531.

Aubent. Misc. tab. 64. fig. 2.

Habitat in America meridionali.

Mandibulae bidentatae,

11. P. thorace marginato vtrinque quadridentato, elytris ferrugineis nigro marginatis. *Syst. Ent.* 162. 9. *armillatus.*
Cerambyx armillatus thorace marginato vtrinque quadridentato, elytris ferrugineis nigro marginatis, femoribus posticis videntatis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 622. 4.
Gron. Zooph. 525. tab. 15. fig. 6.
 Habitat in India.
12. P. thorace marginato denticulato, mandibulis porrectis bidentatis, antennis breuibus. *Syst. Ent.* 162. 10.* *damicornis.*
Cerambyx damicornis thorace marginato crenulato angulato, maxillis porrectis corniformibus, introrsum bidentatis, antennis mediocribus. *Linn. Mant.* 1. 532.
Cerambyx damicornis castaneus, thorace depresso ferato, maxillis porrectis intus villosis apice tridentatis, antennis breuibus. *Degeer Inf.* 5. 97. 2.
Drury Inf. 1. tab. 37. fig. 1.
 Habitat in America meridionali.
 Larua Americanis in deliciis.
13. P. thorace marginato denticulato, corpore nigro, elytris rubris, fasciis duabus atris, antennis breuibus. *bifasciatus.*
Syst. Ent. 162. 11. *Linn. Syst. Nat.* 2. 624. 16.
Gronov. Zooph. 532. tab. 14. fig. 4.
 Habitat in America meridionali.
14. P. thorace marginato tridentato obscurus, pectore abdomineque ferrugineis, antennis breuibus. *cylindricus.*
 Habitat in America boreali. *Mus. D. Blackburn.*
 Medius. Antennae breues, compressae. Caput et thorax nigra. Elytra picea. Pectus, abdomen ferruginea. Statura magis cylindrica quam in reliquis congeneribus.
15. P. thorace marginato crenulato, corpore nigro, elytris glabris ferrugineis, margine luteo. *Thomae.*
Syst. Ent. 162. 12.
Cerambyx Thomae thorace marginato denticulato, corpore nigro, elytris ferrugineis, margine luteo. *Linn. Syst. Nat.* 2. 623. 9.
Cerambyx Thomae. *Act. Soc. Ber. phys.* 4. tab. 7. fig. 9.
 Habitat in Infulis Americae meridionalis.

- bilineatus*. 16. P. thorace marginato crenato albo bilineato, elytris ferrugineis, atomis albis margineque luteo. *Syst. Ent.* 163. 13. *
Habitat in Americae Infulis. *Dom. v. Rohr.*
- spinibarbis*. 17. P. thorace marginato crenato, capite sub mandibulis spinoso scabro, mandibulis tridentatis. *Syst. Ent.* 163. 14. *
Cerambyx spinibarbis thorace marginato subcrenolato, capite sub maxillis spinoso scabro, antennis brevibus. *Linn. Syst. Nat.* 2. 624. 4. *Mus. Lud. Vlr.* 67. *Merian. Surin.* 24. tab. 24.
Habitat in America meridionali.
- maxillosus*. 18. P. thorace marginato crenato, mandibulis porrectis intus hirsutis quadridentatis. *Syst. Ent.* 163. 15. *
Cerambyx maxillosus. *Drury Inf.* 1. tab. 38. fig. 3.
Habitat in America meridionali.
Affinis videtur praecedenti.
- cinnamomeus*. 19. P. thorace marginato denticulato, mandibulis porrectis tridentatis. *Syst. Ent.* 163. 16.
Cerambyx cinnamomeus thorace marginato denticulato, corpore ferrugineo, elytris mucronatis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 623. 10. *Mus. Lud. Vlr.* 66. *Merian. Sur.* 24. tab. 24. *Drury Inf.* 1. tab. 40. fig. 2. *Sulz. Hist. Inf.* tab. 5. fig. 2.
Habitat in America meridionali.
- melanopus*. 20. P. thorace marginato dentato, maxillis porrectis multidentatis, elytris mucronatis.
Cerambyx melanopus thorace marginato ferrulato, corpore nigro, antennis brevibus, elytris mucronatis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 623. 8.
Cerambyx crenulatus. *Drury Inf.* 1. tab. 38. fig. 2. *Gron. Zooph.* 531. *Merian. Surin.* tab. 24. fig. 1.
Habitat in America meridionali.
- barbatus*. 21. P. thorace marginato integro, mandibulis ferrugineo hirsutissimis, antennis mediocribus.
Habitat in America meridionali. *Mus. Dom. Banks.*
Magnus.

Magnus. Antennae longitudine corporis scabrae nigrae articulo ultimo compresso, lacui. Caput atrum mandibulis porrectis labiisque ferrugineo hirsutissimis. Thorax marginatus margine inermi, niger. Elytra picea. Abdomen villoso album. Pedes nigri.

45. CERAMBYX.

1. C. thorace spinoso, punctis quatuor luteis, elytris obtusis nebulosis, antennis longissimis. *Syst. Ent.* 164. 1. *Linn. Syst. Nat.* 2. 628. 37. *Fn. Sv.* 653. *aedilis.*

Cerambyx nebulosus, antennis corpore longioribus, thoracis punctis quatuor luteis. *Linn. It. Oel.* 8.

Cerambyx thorace spinoso punctis quatuor luteis, elytris griseo cinereis fusco maculatis, antennis longissimis. *Degeer Inf.* 5. 66. 5. tab. 4. fig. 1. 2.

Capricornus rufficus. *Petiv. Gazoph.* tab. 8. fig. 8.

Mouff. Inf. 151. fig. 2.

Frijch. Inf. 13. tab. 12.

Sulz. Hist. Inf. tab. 4. fig. 27.

Act. Nidros. 4. tab. 16. fig. 8.

Schaeff. Icon. tab. 14. fig. 7.

Bergstraeß. Nomencl. 1. 3. 5. tab. 1. fig. 5. 6.

tab. 2. fig. 1.

Habitat in truncis arborum Europae borealis.

Antennae longitudine secundum sexum differunt.

2. C. thorace spinoso tuberculatoque, elytris porosis, aranei-
antennis longis, articulo quinto videntato. *Syst. formis.*
Ent. 164. 2. * *Linn. Syst. Nat.* 2. 625. 22.

Sloan. Tam. 2. tab. 237. fig. 24.

Drury Inf. 1. tab. 37. fig. 4.

Habitat in America meridionali.

3. C. thorace spinoso, elytris cinereis nigro maculatis, *nodosus.*
antennis longissimis, articulo tertio apice nodoso.
Syst. Ent. 164. 3. *

Habitat in Marylandia Americae. *Mus. Brit.*

4. C. thorace multidentato, dorso plano, elytris tibiis-
que anticis videntatis. *Syst. Ent.* 165. 4. * *canceriformis.*

Fabr. Spec. Inf.

O

Ceram-

Cerambyx pustulatus. Drury Inf. 2. tab. 35. fig. 1.
Habitat in America meridionali.

hebraeus. 5. C. thorace acute dentato, dorso bicarinato, elytris cinereis fusco striatis maculatisque.

Habitat in America meridionali. *Mus. D. Hunter*.

Caput grossum, porrectum, obtusum, integrum. Antennae nigrae corpore breuiores. Thorax cinereus vtrinque spina porrecta valida basi anteriori vni-dentata, dorsoque lineis duabus eleuatis, glabris, atris. Elytra rotundata, cinerea futura striisque tribus fuscis et inter has maculae plurimae difformes eiusdem coloris. Pedes cinerei.

Scorpio. 6. C. thōrace quadrispinose, elytris tuberculato granulatis, tibiis anticis apice dilatatis.

Habitat in America meridionali. *Mus. D. Hunter*.

Antennae breues, cinereae articulis apice nigris. Caput grande, cinereum mandibulis atris. Thorax cinereus spinis quatuor dorsalibus eleuatis apice atris. Elytra cinerea tuberculis variis eleuatis obtusis granis glabris atris adspersis. Pedes breues cinerei tibiis quatuor anticis apice dilatatis.

glaucus. 7. C. thorace quinquespinofo glaucus, elytris muricatis latere fasciaque nigris, antennis longis. *Syst. Ent.* 165. 5. * *Linn. Syst. Nat.* 2. 626. 28.

Cerambyx tuberculatus cinereus, thorace quinquespinofo, elytris spinosis postice vni-dentatis latere fasciaque nigris, antennis longioribus. *Degcer Inf.* 5. 111. 13. tab. 14. fig. 4.

Habitat in America meridionali.

bidentatus. 8. C. thorace subspinofo, elytris bidentatis scabris cinereo fuscis. *Syst. Ent.* 165. 6. *

Habitat in America meridionali. *Dom. v. Rohr*.

moschatatus. 9. C. thorace spinoso viridis nitens, antennis cyaneis mediocribus. *Syst. Ent.* 165. 7.

Cerambyx moschatatus thorace spinoso, elytris obtusis viridibus nitentibus, femoribus muticis antennis mediocribus. *Linn. Syst. Nat.* 2. 627. 34. *Fn. Sv.* 652.

Ceram-

Cerambyx odoratus thorace spinoso viridi aureo nitidus, antennis mediocribus coeruleo violaceis. *Degeer Inf.* 5. 64. 2.

Cerambyx viridi coerulefscens. *Geoff. Inf.* 1. 203. 5.

Scarabæus maior viridis odoratus. *Raj. Inf.* 81. 17.

Scarabæus fuauiter olens. *Lister. Scarab.* 384. 11.

Scarabæus arboreus coeruleo viridis. *Frijch. Inf.* 13. tab. 11.

Cerambyx tertius. *Mouff. Inf.* 149. fig. vlt.

Bergstr. Nomencl. 1. 13. 2. tab. 2. fig. 2.

Habitat in Europae falice.

Odorem fpargit gratum et foporiferum, qui cum vita perit. Oua candida, fapida. *Lister.*

Variat antennis pedibusque cyaneis et fufcis.

10. *C. thorace rotundato spinoso, corpore viridi, femoribus rufis*. *Syst. Ent.* 166. 8. *virens.*

Cerambyx virens thorace spinoso, elytris obtufis, corpore viridi, antennis longioribus, femoribus vni-dentatis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 627. 33.

Drury Inf. 1. tab. 40. fig. 1.

Habitat in Americae infulis.

Variat antennis corpore longioribus et breuioribus, femoribus muticis et dentatis.

11. *C. thorace rotundato fubspinofa viridi nitens, femoribus clauatis, claua anticorum rufa*. *nitens.*

Habitat in Africa aequinoctiali. *Muf. Dom. Banks.*

Affinis *C. virenti*. Antennae corpore duplo longiores, nigrae. Thorax rotundatus, fubspinofus vel potius tuberculatus. Corpus totum viride, nitidum. Pedes nigri, femoribus omnibus clauatis, claua quatuor anteriorum ferruginea. Tibiae pofticae compreffae.

12. *C. thorace rotundato spinofa, corpore viridi, antennis pedibusque rufis*. *Syst. Ent.* 166. 9. * *afer.*

Cerambyx afer. *Linn. Mant.* 532.

Drury Inf. 1. tab. 39. fig. 4.

Habitat in Africa.

- festivus.* 13. C. thorace spinoso viridi, elytris violaceis basi viridibus, femoribus ferrugineis videntatis. *Syst. Ent.* 166. 10. *
Habitat ad fluuium Gaboon Africae. *Mus. Dom. Banks.*
- vittatus.* 14. C. thorace spinoso viridis nitens, thorace elytrisque nigro lineatis. *Syst. Ent.* 166. 11. *
Habitat in Brasilia. *Mus. Dom. Banks.*
- velutinus.* 15. C. thorace spinoso niger, vitta atra. *Syst. Ent.* 167. 12. *
Habitat in America meridionali.
C. virenti nimis affinis.
- futuralis.* 16. C. thorace spinoso ater, elytris futura vittaque media aureis.
Habitat in America meridionali. *Mus. D. Hunter.*
Nimis praecedenti affinis. Antennae longitudine corporis, nigrae. Corpus atrum quasi velutinum abdomine subtus coerulefcente nitido. Elytra atra futura dorsali vittaque media, quae postice coeunt, aureis. Pedes nigri femoribus clauatis, postici femoribus tibiisque compressis.
- spinicornis.* 17. C. thorace subspinoso niger, elytris viridibus apice spinosis. *Syst. Ent.* 167. 13. *
Habitat in Sierra Leon Africae. *Mus. Dom. Banks.*
- Cerdo.* 18. C. thorace spinoso rugoso niger, antennis longis. *Syst. Ent.* 157. 14.
Cerambyx Cerdo thorace spinoso rugoso nudo, corpore nigro antennis longis, articulis quatuor primis clauatis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 629. 39.
Cerambyx ater elytris rugosis integris, antennis corpore longioribus. *Geoff. Inf.* 1. 201. 2.
Cerambyx Cerdo. *Scop. Ent. carn.* 162.
Bergstr. Nomencl. 1. 8. 10. tab. 1. fig. 10.
et tab. 2. fig. 3.
Frisch. Inf. 13. tab. 8.
Mouff. Inf. 149. fig. 1.
Drury Inf. 1. tab. 39. fig. 1.

β . *Cerambyx Heros*. Scop. Ent. carn. 163.

Cerambyx Heros. Bergstr. Nomencl. 1. tab. 11. fig. 5. 6.

Cerambyx fusco niger, elytris rugosis apice interiori spinosis, antennis corpore longioribus. Geoff. Inf. 1. 200.

Habitat in Europae ligno.

Antennae longitudine differunt.

Varietates α et β vix species distinctae. Differunt imprimis magnitudine.

19. C. thorace spinoso, coleoptris fascia maculisque quatuor atris, antennis longis. *Syst. Ent.* 168. 15. Linn. *Syst. Nat.* 2. 628. 35. Fn. Sv. 654. It. Scan. 260. *alpinus*.

Cerambyx cinereo coerulefcens, elytrorum maculis sex fuscis. Geoff. Inf. 1. 202. 4.

Capricornus primus Mouffetii coloris fere cinerei, cuius venter, crura et cornua coerulea, articulis nigris interstincta, scapulae cauda et elytra nigris quibusdam maculis variegata. Scheuchz. Itin. 1. tab. 1. fig. 5.

Ionst. Inf. tab. 15. fig. 3.

Sulz. Hist. Inf. tab. 4. fig. d.

Drury Inf. 2. tab. 31. fig. 5.

Schaeff. Icon. tab. 123. fig. 1.

Habitat in Europae montosis.

20. C. thorace spinoso fuscus, linea longitudinali alba, *scalaris*. antennis longissimis.

Habitat in America meridionali. *Mus. Dom. Banks*.

Medius. Antennae corpore triplo longiores. Caput fuscum orbita oculorum lineaque dorsali albis. Thorax acute spinosus, fuscus linea dorsali alba. Scutellum album. Elytra fusca puncto medio futuraque dentata albis. Pedes fusci.

21. C. thorace bispinoso rugoso, elytris fascia flava, antennis longioribus compressis. *Syst. Ent.* 168. 16. Linn. *Syst. Nat.* 2. 627. 32. *Mus. Lud. Vr.* 72. *succinctus*.

Cerambyx fusco castaneus, thorace rugoso 4spinoso, elytris fascia flava. *Degeer Inf.* 5. 113. 14. tab. 14. fig. 5.

Quici Margr. Bras. 254.

Drury Inf. 1. tab. 39. fig. 2.

Habitat in America, Brasilia.

depressus. 22. *C. thorace multispinose depressus niger cinereo variegatus, elytris acuminatis, antennis longis.*

Habitat in Americae meridionalis insulis. *Mus. Dom. Banks.*

Magnitudo *C. succincti*, at *depressus*, planus. Antennae corpore longiores, nigrae articulo primo longiori valde clauato. Caput inaequale, nigrum maculis impressis cinereo villosis. Thorax utrinque spinis 4 - 5 breuibus, approximatis dorso plano niger villis cinereis variegatus. Elytra striata, plana, acuminata, nigra maculis cinereis et in his puncta atra. Pedes atri.

fasciatus. 23. *C. thorace spinose cyaneus, elytris fascia flaua, antennis medioeribus ante apicem flauis. Syst. Ent. 168. 17. **

Habitat Tranquebariae. *D. Koenig.*

barbicornis. 24. *C. thorace spinose, antennarum quatuor primis articulis nigro barbatis, corpore testaceo nigro variegato. Syst. Ent. 168. 18. Linn. Syst. Nat. 2. 625. 18. Mus. Lud. Vlr. 68.*

Habitat in Asia.

farinosus. 25. *C. thorace spinose piceus, elytris punctis sparsis farinosis, antennis longis. Syst. Ent. 168. 19. Linn. Syst. Nat. 2. 626. 24.*

Cerambyx niger thorace spinose, elytris maculis rotundatis pilosis flauo albidis sparsis, abdomine bidentato. Degeer Inf. 5. 108. 9. tab. 13. fig. 17.

Cerambyx Chinenfis. Forster. n. sp. Cent. 1. 39. 39.

Drury Inf. 2. tab. 31. fig. 4.

Merian. Surin. tab. 24.

Habitat in radice *Argemones mexicanae*.

Larua albicans, capite caudaque nigris.

Imago lineolis duobus in medio elytrorum approximatis glabris.

26. C. thorace spinoso, elytris punctis fasciisque nigris, *nebulosus*.
antennis longioribus. *Syst. Ent.* 168. 20. *Linn. Syst.*
Nat. 2. 627. 29. *Fn. Sv.* 650.
Cerambyx niger, elytris vellere cinereo marmoratis,
antennis pedibusque cinereo intersectis. *Geoff. Inf.*
1. 204. 7.
Cerambyx thorace spinoso, elytris cinereis punctis
fasciisque nigris, antennis mediocribus cinereo ni-
groque maculatis. *Degeer Inf.* 5. 71. 8.
Cerambyx nebulosus. *Scop. carn.* 173.
Sulz. Hist. Inf. tab. 4. fig. 7.
Habitat in abietum truncis.
27. C. thorace spinoso, elytris apice bidentatis, antennis *hispidus*.
mediocribus hirtis. *Syst. Ent.* 169. 21.
Cerambyx hispidus thorace spinoso, elytris subprae-
morsis punctisque tribus hispidis, antennis hirtis
longioribus. *Linn. Syst. Nat.* 2. 627. 30. *Fn. Sv.*
651.
Cerambyx ouatus fuscus, elytris antice cinereis apice
bidentatis. *Geoff. Inf.* 1. 206. 9.
Cerambyx fasciculatus thorace spinoso, elytris fuscis,
fascia transversa alba fasciculisque sex nigris, anten-
nis longioribus. *Degeer Inf.* 5. 71. 9. tab. 3. fig. 17.
Scarabaeus antennis articulatis longis. *Raj. Inf.* 97. 4.
Schaeff. Icon. tab. 14. fig. 9.
Frisch. Inf. 13. p. 22. tab. 16.
Habitat in Europa.
28. C. thorace inermi, dorso plano, corpore fusco gri- *longicor-*
feoque vario, antennis longissimis. *nis.*
Habitat in Coromandel. *Mus. Dom. Banks.*
Medius. Antennae corpore triplo longiores nigrae ar-
ticulorum basi subcinerascete. Caput cinereum basi
lineaque laterali nigris. Thorax omnino inermis
dorso fere plano et fere impresso fusco cinereoque
varius. Elytra punctato striata fusco cinereoque
varia. Corpus cinereum.
29. C. thorace inermi, elytris subtestaëis, margine omni *margina-*
nigro. *Syst. Ent.* 169. 22. * *lis.*
Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*

- breuicornis.* 30. C. thorace inermi viridi, elytris obscuris, antennis breuibus nigris. *Syst. Ent.* 169. 22. *
Habitat in Sierra Leon Africae. *Mus. Dom. Banks.*
- Iuuencus.* 31. C. thorace inermi rugoso, elytris acuminatis nigris lanuginoso canescentibus, antennis longissimis. *Syst. Ent.* 169. 24. * *Linn. Syst. Nat.* 2. 631. 53.
Habitat in America meridionali.

46. L A M I A.

- Tribulus.* 1. L. thorace quadrispinoso, scutello elytrisque spinosis, antennis longioribus. *Syst. Ent.* 170. 1. *
Habitat ad fluium Gaboon Africae. *D. Solander e Mus. Dom. Banks.*
- fronticornis.* 2. L. thorace spinoso, frontis cornu porrecto apice emarginato recuruo, antennis longis.
Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*
Antennae longae, fuscae articulorum apicibus nigris. Caput fuscum mandibulis atris. Frontis cornu porrectum, crassum, fuscum, supra planum, hirtum, apice late emarginatum, apicibus recuruis, atris. Thorax spinosus, subrugosus, fuscus, supra immaculatus, subtus vero vtrinque linea lata alba. Elytra fusca, glabra basi punctis aliquot eleuatis scabra, ante medium maculae duae ocellares, atrae et pone has macula maior albida. Pedes fusci.
- pedicornis.* 3. L. thorace elytrisque spinosis, femoribus anticis cornutis. *Syst. Ent.* 170. 2. *
Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
- hystrix.* 4. L. thorace quinquespinofo, elytris fasciculato pilosis, antennis mediocribus ferratis.
Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*
Antennae longitudine corporis, pilosae, valde ferratae, testaceae articulorum apicibus fuscis. Caput hispidum griseum. Thorax rotundatus spinis quinque erectis, atris intermedia paullo minori. Praeterea tubercula duo eleuata atra ante spinam intermediam. Elytra fasciculato pilosa carneo variegata.

5. L. thorace acute spinoso grisea, elytris basi tuberculo *crista.*
 compresso tridentato. *Syst. Ent.* 170. 3. *
 Habitat in noua Zelandia. *Mus. Dom. Banks.*
6. L. thorace antice vtrinque bispinoso, corpore nebulo- *ambula-*
 so. *Syst. Ent.* 171. 4. * *tor.*
Pet. Gazoph. tab. 37. fig. 6.
 Habitat in Insulis Luzonum. *Mus. Dom. Banks.*
7. L. thorace spinoso, elytris conuexis atris, antennis *textor.*
 mediocribus. *Syst. Ent.* 171. 5.
Cerambyx textor thorace spinoso, elytris obtusis con-
 uexis atris punctatis, antennis mediocribus. *Linn.*
Syst. Nat. 2. 629. 41. *Fn. Sv.* 656.
Cerambyx ater, elytris punctis eleuatis, antennis cor-
 pore breuioribus. *Geoff. Inf.* 1. 201. 3.
Cerambyx nigro rugosus thorace spinoso nigro opa-
 cus, antennis breuioribus crassis, elytris conuexis.
Degeer Inf. 5. 64. 3.
Cerambyx fordide niger, punctis eleuatis sparsis, an-
 tennis crassis corporis longitudinem subaequantibus.
Vdm. Diff. 29.
Cerambyx textor. *Scop. carn.* 164.
Schaeff. Icon. tab. 10. fig. 1.
Bergstr. Nomencl. 1. 5. 8. tab. 1. fig. 8.
 Habitat in truncis arborum Europae.
8. L. thorace spinoso nigra antice fasciis, postice punctis *pulchra.*
 viridibus, elytris basi mucronatis. *Syst. Ent.* 171. 6. *
Cerambyx pulcher. *Drury Inf.* 1. tab. 32. fig. 6.
 Habitat in Africa. *Dom. Drury.*
9. L. thorace spinoso viridi fasciato, elytris viridi irro- *regalis.*
 ratis, maculisque tribus fuluis.
Cerambyx regalis. *Brown. Illust.* tab. 50. fig. 1.
 Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*
 Statura praecedentis. Antennae corpore longiores, ni-
 grae. Caput atrum viridi lineatum macula subocu-
 lari fulua. Thorax spinosus, ater fasciis tribus im-
 pressis viridibus. Elytra substriata, nigra atomis vi-
 ridibus numerosissimis, et praeterea maculae tres fe-
 re marginales fuluae. Subtus viridis abdomine vtrin-
 que linea punctorum fuluorum.

- nigricornis.* 10. L. thorace mutico grisea, elytris dorso planis, antennis breuibus nigris.
Habitat in Coromandel. *Mus. Dom. Banks.*
Antennae corpore breuiore, nigrae. Corpus griseum supra testaceo mixtum. Thorax omnino inermis. Elytra dorso plana punctis aliquot marginalibus bascos atris impressis apice obtusa et fere truncata.
- sternutator.* 11. L. thorace spinoso, elytris basi porosis, antennis mediocribus. *Syst. Ent. 172. 7. **
Habitat in Insula Barbados. *Dom. Drury.*
- gutturator.* 12. L. thorace spinoso, elytris testaceis albo irroratis, basi punctis eleuatis glabris. *Syst. Ent. 172. 8. **
Habitat in Africa. *Mus. Brit.*
- nebulosa.* 13. L. thorace inermi ferrugineo nigro lineato, elytris fusco ferrugineoque variis, macula marginali cinerea, antennis mediocribus.
Habitat in Germania. *Mus. Dom. Banks.*
Media. Antennae longitudine corporis nigrae articulis basi cinereis. Caput et thorax rotundatus, inermis, ferruginea nigro lineata. Elytra punctata ferrugineo fuscoque varia, macula magna cinerea in medio marginis exterioris. Pedes fusci.
- ariolator.* 14. L. thorace spinoso lineato, elytris fuscis, linea semicirculari alba. *Syst. Ent. 172. 9. **
Habitat in India.
- futor.* 15. L. thorace spinoso, elytris atris ferrugineo maculatis, scutello luteo, antennis longissimis. *Syst. Ent. 172. 10.*
Cerambyx futor thorace spinoso, elytris obtusis atris subnebulosis, scutello luteo, antennis longissimis. *Linn. Syst. Nat. 2. 628. 38. Fn. Sv. 655.*
Cerambyx nigro nebulosus, scutello pallido, elytris fusco aeneis. *Vdm. Diff. 27.*
Cerambyx atomarius thorace spinoso niger nitidus atomis albescentibus, antennis longissimis, scutello albicante. *Deger Inf. 5. 65. 4.*

Sulz. Hist. Inf. tab. 5. fig. 4.

Scopol. carn. 162.

Habitat in Europae fyluis.

Aliam vidimus maiorem elytris minus maculatis, vix tamen distinctam.

16. L. thorace spinoso nigra, thorace elytrisque fulvis, thorace nigro lineato elytris reticulatis. *reticulator.*

Habitat in India orientali. *Mus. Dom. Banks.*

Magnitudo L. Sutoris. Caput atrum, immaculatum. Antennae mediocres, ferrugineae articulo primo toto nigro, secundo basi apiceque clauato, villoso, nigro. Thorax supra fuluus, lineis duabus dorsalibus, nigris. Elytra fulua, nigro reticulata apice emarginata. Corpus et pedes nigra.

17. L. thorace spinoso, elytris cinereo fusco glaucoque nebulosis, antennis longissimis rufis. *titillator.*
172. 11. *

Habitat in Carolina. *Mus. Brit.*

18. L. thorace spinoso, elytris cinereo puluerulentis, vittis duabus flauis nigro marginatis. *vittator.*
Syst. Ent. 173. 12. *

Petiv. Gazoph. tab. 24. fig. 6.

Habitat ad Sinus Campechani littora. *Mus. Brit.*

19. L. thorace spinoso nigra, elytris maculis quatuor flauis subocellaribus, antennis longis. *oculator.*
Syst. Ent. App. 822. *

Cerambyx ocellatus thorace spinoso niger, antennis longissimis, elytris singulis maculis ocellatis quatuor albis. *Degeer Inf.* 7. tab. 49. fig. 1. *Voet. Ceramb.* tab. 7. fig. 21.

Habitat ad Cap. bon. sp.

20. L. thorace spinoso nigra, elytris sanguineis, macula nigra. *Kaehlerii.*
Syst. Ent. 173. 13.

Cerambyx Kaehlerii thorace spinoso niger, thorace elytrisque sanguineis, macula magna nigra. *Linn. Syst. Nat.* 2. 631. 57.

Ceram-

Cerambyx niger elytris thoracisque lateribus rufis.

Geoff. Inf. 1. 204. 6.

Schaeff. Inf. tab. 1. fig. 1.

Scop. Ann. Hist. 5. 96. 56.

Habitat in Europa australiori.

Thorax variat immaculatus et macula laterali rufa.

Elytra apice emarginata mox immaculata, mox macula nigra.

capensis. 21. L. thorace bispinoso nigra, elytris fasciis quatuor rufis, antennis mediocribus. *Syst. Ent.* 173. 14. *

Cerambyx capensis thorace spinoso niger, elytris fasciis quatuor rufis, antennis mediocribus. *Linn.*

Syst. Nat. 2. 628. 36.

Cerambyx pilosus. *Pod. Mus.* 32. 3.

Pet. Gazoph. tab. 3. fig. 8.

Drury Inf. 1. tab. 39. fig. 3.

Habitat ad Cap. bon. sp.

hottentot- 22. L. thorace spinoso rufo, elytris nigris, fascia macu-
ta. lisque duabus marginalibus sanguineis. *Syst. Ent.*
172. 15. *

Cerambyx punctatus niger, thorace rufo, elytris punctis excauatis. *Brown. Illust.* 118. tab. 49. fig. 1.

Habitat ad Cap. bon. sp. *Dom. Teats.*

humera- 23. L. thorace spinoso, elytris flavis nigro fasciatis antice
lis. mucronatis.

Habitat in - - - *Dom. Drury.*

trifascia- 24. L. thorace subspinoso atra, elytris fasciis tribus fla-
ta. uis, antennis mediocribus. *Syst. Ent.* 174. 17. *

Habitat ad Sierra Leon Africae. *Mus. Dom. Banks.*

bifascia- 25. L. thorace spinoso postice sinuato, elytris flavis, fa-
ta. sciis duabus maculaque rhombea cyaneis. *Syst. Ent.*
174. 18. *

Habitat in Iamaica. *Mus. Brit.*

aethiops. 26. L. thorace spinoso atra, elytris fasciis duabus puncto-
que apicis luteis, antennis mediocribus. *Syst. Ent.*
174. 19. *

Habitat

Habitat ad Cap. bon. sp. *Muf. Brit.*

Elytra apice puncto fuluo, rarius immaculata.

27. L. thorace spinoso cinereo, thorace elytrisq̄ue fusco *variigator.*
variis, antennis longis.

Habitat in Africa aequinoctiali. *Muf. Dom. Banks.*

Media. Antennae corpore longiores, fuscae, immaculatae. Caput, thorax, elytra fusca cinereo variegata coloribus mixtis indistinctis, ore nigro. Corpus cinereum.

28. L. fusca, thorace coleoptrisq̄ue ocellis quatuor atris. *curculionoides.*
Syst. Ent. 175. 20.

Cerambyx curculionoides thorace mutico, ocellis quatuor nigris, elytris ocello sesquialtero, antennis longis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 634. 84.

Leptura nigro cinerea, thorace elytrisq̄ue maculis oculiferis atris, circulo cinereo, thorace subcylindrico. *Geoff. Inf.* 1. 210. 5.

Leptura curculionoides. *Scopol. Ann. Hist. nat.* 5. 101. 75.

Schaeff. Icon. tab. 39. fig. 1.

tab. 155. fig. 5.

Habitat in Europa australiori.

29. L. thorace spinoso fusca, elytris maculis duabus atris, *tristis.*
antennis mediocribus. *Syst. Ent.* 175. 21.

Cerambyx tristis thorace spinoso niger, elytris fuscis, maculis duabus atris, antennis mediocribus. *Linn. Syst. Nat.* 2. 629. 42.

Scopol. Ann. Hist. nat. 5. 95. 54.

Habitat in ligno cupressi Europae australioris.

Antennae vix longitudine corporis.

30. L. thorace spinoso ater, elytris albo punctatis, an- *punctator.*
tennis longis. *Gen. Inf. Mant.* 230. *

Habitat in China. *D. Fothergill.*

31. L. thorace spinoso, elytris lineis tribus elevatis ferru- *crispa.*
latis, antennis mediocribus, corpore cinereo. *Gen. Inf. Mant.* 230. *

Habitat ad Cap. bon. sp. *Dom. Lee.*

- rotator.* 32. L. thorace spinoso cinerea, elytris subfasciatis, antennis mediocribus. *Syst. Ent.* 175. 22. *
Habitat in India. *Mus. Dom. Banks.*
- Glycyrrhizae.* 33. L. thorace spinoso niger, elytris albo lineatis bicarinatis, pedibus ferrugineis, antennis breuibus.
Cerambyx Glycyrrhizae. *Pall. It.* 2. 723. 60.
Habitat in Sibiria. *D. Pallas. Mus. Dom. Banks.*
Triplio maior L. fuliginatore. Caput atrum litura bifidos albida. Antennae breues, crassae, nigrae primo articulo ferrugineo apice nigro. Thorax vtrinque spinosus lineis tribus albis. Elytra nigra lineis duabus lateralibus eleuatis, carinatis laeuis, sulci inter has villosi albi. Sutura alba. Pedes ferruginei apice nigri.
Variat saepius aetate, thorace elytrorumque futura totis nigris lanugine alba derasa.
- fuliginator.* 34. L. thorace subspinoso nigra, elytris cinerascens, antennis breuibus. *Syst. Ent.* 175. 23.
Cerambyx fuliginator. *Linn. Syst. Nat.* 2. 639. 43.
Cerambyx ater ouatus, antennis corpore dimidio breuioribus, elytris vellere cinereo albidis. *Geoff. Inf.* 1. 205. 8.
* *Cerambyx niger*, thorace spinoso, elytris cinereis, corpore ouato, antennis breuioribus. *Degeer Inf.* 5. 70. 7.
Frisch. Inf. 13. tab. 19.
Habitat in Europa australiori.
- carinata.* 35. L. thorace spinoso nigra, elytris piceis, carina laterali eleuata albida, antennis breuibus.
Habitat in Sibiria. *D. Pallas. Mus. Dom. Banks.*
Statura et magnitudo L. fuliginatoris. Antennae breues, crassae, nigrae. Caput et thorax punctata lineaque media impressa nigra. Elytra obtusa, picea, linea laterali eleuata villosa albida. Corpus subtus villosa cinereum.
- coquus.* 36. L. thorace subspinoso hirsuto, elytris obtusis sulcatis atris antice ferrugineis, antennis mediocribus. *Syst. Ent.* 176. 24.

Cerambyx coquus. Linn. Syst. Nat. 2. 630. 44.

Habitat in America boreali.

Spinae thoracis minutissimae.

37. L. thorace spinoso fusco, maculis duabus ferrugineis, *ruspator*.
elytris fuscis cinereo variegatis.

Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*

Media. Antennae corpore paullo longiores, fuscae.

Caput fuscum. Thorax acute spinosus, punctatus, fuscus vtrinque macula magna ferruginea. Scutellum ferrugineum. Elytra punctata, obtusa, fusca cinereo varia, qui color postice fuscum constituit. Corpus et pedes fusca.

38. L. thorace spinoso quadripunctato, elytris rufis, *tornator*.
maculis quatuor nigris, antennis breuibus. *Syst. Ent.*
176. 25. *

Habitat in America boreali.

39. L. thorace subspinoso grisea, elytris ferrugineo irro- *Banckii*.
ratis fascisque duabus cinereis. *Syst. Ent.* 176. 26.*

Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*

40. L. thorace spinoso cornuque breui recumbente, cor- *testator*.
pore testaceo, antennis breuibus apice nigris.

Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*

Corpus paruum, breue, villosum, testaceum. Antennae breues, testaceae apice nigrae. Caput magnum fronte plano. Thorax vtrinque spinosus et praeterea in medio dorsi cornu recumbens, breue, latum, retusum. Elytra villosa, striata, immaculata.

41. L. thorace spinoso atra, vitta integra alba, antennis *pedestris*.
mediocribus. *Syst. Ent.* 176. 27.

Cerambyx pedestris thorace spinoso apterus niger, elytris tomentosis atris, futura alba, antennis mediocribus. Linn. Syst. Nat. 2. 631. 51.

Cerambyx pedestris. Pod. Inf. 34. 9.

Cerambyx arenarius. Scop. Ent. carn. 168.

Habitat in Europa australiori.

- molitor.* 42. L. thorace subspinofo fusca, vittis tribus integris albis, antennis mediocribus. *Syst. Ent.* 176. 28. *
Habitat in India. *Mus. Dom. Banks.*
Varietas forte L. pedestris.
- tuberculator.* 43. L. thorace mutico grisea, coleoptris basi bituberculatis, maculisque duabus communibus albis, antennis breuibus.
Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*
Parua. Antennae breues, cinereae. Caput et thorax grisea, immaculata. Coleoptra concolora tuberculis duobus baseos eleuatis, compressis iuxta futuram. Praeterea maculae duae, magnae, albiae communes, altera ad basin, altera versus apicem.
- Rubus.* 44. L. thorace spinofo bimaculato, elytris bidentatis basi scabris mucronatis. *Syst. Ent.* 177. 29.
Cerambyx Rubus thorace spinofo, antennis subtus hispidis longis, elytris bidentatis basique mucronatis albo bimaculatis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 625. 21.
Cerambyx albofasciatus niger thorace spinofo, antennis longis aculeatis, elytris basi videntatis apiceque bidentatis, maculis quatuor albis. *Degeer Inf.* 5. 106. 7. tab. 13. fig. 16.
Habitat in India.
Elytrorum puncta nimis variant.
- spinicornis.* 45. L. thorace spinofo rugoso, elytris griseis truncatis, antennis compressis, articulis apice spinosis.
Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*
Paullo minor L. Rubo. Antennae mediocres, compressae, articulis apice exteriori acute spinosis. Caput nigrum. Thorax acute spinosus, valde rugosus, griseus. Elytra laeuia, grisea apice truncata subspinosa. Corpus fuscum griseo pubescens.
- scabrator.* 46. L. thorace spinofo subtestacea, elytris punctis atris baseos scabris.
Habitat in India orientali. *Mus. Dom. Banks.*
Antennae mediocres, cinereae articulorum apicibus nigris. Caput et thorax acute spinosus subtestacea, Elytra

tra concolora, at basi punctis eleuatis, atris, numerosis scabra apice subemarginata, ad futuram acuminata. Corpus subtus et pedes concolores.

47. L. thorace spinoso tuberculato cinerea, elytris scabris, maculis duabus lateralibus atris. *Gen. Inf. Mant.* 230. * *Spengleri.*
Habitat in America meridionali. *Dom. Spengler.*
48. L. thorace acute spinoso grisea, elytris apice bidentatis. *Syst. Ent.* 177. 30. * *bidens.*
Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
49. L. thorace subspinoso nigra, elytris bidentatis fuscis cinereo lrroratis. *Syst. Ent.* 177. 31. * *Solandri.*
Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
50. L. thorace obtuse spinoso, mandibulis basi cornutis, antennis longissimis. *Syst. Ent.* 177. 32. * *cornutor.*
Habitat in America. *Mus. Brit.*
51. L. thorace spinoso, elytris basi variolosis cinereis, macula laterali nigra, antennis longis. *Syst. Ent.* 178. 33. * *leprosa.*
Habitat in America. *Dom. Drury.*

47. STENOCORVS.

1. S. thorace subspinoso, elytris fastigiatis, pectore nitente. *Syst. Ent.* 178. 1. *meridianus.*
Cerambyx meridianus thorace subspinoso, elytris subfastigiatis fuscis antice testaceis, pectore nitente. *Linn. Syst. Nat.* 2. 630. 47. *Fn. Sv.* 648.
Cerambyx elytris spadiceis, ventre argenteo. *Raj. Inf.* 96. 1.
Leptura fusco cinerea, thorace spinoso, femoribus rufis apice nigris, corpore subtus nitente, abdominis apice rufo. *Degeer Inf.* 5. 305.
Schaeff. Icon. tab. 3. fig. 13.
tab. 79. fig. 7.
Habitat in Europa boreali.
Femina nigricans, mas testaceus.
Larua subterranea pedibus longissimis. *Rains.*
Fabr. Spec. Inf. P 2. S.

- cyaneus*. 2. S. thorace subspinoso cyaneus, elytris basi flavis. *Syst. Ent. App.* 823. *
- Calopus blandus* violaceus, elytris antice luteis, antennis breuibus. *Syst. Ent.* 182. 2. *
- Cerambyx palliatus* thorace spinoso violaceus, elytris subfastigiatis a basi ad medium testaceis, antennis breuibus, articulis quatuor clauatis. *Forster. Cent. Inf.* 1. 40. 40.
Habitat in India.
- lamed*. 3. S. thorace spinoso pubescente, elytris fastigiatis lividis, taenia obscura longitudinali sinuata. *Syst. Ent.* 178. 2.
Cerambyx lamed. *Linn. Syst. Nat.* 2. 630. 46. *Fn. Sv.* 649.
Stenocorus niger, elytris rubescentibus apice futurae medietate nigris. *Geoff. Inf.* 1. 226. 6.
Habitat in Europa.
- garganicus*. 4. S. thorace spinoso, elytris bidentatis testaceis, macula pallida, antennis longis. *Syst. Ent.* 178. 3. *
Habitat in Marylandia. *Mus. Brit.*
- festivus*. 5. S. thorace vtrinque bidentato, elytris bidentatis viridibus, linea laterali lutea. *Syst. Ent.* 179. 4.
Cerambyx festivus. *Linr. Syst. Nat.* 2. 623. 11.
Cerambyx spinosus thorace depresso rufo vtrinque bidentato, fasciis longitudinalibus quinque nigris, elytris bidentatis viridibus, linea lutea. *Degeer Inf.* 5. 100. 4. tab. 13. fig. 14.
Cerambyx fulcatus. *Sulz. Hist. Inf.* tab. 5. fig. 6.
Gron. Zooph. 541. tab. 16. fig. 5.
Drury Inf. 1. tab. 37. fig. 5.
Habitat in Americae Insulis.
- marylandicus*. 6. S. thorace depresso tuberculato mutico, elytris bidentatis fusco cinereoque nebulosis, antennis mediocribus. *Syst. Ent.* 179. 5. *
Habitat in Marylandia. *Mus. Brit.*
- trilineatus*. 7. S. thorace mutico, elytris apice unidentatis, margine omni albo. *Syst. Ent.* 179. 6. *

Cerambyx trilineatus thorace cylindrico, corpore ferrugineo, elytris mucronatis, marginibus dentatis albis, antennis longissimis. *Linn. Mant.* 532.

Drury Inf. 1. tab. 41. fig. 1.

Habitat in Americae infulis. *Dom. Drury.*

8. S. thorace inermi tuberculato, elytris bidentatis, antennarum articulis bispinosis. *Syst. Ent.* 179. 7. * *spinicornis.*

Habitat in Americae meridionalis infulis. *Dom. Drury.*

9. S. thorace spinoso inaequali, elytris bidentatis basi punctatis apice glabris. *Syst. Ent.* 180. 8. * *semipunctatus.*

Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

10. S. thorace mutico inaequali, elytris apice bidentatis albo irroratis, antennis longioribus aculeatis. *Syst. Ent.* 180. 9.

Cerambyx irroratus. *Linn. Syst. Nat.* 2. 633. 62.

Drury Inf. 1. tab. 33. fig. 3.

Habitat in Americae meridionalis infulis.

11. S. thorace mutico cinereo, linea glabra fusca, elytris bidentatis. *Syst. Ent.* 180. 10. * *glabratus.*

Habitat in Insula Americae St. Croix. *D. v. Rohr.*

12. S. thorace scabro spinoso, elytris bidentatis, maculis duorum parium glabris. *Syst. Ent.* 180. 11. * *4maculatus.*

Cerambyx 4maculatus. *Linn. Syst. Nat.* 2. 626. 27.

Sloan. Lam. 2. tab. 237. fig. 21.

Drury Inf. 1. tab. 37. fig. 3.

Habitat in America meridionali.

Femora quatuor postica apice spinosa.

13. S. thorace mutico atro, elytris bidentatis basi testaceis apice atris, fascia pallida. *fasciatus.*

Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*

Antennae setosae longitudine corporis, nigrae. Caput flauum basi lineisque tribus atris, lateralibus sub oculis. Thorax villosus, ater, immaculatus, subtus flauescens. Elytra basi punctata, testacea, tunc usque ad apicem atra fascia ante apicem pallida. Abdomen testaceum macula vtrinque baseos flaua apiceque atrum. Pedes testacei.

- annulatus.* 14. S. thorace lineato, elytris videntatis, antennis longioribus, annulis tribus albis. *Syst. Ent.* 180. 12. *
Habitat - - - *Mus. Dom. Banks.*
- romaculatus.* 15. S. thorace subspinoso quadrimaculato, elytris bidentatis ferrugineis flauo cinereoque maculatis. *Syst. Ent.* 181. 13. *
Habitat in America. *Mus. Dom. Banks.*
- lineola.* 16. S. thorace spinoso ferrugineo, elytris acuminatis testaceis, lineolis tribus glabris flauis.
Habitat in Brasilia. *Mus. Dom. Banks.*
Praecedentibus minor. Caput obscure ferrugineum, immaculatum. Antennae corpore longiores nigrae primo articulo ferrugineo. Thorax ferrugineus immaculatus. Elytra apice unispinosa, testacea lineola baseos duabusque in medio approximatis, exteriori longiori glabris, flauis. Pedes nigri femoribus posticis quatuor flauis apice spina valida, nigra.
- Drurii.* 17. S. thorace subspinoso, elytris truncatis bidentatis ferrugineis cinereo fasciatis, antennis breuibus. *Syst. Ent.* 181. 14. *
Habitat in America meridionali. *Dom. Drury.*
- vndatus.* 18. S. thorace spinoso cinereus, elytris bidentatis, fasciis duabus vndatis nigris. *Syst. Ent.* 181. 15. *
- rusticus.* 19. S. thorace spinoso ferrugineo fuscus, elytris bidentatis pallidioribus, antennis longis.
Habitat in India orientali. *Mus. Dom. Banks.*
Medius. Antennae corpore longiores, fuscae. Caput et thorax pubescentia, obscure ferruginea. Elytra laeuia, multo dilutiora, apice bidentata.

48. CALOPVS.

- ferraticornis.* 1. C. fuscus, antennis compressis. *Syst. Ent.* 182. 1. *
Cerambyx ferraticornis thorace mutico subouali, corpore lurido fusco, antennis compressis antice ferratis mediocribus. *Linn. Syst. Nat.* 2. 634. 65. *Fn. Sv.* 665.

Cerambyx thorace mutico cylindrico griseo fuscus oculis nigris, antennis ferratis mediocribus, tentaculis longis, pedibus teretibus. *Degeer Inf.* 5. 79. 6.
Habitat in Europa boreali.
Corpus elongatum, cylindricum, statura fere Cleri.

49. R H A G I V M.

1. R. thorace spinoso, elytris nebulosis fusco subfasciatis. *inquisitor*.
Syst. Ent. 182. 48.

Cerambyx inquisitor. *Linn. Syst. Nat.* 2. 630. 49. *Fn. Sv.* 659.

Stenocorus niger vellere flavo variegatus, elytris lineis duabus elevatis, thorace spinoso. *Geoff. Inf.* 1. 223. 2.

Leptura inquisitor thorace spinoso fusca, maculis punctisque cinereis villosis, antennis breuibus. *Degeer Inf.* 5. 126. 2. tab. 4. fig. 1.

Frisch. Inf. 13. tab. 14.

Schaeff. Icon. tab. 2. fig. 10.

Sulz. Hist. Inf. tab. 5. fig. 7.

β. *Stenocorus glaber* e fusco niger, elytro singulo lineis tribus elevatis, maculis duabus luteis, thorace spinoso. *Geoff. Inf.* 1. 222. 1.

Leptura mordax thorace spinoso nigra, maculis punctisque griseis villosis, elytris fascia duplici fulva maculaque nigra, antennis breuibus. *Degeer Inf.* 5. 124. 1. tab. 4. fig. 6.

Schaeff. Elem. tab. 118. fig. 1.

Icon. tab. 8. fig. 2. 3.

Habitat in Europae truncis arborum.

Merae varietates mihi videntur α et β.

Larva hexapoda nuda alba, capite collarique corneis fuscis, dorso canaliculato. *Dom. Stroem.*

2. R. thorace spinoso, elytris rufis, futura lineaque nigris. *curfor*.
Syst. Ent. 183. 2.

Cerambyx curfor thorace spinoso, elytris obtusis rufis margine lineaque nigris, antennis mediocribus. *Linn. Syst. Nat.* 2. 630. 45. *Fn. Sv.* 658.

Leptura cursor thorace spinoso nigro, elytris rufis viridi griseo tomentosis, fasciis binis longitudinalibus nigris, antennis longis rufis. *Degeer Inf.* 5. 127. 3.

Scop. Ent. carn. 167.

Sulz. Hist. Inf. tab. 5. fig. 7.

Habitat in Europa boreali.

Noctis. 3. R. thorace spinoso nigrum, antennarum basi ferruginea.

Cerambyx Noctis, thorace spinoso totus niger, antennarum basi ferruginea. *Linn. Syst. Nat.* 2. 630. 48.

Habitat in Europa boreali.

Nimis affinis R. cursori et forte eius mera varietas sexus. Differt tantum colore toto nigro.

bifasciatum. 4. R. thorace spinoso, elytris fuscis, fasciis duabus obliquis flavis. *Syst. Ent.* 183. 3. *

Stenocorus glaber e fusco niger, elythro singulo lineis tribus elevatis, maculis duabus luteis, thorace spinoso. *Geoff. Inf.* 1. 222. 1.

Sulz. Hist. Inf. tab. 5. fig. 8.

Habitat in Anglia, Gallia.

ornatum. 5. R. thorace spinoso nigrum, elytris fascia lata flava.

Syst. Ent. 183. 4. *

Habitat in Pennsylvania. *Mus. Dom. Banks.*

50. S A P E R D A.

carcharias. 1. S. corpore griseo nigro punctato, antennis mediocribus. *Syst. Ent.* 184. 1.

Cerambyx carcharias thorace mutico cylindrico, corpore griseo nigro punctato, antennis mediocribus. *Linn. Syst. Nat.* 2. 631. 52. *Fn. Sv.* 66e.

Cerambyx punctatus thorace mutico cylindrico, flavo griseus nigro punctatus, antennis mediocribus griseo nigroque maculatis. *Degeer Inf.* 5. 73. 10. tab. 3. fig. 19.

Leptura cinerea nigro punctata, thorace cylindraco. *Geoff. Inf.* 1. 208. 1.

- Capricornus norwegicus nigrescens*, vaginis punctatis maculisque pallidis adspersis. *Petiv. Gazoph.* 5. tab. 2. fig. 1.
Drury Inf. 1. tab. 41. fig. 5.
Bergstr. Nomencl. 1. 5. 7. tab. 1. fig. 7.
Schaeff. Icon. tab. 38. fig. 4.
Goedart. Inf. 2. tab. 51.
 Habitat in Europae sylvis.
2. *S. coleoptris linea suturali dentata punctisque flavis, scalaris.* antennis mediocribus. *Syst. Ent.* 184. 2.
Cerambyx scalaris. *Linn. Syst. Nat.* 2. 632. 55. *Fn. Sv.* 697.
Scop. Ent. carn. 175.
Cerambyx flavoviridis thorace mutico cylindrico, macula nigra, elytris nigris fascia dentata punctisque flavo viridibus, antennis mediocribus. *Degeer Inf.* 5. 77. 14.
Leptura scalaris. *Scop. Ann. Hist. nat.* 5. 102. 77.
Cerambyx clytris nigris albo variegatis. *Frisch. Inf.* 12. 29. tab. 3. fig. 3.
Schaeff. Icon. tab. 38. fig. 5.
Huffnag. Inf. tab. 7.
 Habitat in Europae populo.
3. *S. nigra, capite thorace anoque ferrugineis.* *modesta.*
 Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*
 Statura et magnitudo *S. oculatae*. Caput et thorax ferruginea, immaculata. Antennae nigrae. Elytra punctato striata apice emarginata, nigra, immaculata. Abdomen nigrum tomento cinereo nitidulum ano ferrugineo. Pedes nigri.
4. *S. thorace luteo, punctis duobus atris, elytris nigris. oculata.*
Syst. Ent. 184. 3.
Cerambyx oculatus thorace mutico cylindrico luteo, punctis duobus nigris, clytris fastigiatis linearibus, nigris. *Linn. Syst. Nat.* 2. 633. 60. *Fn. Sv.* 664.
Cerambyx thorace mutico cylindrico rufo flavo, punctis duobus nigris, capite antennisque nigris, elytris cinerascens. *Degeer Inf.* 5. 74. 11. tab. 3. fig. 20.

Cerambyx ferrugineo rufus, elytris nigro cinereis, punctis excauatis nigris. *Vdm. Diff.* 31.

Schaeff. Icon. tab. 128. fig. 4.

Huffnag. Inf. tab. 13.

Habitat in Europae syluis.

hirta. 5. *S. grisea villosa*, scutello flauo. *Syst. Ent.* 184. 4. *

Habitat in noua Zelandia. *Mus. Dom. Banks.*

Palporum articulus exterior oblique subtruncatus.

linearis. 6. *S. cylindrica nigra*, pedibus luteis, antennis mediocribus. *Syst. Ent.* 185. 5.

Cerambyx linearis thorace cylindrico mutico niger, pedibus omnibus totisq; luteis, antennis mediocribus.

Linn. Syst. Nat. 2. 632. 58. *Fn. Sv.* 663.

Leptura parallela. Scop. carn. 153.

Habitat in Europae syluis.

cylindrica. 7. *S. cylindrica nigra*, pedibus anticis luteis. *Syst. Ent.* 185. 6.

Cerambyx cylindricus thorace cylindrico mutico, linea albida, elytris fastigiatis nigris, pedibus anticis pallidis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 633. 59. *Fn. Sv.* 662.

Cerambyx cinereus coeruleo niger, thorace mutico cylindrico linea albida, pedibus anticis flauis, antennis mediocribus. *Degeer Inf.* 5. 75. 12.

Leptura tota coeruleo nigra, capite thoraceque subviloso. *Geoff. Inf.* 1. 208. 2.

Leptura cylindrica. Scop. carn. 157.

Roef. Inf. 2. *Scarab.* 2. tab. 3.

Habitat in pyri, pruni ramis.

fasciata. 8. *S. thorace subspinoso cyanea*, elytris fasciis duabus flauis.

Habitat in Sibiria. *D. Pallas. Mus. Dom. Banks.*

Statura omnino *S. clauicornis* paullo minor. Antennae longitudine corporis, atrae. Corpus totum cyaneum fubtus paullo cinereo nitidum. Elytra fasciis duabus latis flauis.

clauicornis. 9. *S. thorace rotundato viridis*, elytris maculis tribus flauis. *Syst. Ent. App.* 824. *

Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*

10. S. thorace subglobofo violacea, antennis longioribus, *longipes*
femoribus clauatis. *Syst. Ent. App.* 824. *
Habitat ad Cap. bon. sp.
11. S. grisea, vittis tribus dentatis albis, antennis lon. *vittata*.
gis. *Gen. Inf. Mant.* 231. *
Habitat in India. *D. Fothergill.*
12. S. nigra, thoracis lateribus, elytrorumque vitta late- *lateralis*.
rali ferrugineis. *Syst. Ent.* 185. 7. *
Habitat in America boreali. *Mus. Dom. Banks.*
Antennae longitudine corporis nigrae.
13. S. thorace atro, puncto vtrinque ferrugineo, elytris *lyncea*.
griseis acuminatis. *Syst. Ent.* 185. 8. *
Habitat in noua Zelandia. *Mus. Dom. Banks.*
14. S. grisea, scutello margine, elytris lineolis flauescen- *grisea*.
tibus. *Syst. Ent.* 186. 9. *
Habitat in noua Zelandia. *Mus. Dom. Banks.*
15. S. testacea, elytrorum apicibus anoque nigris. *analis*.
Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*
Corpus mediocre. Antennae mediocres, nigrae, inter-
dum articulorum apicibus testaceis. Caput testaceum
mox immaculatum, mox linea mox punctis baseos
nigris. Thorax itidem testaceus mox immaculatus,
mox punctis quatuor aut sex nigris. Elytra fulcata
fulcis striato punctatis testacea apice nigra. Corpus
testaceum ano nigro.
16. S. fusca, thorace lineato, scutello flauo, antennis *Cardui*.
longis. *Syst. Ent.* 186. 10. *
Cerambyx Cardui thorace mutico cylindrico, corpore
fusco, linea longitudinali flauicante, antennis lon-
gioribus. *Linn. Syst. Nat.* 2. 632. 56.
Scop. Ann. Hist. nat. 5. 101. 74.
Habitat in Europae australioris carduis.
17. S. thorace quadrispinoso, corpore fusco. *Syst. Ent.* *tristis*.
186. 11. *
Habitat in noua Zelandia. *Mus. Dom. Banks.*

populnea. 18. S. thorace flavo lineato, elytris punctis quatuor flavis, antennis mediocribus. *Syst. Ent.* 186. 12.

Cerambyx populneus. *Linn. Syst. Nat.* 2. 632. 57. *Fn. Sv.* 661.

Cerambyx ropunctatus nigro plumbeus, elytris punctis quinque flavis. *Degeer Inf.* 5. 78. 15.

Cerambyx fusco cinereus, antennis nigro alboque variegatis, elytrorum punctis octo luteis. *Gadd. Sat.* 79.

Leptura nigra, thorace lineis tribus, elytrorumque maculis villosis flavis, thorace cylindraco, antennis corpus aequantibus. *Geoff. Inf.* 1. 208. 3.

Schaeff. Icon. tab. 48. fig. 5.

Habitat in Europae, Americae populetis.

Conf. *Bergstraeff. Nomencl.* 1. tab. 2. fig. 4. Vix distincta videtur, at triplo minor.

tremula. 19. S. viridis, thorace punctis duobus, elytris quatuor nigris. *Syst. Ent.* 186. 13. *

Habitat Halae Saxonum. *Dom. Schreber.*

Antennae longitudine corporis.

punctata. 20. S. thorace cylindrico viridis, punctis nigris numerosis, antennis mediocribus. *Syst. Ent.* 187. 14.

Cerambyx punctatus thorace mutico subcylindrico totus viridis, punctis nigris, antennis mediocribus. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1067. 7.

Sulz. Hist. Inf. tab. 5. fig. 10.

Schaeff. Icon. tab. 101. fig. 1.

Habitat in Europa australiori.

Antennae et pedes nigrae.

longicornis. 21. S. thorace cylindrico fusca, pedibus testaceis, antennis longissimis nigris, annulo albo.

Habitat in Africa aequinoctiali. *Muf. Dom. Banks.*

Corpus paruum, lineare. Antennae corpore triplo longiores, hirtae, nigrae articulo nono toto albo. Caput et thorax fusca, immaculata. Elytra picea apice bidentata. Pedes testacei apice nigri.

22. S. thorace cylindrico ferruginea, antennis pedibusque *ferruginea.*
nigris.
- Habitat in Germania. *Dom. de Hattorf.*
Media. Antennae longitudine corporis fuscae. Thorax cylindricus vtrinque parum prominens, ferrugineus, immaculatus. Pedes nigri femoribus clauatis.
23. S. thorace cylindrico nigra, elytris testaceis. *testacea.*
Habitat in Germania. *Dom. de Hattorf.*
Statura praecedentium. Antennae longitudine corporis nigrae. Corpus totum nigrum elytris solis testaceis.
24. S. thorace cylindrico, corpore violaceo. *Syst. Ent. violacea.*
187. 15. *
Habitat in regione Pedemontana. *Mus. Dr. Allioni.*
25. S. nigra, elytris flavis apice nigris. *Syst. Ent. 187. praeusta.*
16. *
Leptura praeusta thorace subglobofo fusco, elytris flavis apice nigris, pedibus quatuor pallidis. *Linn. Syst. Nat. 2. 641. 24.*
Leptura nigra, elytris flavis apice nigris. *Geoff. Inf. 1. 209. 4.*
Schaeff. Icon. tab. 52. fig. 8.
Scopol. Ann. Hist. nat. 5. 103. 80.
Habitat in Europae sylvis.
26. S. nigra, thoracis linea dorsali femoribusque apice *lineola,*
rufis.
- Habitat in Italia. *Dr. Allioni.*
Parua. Corpus cylindricum, nigrum. Antennae longitudine corporis. Linea rubra in dorso thoracis. Femora omnia apice vti et tibiae anticae rubra.
27. S. thorace cylindrico fusca, femoribus clauatis, an- *minuta.*
tennis mediocribus.
- Habitat in Anglia. *Mus. Dom. Banks.*
Parua tota fusca, immaculata. Femora omnia clauata.

51. CALLIDIUM.

- Baiulus*. 1. *C. thorace villoso, tuberculis duobus, corpore fusco.*
Syst. Ent. 187. 1.
Cerambyx Baiulus thorace mutico subrotundo villoso, tuberculis duobus, antennis breuibus. *Linn. Syst. Nat.* 2. 636. 76. *Fn. Sv.* 672.
Cerambyx caudatus fusco obscurus, thorace mutico subrotundo depresso cinereo villoso, punctis duobus nigris glabris, antennis breuibus. *Degeer Inf.* 5. 86. 82.
Leptura Baiula. *Scop. carn.* 156.
Sulz. Hist. Inf. tab. 4. fig. 29.
Schaeff. Icon. tab. 64. fig. 4. 5.
Frisch. Inf. 13. tab. 10.
Schaeff. Elem. tab. 76. fig. 4.
 Habitat in Europae borealis truncis.
 Elytra in altero sexu pallida.
- fennicum*. 2. *C. thorace tuberculato rufo, elytris violaceis, antennis mediocribus.* *Syst. Ent.* 188. 2.
Cerambyx fennicus thorace mutico subrotundo, tuberculis subferrugineo obsolete, elytris violaceis, antennis longiusculis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 636. 77. *Fn. Sv.* 674.
Cerambyx elytris nigro coeruleis, apice abdominis ferrugineo. *Vdm. Diff.* 33.
Leptura atra, thorace testaceo, femoribus crassis. *Geoff. Inf.* 1. 219. 19.
 Habitat in Europae pinetis.
- ruficollis*. 3. *C. thorace subcylindrico hirtu rufo, elytris violaceis, antennis mediocribus piceis, pedibus nigris.*
 Habitat in Italia. *Dr. Allioni.*
 Differt manifeste a *C. fennico*. Corpus minus. Caput nigrum antennis mediocribus piceis. Thorax fere cylindricus, subspinosus, hirtus, rufus. Elytra violacea. Pedes nigri femoribus subclauatis.
- clauipes*. 4. *C. nigrum opacum, femoribus omnibus clauatis, antennis longioribus.* *Syst. Ent.* 188. 2. *
 Habitat in Germania. *Dom. de Hattorf.*

5. C. thorace subpubescente, corpore violaceo, antennis *violaceum.*
breuibus. *Syst. Ent.* 188. 4.
- Cerambyx violaceus* thorace mutico subrotundo pubescente, corpore violaceo, antennis mediocribus. *Linn. Syst. Nat.* 2. 635. 70. *Fn. Sv.* 667.
- Cerambyx violaceus* nitens, corpore thoraceque mutico subrotundo depressis, femoribus clauatis, antennis mediocribus. *Degeer Inf.* 5. 88. 24.
- Stenocorus violaceus.* *Scopol. Ann. Hist. nat.* 597. 59.
- Cantharis nigra* thorace rotundato, elytris coerulescentibus. *Gadd. Diff.* 28.
Frisch. Inf. 12. tab. 3.
- Habitat in Europa boreali frequens.
6. C. thorace nudo, corpore atro opaco, femoribus *femoratum.*
ru-bris, antennis mediocribus.
- Cerambyx femoratus.* *Linn. Syst. Nat.* 2. 634. 69.
Degeer Inf. 5. 93. 31.
Schaeff. Icon. tab. 55. fig. 7.
- Habitat in Germania.
Statura omnino C. violacei, at tamen distincta species.
7. C. thorace verrucoso, nigricante, elytris acuminatis *acuminatum.*
viridibus, futura cyanea. *Gen. Inf. Mant.* 131. *
- Habitat ad Cap. bon. sp. *Dom. Lee.*
8. C. thorace verrucoso nigrum, elytris testaceis, macula *ruficum.*
media apiceque nigris. *Gen. Inf. Mant.* 132. *
- Habitat in Russiae fyluis. *Dom. Lee.*
9. C. thorace glabro, corpore fusco aeneo, antennis *variabile.*
pedibus fuscis. *Syst. Ent.* 188. 5.
- Cerambyx variabilis* thorace mutico subrotundo inaequali glabro, pectore anoque ferrugineis, antennis ferrugineis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 635. 74. *Fn. Sv.* 669.
- Cerambyx scaber.* *Pod. Mus. gr.* p. 36.
Frisch. Inf. 12. 345. tab. 6. fig. 3. 4.
Schaeff. Icon. tab. 4. fig. 12.
- Habitat in Europae borealis pinetis.

- rusticum.* 10. *C. thorace nudo, corpore lurido, antennis breuibus.*
Syst. Ent. 188. 6.
Cerambyx rusticus. *Linn. Syst. Nat.* 2. 634. 67. *Fn. Sv.* 666.
Cerambyx griseo fuscus, thorace mutico subrotundo depresso punctis impressis, antennis subulatis breuioribus. *Degeer Inf.* 5. 83. 20.
Sulz. Hist. Inf. tab. 4. fig. 20.
Schaeff. Elem. tab. 76. fig. 1.
 tab. 13. fig. 1.
Schaeff. Icon. tab. 63. fig. 6.
 Habitat in Europae fyluis.
- stigma.* 11. *C. thorace punctato, corpore atro, elytris laeuis*
stigmatibus albo. *Syst. Ent.* 189. 7.
Cerambyx stigma. *Linn. Syst. Nat.* 2. 635. 72.
Cerambyx niger, thorace submutico semilunari punctato, corpore depresso, elytris laeuis, stigmatibus flavo. *Degeer Inf.* 5. 119. 22. tab. 14. fig. 13.
 Habitat in America.
- barbatum.* 12. *C. thorace rotundato subtus vtrique macula tomentosa ferruginea, antennis longioribus barbatis.* *Syst. Ent.* 189. 8.*
 Habitat Tranquebariae. *D. Koenig.*
- variegatum.* 13. *C. thoracis dorso glabro atro, lineis quatuor albis, elytris flavo irroratis.* *Syst. Ent.* 189. 9.*
 Habitat in noua Zelandia. *Mus. Dom. Banks.*
- lineatum.* 14. *C. thorace lineis duabus, elytris quatuor albis, mediis coeuntibus abbreviatis.* *Syst. Ent.* 189. 10.*
 Habitat in noua Zelandia. *Mus. Dom. Banks.*
- fulcatum.* 15. *C. thorace tomentoso cinereo, elytris albo nigroque striatis.* *Syst. Ent.* 189. 11.*
 Habitat in noua Zelandia. *Mus. Dom. Banks.*
- sanguineum.* 16. *C. thorace subtuberculato elytrisque sanguineis, antennis mediocribus.* *Syst. Ent.* 190. 12.
Cerambyx sanguineus thorace mutico subrotundo elytrisque sanguineis, corpore nigro, antennis mediocribus. *Linn. Syst. Nat.* 2. 636. 80.

Cerambyx thorace mutico subrotundo depresso angulato, elytrisque fanguineis, corpore nigro. *Degeer Inf.* 5. 92. 29.

Cerambyx minor. *Raj. Inf.* 97. 3.

Leptura nigra, thorace coleoptris que fericeo rubris. *Geoff. Inf.* 1. 220. 21.

Schaeff. Icon. tab. 64. fig. 1.

Habitat in Europae sylvis.

17. *C.* thorace subtuberculato, corpore testaceo, antennis *testaceum*, mediocribus fuscis. *Syst. Ent.* 190. 13.

Cerambyx testaceus thorace subrotundo mutico glabro, corpore testaceo, antennis mediocribus. *Linn. Syst. Nat.* 2. 635. 75. *Fn. Sv.* 670.

Cerambyx testaceus. *Degeer Inf.* 5. 93. 30.

Leptura testacea, thorace glabro. *Geoff. Inf.* 1. 218. 18.

Schaeff. Icon. tab. 64. fig. 6.

Habitat in Europae sylvis.

18. *C.* thorace subtuberculato nudo nigrum, elytris testaceis. *Syst. Ent.* 190. 14. *luridum.*

Cerambyx luridus thorace mutico subrotundo, corpore nigro, elytris luridis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 634. 68.

Habitat in Europae borealis pinetis.

19. *C.* thorace laevi obscure ferrugineo, elytris testaceis. *raucum.*
Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*

Statura praecedentium. Antennae ferrugineae longitudine corporis. Caput et thorax plana, laevia, obscure ferruginea, immaculata. Elytra laevia, glabra, testacea. Abdomen conicum, testaceum. Pedes simplices.

20. *C.* thorace subuilloso nigro, lineis quatuor albis, intermediis abbreviatis, antennis breuibus. *Syst. Ent.* 190. 15. * *hafniense.*

Habitat Hafniae.

21. *C.* thorace laevi nitido, corpore nigro opaco, elytris *aulicum.*
laevibus, antennis breuibus. *Syst. Ent.* 190. 16. *

Habitat Hafniae.

- rufipes.* 22. *C. thorace laevi nitido, elytris violaceis, tibiis rufis, antennis breuibus. Gen. Inf. Mant. 231. **
Habitat in Germania boreali. *Dom. de Hattorf.*
- striatum.* 23. *C. thorace glabro, corpore nigro, elytris striatis, antennis breuibus. Syst. Ent. 191. 17.*
Cerambyx striatus. Linn. Syst. Nat. 2. 635. 73. Fn. Sv. 668.
Cerambyx niger nitidus, thorace mutico subrotundo subdepresso, elytris striatis, antennis breuibus. Degeer Inf. 5. 90. 26.
Habitat in Europae fyluis.
- lynceum.* 24. *C. thorace subspinoso rotundato villoso, nigrum, elytris macula subdidyma fulua. Syst. Ent. 191. 18. **
Habitat ad Cap. bon. sp. *Dom. Teats.*
- 2maculatum.* 25. *C. thorace rotundato villoso, fuscum, elytris maculis duabus ferrugineis.*
Habitat ad Cap. bon. sp. *D. Forster. Mus. Dom. Banks.*
Medium. Antennae vix longitudine corporis. Corpus villosum, fuscum, obscurum, minime nitidum. Elytra maculis duabus ferrugineis, altera in medio, altera ad apicem. Femora subclauata.
- flauum.* 26. *C. thorace subrotundo mutico, corpore flauo, femoribus clauatis, antennis mediocribus. Syst. Ent. 191. 19. **
Habitat in Americae meridionalis insulis. *Mus. Tottenhamum.*
- vndatum.* 27. *C. thorace tuberculato, elytris nigris, fasciis duabus vndatis albis, antennis breuibus. Syst. Ent. 191. 20. **
Cerambyx vndatus thorace mutico subrotundo tuberculato, elytris fasciis duabus vndatis, antennis submediocribus. Linn. Syst. Nat. 2. 636. 79. Fn. Sv. 675.
Cerambyx nigro fuscus, thorace mutico subrotundo, depresso tuberculato, elytris fasciis duabus vndatis albidis. Degeer Inf. 5. 91. 28.
Schaeff. Icon. tab. 68. fig. 1.
Habitat in Europa boreali.

28. C. thorace rotundato, elytris liuidis, fasciis tribus *colonom.*
 fuscis, antennis breuibus. *Syst. Ent.* 191. 21. *
 Habitat in Carolina.
29. C. thorace rotundato rufo, elytris nigris basi rufis, *varium.*
 fasciis duabus albis. *Gen. Inf. Mant.* 132. *
 Habitat in America boreali. *Dom. Leats.*
30. C. thorace rotundato flauo fasciato, elytris fasciis *flexuo-*
 septem flauis, anticis antrorsum, posticis retrorsum *sum.*
 arcuatis. *Syst. Ent.* 191. 22. *
Petiv. Gazoph. tab. 27. fig. 3.?
 Habitat in America. *Dom. Drury.*
31. C. testaceum, elytris fascia abbreviata alba. *Syst. Ent. minutum.*
 192. 23. *
 Habitat in noua Zelandia. *Mus. Dom. Banks.*
 Femora valde clauata basi alba.
32. C. thorace globoso nigro flauo fasciato, elytris nigris, *angula-*
 fasciis sex flauis, secunda tertiaque angulatis. *Syst. tum.*
Ent. 192. 24. *
 Habitat in America boreali. *Mus. D. Hunter.*
33. C. thorace globoso albo fasciato, elytris nigris, fasciis *florale.*
 quinque albis, secunda tertiaque lunatis.
Cerambyx floralis. *Pall. Iter.* 2. 724. 63.
 Habitat in Italia. *Dr. Allioni.*
 Statura praecedentium. Caput nigrum antennis fer-
 rugineis. Thorax globosus niger fasciis duabus al-
 bis. Elytra nigra fasciis quinque prima baseos, quin-
 ta apicis. Pedes rufi.
34. C. thorace globoso maculato, elytris nigris, fasciis vn- *fulmi-*
 dato angulatis albis. *Syst. Ent.* 192. 25. * *nans.*
 Habitat - - - *Mus. Dom. Banks.*
35. C. thorace rotundato, elytris fasciis quatuor flauis, *arcua-*
 prima interrupta, reliquis retrorsum arcuatis. *Syst. tum.*
Ent. 192. 26.
Leptura arcuata, thorace globoso nigra, elytris fa-
 sciis linearibus flauis, tribus retrorsum arcuatis, pe-
Fabr. Spec. Inf. Q *dibus*

dibus ferrugineis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 640. 21. *Fn. Sv.* 696.

Leptura nigra, elytrorum lineis quatuor arcuatis punctisque flavis, pedibus testaceis. *Geoff. Inf.* 1. 212. 10.

Cerambyx niger, elytris fasciis quatuor flavis arcuatis. *Idm. Diff.* 30.

Scarabaeus arboreus luteo pictus. *Frisch. Inf.* 12. fig. 3.

Cerambyx niger, elytris fasciis quatuor flavis arcuatis. *Leche nou. spec.* 30.

Scarabaeus maior corpore longo angusto nigro, cum tribus in vtraque ala lineis transversis lutescentibus. *Raj. Inf.* 83. 23.

Petiv. Gazoph. tab. 63. fig. 7.

Schaeff. Icon. tab. 38. fig. 6.

tab. 107. fig. 2. 3.

Habitat in Europae hortis.

arietis. 36. *C.* thorace rotundato nigro, elytris nigris, fasciis flavis, secunda antrorsum arcuata, pedibus ferrugineis. *Syst. Ent.* 193. 27.

Leptura arietis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 640. 23. *Fn. Sv.* 695.

Leptura nigra, elytrorum lineis tribus transversis punctisque flavis, pedibus testaceis. *Geoff. Inf.* 1. 214. 11.

Cerambyx 4fasciatus niger, thorace mutico subgloboso, elytris fasciis flavo vitreis, secunda obliqua, pedibus ferrugineis. *Degeer Inf.* 5. 81. 18.

Stenocorus arietis. *Scop. Ann. Hist. nat.* 5. 96. 57.

Scarabaeus medius niger, lineolis et maculis luteis pulchre variegatis. *Raj. Inf.* 82. 22.

Scarabaeus niger lineolis quibusdam luteis distinctus. *List. Scar.* 385. 14.

Petiv. Gazoph. tab. 63. fig. 6.

Frisch. Inf. 12. 32. tab. 3. fig. 5.

Schaeff. Icon. tab. 38. fig. 7.

Habitat in Europae hortis.

Conf. Bergstr. Nomencl. 1. 9. 12. tab. 1. fig. 12. Vix distincta species videtur, quamvis magnitudine differat.

37. *C. thorace globofo immaculato, elytris nigris, fasciis linearibus albis.* *Syst. Ent.* 193. 28. *plebeium.*

Leptura rustica thorace globofo tomentoso, elytris cinereis, fasciis linearibus albidis vndatis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 639. 17. *Fn. Sv.* 692.

Leptura nigra, elytrorum lineis transuersis punctisque albis. *Geoff. Inf.* 1. 215. 12.

Scarabaeus niger, elytris lineis duabus albis. *Raj. Inf.* 83. 25.

Petiv. Gazoph. tab. 63. fig. 5.

Schaeff. Icon. tab. 2. fig. 7.

Habitat in Europae hortis.

38. *C. thorace rotundato maculato, elytris mucronatis nigris, strigis tribus arcuatis flauis, basi ferrugineis.* *Syst. Ent.* 193. 29. * *mucronatum.*

Habitat in America. *D. Solander.*

39. *C. thorace rotundato subspinoso, elytris bidentatis fuscis, strigis quatuor flauis, femoribus clauatis compressis.* *Syst. Ent.* 194. 30. * *acuminatum.*

Habitat in America boreali. *D. Solander.*

40. *C. thorace rotundato flauo fasciato, elytris nigris, fasciis quinque flauis, pedibus ferrugineis.* *Syst. Ent.* 194. 31. *detritum.*

Leptura detrita thorace globofo nigricante, elytris fuscis, fasciis quatuor transuersis flauis, pedibus rufis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 640. 20. *Fn. Sv.* 694.

Leptura nigra, elytris pallido fuscis, signaturis flauis. *Geoff. Inf.* 1. 216.

Schaeff. Elem. tab. 76. fig. 2.

Icon. tab. 38. fig. 9.

tab. 64. fig. 3.

Habitat in Europae hortis.

41. *C. thorace rotundato nigrum, elytris glaucis basi nigro maculatis.* *glaucum.*

Habitat in India orientali. *Mus. Dom. Banks.*

Medium. Corpus totum nigrum pube glaucescente nitidum. Antennae breuissimae vix thorace longiores,

nigrac. Elytra obtusa, glauca basi maculis aliquot nigris.

trifasciatum. 42. C. thorace globoso ferrugineo, elytris nigris, fasciis tribus atris, prima annulari.

Habitat in Lusitania. *D. Gray.*

Statura omnino C. verbasci. Caput atrum antennis rufis. Thorax globosus, ferrugineus tomento cinereo tectus. Elytra atra fasciis tribus albis, prima annulari. Abdomen subtus annulis albis.

Verbasci. 43. C. thorace rotundato nigro maculato, elytris subvirescentibus, fasciis tribus nigris, prima lunari. *Syst. Ent.* 194. 32.

Leptura Verbasci thorace subovato nigro, elytris fasciis tribus nigris, prima femiannulata. *Linn. Syst. Nat.* 2. 640. 22.

Sulz. Hist. Inf. tab. 5. fig. 12.

Habitat in Europae australioris verbasco.

aegyptiacum. 44. C. thorace rotundato ferrugineo, elytris cinerascensibus, fasciis tribus fuscis, prima annulari. *Syst. Ent.* 194. 33. *

Habitat in Oriente. *Dom. Prof. Forstkahl.*

mysticum. 45. C. thorace rotundato, elytris fuscis, fasciis apiceque cinereis, basi rufis. *Syst. Ent.* 194. 34.

Leptura mystica thorace globoso tomentoso, elytris fusco cinereis antice rufis, fasciis linearibus arcuatis lateque canis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 639. 18. *Fn. Sv.* 693.

Leptura nigra, elytris maculis testaceis nigris albidis lineisque nigris et albicantibus variegatis. *Geoff. Inf.* 1. 217. 15.

Cerambyx albo fasciatus niger, thorace mutico subgloboso, elytris lineis tribus arcuatis fasciaque transversa griseis, antennis brevioribus. *Degeer Inf.* 5. 82. 19.

Cerambyx quadricolor. *Scop. Ent. carn.* 177.

Scarabaeus parvus, elytris triplici colore, rufo, albo, nigro. *Raj. Inf.* 83. 26.

Schaeff. Icon. tab. 2. fig. 9.

46. C. thorace rotundato nigrum, elytris fasciis duabus albis, elytrorum basi antennis tibiisque ferrugineis. *Alni.*
Syst. Ent. 195. 35.
Leptura Alni. *Linn. Syst. Nat.* 2. 639. 19.
 Habitat in Europa, Anglia.

52. DONACIA.

1. D. femoribus posticis clauatis dentatis. *Syst. Ent.* 195. 1. *crassipes.*
Leptura aquatica deaurata, antennis nigris, femoribus posticis dentatis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 637. 1. *Fn. Sv.* 677.
Leptura aquatica spinosa viridi deaurata, antennis nigris, pedibus fuscis, femoribus posticis magnis dentatis. *Degeer Inf.* 5. 140. 80. tab. 4. fig. 14. 15.
Stenocorus deauratus femoribus posticis dentatis. *Geoff. Inf.* 1. 229. 12.
Cantharis arundines frequentans prima. *Raj. Inf.* 100. 1.
Scarabaeus arboreus purpureo aureus medius. *Frisch. Inf.* 12. 33. tab. 6. fig. 2.
 Habitat in plantis aquaticis, nymphaeis, phellandriis, aliisque.
 Variat rarius femoribus posticis clauatis, muticis.
2. D. femoribus simplicibus. *Syst. Ent.* 195. 2. * *simplex.*
 Habitat in Anglia.

53. LEPTURA.

1. L. nigra villosa, elytris liuidis, futura puncto medio apiceque nigris. *punctata.*
 Habitat in Sibiria. *D. Pallas. Mus. Dom. Banks.*
 Differt a L. melanura, quamvis valde affinis. Corpus maius nigrum, tomento cinereo villosum. Elytra liuida, rarius testacea, futura, puncto medio apiceque nigris. Elytra apice rotundata nec emarginata.
2. L. nigra, elytris rubescentibus liuidisue, futura apiceque nigris. *melanura.*
Syst. Ent. 196. 1. *Linn. Syst. Nat.* 2. 637. 2. *Fn. Sv.* 671.

Leptura variabilis nigra, pedibus posticis corpore longioribus, elytris maris flauo testaceis apice nigris, feminae obscure rubris. *Degeer Inf.* 5. 137. 14.

Stenocorus niger, elytris rubescentibus liuidisue. *Geoff. Inf.* 1. 226. 7. tab. 4. fig. 1.

Leptura thorace nigro nitido, elytris obsolete sordideque flauescentibus. *Gad. Diss.* 27.

Cerambyx niger elytris flauis, extremitatibus nigris. *Raj. Inf.* 97. 6.

Capricornus exiguus, vaginis rubescentibus apice nigro. *Petiv. Gazoph.* tab. 30. fig. 5.

Schaeff. Icon. tab. 39. fig. 4.

Habitat in Europa frequens in floribus.

liuida. 3. *L. nigra*, elytris testaceis immaculatis, pedibus nigris. *Gen. Inf. Mant.* 232. *

Habitat in floribus Kiloniensibus. *Dom. Lund.*

sanguinolenta. 4. *L. nigra*, elytris sanguineis. *Syst. Ent.* 196. 2. *Linn. Syst. Nat.* 2. 638. 4. *Fu. Sv.* 679.

Scopol. carn. 150.

Schaeff. Icon. tab. 39. fig. 9.

Habitat in Europae floribus.

villica. 5. *L. ferruginea*, antennis elytrisque fuscis. *Syst. Ent.* 196. 3. *

Habitat in Anglia. *Mus. Brit.*

rubra. 6. *L. nigra*, thorace elytris tibiisque purpureis. *Syst. Ent.* 196. 4. *Linn. Syst. Nat.* 2. 638. 3. *Fu. Sv.* 500.

Leptura nigra thorace elytris tibiisque obscure rufis. *Degeer Inf.* 5. 132. 7.

Scarabaeus arboreus maior purpureo ruber. *Frisch. Inf.* 12. tab. 3. fig. 6.

Sulz. Hist. Inf. tab. 5. fig. 30.

Schaeff. Icon. tab. 39. fig. 2.

Habitat in Europae floribus.

testacea. 7. *L. nigra*, elytris testaceis, tibiis rufis, thorace postice rotundato. *Syst. Ent.* 197. 5. *Linn. Syst. Nat.* 2. 638. 5. *Fu. Sv.* 680.

Leptura nigra, elytris tibiis pedibusque flauo testaceis. *Degeer Inf.* 5. 135. 11.

Schaeff. Icon. tab. 39. fig. 3.

Habitat in Europa boreali.

8. *L. sericeo virefcens*, antennis fusco viridique variis. *virens.*
Syst. Ent. 197. 6.

Leptura virens viridi flaua, antennis luteo viridique flauis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 638. 7. *Fn. Sv.* 682.

Leptura flauo viridis, antennis nigro luteoque variis.
Degeer Inf. 5. 131. 6.

Habitat in Europa boreali.

9. *L. corpore toto nigro.* *Syst. Ent.* 197. 7. * *atra.*

Leptura Aethiops. *Pod. Mus.* p. 28.

Stenocorus totus niger. *Geoff. Inf.* 1. 228. 10.

Habitat in Europa australiori.

Variat pedibus nigris et testaceis.

10. *L. nigra*, scutello albo. *scutellata.*

Habitat in Italia. *Dr. Allioni.*

Maior *L. atra.* Corpus nigrum solo scutello albo. Elytra apice emarginata. Abdomen sericeo albo nitet.

11. *L. nigra*, antennis pedibusque rufis. *ruficornis.*

Habitat in Italia. *Dr. Allioni.*

Minuta. Corpus totum nigrum pube flauescente sericeum. Antennae rufae. Pedes rufi femoribus posticis apice nigris.

Variat femoribus omnibus apice nigris.

12. *L. nigra*, elytrorum margine tibiisque posticis rufis. *marginata.*

Habitat in Norwegia. *Dom. Lund.*

Statura *L. nigrae.* Corpus totum nigrum, obscurum exceptis margine elytrorum tibiisque posticis rufis.

13. *L. clytris attenuatis*, corpore nigro nitido, abdomine rubro. *Syst. Ent.* 197. 8. *Linn. Syst. Nat.* 2. 639. 14.

Fn. Sv. 689. *Degeer Inf.* 5. 144. 24.

Stenocorus niger nitidus, abdomine fusco rubente.
Geoff. Inf. 1. 227. 9.

Schaeff. Icon. tab. 39. fig. 7.

Habitat in Europa floribus.

- luteicornis*. 14. *L. lutea*, thorace lineis duabus, elytris fasciis quatuor nigris. * *Syst. Ent.* 197. 9. *
Habitat in Carolina. *Mus. Brit.*
- 4maculata*. 15. *L. nigra*, elytris lividis, maculis quatuor nigris. *Syst. Ent.* 197. 10. *Linn. Syst. Nat.* 2. 638. 9. *Fn. Sv.* 684. *Schaeff. Elem.* tab. 118. fig. 2.
Icon. tab. 1. fig. 7.
Habitat in Europae plantis.
- 6maculata*. 16. *L. nigra*, coleoptris testaceis, maculis sex nigris margine connexis. *Syst. Ent.* 197. 11. *Linn. Syst. Nat.* 2. 638. 11. *Fn. Sv.* 686.
Leptura testaceo maculata nigra fasciis tribus elytrorum transuersis undulatis testaceo flavis. *Degeer Inf.* 5. 133. 9.
Scarabaeus elytris pallidis nigris maculis pictis. *Raj. Inf.* 81. 18.
Habitat in Europae plantis.
- 12maculata*. 17. *L. nigra*, elytris flavis, maculis quinque flavis.
Habitat in Sibiria. *D. Pallas. Mus. Dom. Banks.*
Statura *L. 6maculatae*, at paullo maior. Corpus totum nigrum, immaculatum. Elytra laevia, glabra, flava maculis sex nigris, 1. ad scutellum, 2. ad marginem anteriorem, 3. ad marginem interiorem, 4. ad marginem posteriorem, 5. in medio, 6. ad apicem. Pedes nigri.
- attenuata*. 18. *L. elytris attenuatis flavis, fasciis quatuor nigris, pedibus testaceis.* *Syst. Ent.* 198. 12. *Linn. Syst. Nat.* 2. 639. 13. *Fn. Sv.* 688.
Prionus attenuatus. *Scop. Ann. Hist. nat.* 5. 99. 66.
Schaeff. Icon. tab. 39. fig. 6.
Habitat in Europa.
Fascia elytrorum anterior variat mox integra, mox interrupta, interdum omnino deest.
- 4fasciata*. 19. *L. nigra*, elytris testaceis, fasciis quatuor dentatis nigris. *Syst. Ent.* 198. 13. *Linn. Syst. Nat.* 2. 639. 12. *Fn. Sv.* 687.

Leptura octomaculata nigra maculis quatuor flavis in
singulo elytro. *Degeer Inf.* 5. 132. 8. tab. 4. fig. 11.

Cerambyx fasciatus. *Scop. carn.* 172.

Schaeff. Icon. tab. 59. fig. 6.

Habitat in Europa.

Affinis praecedenti, feminam credit *Scopoli*.

20. *L. nigra* subuillofa, elytris testaceis nigro punctatis, *dubia*.
pedibus nigris.

Habitat in Sibiria. *D. Pallas. Mus. Dom. Banks.*

Nimis affinis videtur *L. attenuatae*. Corpus totum ni-
grum tomento fuluo nitidulum. Elytra glabra, te-
stacea antice punctis tribus parvis, intermedio an-
teriore, in medio puncto maiusculo, et versus api-
cem altero paullo minori. Pedes nigri.

21. *L. nigra*, elytris maculis tribus flavis. *Syst. Ent. sexgutta*
198. 14. * *ta.*

Habitat in Germania. *Dom. de Hattorf.*

22. *L. viridi* coerulea, elytris subfastigiatis.* *Syst. Ent. sericea*.
198. 15. *Linn. Syst. Nat.* 2. 638. 8. *Fn. Sv.* 683.

Schaeff. Icon. tab. 84. fig. 1.

Habitat in Europa boreali.

23. *L. thorace* globoso abdomineque rubris, elytris nigris. *collaris*.
Syst. Ent. 198. 16. *Linn. Syst. Nat.* 2. 639. 16. *Fn.*

Sv. 691. *Scop. carn.* 159.

Leptura ruficollis nigra thorace abdomineque rufis.

Degeer Inf. 5. 143. 22.

Stenocorus niger thorace rubro. *Geoff. Inf.* 1. 228. 11.

Schaeff. Icon. tab. 58. fig. 9.

Habitat in Europa.

24. *L. thorace* globoso nigro, elytris violaceis, abdomi- *virginica*.
ne rufo. *Syst. Ent.* 198. 17. *Linn. Syst. Nat.* 2. 639.
15. *Fn. Sv.* 690.

Leptura violacea nigra, elytris violaceis nitidis, abdo-
mine flavo rufo. *Degeer Inf.* 5. 144. 23.

Leptura nigra, elytris coerulefcentibus, toto abdomi-
ne rubro. *Gad. Diff.* 26.

Schaeff. Icon. tab. 58. fig. 8.

Habitat in Europa boreali.

abbreviata. 25. L. elytris dimidiatis ferrugineis immaculatis, antennis breuibus. *Syst. Ent.* 199. 18.

Necydalis maior. *Linn. Syst. Nat.* 2. 641. 1.

Necydalis ichneumonea nigra, elytris abbreviatis rufo fuscis, pedibus rufis, antennis corpore brevioribus. *Degeer Inf.* 5. 148. 1. tab. 5.*fig. 1.

Musca Cerambyx maior. *Schaeff. Monogr.* 1753. fig. 1. 2.

— — *Elem.* tab. 13. fig. 2.

— — *Icon.* tab. 10. fig. 10. 11.

Habitat in Europa.

variogata. 26. L. elytris abbreviatis, abdomine atro, fasciis fulvis. *Syst. Ent.* 199. 19. *

Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

dimidiata. 27. L. elytris dimidiatis testaceis, apice lineola alba, antennis longis. *Syst. Ent.* 199. 20.

Necydalis minor. *Linn. Syst. Nat.* 2. 641. 2. *Fn. Sv.* 857.

Necydalis ceramboides fusca, elytris abbreviatis, lineola abbreviata alba, capite thoraceque nigris, antennis rufis corpore longioribus. *Degeer Inf.* 5. 151. 2.

Musca Cerambyx minor. *Schaeff. Monogr.* 1753. fig. 6. 7.
Icon. tab. 95. fig. 5.

Sulz. Hist. Inf. tab. 7. fig. 51.

Habitat in Europa inprimis boreali.

umbellatarum. 28. L. elytris dimidiatis testaceis immaculatis, antennis longis. *Syst. Ent.* 199. 21.

Necydalis umbellatarum. *Linn. Syst. Nat.* 2. 641. 3.

Necydalis minima. *Scop. carn.* 180.

Necydalis elytris apice nigris. *Schreb. Inf.* 4.

Schaeff. Icon. tab. 95. fig. 4.

Sulz. Hist. Inf. tab. 6. fig. 1.

Habitat in Germaniae umbellatis.

54. LAMPYRIS.

1. *L. oblonga fusca*, clypeo cinereo. *Syst. Ent.* 200. 1. *noctiluca*.
Linn. Syst. Nat. 2. 643. 1. *Fn. Sv.* 699.
Lampyris noctiluca communis oblonga supra nigro
 fusca, subtus albido flava. *Degeer Inf.* 4. 31. 1. tab.
 1. fig. 19. 20.
Cantharis mas coleopterus. *Leche non. sp.* 23. 47.
 Habitat in Europae borealis iuniperetis.
2. *L. oblonga fusca*, clypeo apice hyalino. *Syst. Ent.* 200. 2. *splendidula*.
Lampyris splendidula oblongiuscula fusca, clypeo su-
 pra oculos fenestrato. *Linn. Syst. Nat.* 2. 644. 3.
Lampyris femina aptera. *Geoff. Inf.* 1. 166. 1.
Cassida noctiluca. *Scop. carn.* 118.
Scarabaeus lampyris fordide nigricans, corpore longo
 angusto. *Raj. Inf.* 78. 15.
Noctiluca terrestris. *Colum. ecphr.* 1. 38. fig. 36.
Mouff. Inf. p. 109. fig. 1. mas. fig. 2. fem.
Bradl. nat. tab. 26. fig. 3. A. mas. B. fem.
 Habitat in Europae sylvaticis, tempestate pluviosa im-
 primis lucem spargens.
 Vix a praecedente fatis distincta.
3. *L. obscure nigra*, clypeo vtrinque lunula rosea. *corusca*.
Lampyris corusca oblongiuscula fusca, clypeo vtrin-
 que intra marginem fulvo. *Linn. Syst. Nat.* 2. 644.
 2. *Vdm. Diff.* 47.
 Habitat in America boreali. *Mus. D. Blackburn.*
 Corpus totum obscure nigrum minime nitidum. Cly-
 peus vtrinque lunula rosea ab apice ad basin ducta.
4. *L. nigra*, clypeo vtrinque macula rufa. *Syst. Ent. obscura*.
 200. 3. *
 Habitat in Terra del Fuego. *Mus. Dom. Banks.*
5. *L. clypeo rufo medio nigro*, elytris nigris, margini-
 bus abdomineque albis. *Syst. Ent.* 200. 4. *pyralis*.
Lampyris pyralis oblonga fusca, elytris margine rufe-
 scentibus, clypeo intra marginem rufescente. *Linn.*
Syst. Nat. 2. 644. 4. *Mus. Lud. Flr.* 78.
Lampy-

1. Feminae totius generis apterae larvis simillimae.

Lampyris oblonga, elytris obscure fuscis margine rufescentibus, abdomine atro postice flauissimo, pedibus fuscis. *Degeer Inf.* 4. 52. 7. tab. 17. fig. 7.
Habitat in America meridionali.

marginata. 6. *L. oblonga nigra* thoracis elytrorumque margine omni scutello abdominisque postico flauis. *Syst. Ent.* 201. 5. *Linn. Syst. Nat.* 2. 644. 5.
Habitat in America meridionali.

pectinata. 7. *L. atra*, clypei lateribus basi exteriore, elytrorum abdominisque apicibus albis, antennis pectinatis. *Syst. Ent. App.* 824. *

Lampyris atra antennis pectinatis, thorace lateribus flauis, elytris striatis reticulatis. *Degeer Inf.* 4. 57. 11. tab. 17. fig. 13.

Cantharis pectinata clypei lateribus basique exteriori elytrorum luteis, antennis pectinatis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 649. 17.

Habitat in America meridionali.

flabellicornis. 8. *L. nigra*, clypeo ante marginem, elytris lineola marginali baseos abdomineque apice albis.

Habitat in Brasilia. *Mus. Dom. Banks.*

Magna. Antennae maximae valde pectinatae vel potius flabellatae. Clypeus niger ante marginem exteriorem et anticum pallidus. Elytra vix striata, nigra lineola pallida ante marginem exteriorem baseos. Corpus nigrum ano albo.

Hespera. 9. *L. ouata*, elytris fuscis, macula marginali triangulari flaua. *Syst. Ent.* 201. 6. *Linn. Syst. Nat.* 2. 644. 6.

Lampyris surinamensis ouata, elytris fuscis, macula marginali triangulari flaua, abdomine subtus fusco apice flauo. *Degeer Inf.* 4. 48. 1. tab. 17. fig. 1.

Habitat in America meridionali.

ignita. 10. *L. ouata*, elytris fuscis, macula marginali ouata lutea. *Syst. Ent.* 201. 7. *Linn. Syst. Nat.* 2. 645. 7.

Lampyris ouata, elytris fuscis, macula marginali ouata flaua, abdomine subtus toto flauo. *Degeer Inf.* 4. 49. 2. tab. 17. fig. 2.

Habitat in America meridionali.

11. *L. oblonga*, elytris fuscis, margine exteriori luteo, abdomine flavo. *Syst. Ent.* 201. 8. *Linn. Syst. Nat.* 2. 645. 8. *lucida.*
Cantharis lucida. Degeer *Inf.* 4. 51. 5. tab. 17. fig. 5.
Cantharis lucida. Sulz. *Hist. Inf.* tab. 5. fig. 22.
 Habitat in America meridionali.
12. *L. oblonga fusca*, thorace flavescente, macula media nigra, abdomine apice maculis duabus flavis. *nitidula.*
 Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*
 Statura praecedentium. Caput atrum. Clypeus flavus macula media fusca. Elytra vix striata, fusca, immaculata. Abdomen fuscum apice siue ultimo segmento subtus maculis duabus flavis.
13. *L. oblonga subtestacea*, abdomine atro postice flavissimo. *Syst. Ent.* 201. 9. *Linn. Syst. Nat.* 2. 645. 9. *phosphorea.*
Lampyris oblonga, elytris fuscis margine exteriori flavis, abdomine atro postice flavissimo, pedibus testaceis. Degeer *Inf.* 4. 51. 6. tab. 17. fig. 6.
 Habitat in America meridionali.
14. *L. liuida*, thorace flavescente, abdomine postice flavissimo. *Syst. Ent.* 201. 10. * *capensis.*
 Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*
 Variat thorace maculis duabus fuscis.
15. *L. flavicans*, capite elytris fuscis. *Syst. Ent.* 201. *australis.*
 11. *
 Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
16. *L. elytris fuscis*, thorace transverso rufo. *Syst. Ent.* *italica.*
 202. 12.
Lampyris italica elytris fuscis, clypeo antice transverso rufo medio nigro. *Linn. Syst. Nat.* 2. 645. 11.
 **Lampyris oblonga*, elytris nigro fuscis, thorace rufo, macula nigra in medio, capite nigro. Degeer *Inf.* 4. 53. 9. tab. 17. fig. 9. 10.
Sulz. Hist. Inf. tab. 6. fig. 3.
 Habitat in Italiae arboribus.
 In nostra thorax immaculatus.

- mauritanica*. 17. *L. elytris* liuidis, corpore flauo. *Syst. Ent.* 202. 13.
Linn. Syst. Nat. 2. 645. 10.
 Habitat in Africae plantis.
- depressa*. 18. *L. fusca*, clypei elytrorumque margine dilatato plano.
 Habitat in Coromandel. *Mus. Dom. Banks.*
 Magna tota fusca minime nitida. Margo et clypei, et
 elytrorum valde dilatatus, planus vix reflexus. Elytra
 striata vnica in medio eleuata. Antennae extrorsum
 parum crassiores.

55. P Y R O C H R O A.

- coccinea*. 1. *P. nigra*, thorace elytrisque sanguineis immaculatis.
Syst. Ent. 202. 1.
Pyrochroa. Geoff. Inf. 1. 338. 1. tab. 6. fig. 4.
Lampyrus coccinea nigra thorace elytrisque sanguineis,
 elytris striatis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 646. 18. *Fu. Sv.* 705.
Lampyrus villosa nigra, thorace elytrisque villosis rubris.
Degeer Inf. 4. 47. 4.
Schaeff. Icon. tab. 90. fig. 4.
 Habitat in Europae sepibus.
 Variat capite nigro aut rufo. Elytra in nostris nullo
 modo striata, vti et *Linné* in *Fu. Sv.* testatur.
 Conf. *Cantharis pectinicornis* thorace orbiculato, elytris
 rufo testaceis, antennis pectinatis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 650. 20. *Fu. Sv.* 715.
- sanguinea*. 2. *P. nigra*, thoracis lateribus elytrisque sanguineis. *Syst. Ent.* 202. 2.
Lampyrus sanguinea. Linn. Syst. Nat. 2. 646. 17. *Fu. Sv.* 704.
Lampyrus elytris rubris, thorace rubro, nigra macula.
Geoff. Inf. 1. 168. 3.
Lampyrus sanguinea nigra, thorace rubro maculis
 quinque nigris, elytris rubris venis reticulatis. *Degeer Inf.* 4. 452. tab. 2. fig. 1.
Cassida sanguinea. Scopol. carn. 119.
Cantharis prioribus similis quarta, *Raj. Inf.* 101.

Scarabaeus arboreus parvus ruber, elytris longis, clypeo pectorali linea nigra. *Frisch. Inf.* 12. 40. 3. tab. 7. fig. 2.

Schaeff. Icon. tab. 7. fig. 1.

Habitat in Europae lapidosis.

3. *P. fanguinea*, elytris postice violaceis. *Syst. Ent. bicolor.* 203. 3.

Lampyris bicolor. *Lin. Syst. Nat.* 2. 646. 16.

Cantharis bicolor. *Amoen. acad.* 6. 395. 21.

Habitat in Africa.

4. *P. atra*, thoracis margine flauo, elytris flauis, fascia apiceque nigris. *Syst. Ent.* 203. 4. * *reticulata.*

Habitat in America boreali.

5. *P. flaua*, elytris macula marginali posticeque nigris, margine laterali maximo dilatato. *Syst. Ent.* 203. 5. * *latissima.*

Lampyris latissima. *Lin. Syst. Nat.* 2. 646. 14.

Habitat ad Sierra Leon Africae.

6. *P. clytris coriaceis latissimis testaceis apice nigris.* *Syst. Ent.* 203. 6. * *palliat.*

Habitat ad Cap. bon. sp. *Dom. Travts.*

7. *P. nigra*, thoracis lateribus elytrisque dilatatis flauis antice posticeque nigris. *Syst. Ent.* 203. 7. * *rostrata.*

Lampyris rostrata elytris testaceis antice posticeque nigris. *Lin. Syst. Nat.* 2. 646. 15. *Mus. Lud. Vlr.* 78.

Lampyris rostrata ouata, elytris flauo fuluis antice posticeque nigris, thorace flauo, macula nigra, capite rostrato. *Degeer Inf.* 7. 622. 19. tab. 46. fig. II

Habitat in Africae plantis.

8. *P. nigra*, thoracis lateribus elytrisque flauis postice nigris. *proboscidea.*

Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*

Statura et summa affinitas *P. rostratae*, a qua tamen differt elytris minus dilatatis, apice tantum nigris.

- ferrati-*
cornis. 9. *P. nigra*, thorace elytrisque rufescentibus, elytris apice nigris. *Syst. Ent.* 203. 8. *
- Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
- Species 5 — 8 ob os porrectum, cylindricum rostrum simulans, singulares, attamen huius generis.

56. L Y M E X Y L O N.

- testaceum.* 1. *L. rufum*, pedibus nigris.
- Habitat - - - - *Mus. Dom. Banks.*
- Antennae defunt. Corpus magnum, cylindricum rufo testaceum pedibus folis nigris femoribus basi ferrugineo testaceis.
- dermestoides.* 2. *L. testaceum*, oculis alis pectoreque nigris. *Syst. Ent.* 204. 1.
- Cantharis dermestoides* testacea oculis alis pectoreque nigris, antennis longitudine thoracis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 650. 25. *Fn. Sv.* 702.
- Habitat in Europa media.
- Abdomen nigrum apice testaceum.
- nauale.* 3. *L. luteum*, elytris margine apiceque nigris. *Syst. Ent.* 204. 2.
- Cantharis naualis* thorace teretiufculo, corpore luteo, elytris margine apiceque nigris. *Linn. Syst. Nat.* 2. 650. 26. *Fn. Sv.* 718. *It. Westr.* 155. tab. 2.
- Frisch. Inf.* 13. 24. tab. 20.
- Schaeff. Icon.* tab. 59. fig. 1.
- Habitat intra quercus lignum, quod destruit.
- proboscideum.* 4. *L. nigrum*, elytris testaceis apice nigris, palpis hamato irregularibus.
- Habitat in Germaniae lignis. *Dom. de Hattorf.*
- Forte proprii generis insectum. Caput et thorax plana, depressa, nigra, immaculata. Palpi porrecti nigri articulo penultimo maiori, subtus appendiculo quato, irregulari, fisso, ultimo arcuato hamato, acuto. Elytra laeuius, testacea apice nigra. Abdomen nigrum apice testaceum.

57. C V C V I V S.

1. C. thorace denticulato rufo, pedibus simplicibus ni- *depressus*.
gris. *Syst. Ent.* 204. 1. *
Habitat in Germania. *Dom. de Hattorf*.
2. C. ruber, thorace sulcato, femoribus clauatis rufis. *clauipes*.
Gen. Inf. Mant. 233. *
Habitat in America boreali. *Dom. Teats*.
3. C. thorace denticulato rufo, elytris nigris, antennis fi- *dubius*.
lifformibus longitudine corporis. *Gen. Inf. Mant.*
233.
Habitat in America boreali.
De genere adhuc haereo.
4. C. thorace denticulato nigro, pedibus flavescentibus, *flauipes*.
antennis filiformibus longitudine corporis. *Iter.*
Norwag. d. 14. Jun. *
Habitat in arborum truncis decorticatis Norwagiae
d. 14. Jun.
5. C. thorace mutico nigro, puncto vtrinque impresso, *muticus*.
elytris striatis fuscis.
Habitat in Germania. *Dom. de Hattorf*.
Statura depressa praecedentium. Antennae filiformes
corpore breuiores. Caput et thorax atra, immacu-
lata, ad basin thoracis puncta duo impressa. Elytra
filiformia, striata, obscura siue fusca. Pedes simpli-
ces, nigri.

58. C A N T H A R I S.

1. C. thorace marginato rubro, macula nigra, elytris *fusca*.
fuscis. *Syst. Ent.* 205. 1. *Linn. Syst. Nat.* 2. 647. 2.
Fn. Sv. 700.
Cantharis sepiarius maior, elytris nigricantibus. *Raj.*
Inf. 84. 29.
Cicindela elytris nigricantibus, thorace rubro nigra
macula. *Geoff. Inf.* 1. 170. 1.
Fabr. Spec. Inf. R *Thele-*

Thelephorus fuscus thorace flavo rubro macula nigra, elytris obscuris cinereo nigris. *Degeer Inf.* 4. 60. 1. tab. 2. fig. 12.

Frisch. Inf. 12. 3. tab. 6. fig. 5.

Sulz. Hist. Inf. tab. 5. fig. 33.

Schaeff. Elem. tab. 123. fig. 1. 2.

Icon. tab. 16. fig. 10.

tab. 26. fig. 9 — 12.

Habitat frequens in Europae sepibus.

Animal rapacissimum in propriam speciem facuit.

livida. 2. *C.* thorace marginato tota testacea. *Syst. Ent.* 205. 2.

Linn. Syst. Nat. 2. 647. 3. *Fn. Sv.* 701.

Cantharis sepiarius maior e rufo flavicans, elytris non maculatis. *Raj. Inf.* 84. 28.

Cicindela thorace rubro immaculato, geniculis posticis nigris. *Geoff. Inf.* 1. 171. 2.

Thelephorus flavus thorace flavo rufo, elytris testaceis femorum posteriorum apice nigro. *Degeer Inf.* 4. 70. 2.

Habitat in Europa, America boreali.

Nimis praecedenti affinis.

obscura. 3. *C.* thorace marginato, marginibus rubris, corpore nigro. *Syst. Ent.* 205. 3. *Linn. Syst. Nat.* 2. 648. 5.

Fn. Sv. 706. *At. Nidros.* 3. 396. tab. 6. fig. 5.

Schaeff. Icon. tab. 16. fig. 8.

Habitat in Europa boreali.

Variat thoracis margine rubro et pallide fusco pedibus rubris et nigris.

limbata. 4. *C.* thorace marginato, fronte elytrorumque marginibus rufis, corpore nigro.

Habitat in Iamaica. *Mus. Dom. Banks.*

Media. Antennae nigrae. Caput rufum vertice nigro.

Thorax marginatus, rufus, immaculatus. Elytra laevia, atra margine omni rufo. Corpus atrum.

lateralis. 5. *C.* thorace marginato rubro, corpore fusco, elytris margine exteriori flavescentibus. *Syst. Ent.* 206. 4.

Linn. Syst. Nat. 2. 648. 6. *Fn. Sv.* 707.

Habitat in Europa boreali.

6. C. thorace marginato flauo macula viridi, elytris viridibus nitidis. *smaragduia.*
 Habitat in Brasilia. *Mus. Dom. Banks.*
 Media. Caput flauescens basi nigrum. Antennae flauescētes apice parum fuscescentes. Thorax marginatus, flauus, macula in medio magna, sinuata, virescēti et praeterea punctis vtrinque duobus. Elytra laeuiā, viridia, nitida. Abdomen et pedes flaua. Pectus fuscum.
7. C. thorace marginato, corpore toto atro. *Syst. Ent. 206. atra.*
 5. *Linn. Syst. Nat. 2. 649. 16.*
 Habitat in Europa boreali.
8. C. thorace marginato nigra, thoracis elytrorumque marginibus rubris. *Syst. Ent. 206. 6. * marginata.*
 Habitat in America. *Dom. Eaton.*
9. C. thorace marginato ferrugineo, macula nigra, elytris testaceis, macula apicis nigra. *2maculata.*
 Habitat in America septentrionali. *Mus. Dom. Banks.*
 Antennae nigrae. Caput nigrum mandibulis basi flauis. Thorax marginatus flauus in medio macula magna nigra. Elytra laeuiā, testacea macula magna apicis nigra. Corpus nigrum, abdominis segmentis apice flauis. Pedes nigri. Femora interdum rufa.
10. C. thorace marginato, atra elytris pallidis apice fuscis. *pallipes.*
 Habitat in Germania. *Dom. de Hattorf.*
 Statura praecedentium. Caput atrum palpis pallidis. Antennae fuscae basi pallidae. Thorax marginatus ater. Elytra glabra pallida apice fusca. Pedes pallidi.
11. C. atra, thorace abdomineque rufis. *Syst. Ent. 206. 7.* ruficollis.*
Sulz. Hist. Inf. tab. 6. fig. 6.
 Habitat in Anglia.
12. C. testacea, capite thoracis macula media elytrisque dimidiato nigris. *flauipes.*
 Habitat in China. *Mus. Dom. Banks.*
 Magna. Antennae defunt. Caput nigrum macula inter antennas tridentata testacea. Elytra glabra, nitida

tida basi testacea, apice nigra margine tamen testaceo. Pedes testacei.

- melanocephala*. 13. C. testacea, capite elytrorum apicibus tibiisque nigris. Habitat in Coromandel. *Mus. Dom. Banks*.
Magna. Caput cum antennis atrum, immaculatum. Thorax marginatus, testaceus, immaculatus. Elytra laevia, testacea, apice nigra. Abdomen testaceum. Pedes nigri femoribus testaceis.
- punctata*. 14. C. thorace marginato, punctis duobus nigris, elytris testaceis apice nigris. *Syst. Ent.* 206. 8. *
Habitat Lipsiae.
- nigripes*. 15. C. thorace rotundato lutea, abdomine pedibus, elytrorumque apicibus atris.
Habitat in Europa boreali. *Dom. Lund*.
Caput et thorax lutea. Antennae fuscae et punctum fuscum inter antennis. Elytra pallide testacea, apice nigra. Abdomen et pedes atra. Similis C. melanurae, attamen omnino distincta.
- melanura*. 16. C. thorace rotundato, corpore luteo, elytris apice nigris. *Syst. Ent.* 206. 9. *Linn. Syst. Nat.* 2. 651. 27. *Fn. Sv.* 719.
Cantharis sepiarius, elytrorum apicibus nigris. *Raj. Inf.* 84. 27.
Cicindela rubra, elytris testaceis apice nigris. *Geoff. Inf.* 1. 173. 5.
Schaeff. Icon. tab. 16. fig. 14.
Habitat in Europae hortis.
- pulicaria*. 17. C. thorace marginato rufo, macula nigra, elytris atris. Habitat in Germania. *Dom. de Hattorf*.
Parua tota atra, exceptis thoracis marginibus tentaculisque abdominalibus.
- minima*. 18. C. thorace marginato rufo, macula nigra, corpore fusco, elytris apice flavis. *Syst. Ent.* 207. 10. *Linn. Syst. Nat.* 2. 649. 12. *Fn. Sv.* 713. *Scop. carn.* 128.
Necydalis elytris puncto flavo. *Geoff. Inf.* 1. 372. 1. tab. 7. fig. 2.
Habitat in Europae hortis.

19. C. thorace marginato flavo, macula nigra, corpore nigro, elytris pedibusque liuidis. *Syst. Ent.* 207. 11. *testacea.*
Linn. Syst. Nat. 2. 649. 15. *Fn. Sv.* 714.
Cicindela nigra, thoracis margine flavo, elytris pedibusque pallidis. *Geoff. Inf.* 1. 173. 6. b.
Thelephorus niger, thorace rufescente, macula nigra, elytris testaceis, tibiis flavis. *Degeer Inf.* 4. 71. 4.
Scop. carn. 123.
Schaeff. Icon. tab. 52. fig. 8.
 Habitat in Europae hortis.

20. C. thorace marginato medio atro, elytris abbreviatis nigris apice flavis. *Syst. Ent.* 207. 12. *biguttata.*
Linn. Syst. Nat. 2. 648. 11. *Fn. Sv.* 712.
Cicindela fusca, elytris apice flavis, thorace fusco. *Geoff. Inf.* 1. 176. 11.
Thelephorus niger, femoribus flavis, elytris apice luteis. *Degeer Inf.* 4. 77. 10.
 Habitat in Europae nemoribus, hortis.

59. MALACHIVS.

1. M. corpore viridi aeneo, elytris extrorsum sanguineis. *aeneus.*
Syst. Ent. 207. 1.
Cantharis aenea thorace marginato, corpore viridi aeneo, elytris extrorsum vndique rubris. *Linn. Syst. Nat.* 2. 648. 7. *Fn. Sv.* 708.
Cicindela viridi aenea, elytris extrorsum rubris. *Geoff. Inf.* 1. 174. 7.
Thelephorus aeneus viridi aeneus, elytris extrorsum rubris, capite antice flavo. *Degeer Inf.* 4. 73. 6. tab. 2. fig. 16. 17.
Scarabaeus minor, corpore longiusculo, elytris rubicundis. *Raj. Inf.* 77. 12.
Schaeff. monogr. 1754. tab. 2. fig. 10. 11.
Icon. tab. 18. fig. 12. 13.
Sulz. Hist. Inf. tab. 6. fig. 5.
 Habitat in Europae plantis.
 Exferit tentacula duo basi connata, obtusa, sanguinea vtrinque ad basin abdominis, et duo alia ad apicem thoracis.

Varietas minor elytris fere totis sanguineis 4 hebdomades ferior prouenit, vix tamen distincta species.

- 2pustulatus*. 2. M. aeneo viridis, elytris apice rubris. *Syst. Ent.* 208. 2.
Cantharis 2pustulata thorace marginato, corpore aeneo viridi, elytris apice rubris. *Linn. Syst. Nat.* 2. 648. 8. *Fn. Sv.* 709.
Cantharis vix $\frac{3}{8}$ vnciae longa. *Raj. Inf.* 101. 7.
Cicindela aeneo viridis, elytris apice rubris. *Geoff. Inf.* 1. 175. 8.
Thelephorus viridi aeneus, nitidus, elytris apice rubris. *Degeer Inf.* 4. 75. 7.
Schaeff. Icon. tab. 18. fig. 10. 11.
 tab. 19. fig. 14.
 Habitat in Europa frequens.
 Vicitat rapina minimorum insectorum.
- pedicularius*. 3. M. ater, elytris apice rubris. *Syst. Ent.* 208. 3.
Cantharis pedicularia thorace marginato, corpore atro, elytris apice rubris. *Linn. Syst. Nat.* 2. 648. 9. *Fn. Sv.* 710.
 Habitat in Europae hortis.
 Pediculo paullo maior.
- pulicarius*. 4. M. niger, thorace margine elytrisque apice rubris. *Gen. Inf. Mant.* 133. *
 Habitat in Kiliae nemoribus. *Dom. Lund.*
- fasciatus*. 5. M. elytris nigris, fasciis duabus rubris. *Syst. Ent.* 208. 4.
Cantharis fasciata thorace subrotundo virescente, elytris nigris, fasciis duabus rubris. *Linn. Syst. Nat.* 2. 648. 10. *Fn. Sv.* 711.
Cantharis valde exigua. *Raj. Inf.* 102. 22.
Cicindela elytris nigris, fasciis duabus rubris. *Geoff. Inf.* 1. 177. 12.
Thelephorus thorace obscure viridi aeneo, elytris nigris, fasciis duabus transuersis rubris. *Degeer Inf.* 4. 76. 9.
Schaeff. Icon. tab. 189. fig. 3.
 Habitat in Europae muscis.

60. N E C Y D A L I S.

1. N. thorace teretiufculo, corpore viridi. *Syst. Ent. viridissima.*
208. 1.
Cantharis viridissima. Linn. *Syst. Nat.* 2. 650. 23. *Fn.*
Sv. 717.
Cantharis viridi aenea nitida, antennis nigris thorace
tereti clongato. *Degeer Inf.* 5. 15. 3. tab. 1. fig. 13.
Cicindela viridi coerulea. *Geoff. Inf.* 1. 177. 14.
Habitat in Europae hortis frequens.
2. N. thorace teretiufculo, corpore coeruleo subopaco. *coerule-*
Syst. Ent. 208. 2. *scens.*
Cantharis coerulea. Linn. *Syst. Nat.* 2. 650. 22. *Fn.*
Sv. 716.
Thelephorus villosus violaceo coeruleus, antennis pe-
dibusque nigris. *Degeer Inf.* 4. 76. 8.
Habitat in Europa boreali.
3. N. thorace teretiufculo abdomineque rufis, capite ely- *ruficollis.*
trisque viridi aeneis.
Habitat in Italia. *Dr. Allioni.*
Statura et magnitudo omnino N. coerulefcentis. Caput
viride, nitidum antennis nigris. Thorax teretiufcu-
lus, rufus, nitidus, immaculatus. Elytra viridia.
Abdomen rufum. Pedes nigri.
4. N. elytris subulatis nigra, femoribus omnibus clauatis. *atra.*
Syst. Ent. 209. 3. Linn. *Syst. Nat.* 2. 642. 5.
Habitat in Europa australi.
Corpus totum nigrum, opacum, immaculatum.
5. N. elytris subulatis nigris basi flavis. *Syst. Ent.* 209. 4.* *humura-*
Cantharis nigra, elytris attenuatis antice flavis. *Geoff. lis.*
Inf. 1. 342. 2.
Necydalis muralis elytris subulatis fusca, humeris fla-
uis, pedibus simplicibus. *Forst. n. sp. Cent.* 1. 48. 48.
Habitat in Anglia.
6. N. elytris subulatis nigra, femoribus omnibus clauatis, *rufa.*
elytris antennisque rufis. *Syst. Ent.* 209. 5.

Necydalis rufa elytris subulatis nigra, femoribus omnibus clauatis, elytris antennisque rufis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 642. 6.

Leptura nigra, elytris pedibusque rubescentibus lividis, coleoptris attenuatis. *Geoff. Inf.* 220. 22.
Schaeff. Icon. tab. 94. fig. 8.

Habitat in Europa.

Scutellum album. Elytra basi puncto nigro.

coerulea. 7. *N.* elytris subulatis coerulea, femoribus posticis clauatis arcuatis. *Syst. Ent.* 209. 6. *Linn. Syst. Nat.* 2. 642. 4.

Cantharis viridi coerulea, elytris attenuatis, femoribus posticis globosis. *Geoff. Inf.* 1. 342. 3.

Cantharis nobilis. *Scop. Ent. carn.* 145.

Schaeff. Icon. tab. 94. fig. 7.

Sulz. Hist. Inf. 48. tab. 6. fig. 2.

Habitat in Europa australiori, Oriente.

Variat pedibus simplicibus.

Podagra-riae. 8. *N.* elytris subulatis testaceis, corpore nigro, femoribus posticis clauatis basi testaceis. *Syst. Ent.* 209. 7. *Linn. Syst. Nat.* 2. 642. 9.

Cantharis nigra, elytris attenuatis fulvis, femoribus posticis globosis. *Geoff. Inf.* 1. 343. 4.

Cantharis femorata. *Scop. carn.* 144.

Schaeff. Icon. tab. 85. fig. 7.?

β . *Necydalis flauescens* nigra, elytris testaceis subulatis, femoribus posticis clauatis. *Degeer Inf.* 5. 155. 4. *Linn. Syst. Nat.* 2. 642. 8.

Habitat in Aegopodio podagraria,

β . Vix distincta videtur.

simplex. 9. *N.* elytris subulatis testaceis, pedibus simplicibus. *Syst. Ent.* 210. 8.

Necydalis simplex. *Linn. Syst. Nat.* 2. 643. 10.

Cantharis phthysica. *Scop. carn.* 144.

Habitat in Europa.

Forte praecedentis mera varietas.

61. ELATER.

1. *E. fuscus*, antennarum fasciculo flabelliformi. *Syst. flabellicornis.*
Ent. App. 824. * *Linn. Syst. Nat.* 2. 651. 1.
 Habitat in India.
2. *E. albus nigro maculatus.* *Syst. Ent.* 210. 1. *speciosus.*
Elater speciosus albus lineis punctis maculisque nigris.
Linn. Syst. Nat. 2. 652. 2.
 Habitat in India.
3. *E. cinereo tomentosus*, elytris substriatis, plantis *luridus.*
 fuscis.
 Habitat in Coromandel. *Mus. Dom. Banks.*
 Corpus magnum totum cinereum, subtomentosum,
 plantis folis fuscis. Thorax punctatus. Elytra sub-
 striata.
4. *E. thorace ocellis duobus atris*, corpore nigro albo *oculatus.*
 maculato. *Syst. Ent.* 210. 2.
Elater oculatus thorace ocellis binis atris, iridibus al-
 bis, corpore nigricante. *Linn. Syst. Nat.* 2. 651. 3.
Elater niger thorace maculis binis ovatis villosis ater-
 rimis. *Degeer Inf.* 4. 159. 1. tab. 17. fig. 28.
Scarabaeus elasticus maior, capite bimaculato, *Petiv.*
Gazoph. tab. 10. fig. 4.
Aët. Angl. 246. 396. 13. et 271. 842. 32.
 Habitat in America meridionali.
5. *E. thorace ocellis binis atris*, corpore nigro immacu- *luscus.*
 lato. *Syst. Ent. App.* 824. *
 Habitat in America. *Dom. Drury.*
6. *E. ater*, thorace maculis duabus ocellaribus, elytris *coecus.*
 strigis duabus arcuatis punctoque postico ferrugi-
 neis. *Gen. Inf. Mant.* 235. *
 Habitat in Africa. *Dom. Lee.*
7. *E. thoracis lateribus macula flava glabra.* *Syst. Ent. noctilu-*
 210. 3. *Linn. Syst. Nat.* 2. 657. 4. *Mus. Lud. Vr.* 82. *cus.*
Elater fuscus, thoracis lateribus macula flava glabra
 convexa nitida. *Degeer Inf.* 4. 160. 2. tab. 18. fig. 1.

Elater maior fuscus phosphoricus. Brown. *Iam.* 432. tab. 44. fig. 10.

Scarabaeus medius fuscus, thorace angulato lucem emittente. Sloan. *Iam.* 2. 206. tab. 237. fig. 1.

Cocuias. Mouff. *Inf.* 112.

Habitat in America meridionali.

phosphoreus. 8. E. thorace postice maculis duabus flavis. *Syst. Ent.* 210. 4. *Linn. Syst. Nat.* 2. 652. 5.

Elater fusco castaneus, thorace postice maculis duabus flavis glabris, antennis pedibusque rufo fuscis. *Degeer Inf.* 4. 161. 3. tab. 18. fig. 2.

Habitat in America meridionali.

Præcedenti nimis affinis, quamuis duplo minor.

fuscipes. 9. E. ater, antennis pedibusque fuscis. *Syst. Ent.* 211. 5. *
Habitat in India orientali. D. Koenig.

ligneus. 10. E. ferrugineus, elytris mucronatis, antennis nigris. *Syst. Ent.* 211. 6. *Linn. Syst. Nat.* 2. 652. 7. *Amoen. acad.* 6. 395. 24.

Elater testaceus, thorace antice truncato, elytris postice acuminatis. *Gron. Zooph.* 477.?

Habitat in America meridionali.

ferrugineus. 11. E. thorace elytrisque ferrugineis, corpore thoracisque margine postico nigris. *Syst. Ent.* 211. 7. *Linn. Syst. Nat.* 2. 654. 20. *Fn. Sv.* 729.

Elater thorace elytrisque rubris. Geoff. *Inf.* 1. 130. 1. tab. 2. fig. 4.

Schaeff. Icon. tab. 19. fig. 1.

Habitat in Europa.

porcatus. 12. E. viridi aeneus, elytris fulcatis, fulcis villosis albis. *Syst. Ent.* 211. 8.

Elater porcatus fuscus, elytris nigris porcatis, fulcis elevatis glabris. *Linn. Syst. Nat.* 2. 652. 6.

Sulz. Hist. Inf. tab. 6. fig. 7.

Habitat in America meridionali.

Pectoris futura atra nitida.

fulcatus. 13. E. villosis albidus, elytris striis tribus elevatis glabris atris. *Gen. Inf. Mant.* 235. *

Habitat in America meridionali. Dom. Spengler.

14. E.

14. E. thorace atro nitido, elytris striatis nigris. *Syst. Ent.* 211. 9. *aterrimus.*
Elater aterrimus ater, thorace opaco punctato, elytris striatis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 653. 17. *Fn. Sv.* 726.
Elater totus niger nitidus. *Geoff. Inf.* 1. 136. 13.
 Habitat in Europa boreali.
15. E. thorace obscure cinereo, elytris cinereo nebulosis, plantis rufis. *Syst. Ent.* 211. 10. *Linn. Syst. Nat.* 2. 655. 22. *Fn. Sv.* 738. *murinus.*
Elater niger, elytris villoso murinis. *Geoff. Inf.* 1. 135. 10.
Elater rufipes nigro fuscus, maculis nebuloso villosis viridi griseis, plantis rufis. *Degeer Inf.* 4. 150. 10.
Schaeff. Icon. tab. 4. fig. 6.
 Habitat in Europa.
16. E. elytris aeneis maculis pallidioribus confertis, vnguibus rubris. *Linn. Syst. Nat.* 2. 655. 29. *Fn. Sv.* 739. *tessellatus.*
Elater niger villoso vndatus. *Geoff. Inf.* 1. 135. 9.
Elater rufo vnguiculatus fusco aeneus nitidus maculis villosis viridi griseis, antennis nigris vnguibus rufis. *Degeer Inf.* 4. 148. 7.
Elater thoracicus. *Scop. carn.* 282.
Elater niger pilis minimis flauo aeneis iunctim intermixtis. *Gad. Sat.* 80.
Schaeff. Icon. tab. 4. fig. 7.
 Habitat in Europae hortis.
 Scutellum pallidum.
17. E. thorace nigro pallidoque vario, elytris nigricantibus, fascia alba vndulata. *Syst. Ent.* 212. 12. *Linn. Syst. Nat.* 2. 655. 27. *Fn. Sv.* 737. *fasciatus.*
Scopol. carn. 281.
 Habitat in Europae hortis.
18. E. thorace elytrisque aeneis, antennis nigris simplicibus. *Syst. Ent.* 212. 13. *Linn. Syst. Nat.* 2. 655. 31. *aeneus.*
Fn. Sv. 740.

Elater aeneus rufipes viridi aeneus nitidus, pedibus fulvis. *Degeer Inf.* 4. 149. 8.

Act. Nidros. 3. tab. 4. fig. 6.

β. *Elater germanus*, thorace elytrisq. atro coeruleis, corpore toto pedibusq. nigris. *Linn. Syst. Nat.* 2. 655. 30. *Fn. Sv.* 730.

Elater nitens. *Scop. carn.* 279.

Elater latus. *Sulz. Hist. Inf.* tab. 6. fig. 8.

Habitat in Europae nemoribus.

pectinicornis. 19. E. thorace elytrisq. aeneis, antennis maris pectinatis. *Syst. Ent.* 212. 14. *Linn. Syst. Nat.* 2. 655. 32. *Fn. Sv.* 741.

Elater fusco aeneus. *Geoff. Inf.* 1. 133. 7.

Elater aeneo pectinicornis viridi aeneus obscurus nitidus, antennis pectinatis. *Degeer Inf.* 4. 145. 2. tab. 5. fig. 3.

Scarabaeus antennis articulatis septimus. *Raj. Inf.* 92. 7.

Scarabaeus e nigro virens, corniculis altero tantum versu pectinatis. *List. Angl.* 387. 19.

Sulz. Hist. Inf. tab. 5. fig. 36.

Bergstr. Nomencl. 1. tab. 13. fig. 11.

Schaeff. Icon. tab. 2. fig. 4.

Elem. tab. 11. fig. 1.

tab. 60. fig. 3.

Habitat in Europae nemoribus.

cupreus. 20. E. cupreus, elytris dimidiato flavis. *Syst. Ent.* 212. 15.*
Schaeff. Icon. 1. tab. 38. fig. 2.

Habitat in Anglia.

Antennae nigrae pectinatae rarius simplices.

cruciatus. 21. E. thorace nigro, lateribus ferrugineis, coleoptris flavis, cruce margineque nigris. *Syst. Ent.* 212. 16. *Linn. Syst. Nat.* 2. 653. 12. *Fn. Sv.* 722.

Elater thorace nigro circulo rubro, elytris fulvis cruce rubra. *Geoff. Inf.* 1. 133. 6.

Elater pedibus rufis, thorace nigro lateribus rubro, elytris fulvis, cruce maculisque binis nigris. *Degeer Inf.* 4. 149. 9.

Sulz. Hist. Inf. tab. 6. fig. 10.

Habitat in Europae graminosis.

22. E. thorace rufo, elytris fascia duplici alba, corpore nigro. *Syst. Ent.* 212. 17. *Linn. Syst. Nat.* 2. 653. 11. *Mus. Lud. Vlr.* 83. *syriacus.*
 Habitat in Oriente.
23. E. thorace testaceo pubescente, elytris flavis apice nigris, corpore nigro. *Syst. Ent.* 213. 18. *Linn. Syst. Nat.* 2. 654. 18. *Fn. Sv.* 727. *castaneus.*
Elater flavo pectinicornis thorace fusco pilis rufis, elytris flavis apice rufis, corpore subtus nigro, antennis pectinatis. *Degeer Inf.* 4. 153. 15.
Elater thorace villosa, elytris testaceis apice nigris. *Geoff. Inf.* 1. 132. 4.
Scarabaeus antennis articulatis. *Raj. Inf.* 92. 6.
Scarabaeus ex fusco rufescens f. *castaneus.* *List. Loqu.* 387.
Schaeff. Icon. tab. 11. fig. 9.
 tab. 31. fig. 4.
 Habitat in Europae campis.
24. E. niger, thorace glaberrimo rubro, elytris testaceis. *Syst. Ent.* 213. 19. *Linn. Syst. Nat.* 2. 654. 19. *Fn. Sv.* 728. *liuens.*
Schaeff. Icon. tab. 11. fig. 8.
 Habitat in Europa boreali.
25. E. thorace rufo medio fusco, elytris testaceis linearibus. *Syst. Ent.* 213. 20. *Linn. Syst. Nat.* 2. 655. 13. *linearis.*
Fn. Sv. 723.
Elater variabilis thorace rufo, capite corporeque nigris, elytris mari flavis, feminae fuscis flavo marginatis. *Degeer Inf.* 4. 154. 17.
Pontop. Atl. Dan. tab. 16.
 Habitat in Europa boreali.
26. E. piceus, thorace elytrisque obscure nigris. *Syst. Ent.* 213. 21. *obscurus.*
Elater obscurus thorace fusco obscuro, elytris obscure testaceis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 655. 25. *Fn. Sv.* 735.
 Habitat in Europae borealis plantis frequens.
 Color tristis, fuscus, minime nitidus.

- flauipes.* 27. E. thorace obscure nigro, elytris striatis fuscis, pedibus testaceis. *Syst. Ent.* 213. 22. *
Habitat in Americae insulis. *Dom. v. Rohr.*
- filiformis.* 28. E. cinereo fuscus immaculatus.
Habitat in Italia. *D. Allioni.*
Corpus filiforme, E. obscuro duplo minus, totum cinereo fuscum, immaculatum.
- tristis.* 29. E. thorace atro nitido, elytris basi margineque exteriore liuidis. *Syst. Ent.* 213. 23. *Linn. Syst. Nat.* 2. 655. 26. *Fn. Sv.* 736.
Schaeff. Icon. tab. 194. fig. 1.
Habitat in ligno putrescente.
- marginatus.* 30. E. thorace fusco, elytris testaceis margine vndique nigro. *Syst. Ent.* 213. 24. *Linn. Syst. Nat.* 2. 654. 23. *Fn. Sv.* 733.
Atf. Nidrosf. 3. 16. tab. 6. fig. 6.
Habitat in Europa boreali.
- mesomelus.* 31. E. thorace margineque elytrorum ferrugineis, corpore elytrisque nigris. *Syst. Ent.* 214. 25. *Linn. Syst. Nat.* 2. 653. 16. *Fn. Sv.* 725.
Habitat in Europa boreali.
Larua in ligno putrescente hexapoda, filiformis, duriuscula, caudae scuto corneo lateribus dentato, subtus tuberculo conico pediformi tubuloso. *D. Stroem.*
- thoracicus.* 32. E. niger, thorace toto rufo. *Syst. Ent.* 214. 26. *
Elater niger, thorace rufo. *Geoff. Inf.* 1. 132. 5.
Habitat prope Henly Anglorum.
Affinis sequenti.
- ruficollis.* 33. E. niger, thorace postice rubro nitido. *Syst. Ent.* 214. 27.
Elater ruficollis thorace rubro nitido antice nigro, elytris corporeque nigris. *Linn. Syst. Nat.* 2. 653. 14. *Fn. Sv.* 724.
Elater thorace rubro nitido antice nigro, elytris corporeque nigris. *Degeer Inf.* 4. 153. 16.

Scarabaeus elytris nigris, scapulis rubris. *Raj. Inf.*
92. 8.

Elater gramineus. *Scop. carn.* 290.

Schaeff. Icon. tab. 31. fig. 3.

Habitat in Europae graminosis.

34. *E. thorace rufo medio nigro*, elytris corporeque fer- *brunneus*.
ruginis. *Syst. Ent.* 214. 28.

Elater brunneus thorace nigro vtrinque rufo, elytris
corporeque ferrugineis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 653. 10.

Fn. Sv. 721.

Habitat in Europae hortis.

35. *E. niger*, thorace pubescente fuluo, elytris sanguineis. *haemato-*
des.

Gen. Inf. Mant. 235. *

Elater antennis pectinatis secundus. *Schaeff. Icon.* tab.
2. fig. 6. at thorax niger.

Elater sanguineus. *Sulz. Hist. Inf.* tab. 6. fig. 9.

Habitat Hamburgi.

36. *E. ater*, elytris sanguineis. *Syst. Ent.* 214. 29. *sangui-*

Elater sanguineus thorace atro, elytris rubris, corpo- *neus.*
re nigro. *Linn. Syst. Nat.* 2. 654. 21. *Fn. Sv.* 731.

Elater niger, elytris rubris. *Geoff. Inf.* 1. 131. 2.

Elater niger, elytris rubris. *Degeer Inf.* 5. 151. 13.

Scop. carn. 287.

Schaeff. Elem. tab. 60. fig. 2.

Icon. tab. 31. fig. 7.

Bergstr. Nomencl. tab. 10. fig. 10.

Habitat in Europae graminosis.

Elytrorum summus apex niger.

Variat rarius macula elytrorum magna communi atra.

37. *E. thorace rufo*, elytris antice dimidiato rufis, cor- *balteatus.*
pore nigro. *Syst. Ent.* 215. 30. *Linn. Syst. Nat.* 2.

654. 22. *Fn. Sv.* 732.

Elater niger, elytris antice dimidiato rufis postice ni-
gris. *Degeer Inf.* 4. 152. 14.

Scarabaeus minor, elytris bicoloribus e fuluo et ni-
gro saltatrix. *Raj. Inf.* 78. 23.

Schaeff. Icon. tab. 77. fig. 2.

Habitat in Europae aruis.

- melanocephalus.* 38. E. fanguineus, capite thoracis linea dorsali elytrorumque apicibus nigris.
Habitat in Coromandel. *Mus. Dom. Banks.*
Magnitudo et statura E. balteati. Caput et antennae nigra, immaculata. Thorax laevis, nitidus, fanguineus linea dorsali nigra, quae tamen basin haud attingit. Elytra punctato striata, fanguinea apice nigra. Corpus fanguineum abdominis apice nigro. Pedes fanguinei.
- spectator.* 39. E. thorace fusco nitido, elytris cinereis, corpore nigro. *Syst. Ent.* 215. 31. *Linn. Syst. Nat.* 2. 654. 24. *Fn. Sv.* 734. *Scop. carn.* 583.
Elater fuscus flavipes capite thoraceque nigris, elytris rufo fuscis, pedibus flavis, antennis rufis. *Degeer Inf.* 4. 151. 11.
Schaeff. Icon. tab. 19. fig. 11.
Habitat in Europa boreali.
- striatus.* 40. E. niger, elytris fuscis lineatis. *Syst. Ent.* 215. 32. *
Habitat in Sueciae graminosis.
- minutus.* 41. E. thorace atro nitido, elytris nigris. *Syst. Ent.* 215. 33. *Linn. Syst. Nat.* 2. 656. 34. *Fn. Sv.* 744.
Habitat in Europae plantis.
Paruus, niger, nitidus, immaculatus.
- limbatus.* 42. E. thorace atro nitido, elytris testaceis, limbo nigro.
Gen. Inf. Mant. 235. *
Habitat Kiliae. *Dom. Lund.*
- marginatus.* 43. E. thorace nigro, margine ferrugineo, elytris testaceis.
Habitat in Germania. *Dom. de Hattorf.*
Simillimus E. limbati, at paullo maior. Corpus nigrum. Thorax niger obscurus margine omni ferrugineo.
- pulchellus.* 44. E. capite thoraceque atris, elytris nigris, maculis flavicantibus, pedibus flavis. *Syst. Ent.* 215. 34. *Linn. Syst. Nat.* 2. 656. 35. *Fn. Sv.* 745.
Habitat in Europa boreali.

45. E. thorace rufo nigro bimaculato, elytris basi rufis, *notatus*.
apice nigris, maculis duabus albis.
Habitat in Coromandel. *Mus. Dom. Banks*.
Statura parua E. pulchelli. Caput atrum fronte cinereo
villoso. Thorax rufus antice maculis duabus magnis
atris annulo cinereo tomentoso cinctis. Elytra stria-
ta basi rufa ultra medium nigra maculis duabus trans-
uersis albis. Abdomen nigrum cinereo nitidulum.
Femora nigra, tibiae pallefcentes.
46. E. thorace ferrugineo, elytris atris, fasciis duabus fla- *festinus*.
uis. *Syst. Ent.* 215. 35. *
Habitat in Aegypto. *Dom. Prof. Forskahl*.
47. E. niger nitidus, elytris puncto baseos rubro. *Syst.* *2pustula-*
Ent. 215. 36. *Linn. Syst. Nat.* 2. 652. 9. *tus*.
Elater niger elytrorum basi maculis rubris. Geoff. Inf.
1. 136. 15.
Habitat in Germaniae graminosis.

62. B V P R E S T I S.

1. B. elytris unidentatis aeneis, margine aureo. *Syst. Ent.* *unidenta-*
216. 1. * *ta*.
Habitat - - - *Mus. Dom. Banks*.
2. B. elytris acuminatis viridi aeneis, macula flava, pecto- *bicolor*.
re abdomineque flavis. *Syst. Ent. App.* 825. *
Habitat in America meridionali. *Dom. Drury*.
3. B. elytris bidentatis rugosis, thorace laeui, corpore in- *gigantea*.
aurato. *Syst. Ent.* 216. 2. *Linn. Syst. Nat.* 2. 659.
1. *Mus. Lud. Vir.* 85.
Buprestis gigantea viridi aenea nitidissima, elytris ru-
goso sulcatis, thorace maculis binis nigro aeneis.
Degeer Inf. 4. 131. 1.
Cantharis maxima, elytris cuprei coloris sulcatis.
Sloan. Jam. 2. 210. tab. 236. fig. 1. 2.
Cerambyx Indiae orientalis maximus. Grew. Mus.
165. tab. 13.
Mordella gigantea. Scopol. Ann. Histor. nat. 5.
104. 84.
Fabr. Spec. Inf. § *Pet.*

Pet. Gazoph. tab. 147. fig. 16. 17.

Sulz. Hist. Inf. tab. 6. fig. 38.

Merian. Sur. tab. 50. fig. inf.

Seb. Mus. 3. tab. 84. fig. 12.

Habitat in America, Asia.

- vittata.* 4. *B. elytris bidentatis punctatis*, lineis elevatis quatuor, viridi aeneus, vitta lata aurea. *Syst. Ent.* 216. 3. *
Habitat in India. *Mus. Dom. Banks.*
- fastuosa.* 5. *B. elytris truncatis bidentatis punctato striatis viridibus*, dorso aureo. *Syst. Ent.* 216. 4. *
Habitat in America septentrionali. *Mus. Dom. Banks.*
- punctatis-sima.* 6. *B. elytris bidentatis cupreis*, punctis violaceis, numerosis. *Syst. Ent.* 216. 5. *
Habitat in Sierra Leon Africae. *Dom. Drury.*
- decora.* 7. *B. elytris truncatis bidentatis viridibus*, vitta coerulescente marginibusque aureis. *Syst. Ent.* 217. 6. *
Habitat in America. *Mus. Dom. Banks.*
- lurida.* 8. *B. elytris bidentatis obscura*, ano tridentato. *Syst. Ent.* 217. 7. *
Habitat in America. *Mus. Dom. Banks.*
- obscura.* 9. *B. elytris bidentatis obscure aenea*, punctis elevatis obscurioribus.
Habitat in America boreali. *Mus. Dom. Blackburn.*
Parva. Corpus totum supra obscure aeneum punctis elevatis obscurioribus. Elytra apice bidentata. Subtus tota cuprea nitida.
- striata.* 10. *B. elytris truncatis subbidentatis cupreis*, lineis elevatis quatuor. *Syst. Ent.* 217. 8. *
Habitat in Pennsylvania. *Mus. Dom. Banks.*
- rutilans.* 11. *B. elytris tridentatis viridibus nigro maculatis*, margine aureo. *Gen. Inf. Mant.* 236. *
Habitat in Austria. *Mus. D. Schultz.*
- ignita.* 12. *B. elytris tridentatis*, thorace impresso, corpore inaurato. *Syst. Ent.* 217. 9. *Linn. Syst. Nat.* 2. 659. 3.
Mus. Lud. Vlr. 86.

Beetle Grew. Mus. 166. tab. 13.
Sulz. Hist. Inf. tab. 6. fig. 14.
Petiv. Gazoph. tab. 20. fig. 8.
Kaempf. tab. 1. p. 132. tab. 10. fig. 7.

Habitat in Indiis.

13. *B. clytris truncatis subtridentatis nigro aeneis, vittis lineata.*
 duabus aureis. *Syst. Ent.* 217. 10. *

Habitat in America meridionali. *Mus. Dom. Banks.*

14. *B. viridi nitens, elytris tridentatis, maculis duabus ocellata.*
 aureis ocellarique flava. *Syst. Ent.* 218. 11. *

Sulz. Hist. Inf. tab. 6. fig. 15.

Habitat in Indiis.

15. *B. elytris tridentatis, corpore aeneo immaculato.* *aenea.*

Habitat in Coromandel. *Mus. Dom. Banks.*

Minor. Corpus totum aeneum obscure nitidum. Elytra
 striata apice tridentata.

16. *B. elytris tridentatis cyaneis flavo maculatis.* *maculata.*

Habitat in Sibiria. *D. Pallas. Mus. Dom. Banks.*

Media. Caput cyanæum ore flavo. Frons flavus punctis
 duobus nigris maculisque duabus cyaneis margine
 flavo. Elytra tridentata, striata, cyanea maculis dua-
 bus magnis, lunatis, flavis, quarum posterior in-
 terdum in duas diuisa. Corpus subtus aeneum, ab-
 domine vtrinque punctorum flavorum.

17. *B. elytris ferrato tridentatis viridibus, punctis cine-
 reis impressis, sterno porrecto conico.* *Syst. Ent. nis.*

218. 12. * *Linn. Syst. Nat.* 2. 660. 5. *Mus. Lud.*
Vlr. 88.

Carabus orientalis crassus. Grew. Mus. 167. tab. 13.

Habitat in India.

Varietas elytrorum punctis consolidatis vix distincta.

18. *B. elytris ferrato tridentatis castaneis, sterno conico
 porrecto.* *Syst. Ent.* 218. 13. * *Chrysis.*

Buprestis sternicornis β . *Linn. Syst. Nat.* 2. 660. 5.
Mus. Lud. Vlr. 88.

Buprestis viridi aurata, elytris fusco castaneis ferrato tridentatis, thorace punctato, sterno porrecto. *Degeer Inf.* 4. 136. 2. tab. 17. fig. 25.

Habitat in India orientali, China.

Varietatem praecedentis credit a *Linné*, at tamen distincta videtur.

depressa. 19. B. elytris ferratis fulcatis, corpore depresso obscuro. *Syst. Ent.* 219. 14. *

Habitat in Aegypto. *Dom. Prof. Forskahl.*

mariana. 20. B. elytris ferratis longitudinaliter rugosis, maculis duabus impressis, thorace fulcato. *Syst. Ent.* 219. 21. *Linn. Syst. Nat.* 2. 660. 6. *Fn. Sv.* 754. *Mus. Lud. Vlr.* 89.

Buprestis nitida supra fusco aenea subtus rubro cuprea, elytris rugosis postice dehiscentibus. *Degeer Inf.* 4. 128. 1. tab. 4. fig. 18.

Cantharis marianus viridis perelegans, vaginis fulcatis, signaturis flavescentibus notatis. *Pet. Gazoph.* tab. 2. fig. 2.

Schaeff. Icon. tab. 49. fig. 1.

Habitat in Europa, America boreali.

farinosa. 21. B. elytris ferratis viridibus, fulco abbreviato suturali impresso. *Syst. Ent.* 219. 16. *

Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

modesta. 22. B. elytris ferratis corpore obscurioribus, maculis tribus impressis aureis.

Habitat in Brasilia. *Mus. Dom. Banks.*

Magnitudo praecedentis. Caput impressum, viride, nitidum oculis testaceis. Thorax punctatus, aeneus, nitidus maculis tribus impressis. Elytra ferrata, subfulcata, obscuriora basi nitidiora maculis tribus impressis aureis.

blanda. 23. B. elytris ferratis attenuatis fulcatis viridi aeneis, fulcis cupreis.

Habitat in America meridionali. *Mus. D. Hunter.*

Corpus medium subtus viridi aeneum, nitidum. Thorax linea dorsali impressa viridi cupreoque rutilans.

Elytra

Elytra ferrata, apice attenuata, fulcata lineis eleuatis viridibus fulcisque depressis cupreis.

24. *B. elytris ferratis aenea nitida, thorace lineis duabus elegans.*
 elytrorumque vnica aureis.
 Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*
 Media. Caput viridi, nitidum, scabrum. Thorax punctatus et fere variolosus aeneus, nitens lineis duabus approximatis, dorsalibus, aureis. Elytra valde ferrata lineis quatuor eleuatis interstitiisque punctatis fere variolosis viridia, nitida linea longitudinali aurea. Subtus aenea, nitida.
25. *B. elytris ferratis porcatis, thorace angulato, corpore porcata.*
 fusco nitido. *Syst. Ent.* 219. 17. *
 Habitat in Oriente. *Prof. Forskahl,*
26. *B. elytris ferratis longitudinaliter fulcatis, maculis chryso-*
 duabus aureis impressis, thorace punctato. *Syst. Ent.* *stigma.*
 219. 18. *Linn. Syst. Nat.* 2. 660. 7. *Fu. Sv.* 755.
Buprestis fusca, elytris singulis maculis tribus rubro aureis impressis, abdomine subtus viridi aureo, margine purpureo nitido. *Degeer Inf.* 4. 129. 3.
Cucuius aureus fossulis elytrorum quatuor impressis nitentibus. *Geoff. Inf.* 1. 125. 1.
Schaeff. Elem. tab. 31. fig. 1. 2.
Sulz. Hist. Inf. tab. 6. fig. 39.
 Habitat in Europa.
27. *B. elytris ferratis aeneis, punctis tribus impressis. impressa.*
Syst. Ent. 220. 19. *
 Habitat in Indiis. *Mus. Dom. Bernoulli, Basileensis.*
28. *B. elytris ferratis obscuris albomaculatis. Syst. Ent. ornata.*
 220. 20. *
 Habitat in Pensyluania. *Mus. Dom. Banks.*
29. *B. elytris ferratis striatis, corpore cylindrico nigro. cylindri-*
Syst. Ent. 220. 21. * *ca.*
 Habitat in Oriente. *Dom. Prof. Forskahl.*
30. *B. elytris integris, fronte sulcato, corpore scabro au-* *scabra.*
 reo. *Syst. Ent.* 220. 22. *
 Habitat in Indiis. *Dom. Mallet.*

- Trochilus*. 31. B. elytris integris aurea nitidissima, dorso elytris pedibusque viridibus. *Gen. Inf. Mant.* 236. *
Habitat in Austria. *D. Schulz.*
- sguttata*. 32. B. elytris integris, maculis quatuor albis, corpore coeruleo. *Syst. Ent.* 220. 23. *Linn. Syst. Nat.* 2. 659. 2. *Fn. Sv.* 753.
Buprestis albo punctata coeruleo violacea nitida, thoracis lateribus albis, elytris striatis, maculis quinque albis. *Degeer Inf.* 4. 132. 5. tab. 4. fig. 20.
Cucuius viridi aeneus, punctis quatuor impressis. *Geoff. Inf.* 1. 126. 2.
Schaeff. Icon. tab. 31. fig. 1.
Habitat in Europae nemoribus.
- fascicularis*. 33. B. elytris integerrimis striatis, punctis fasciculato villosis, corpore inaurato hirsuto. *Syst. Ent.* 220. 24. *Linn. Syst. Nat.* 2. 661. 12. *Mus. Lud. Vlr.* 90.
Scarabaeusamboinensis. *Seb. Mus.* 2. p. 22. tab. 20. fig. 5.
Scarabaeus viridis aureus, papillis pilis albis obtusis vndique hirtus. *Petiv. Gazoph.* 4. tab. 13. fig. 5.
Sulz. Hist. Inf. tab. 6. fig. 4.
Degeer Inf. 7. tab. 47. fig. 6.
Habitat ad Cap. bon. sp.
Variat rarius corpore nigro. *Mus. Dom. Banks.*
- variolaris*. 34. B. elytris integris obscuris, punctis impressis numerosis, thorace carinato.
Buprestis variolaris. *Pall. Iter.* 1. 464. 37.
Habitat in Sibiria. *D. Pallas. Mus. Dom. Banks.*
Magnitudo et statura B. fascicularis, cui affinis videtur.
Caput et thorax obscura, scabra, nigra minime nitida lineaque dorsali thoracis eleuata. Elytra scabra, nigra punctis plurimis impressis cinereo villosis.
Subtus hirta cupreo paullo nitens.
- hirta*. 35. B. elytris integerrimis, pedibus ferrugineis, corpore hirsuto. *Syst. Ent.* 221. 25. *Linn. Syst. Nat.* 2. 661. 13. *Mus. Lud. Vlr.* 91.
Habitat in Africa.
Varietas huius a colore plures.

36. B. elytris integris fulcatis aeneis, capite thoraceque *austriaca*.
viridibus. *Syst. Ent.* 221. 26.
Buprestis austriaca elytris striatis bidentatis, capite
thoraceque viridi, abdomine violaceo. *Linn. Syst.*
Nat. 2. 661. 9.
Mordella gigantea. *Scop. carn.* 187.
Habitat Idriae.
Elytra in nostro specimine truncata nec bidentata.
37. B. elytris integerrimis atris, vittis duabus cinereo to- *sibirica*.
mentosis impressis.
Habitat in Sibiria. *D. Pallas. Mus. Dom. Banks.*
Corpus medium, at latiusculum atrum, subtus cinereo
villosum. Caput et thorax scabra, immaculata. Ely-
tra glabra, atra vittis duabus impressis tomento ci-
nereo repletis, inferiore obliqua a margine exteriori
baseos ad futuram apicis ducta, exteriori marginali.
38. B. elytris integris viridibus, margine omni aureo, li- *splendens*.
neisque tribus elevatis. *Syst. Ent.* 221. 27. *
Habitat in China.
39. B. elytris integris obscure fuscis, subtus aenea, abdo- *fusca*.
mine punctis lateralibus fulvis.
Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*
Magnitudo et statura praecedentium. Caput rugosum,
fuscum oculis flavescentibus. Thorax obscure fu-
scus lateribus scabris impressis. Elytra subtilissima
punctato striata fusca, obscura. Corpus subtus ae-
neum vtrinque linea macularum fulvarum.
40. B. elytris emarginatis striatis obscure aeneis. *Syst. rustica*.
Ent. 221. 28.
Buprestis rustica elytris striatis fastigiatis, thorace pun-
ctato. *Linn. Syst. Nat.* 2. 660. 8. *Fn. Sv.* 756.
Buprestis violacea viridi aenea, elytris striatis. *Degeer*
Inf. 4. 130. 4. tab. 4. fig. 10.
Cucuius viridi auratus oblongus, thorace punctato,
elytris striatis. *Geoff. Inf.* 1. 126. 3.
Mordella rustica. *Scop. carn.* 188.
Schaeff. Icon. tab. 2. fig. 1.
Habitat in Europae nemoribus.

- plebeia*. 41. B. elytris emarginatis cupreis fusco maculatis. *Gen. Inf. Mant.* 236. *
Habitat in India. *D. Schulz.*
- lugubris*. 42. B. elytris integris obscuris nigro scabris, corpore subtus cupreo. *Gen. Inf. Mant.* 237. *
Habitat in Austria. *D. Schulz.*
- Tenebrionis*. 43. B. atra, elytris integris truncatis, thorace varioloso dilatato. *Syst. Ent.* 221. 29.
Buprestis Tenebrionis atra, elytris integris lineato punctatis, thorace varioloso dilatato. *Linn. Syst. Nat.* 2. 661. 11.
Sulz. Hist. Inf. tab. 6. fig. 16.
Habitat in Europa, Africa.
- Rubi*. 44. B. cylindrica nigra, elytris fasciis cinereis undulatis. *Syst. Ent.* 221. 30. *Linn. Syst. Nat.* 2. 662. 14.
Habitat in Europae australioris rubo, cichorio.
- bimaculata*. 45. B. elytris integerrimis striatis, macula rubra, corpore fusco viridi. *Syst. Ent.* 222. 31. *Linn. Syst. Nat.* 2. 662. 16. *Mus. Lud. Vlr.* 92.
Sulz. Hist. Inf. 57. tab. 6. fig. 15.
Habitat in India.
- amaculata*. 46. B. elytris integris, viridis, thorace postice elytrisque maculis duabus aureis. *Gen. Inf. Mant.* 137. *
Habitat in India. *D. Fothergill.*
- tristis*. 47. B. elytris integerrimis marginatis, corpore cupreo, abdomine punctis decem nigris. *Syst. Ent.* 222. 32. *Linn. Syst. Nat.* 2. 662. 18. *Mus. Lud. Vlr.* 93.
Habitat in Indiis.
- cuprea*. 48. B. elytris integerrimis, thoracis lateribus scabris, scutello tuberculari, corpore cupreo. *Syst. Ent.* 222. 33. *Linn. Syst. Nat.* 2. 662. 20. *Mus. Lud. Vlr.* 94.
Habitat in America.
- nobilis*. 49. B. elytris integerrimis, strigis duabus undatis inauratis, corpore fusco. *Syst. Ent.* 222. 34. *Linn. Syst. Nat.* 2. 662. 21.
Habitat in Indiis.

50. B. elytris integerrimis punctatis, thorace punctis quatuor impressis, corpore obscuro. *Syst. Ent.* 222. 35. *4punctata.*
Linn. Syst. Nat. 2. 662. 22. *Fn. Sv.* 759.
Buprestis subviridi nigra, thorace punctis quatuor impressis. *Degeer Inf.* 4. 134. 8.
 Habitat in Europae floribus, frequens in caltha palustri.
51. B. coleoptris integerrimis aureis, punctis duobus cruceque postica nigris. *Syst. Ent.* 222. 36. * *cruciata.*
 Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
52. B. elytris integris obscuris, thorace aureo, striis duabus nigris. *manca.*
Buprestis 2striata. Syst. Ent. 222. 37. *
Buprestis manca aurata, thoracis lineis duabus elytrisque fuscis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1067. 10.
Cucuius aeneus, elytris fuscis, thorace rubro, fasciis fuscis. *Geoff. Inf.* 1. 127. 4.
 Habitat in Gallia, Germania.
53. B. elytris integerrimis transuerse rugosis, thorace subtilo laeui, corpore ouato nigro. *Syst. Ent.* 223. 38. *minuta.*
Linn. Syst. Nat. 2. 663. 24. *Fn. Sv.* 760.
Cucuius fusco cupreus triangularis, fasciis undulatis, villoso albidis. *Geoff. Inf.* 1. 128. 6.
 Habitat in Europa, saepius capta in coryli foliis.
54. B. elytris integerrimis linearibus punctatis, corpore viridi elongato. *Syst. Ent.* 223. 39. *viridis.*
Linn. Syst. Nat. 2. 663. 25. *Fn. Sv.* 762.
Buprestis viridis nitida, corpore elongato, elytris linearibus scabris integerrimis. *Degeer Inf.* 4. 153. 6. tab. 5. fig. 1.
Cucuius viridi cupreus oblongus. *Geoff. Inf.* 1. 127. 5.
Mordella ferraticornis. Scop. carn. 190.
Schaeff. Icon. tab. 76. fig. 9.
 Habitat in Europae betula alba.
55. B. elytris integerrimis linearibus viridibus, puncto albo, abdomine cyaneo, punctis tribus albis. *Gen. biguttata.*
Inf. Mant. 237. *
 Habitat in Angliae plantis. *Dom. Feats.*

- atra.* 56. *B. elytris integerrimis linearibus, corpore elongato atro.* *Syst. Ent.* 223. 40. *Linn. Syst. Nat.* 2. 663. 26.
Habitat in Germania.
- festiua.* 57. *B. elytris integerrimis, maculis sex coeruleis, corpore viridissimo elongato.* *Syst. Ent.* 223. 41. *Linn. Syst. Nat.* 2. 663. 27.
Habitat in Africa.
- nitidula.* 58. *B. elytris integerrimis, thorace marginato vtrinque depresso, corpore viridi nitido.* *Gen. Inf. Mant.* 237. * *Linn. Syst. Nat.* 2. 662. 15. *Fn. Sv.* 757.
Schaeff. Icon. tab. 50. fig. 7.
Habitat in Europa boreali.
- laeta.* 59. *B. elytris integris viridibus, capite thoraceque aureis.* *Syst. Ent.* 223. 42. *
Habitat Halae Saxonum. *Dom. Schaller.*
Varietatem *B. nitidulae* credit a *Linné*, an rite?
- falicis.* 60. *B. elytris integerrimis viridis nitens, coleoptris aureis basi viridibus.* *Gen. Inf. Mant.* 237. *
Schaeff. Icon. tab. 31. fig. 12.
Habitat in Germaniae falice. *D. Schulz.*
- cyanea.* 61. *B. elytris integerrimis rugosis, corpore cyaneo.* *Syst. Ent.* 223. 43. *
Habitat Halae Saxonum. *Dom. Schaller.*
- gmaculata.* 62. *B. elytris integerrimis nigris, maculis tribus flavis.* *Syst. Ent.* 223. 44. *
Buprestis gmaculata elytris integerrimis, maculis tribus longitudinalibus, fronte thoracisque lateribus luteis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 662. 17.
Sulz. Hist. Inf. tab. 16. fig. 17.?
Habitat - - - *Dom. Mauduit.*

63. C I C I N D E L A.

- grossa.* 1. *C. nigra, elytris acuminatis, maculis tribus albis.*
Habitat in Coromandel. *Muf. Dom. Banks.*
Maxima. Corpus maximum, fuscum pilis cinereis hirtum labio flauo. Mandibulae flauae apice nigrae.
Tho-

Thorax rotundatus, punctatus, fuscus, immaculatus striga antica impressa. Elytra punctata, subhirta maculis tribus flavis anteriore baseos, postica oblonga apicis. Corpus subtus cinereo hirtum.

2. *C. viridis nitida*, elytris obscure cyaneis immaculatis, abdominis margine testaceo. *bicolor.*

Habitat in India orientali. *Mus. Dom. Banks.*

Magnitudo et statura *C. campestris*. Antennae fuscae basi virescentes. Caput viride, nitidum mandibulis albis apice nigris. Palpi testacei apice nigri. Thorax viridis, nitidus, immaculatus. Elytra obscure cyanea, immaculata. Corpus subtus cyaneum, nitidum, margine abdominis testaceo.

3. *C. viridis*, punctis quinque albis. *Syst. Ent.* 224. 1. *campestris.*
Linn. Syst. Nat. 2. 657. 1. *Fn. Sv.* 746. *Scop. carn.* 181.

Cicindela viridis nitida, elytris singulis punctis sex albis. *Degeer Inf.* 4. 113. 1. tab. 4. fig. 1.

Buprestis inauratus supra viridis, coleoptris punctis duodecim albis. *Geoff. Inf.* 1. 153. 27.

Cantharis quarta. *Mouff. Inf.* 145. fig. inf.

Scarabaeus viridis, cui decem maculae albae supra alarum thecas. *List. Sc. Angl.* 386. 17.

Cantharis Mouffeti minor quarta. *Ionst. Inf.* tab. 15.

Bergstraeff. Nomencl. 1. 15. 8. 9. 10. 11. tab. 2. fig. 8 — 11.

Schaeff. Icon. tab. 34. fig. 8. 9.

Sulz. Hist. Inf. tab. 5. fig. 37.

Habitat in Europae campis arenosis.

Larva mollis alba, capite pedibusque sex ferrugineis foueam magnitudine corporis in terra excauat, in qua latens infecta arripit. *Geoff.*

Imago laruas etiam hirsutas venatur. *Raj.*

4. *C. subpurpurascens*, elytris fascia lunulisque duabus albis. *Syst. Ent.* 224. 2. *hybrida.*
Linn. Syst. Nat. 2. 657. 2. *Fn. Sv.* 747. *Scop. carn.* 183.

Cicindela maculata supra viridi grisea nitida subtus viridi aurea, elytris singulis fascia lunulisque duabus albis. *Degeer Inf.* 4. 115. 3. tab. 4. fig. 8.

Berg-

Bergstr. Nomencl. 1. 26. tab. 4. fig. 5.

Schaeff. Elem. tab. 43.

Icon. tab. 35. fig. 10.

Habitat in Europae sabulosis.

sylvatica. 5. *C. nigra*, elytris fascia vndata punctisque duobus albis. *Syst. Ent.* 224. 3. *Linn. Syst. Nat.* 2. 658. 8. *Fn. Sv.* 748.

Cicindela supra nigra, subtus viridis nitida, elytris singulis fascia punctisque tribus albis. *Degeer Inf.* 4. 114. tab. 4. fig. 7.

Buprestis inauratus, supra fusco viridis, coleoptris fasciis sex vndulatis albis. *Geoff. Inf.* 1. 155. 28.

Petiv. Gazoph. tab. 50. fig. 5.

Habitat in Europae pinetis.

tristis. 6. *C. nigra*, elytris macula media flava. *Syst. Ent. App.* 825. *

Habitat - - - *Dom. Drury.*

interrupta. 7. *C. elytris* fuscis, puncto baseos fasciis tribus interruptis lineolaque apicis flavis. *Syst. Ent.* 225. 4.

Habitat in Sierra Leon. *Mus. Dom. Banks.*

lunulata. 8. *C. nigra*, elytris lunulis duabus maculisque duabus albis, anteriore transuersa.

Habitat ad Cap. bon. sp. *D. Forster. Mus. Dom. Banks.*

Magnitudo et statura *C. hybridae*. Caput nigrum labio flauo. Mandibulae valde exsertae, dentatae, nigrae basi flavescentes. Thorax rotundatus, niger, immaculatus. Elytra nigra lineola baseos ad marginem exteriorem, macula transuersa in medio, tunc puncta duo parua et tandem lunula apicis albis. Subtus cyaneo nitida.

turida. 9. *C. obscura*, elytris punctis duobus lunulisque tribus albis, intermedia flexuosa.

Habitat ad Cap. bon. sp. *D. Forster. Mus. Dom. Banks.*

Caput et thorax obscure cuprea, immaculata. Labium flauum striga antica punctorum nigrorum impressa.

Elytra

Elytra nigra puncto medio baseos et altero ante medium versus futuram. Praeterea lunulae tres, baseos ad marginem exteriorem, secunda in medio fere duplicata et tertia apicis.

10. *C. subaenea*, elytris albis, linea fusca triramosa. *Syst. capensis*.
Ent. 225. 5. *Linn. Syst. Nat.* 2. 657. 3. *Mus. Lud.*
Vlr. 84.
Degeer Inf. 7. tab. 47. fig. 3.
Sulz. Hist. Inf. tab. 6. fig. 11.
 Habitat ad Cap. bon. sp.
11. *C. cuprea*, elytris viridibus, puncto lunulaque apicis albis. *Syst. Ent.* 225. 6. *Linn. Syst. Nat.* 2. 657. 4. *Scop. carn.* 122. *germanica.*
Buprestis inauratus supra fusco viridis, coleoptris punctis sex albis. *Geoff. Inf.* 1. 155. 29.
Cicindela obscurior viridis, elytris punctis quatuor lineolaque alba. *Schreb. Inf.* 10. 5.
 Habitat in Germaniae arenosis.
12. *C. thorace fusco bituberculato*, elytris fusco viridique variis, margine tridentato albo. *Syst. Ent.* 225. 7. * *tuberculata.*
 Habitat in noua Zelandia. *Mus. Dom. Banks.*
13. *C. subpurpurascens*, labio elytrisque puncto albo. *Syst. Ent.* 225. 8. * *unipunctata.*
 Habitat in America. *Dom. Drury.*
14. *C. viridi aenea*, elytrorum disco obscuriore, punctis tribus albis. *Syst. Ent.* 226. 9. * *sexpunctata.*
 Habitat ad littora Malabarica. *Dom. Drury.*
15. *C. viridi aenea*, elytris obscuris, margine lineaque media albis. *quadrilineata.*
 Habitat in Indiis. *D. Schulz.*
 Magnitudo praecedentium. Maxillae porrectae, basi albae, apice nigrae. Caput viridi aeneum oculorum orbita aurea. Thorax rotundatus aeneo nitens, subtus aureus hirsutiae alba. Elytra obscura margine albo, qui versus apicem denticulum exferit. In medio elytrorum linea lata alba, quae tamen apicem haud attingit.

attingit. Abdomen subtus aureum nitidissimum lateribus hirtis.

- biramosa*. 16. C. obscure aenea, elytrorum margine biramoso albo. Habitat in Germania. *Dom. de Hattorf*.
Magnitudo praecedentis. Corpus totum supra obscure aeneum, subtus aureum, nitidum. Elytrorum margo exterior albus ramos siue dentes duos emittens altero in medio, altero versus apicem.
- sexguttata*. 17. C. viridis nitida, elytris punctis tribus marginalibus albis. *Syst. Ent.* 226. 10. *
Habitat in Virginia.
Labium superius flavum.
- Catena*. 18. C. viridi aenea, elytris albidis, punctis sex viridibus concatenatis. *Syst. Ent.* 226. 11. *
Habitat in India orientali.
- marginata*. 19. C. viridis, elytris margine fascia vndata punctisque duobus albis. *Syst. Ent.* 226. 12. *
Habitat in Virginia.
- trifasciata*. 20. C. obscura, elytris strigis tribus albis, secunda flexuosa.
Habitat in America.
Parua, supra obscura, subtus aenea nitida. Labium album. Elytra strigis tribus, prima abbreviata, lunata, secunda flexuosa, tertia apicis.
- carolina*. 21. C. viridis nitida, elytrorum apicibus ore antennis pedibusque flavis. *Syst. Ent.* 226. 13. *Linn. Syst. Nat.* 2. 657. 6. *Amoen. acad.* 6. 395. 23.
Cicindela carolina. *Degeer Inf.* 4. 120. 2. tab. 17. fig. 24.
Habitat in Carolina.
- virginica*. 22. C. nitida, ore antennis pedibusque testaceis, *Syst. Ent. App.* 825. *Linn. Syst. Nat.* 2. 657. 5.
Habitat in Virginia.

23. *C. flava*, elytris fasciis duabus nigris latis. *Syst. Ent. aequino-*
226. 14. *Linn. Syst. Nat.* 2. 658. 7. *Amoen. acad. Etialis.*
6. 395. 6.

Habitat Surinami.

24. *C. nigra*, elytris punctis sex albis, tertio et quarto *maura.*
parallelo. *Syst. Ent.* 226. 15. *Linn. Syst. Nat.* 2.
658. 9.

Habitat in Oriente.

64. ELAPHRVS.

1. *E. viridi aeneus*, elytris punctis latis excauatis. *Syst. riparius.*
Ent. 227. 1.

Cicindela riparia. *Linn. Syst. Nat.* 2. 658. 10. *Fn. Sv.*
749.

Cicindela viridi aenea maculis rotundis excauatis griseo
viridibus. *Degeer Inf.* 4. 117. 4. tab. 4. fig. 9.

Buprestis viridi aeneus, elytris punctis latis excauatis
mammillofis. *Geoff. Inf.* 1. 156. 30.

Scarabaeus parvus inauratus. *List. Loqu.* 385.

Schaeff. Icon. tab. 86. fig. 4.

Sulz. Hist. Inf. tab. 6. fig. 13.

Habitat in Europae humentibus.

Colore saepius variat.

2. *E. obscure aeneus*, elytris subnebulosis, pedibus lu- *flauipes.*
teis. *Syst. Ent.* 227. 2.

Cicindela flauipes. *Linn. Syst. Nat.* 2. 658. 11. *Fn. Sv.*
750.

Cicindela flauipes capite thoraceque viridi aeneis, ely-
tris pallide fuscis nigro maculatis, antennis pedibus-
que flavescentibus. *Degeer Inf.* 4. 119. 6.

Habitat in Europa boreali ad littora riparum.

Elytra punctata.

3. *E. niger*, coleoptris punctis duobus fasciaque ferrugi- *rupestris.*
neis. *Syst. Ent.* 227. 3.

Cicindela rupestris. *Linn. Syst. Nat.* 2. 658. 12.

Habitat in Sueciae rupibus.

- aquatius.* 4. *E. aeneus nitidus capite striato. Syst. Ent. 227. 4.*
Cicindela aquatica. Linn. Syst. Nat. 2. 658. 14. Fn. Sv. 752.
Buprestis fulco aeneus, capite profunde striato, elytrorum stria prima remotissima. Geoff. Inf. 1. 157. 31.
Cicindela pusilla. Schreb. Inf. 6.
List. mut. tab. 31. fig. 13.
 Habitat ad Europae aquas frequens.
- semipunctatus.* 5. *E. aeneus nitidus, elytris punctatis, dorso glaberrimo. Syst. Ent. 227. 5. **
Cicindela striata aenea nitidissima, capite striato, elytris dimidio striatis punctatis, intus laevis. Degeer Inf. 4. 118. 5.
 Habitat Halae Saxonum.
- 2guttatus.* 6. *E. aeneus, elytris nitidis apice flavescentibus. Iter Norvag. d. 11. Iul. **
 Habitat ad Norvagiæ aquas, capt. d. 11. Iul.

65. HYDROPHILUS.

- piceus.* 1. *H. niger, sterno canaliculato postice spinoso. Syst. Ent. 228. 1.*
Hydrophilus niger, elytris fulcatis, antennis fuscis. Geoff. Inf. 1. 182. 1. tab. 3. fig. 1.
Hydrophilus ruficornis niger capitulo antennarum rufo, elytris laevis abdomine postice acuminato. Degeer Inf. 4. 371. 1. tab. 14. fig. 1. 2.
Dytiscus piceus antennis perfoliatis, corpore laevi, sterno carinato postice spinoso. Linn. Syst. Nat. 2. 664. 1. Fn. Sv. 764.
Dytiscus hastatus. Acta Soc. Berol. phys. 4. tab. 7. fig. 2. Lyonet. Less. tab. 1. fig. 15. 16. 17.
Frisch. Inf. 2. tab. 6.
Sulz. Hist. Inf. tab. 6. fig. 8.
Bergstr. Nomencl. 1. tab. 6. fig. 3.
tab. 8. fig. 1.
tab. 9. fig. 1.
Schaeff. Elem. tab. 71.
Icon. tab. 33. fig. 1. 2.
 Habitat in Europae aquis, piscibus infestus.

2. *H. oliuaceus*, sterno canaliculato postice spinoso, coleoptervis emarginatis.

Habitat in Coromandel. *Mus. Dom. Banks.*

Corpus *H.* piceo paullo minus totum oliuaceum siue obscure virescens, laeve, glabrum antennis femoribusque piceis. Sternum postice porrectum fere longitudine abdominis. Coleoptera emarginata.

3. *H. niger nitidus*, elytris substriatis. *Syst. Ent.* 228. 2. *caraboides*.
Hydrophilus niger, elytrorum punctis per strias digestis, antennis nigris. *Geoff. Inf.* 1. 183. 2.

Hydrophilus nigricornis niger capitulo antennarum nigro, elytris laevibus, abdomine postice rotundato. *Degeer Inf.* 4. 516. 2.

Dytiscus caraboides antennis perfoliatis, corpore glabro, striis aliquot recuruis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 664. 2. *Fn. Sv.* 765.

Hydrocantharis niger subrotundus. *Raj. Inf.* 95. 7.

Roef. Inf. 2. *Aquat.* 1. tab. 4. fig. 1. 2.

Frijch. Inf. 13. p. 24. tab. 21.

Bergstr. Nomencl. 1. tab. 5. fig. 8. 9.

tab. 7. fig. 8. 9. Laru. Pupp.

Sulz. Hist. Inf. tab. 6. fig. 41.

Schaeff. Icon. tab. 53. fig. 10.

Habitat in Europae aquis dulcibus.

4. *H. niger nitidus*, thoracis elytrorumque marginibus *lateralis*.
flavis. *Syst. Ent.* 228. 3. *

Habitat in Americae insulis. *Mus. Tottianum.*

5. *H. niger*, elytris striatis, pedibus piceis. *Syst. Ent. scarabaeoides*.
228. 4.

Scarabæus aquaticus muticus piceus, elytris striatis, antennis flavescentibus filiformibus. *Linn. Syst. Nat.* x. n. 56.

Scarabæus piceus. *Geoff. Inf.* 1. 85.

Dytiscus scarabaeoides ovalis conuexus ater laevissimus, antennis filiformibus triarticulatis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 664. 3.

Habitat in Europae aquis.

Antennae omnino perfoliatae, at palpi prominentes filiformes triarticulati.

Fabr. Spec. Inf.

T

6. H.

- orbicularis*. 6. H. subrotundus, corpore glabro atro. *Syst. Ent.* 229. 5.*
Habitat in Germaniae aquis.
- collaris*. 7. H. niger, ore thoracis lateribus lineisque elytrorum ferrugineis. *Syst. Ent.* 229. 6.*
Habitat in America. *Mus. Tottianum*.
- luridus*. 8. H. elytris striatis, corpore cinereo fusco. *Syst. Ent.* 229. 7.
Hydrophilus fuscus, corpore conuexo supra fusco, subtus nigro, capitulo antennarum oblongo, elytris striatis. *Degeer Inf.* 4. 378. 4. tab. 15. fig. 1. 2.
Dytiscus luridus antennis perfoliatis luridus, elytris punctis tribus fuscescentibus, thorace lateribus flavicante. *Linn. Syst. Nat.* 2. 665. 5. *Fn. Sv.* 767.
- minutus*. 9. H. ovatus niger, elytris pedibusque griseis. *Syst. Ent.* 229. 8.
Dytiscus dermestoides hemisphaericus ovatus luridus, capite thoraceque nigris. *Forst. nou. sp. Cent.* 1. 53.
Scarabaeus totus rufo niger maculis nigrioribus. *Geoff. Inf.* 1. 85. 27.?
Habitat in Europae aquis.
Vesperis sonorus. *Goeze*.
- bipunctatus*. 10. H. thorace atro, margine griseo, elytris fuscis, puncto postico albo. *Syst. Ent.* 229. 9.*
Habitat in Vpsaliae aquis.

66. D Y T I S C V S.

- latissimus*. 1. D. niger, elytrorum marginibus dilatatis, linea flava. *Syst. Ent.* 230. 1. *Linn. Syst. Nat.* 2. 665. 6. *Fn. Sv.* 768.
Dytiscus nigro fuscus, thorace margine flavo, elytrorum marginibus dilatatis, linea transuersa flava. *Degeer Inf.* 4. 390. 1.
Scarabaeus aquaticus magnus niger, margine luteo. *Frisch. Inf.* 2. tab. 7. fig. 1. 2.
Sulz. Hist. Inf. tab. 6. fig. 19.

Bergstr. Nomencl. 1. tab. 5. fig. 1. 2.
tab. 9. fig. 3.

Habitat in Europae borealis aquis.

Mas glaber, femina fulcata.

In propriam speciem faecit.

2. *D. niger*, capitis fascia, thoracis margine, elytrorum- *costalis.*
que stria costali ferrugineis. *Syst. Ent.* 230. 2. *

Habitat Surinami. *Dom. Teats.*

Color ferrugineus feminae multo obscurior. Elytra
semistriata.

3. *D. niger*, thoracis marginibus omnibus, elytrorumque *margina-*
exteriori flavis. *Syst. Ent.* 230. 3. *Linn. Syst. Nat.* *lis.*
2. 665. 7. *Fn. Sv.* 769. *Geoff. Inf.* 1. 186. 2.

Dytiscus nigro fuscus nitidus, thorace vndique elytrorumque
margine flauo. *Degeer Inf.* 4. 391. 2. tab.
16. fig. 2.

Hydrocantharis nostras. *Raj. Inf.* 93. 1.

Hydrocantharis. *Mouff. Inf.* 164.

Roef. Inf. 2. *Aquat.* 1. tab. 1. fig. 9. 11.

List. mut. tab. 5. fig. 2.

Sulz. Hist. Inf. tab. 6. fig. 42.

Bergstr. Nomencl. 1. 1. 1. tab. 1. fig. 1.

tab. 6. fig. 1. 2.

tab. 7. fig. 4. 5. Larv. Pup.

Schaeff. Icon. tab. 8. fig. 8.

- β. *Dytiscus semistriatus* fuscus, elytris fuleis dimidia-
tis decem. *Syst. Ent.* 231. 5. *Linn. Syst. Nat.* 2. 665.
8. *Fn. Sv.* 772. *Geoff. Inf.* 1. 187. 3.

Hydrocantharis elytris striatis siue canaliculatis. *Raj.*
Inf. 94. 2.

Frisch. Inf. 2. tab. 7. fig. 4.

Schaeff. Icon. tab. 8. fig. 7.

Roef. Inf. 2. *Aquat.* 1. tab. 1. fig. 10.

Bradl. nat. tab. 26. fig. 2.

Degeer Inf. 4. 391. 2. tab. 16. fig. 1.

Bergstr. Nomencl. 1. 2. 2. tab. 1. fig. 2.

Habitat in Europae aquis.

Agilis in dorso incubans saltu se restituit. Si diu in
siccio detineantur, aegre se immergunt.

Maribus α anteriorum pedum plantae hemisphaericae, patelliformes ad arctiorem copulam.
 Feminae β oua oblonga, magna alba.
 Conf. *Bergstraeff. Nomencl.* 1. tab. 7. fig. 1. vix distinctus.

punctulatus. 4. *D. niger*, clypeo thoracis elytrorumque margine exteriori albis, elytris striis tribus punctatis. *Gen. Inf. Mant.* 238. *

Dytiscus margine coleoptrorum thoracisque flavo. *Geoff. Inf.* 1. 185. 1.

Dytiscus glaber ex virescenti fuscus, elytris compressis glabris, marginibus exterioribus quaquauerfum flavis, ventre pedibusque ferrugineis. *Bergstr. Nomencl.* 1. 31. 45. tab. 6. fig. 4. 5. tab. 8. fig. 4. et tab. 9. fig. 2.

Dytiscus laterali marginatus. *Degeer Inf.* 4. 396. 3.
Roef. Inf. 2. *Aquat.* 1. tab. 2.
Frisch. Inf. 13. tab. 1. fig. 7.
Schaeff. Elem. tab. 7.

Habitat in Germaniae riuis syluaticis.

Femina fulcis decem dimidiatis elytrorum, vti in *D. marginali*.

Conf. *Bergstraeff. Nomencl.* 1. tab. 8. fig. 6. 7. vix distincta species.

limbatus. 5. *D. niger*, thoracis elytrorumque margine exteriori flavo, elytris laeuissimis. *Syst. Ent.* 230. 4. *
 Habitat in China. *Mus. Dom. Banks.*
 Abdomen atrum vtrinque punctis tribus ferrugineis.

fulcatus. 6. *D. coleoptris* fulcis decem longitudinalibus villosis. *Syst. Ent.* 231. 6. *Linn. Syst. Nat.* 2. 666. 13. *Fn. Sv.* 773. *Geoff. Inf.* 1. 189. 5.

Dytiscus fasciatus elytris fuscis, thorace fuluo, fasciis duabus nigris latere connatis, abdomine subtus flavo, lineis nigris. *Degeer Inf.* 4. 397. 4.

Hydrocantharis minor, corpore rotundo plano. *Raj. Inf.* 94. 3 et 10.

Frisch. Inf. 13. p. 13. tab. 7.

Roef. Inf. 2. *Aquat.* 1. tab. 3. fig. 7.

Bradl. nat. tab. 26. fig. 2. A.

Schaeff. Icon. tab. 3. fig. 3.

Bergstr. Nomencl. 1. tab. 5. fig. 3. 4. 5.
tab. 7. fig. 6. 7.

Habitat in Europae, Americae aquis.

Mas elytris glabris omnino distinctus a *D. cinereo*.

7. *D. elytris flavis, fasciis duabus punctoque apicis nigris. fasciatus.*

*Syst. Ent. App. 825. **

Habitat in Indiae aquis.

8. *D. fuscus, elytris transuersim subtilissime striatis. Syst. striatus.*

Ent. 231. 7. Linn. Syst. Nat. 2. 665. 9. Fn. Sv. 770.

Dytiscus transuersae striatus supra nigro fuscus, subtus niger, elytris transuersae subtilissime striatis. *Degeer Inf. 4. 399. 5. tab. 15. fig. 16.*

Habitat in Europae aquis.

9. *D. niger, ore verticis punctis duobus thoracisque marginibus rufis, elytris fuscis. Syst. Ent. 231. 8. **

Habitat in Maderae aquis. *Mus. Dom. Banks.*

10. *D. ater laevis, elytris vitta marginali flava, macula vittatus. bascos atra. Syst. Ent. App. 825. **

Habitat in Indiae aquis. *Mus. D. Hunter.*

11. *D. cinereus, elytrorum margine thoracisque medietate flavis. Syst. Ent. 231. 9. Linn. Syst. Nat. 2. 666.*

11. Fn. Sv. 771. Geoff. Inf. 1. 188. 4.

Dytiscus fasciatus elytris fuscis thorace fuluo, fasciis duabus transuersis nigris latere connatis, abdomine subtus fuluo, lineis nigris. *Degeer Inf. 4. 397. 14.*

Huffnag. Inf. 2. tab. 12.

Roef. Inf. 2. aquat. 1. tab. 3. fig. 6.

List. mut. tab. 5. fig. 1.

Act. Nidrosf. 425. tab. 16. fig. 11.

Petiv. Gazoph. tab. 70. fig. 3.

Schaeff. Icon. tab. 90. fig. 7.

Habitat in Europae aquis frequentissimus.

12. *D. cinereus, elytris fascia dentata nigra.*

Habitat in Indiae aquis. *Dom. Lund.*

griseus.

Paullo maior D. cinereo. Caput flavescens macula frontali transuersa nigra. Thorax griseus maculis duabus dorsalibus transuersis nigris. Elytra grisea lineis tribus punctorum impressorum. In medio macula marginalis nigra et postice fascia dentata nigra. Corpus subtus flavescens.

siccus. 13. D. pallens, elytris griseis, puncto oblongo laterali impresso nigro. *Syst. Ent.* 232. 10. *Linn. Syst. Nat.* 2. 666. 12.

Habitat in Africae aquis.

10punctatus. 14. D. ater glaber, elytris punctis albis quinque. *Syst. Ent.* 232. 11. *

Habitat in nouae Hollandiae aquis. *Mus. Dom. Banks.*

2pustulata. 15. D. laeuis ater, capite postice punctis duobus rubris. *Syst. Ent.* 232. 12. *Linn. Syst. Nat.* 2. 667. 17.

Dytiscus totus niger laeuis. *Geoff. Inf.* 1. 189. 6. ?

Habitat in Europae borealis aquis.

Puncta capitis rubra vix nudo oculo conspicua.

cinctus. 16. D. capite thoraceque flauis, elytris nigris, margine omni albo. *Syst. Ent.* 232. 13. *

Habitat in Americae aquis. *Dom. Mauduit.*

fenestratus. 17. D. subtus ferrugineus supra niger, elytris punctis duobus fenestratis.

Habitat in aquis Hamburgensibus. *D. Schulz.*

Statura omnino D. 2pustulati. Corpus subtus ferrugineum. Caput nigrum, ore antennis punctisque duobus baseos ferrugineis. Thorax niger margine ferrugineo. Elytra nigra punctis duobus fenestrato hyalinis, altero in medio, altero versus apicem.

transuersalis. 18. D. ater, thorace antice elytrorumque marginibus flauis.

Dytiscus niger thorace vtrinque fasciaque antica, elytris margine lineaque transuersa baseos flaua. *Müll. Zool. Dan. prodr.* 71. 668.

Pontopp. Atl. Dan. 1. tab. 29.

Bergstr. Nomencl. 1. tab. 5. fig. 6.

Habitat in Europae aquis.

19. *D. gibbus*, capite, thorace elytrorumque basi ferrugineis, elytris truncatis. *Hermannii*.

Dytiscus Hermannii gibbus, elytris fascia vidata bascos ferruginea. *Syst. Ent.* 232. 14.

Dytiscus tardus. *Acta Soc. Berol. phys.* 4. tab. 7. fig. 3.

Habitat in Alsatiae aquis stagnantibus. *Prof. Hermann.*

Statura *D. erythrocephali*. Caput obscure ferrugineum oculorum orbita nigra. Thorax ferrugineus margine antico et postico nigris. Elytra laevia, nigra basi ferruginea, apice truncata. Abdomen ferrugineum apice nigrum.

20. *D. gibbus ferrugineus*, elytris nigris apice acuminatis. *Gibbus*.
Gen. Inf. Mant. 238.

Habitat in Kiliae aquis stagnantibus. *Dom. de Scheffstadt.*

21. *D. ater nitidus*, antennis, pedibus elytrorumque latere exteriori ferrugineis. *Uliginosus*.
Syst. Ent. 232. 15. * *Linn.*

Syst. Nat. 2. 667. 20. *Fn. Sv.* 776.

Habitat in Europae aquis.

22. *D. testaceus nigro irroratus*, capite pectoreque nigris. *irroratus*.
Syst. Ent. 233. 16. *

Habitat in Americae aquis.

23. *D. niger*, thorace nigro, fascia pallida, elytris albo nigroque variis. *maculatus*.
Syst. Ent. 233. 17. *Linn. Syst. Nat.*

2. 666. 5. *Fn. Sv.* 777. *Vdm. Diff.* 43.

Habitat in Europae aquis.

24. *D. ovato oblongus niger*, capite pedibusque rufis. *erythrocephalus*.
Syst. Ent. 233. 18. *Linn. Syst. Nat.* 2. 660. 14. *Fn. Sv.* 774.

Degeer Inf. 4. 404. 12.

Habitat in Europae aquis.

25. *D. thorace rufo*, elytris cinereo nigroque striatis. *varius*.
Syst. Ent. 233. 19. *

Habitat in Patagoniae aquis. *Mus. Dom. Banks.*

- notatus*. 26. D. fuscus, thorace flavo, punctis quatuor nigris.
Dytiscus notatus. *Bergstr. Nomencl.* 1. tab. 5. fig. 10.
 Habitat in Germaniae aquis.
 Statura D. palustris. Margo elytrorum flavescit.
- depressus*. 27. D. thorace ferrugineo, punctis duobus baseos nigris,
 elytris fuscis ferrugineo maculatis. *Syst. Ent.* 233.
 20. *
 Habitat in Sueciae aquis.
- 6pustulatus*. 28. D. ater, capite ferrugineo, elytris maculis tribus rufis, baseos maiore. *Gen. Inj. Mant.* 239. *
 Habitat in Sueciae aquis stagnantibus.
- palustris*. 29. D. laevis, elytris lituris duabus lateralibus albis. *Syst. Ent.* 233. 21. *Linn. Syst. Nat.* 2. 667. 19. *Fn. Sv.* 775.
 Habitat in Europae aquis stagnantibus.
 Thorax ferrugineus.
- ouatus*. 30. D. ouatus fuscus, capite thoraceque ferrugineis. *Syst. Ent.* 233. 22. *Linn. Syst. Nat.* 2. 667. 18. *Fn. Sv.* 2282.
Dytiscus ouatus fuscus, capite thoraceque rubicundis.
Geoff. Inf. 1. 191. 10.
Dytiscus sphaericus rufus fuscus, corpore ouato gibbo.
Degeer Inf. 4. 402. 9. tab. 14. fig. 17 — 19.
 Habitat in Europae aquis stagnantibus.
 Varietatem vidimus duplo maiorem vix tamen distinctam, margine elytrorum albo maculato.
- lituratus*. 31. D. niger, elytris basi lituraque apicis pallidis.
 Habitat in Italia. *Dr. Allioni*.
 Corpus parvum, depressum, atrum. Basis elytrorum pallida et versus apicem punctum vnum alterumue.
 Pedes picei.
- signatus*. 32. D. niger, capite thoraceque rufis, signaturis nigris.
Syst. Ent. 234. 23. *
 Habitat in Patagoniae aquis. *Mus. Dom. Banks*.
- granularis*. 33. D. niger, elytris lineis duabus flavescentibus, pedibus rufis. *Syst. Ent.* 234. 24. *Linn. Syst. Nat.* 2. 667. 22.

Dytiscus minimus. Scop. carn. 297.

Habitat in Europae borealis aquis stagnantibus.

34. *D. ferrugineus*, coleoptris fuscis, lineis flavescenti-*lineatus*.
bus. *Syst. Ent.* 234. 25. *

Dytiscus lineatus. Bergstr. *Nomencl.* 1. 32. 8. 9. tab.
6. fig. 8. 9.

Habitat in aquis stagnantibus Alsatiae. *D. Prof. Hermann.*

35. *D. ferrugineus*, elytris nigris, lateribus inaequaliter *inaequalis*.
ferrugineis. *Gen. Inf. Mant.* 239. *

Habitat in Sueciae aquis stagnantibus.

36. *D. flavescens*, elytris fuscis, margine flavo maculato. *minutus*.
Syst. Ent. 234. 26.

Dytiscus minutus elytris fuscis basi lateribusque pallidis, thorace flavo immaculato, corpore ovato. *Linn. Syst. Nat.* 2. 667. 23. *Fn. Sv.* 778.

Dytiscus ruficollis rufus, elytris striatis flavo griseis, maculis nigris. *Degeer Inf.* 4. 404. 18. tab. 16. fig. 9.

Habitat in Europae aquosis.

37. *D. ater*, thorace elytrisque margine albis. *pusillus*.

Habitat in Italiae aquis. *D. Allioni.*

Corpus vix magnitudine pediculi nigrum. Thorax ater margine albo. Elytra nigra margine inprimis antico et apicis albo.

67. G Y R I N V S.

1. *G. substriatus.* *Syst. Ent.* 234. 1. *Linn. Syst. Nat.* 2. *natator*.
567. 1. *Fn. Sv.* 779. *Geoff. Inf.* 1. 194. tab. 3. fig. 3.

Dytiscus natator. Scop. carn. 299.

Scarabaeus aquaticus subrotundus e coeruleo viridi colore splendente vndique tinctus. *Raj. Inf.* 87. 10.

Scarabaeus niger nostras, supra aquam velociter circumnatans. *Petiv. Gazoph.* 21. tab. 13. fig. 9.

Pulex aquaticus. *Merret. pin.* 203.

Roef. Inf. 3. 195. tab. 31.

Sulz. Hist. Inf. tab. 6. fig. 43.

Schaeff. Elem. tab. 57.

Habitat in Europae lacubus frequens.

Animalculum nitidissimum foetens velocissime supra aquam per orbis curstat, dum vero vrinatur, bul- lam aeream hydrargyri coloris secum trahit.

australis. 2. *G. virescens* substriatus, elytris abbreviatis videntatis.
Syst. Ent. 235. 2. *

Habitat in novae Hollandiae aquis. *Mus. Dom. Banks.*

americana- 3. *G. laevis* ater opacus. *Syst. Ent.* 235. 3. *Linn. Syst.*
nus. *Nat.* 2. 568. 2.

Habitat in Americae meridionalis aquis.

spinofus. 4. *G. niger* nitidus, thoracis elytrorumque margine flauo, elytris spinosis.

Habitat in Coromandel. *Mus. Dom. Banks.*

Statura praecedentium, at distinctus spinis elytrorum duabus elongatis, acutissimis. Corpus subtus ferrugineum ano nigro.

68. C A R A B V S.

* M a i o r e s.

maxillo- 1. *C. apterus* ater, mandibulis exsertis longitudine capi-
fus. tis, thorace postice producto bilobo.

Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*

Maximus in hoc genere. Antennae filiformes, nigrae apice fuscae. Caput magnum, exsertum fronte plana, clypeoque porrecto, rotundato, integro. Mandibulae magnae, exsertae, acutae, integrae. Thorax singularis, cordatus, marginatus, dorso eleuato, medio concauo et postice producto lamellis duabus depressis, obtusis. Elytra glabra, vix punctata, atra.

coriaceus. 2. *C. apterus* ater opacus, elytris connatis punctis intricatis subrugosis. *Syst. Ent.* 235. 1. *Linn. Syst. Nat.* 2. 668. 1. *Scop. carn.* 265.

Buprestis ater, elytris rugosis. *Geoff. Inf.* 1. 141. 1.

Sulz. Hist. Inf. tab. 6. fig. 44.

Pontop. Atl. Dan. 1. tab. 29.

Degeer Inf. 4. 9. 4.

Bergstr. Nomencl. 1. tab. 13. fig. 7.

Schaeff. Icon. tab. 36. fig. 1.

Habitat in Germaniae sylvis.

3. *C. alatus niger*, thorace elytrorumque marginibus violaceis. *Syst. Ent.* 236. 2.

Carabus violaceus alatus, elytris laeviusculis nigris, margine aureo, thorace subviolaceo. *Linn. Syst. Nat.* 2. 669. 8. *Fn. Sv.* 787.

Carabus apterus aeneo niger nitidus thorace subviolaceo, elytris punctis minutissimis excavatis triplici serie. *Degeer Inf.* 4. 89. 3.

Scarabaeus maior e purpura nigricans. *Raj. Inf.* 96. 1.

Scarabaeus maximus e viola nigricans. *List. Scar. Angl.* 389. 22.

Scarabaeus terrestris nigricans. *Frisch. Inf.* 13. tab. 23.

Schaeff. Icon. tab. 3. fig. 1.

tab. 88. fig. 1.

Bergstr. Nomencl. 1. 16. 14. tab. 2. fig. 14.

tab. 10. fig. 6.

Habitat in Europae sylvis passim.

4. *C. apterus niger violaceo nitens*, elytris punctis intricatis rugosis. *Gen. Inf. Mant.* 239. *

Carabus intricatus violaceo niger, elytris intricatis elevato striatis punctatisque. *Linn. Fn. Sv.* 207. 780.

Buprestis nigro violaceus, elytris dense striatis. *Geoff. Inf.* 1. 144. 4.

Pontop. Atl. Dan. 1. tab. 29.

Bergstr. Nomencl. 1. tab. 10. fig. 7.

Habitat in Europa boreali rarior.

5. *C. apterus*, thorace angustato ater, coleoptris novem *roguttatus*.
fulcatis punctisque decem albis. *Syst. Ent.* 236. 3.

Linn. Syst. Nat. 2. 669. 10. *Mus. Lud. Vlr.* 96.

Carabus ferrator coleoptris ovatis subplanis pone truncatis nigris, maculis inaequalibus albis. *Forsk. Desc. anim.* 77. 4.?

Habitat in Africa.

Maximus in hoc genere.

- 6guttatus.* 6. *C. apterus*, thorace postice angustato, elytris laevis aetris, punctis duobus griseis. *Syst. Ent.* 236. 4.*
Habitat in Suratte. *Mus. Dom. Banks.*
Thorax puncto vtrinque unico, elytris duobus viloso griseis.
- quadriguttatus.* 7. *C. apterus*, thorace postice attenuato, elytris fulcatis, maculis duabus griseis remotis. *Syst. Ent.* 236. 5.*
Habitat ad Cap. bon. sp.
- tabidus.* 8. *C. apterus*, thorace postice angustato ater, elytris rugoso fulcatis. *Syst. Ent.* 237. 6.*
Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*
- gemma-tus.* 9. *C. apterus niger*, elytris striatis, punctis aeneis bilobis excauatis triplici serie.
Habitat Hamburgi. *D. Schulz.*
Statura omnino *C. hortensis*. Caput et thorax atra, immaculata. Elytra striis plurimis exarata punctisque aeneis bilobis excauatis triplici serie.
- hortensis.* 10. *C. apterus niger*, elytris laevis aetris, punctis aeneis excauatis triplici serie. *Syst. Ent.* 237. 7. *Linn. Syst. Nat.* 2. 668. 3. *Fn. Sv.* 783.
Carabus striatus niger, elytris striatis, margine violaceis punctis aureis excauatis triplici serie. *Degeer Inf.* 4. 90. 5. tab. 3. fig. 1.
Cerambyx purpurea punctata. *Raj. Inf.* 96. 2. *List. mut.* tab. 8. fig. 4.
Stroem. Act. Nidros. 3. p. 401. tab. 6. fig. 7.
Schaeff. Icon. tab. 11. fig. 3.
Bergstr. Nomencl. 1. tab. 10. fig. 4. 5.
Habitat in Europae hortis et syluis.
- calidus.* 11. *C. apterus niger*, elytris crenato striatis punctisque aureis excauatis triplici serie. *Syst. Ent.* 237. 8.*
Habitat in Americae meridionalis insulis. *D. v. Rohr,*
- retusus.* 12. *C. apterus*, elytris striatis virescentibus, punctis aeneis excauatis triplici serie basi retusis. *Syst. Ent.* 237. 9.*
Habitat ad Patagoniae littora. *Mus. Dom. Banks.*

13. *C. apterus ater*, elytris basi retusis. *Syst. Ent.* 237. 10.* *Maderae.*
Habitat in Madera infula. *Mus. Dom. Banks.*
14. *C. apterus conuexus ater laevis*, thorace postice emar- *conuexus.*
ginato. *Syst. Ent.* 238. 11.*
Habitat in Germaniae fyluis.
15. *C. apterus*, elytris auratis fulcatis, antennis pedibus- *auratus.*
que rufis. *Syst. Ent.* 238. 12.
Carabus auratus apterus, elytris fulcatis, striis fulcis-
que laevis inauratis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 669. 7.
Fn. Sv. 780.
Carabus fulcatus apterus viridi aeneus nitidus, anten-
nis pedibusque rufis, abdomine nigro, elytris fulca-
tis. *Degeer Inf.* 4. 104. 1. tab. 7. fig. 20.
Buprestis viridis, elytris obtuse fulcatis non punctatis,
pedibus antennisque ferrugineis. *Geoff. Inf.* 1. 142.
2. tab. 2. fig. 5.
Cerambyx dorso in longas regulas diuiso, omnium pul-
cherrimus. *Raj. Inf.* 96. 6.
Bergstr. Nomencl. 1. tab. 12. fig. 8. 9.
Habitat in Europae locis suffocatis, fyluis.
16. *C. apterus*, elytris striatis viridibus, sutura aurea. *Syst. futuralis.*
Ent. 238. 13.*
Habitat in Terra del Fuego. *Mus. Dom. Banks.*
17. *C. apterus nigricans*, elytris aeneis striatis interiectis *granula-*
punctis eleuatis longitudinalibus. *Syst. Ent.* 238. 14. *tus.*
Carabus granulatus apterus, elytris longitudinaliter
conuexe punctatis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 668. 2. *Fn.*
Sv. 780.
Buprestis niger, elytris aeneis conuexe punctatis stria-
tisque. *Geoff. Inf.* 1. 143. 3.
Carabus subapterus supra viridi aeneus subtus niger,
elytris tuberculis triplici ordine fulcis eleuatis. *De-*
geer Inf. 4. 88. 2.
Carabus granulatus. *Bergstr. Nomencl.* 1. tab. 12.
fig. 4. 5.
Schaeff. Icon. tab. 18. fig. 6.
Sulz. Hist. Inf. tab. 7. fig. 2.
Habitat in Europae aruis.

clatratus. 18. *C. apterus nigricans*, elytris aeneis striatis interiectis punctis excavatis cupreis.

Carabus clatratus apterus nigricans, elytris aeneis porcatis interiectis punctis excavatis longitudinalibus. *Syst. Ent.* 238. 15. *Linn. Syst. Nat.* 2. 669. 5. *Fn. Sv.* 782.

Habitat in Europa.

Differt manifeste a praecedente elytris striatis et inter strias puncta eleuata longitudinalia et inter haec puncta magna excavata, cuprea.

porcatus. 19. *C. apterus ater*, elytris striatis apice granulatis. *Syst. Ent.* 239. 16. *

Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

reflexus. 20. *C. apterus ater*, thoracis margine rotundato reflexo, elytris fulcatis, maculis duabus flauis.

Habitat in Coromandel. *Mus. Dom. Banks.*

Caput atrum vtrinque impressum. Thorax inaequaliter punctatus margine vtrinque dilatato rotundato parum reflexo. Elytra conuata fulcis octo exarata, atra maculis duabus transuersis flauis. Pedes nigri.

angulatus. 21. *C. apterus hirtus ater*, thorace canaliculato, coleoptris fulcatis, fasciis duabus flauis interruptis.

Habitat in Coromandel. *Mus. Dom. Banks.*

Affinis praecedenti, attamen differre videtur. Thorax vix marginatus vtrinque angulum format lineaque dorsali impressa. Coleoptrorum maculae maiores fasciam in medio interruptam constituunt.

nitens. 22. *C. apterus*, elytris porcatis scabris viridibus, margine aureo. *Syst. Ent.* 239. 17.

Carabus nitens apterus, elytris porcatis, striis passim interruptis fulcisque scabriusculis inauratis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 669. 6. *Fn. Sv.* 185.

Carabus aureus apterus, capite thoraeque auris, corpore subtus nigro, elytris viridi aeneis, margine aureo, fulcis eleuatis nigris. *Degeer Inf.* 4. 91. 6.

Schaeff. Icon. tab. 51. fig. 1.

Sulz. Hist. Inf. tab. 7. fig. 3.

Scopol. carn. 262.

Habitat in Europae fyluis.

23. *C. alatus*, elytris striatis viridi aeneis, punctis triplici *inquisitor*.
ordine. *Syst. Ent. 239. 18. Linn. Syst. Nat. 2. 669.*

11. Fn. Sv. 789.

Carabus alatus, elytris striatis margine aeneis, punctis
excauatis triplici ordine. *Degeer Inf. 4. 94. 9.*

Buprestis, elytris latis, singulo striis sedecim. *Geoff.*
Inf. 1. 145. 6.

Bergstr. Nomencl. 1. tab. 12. fig. 3.

Habitat in Europae locis suffocatis.

Variat rarius elytris totis nigris.

24. *C. alatus*, elytris striatis viridibus, punctis triplici *scrutator*.
serie, thorace cyaneo, margine reflexo inaurato.

*Syst. Ent. 239. 19. **

Habitat in Virginia. *Mus. Dom. Banks.*

25. *C. alatus violaceo nitens*, elytris striatis aureis. *Syst. sycophanta*.
Ent. 239. 20.

Carabus sycophanta aureo nitens, thorace coeruleo,
elytris aureo viridibus striatis, abdomine subatro.

Linn. Syst. Nat. 2. 670. 12. Mus. Lud. Vlr. 95. Fn.

Sv. 790.

Carabus alatus nitens, thorace femoribusque violaceis,
elytris viridibus striatis, abdomine viridi aureo. *De-*
geer Inf. 4. 105. 2. tab. 17. fig. 19.

Buprestis nigro violaceus, elytris latis aeneis, e viridi
purpureis, singulis striis sexdecim. *Geoff. Inf. 1.*

144. 5.

Bergstr. Nomencl. 1. tab. 12. fig. 1. 2.

Reaum. Inf. 2. tab. 37. fig. 18.

Rob. Inn. tab. 20. fig. 2.

Schaeff. Elem. tab. 2. fig. 1.

Icon. tab. 66. fig. 6.

Sulz. Hist. Inf. tab. 7. fig. 1.

Habitat in Europa sub lapidibus.

Larua nigra laruis phalaenarum victitat.

- rostratus.* 26. *C. apterus*, elytris laeuiibus nigris, thorace angustiore, capite angustissimo. *Syst. Ent.* 240. 21.
Tenebrio rostratus apterus niger, elytris laeuiusculis vniangulatis, thorace angustiore, capite angustissimo. *Linn. Syst. Nat.* 2. 577. 20. *Fn. Sv.* 823.
 Habitat in Europa boreali.
 Huius generis, at elytra deflexa, vti in *Tenebrionibus*.
- cephalotes.* 27. *C. apterus ater* laeuissimus, thorace orbiculato conuexo. *Syst. Ent.* 240. 22.
Carabus Cephalotes apterus, elytris atris laeuiibus, thorace exserto oblongo. *Linn. Syst. Nat.* 2. 669. 9. *Fn. Sv.* 188.
Scarabaeus. *Frisch. Inf.* 13. 25. tab. 22.
Sulz. Hist. Inf. tab. 7. fig. 4.
Schaeff. Icon. tab. 17. fig. 1.
 β. *Tenebrio gibbus* apterus laeuis, thorace orbiculato conuexo antice truncato. *Linn. Syst. Nat.* 2. 676. 18. *Fn. Sv.* 824.
Tenebrio apterus niger laeuissimus, thorace orbiculato, elytris valde eleuatis conuexis. *Degeer Inf.* 5. 51. 1. tab. 13. fig. 8.
 Habitat in Europa boreali.
- laeuigatus.* 28. *C. alatus depressus* ater, thoracis angulis postice rotundatis, thorace elytrisque laeuissimis.
 Habitat in Coromandel. *Mus. Dom. Banks.*
 Corpus maiusculum, at praecedentibus magis planum, laeue, glabrum, atrum, immaculatum. Thoracis anguli postice omnino rotundati.
- leucophtalmus.* 29. *C. alatus ater*, elytris striatis, thorace canaliculato. *Syst. Ent.* 240. 23.
Carabus leucophtalmus elytris laeuiibus, striis obsoletis octo. *Linn. Syst. Nat.* 2. 668. 4. *Fn. Sv.* 784.
Carabus niger striatus alatus totus niger nitidus, elytris striatis. *Degeer Inf.* 4. 96. 12.
Buprestis ater, elytro singulo striis octo laeuiibus, pedibus nigris. *Geoff. Inf.* 1. 146. 7.
Scarabaeus ex toto niger. *List. Scar. Angl.* 390. 23.
Bergstr. Nomencl. 1. 9. 13. tab. 1. fig. 13.
Schaeff. Icon. tab. 18. fig. 2.

Habitat

Habitat in Europae quisquiliis frequens.
Magnitudine variat.

30. *C. apterus ater*, thorace angustiori, capite postice attenuato, elytris fulcatis truncatis. *attelaboides.*

Habitat in Coromandel. *Mus. Dom. Banks.*

Magnitudo *C. leucophthalmi*. Caput magnum, porrectum, atrum, oculis testaceis antice subretusum, postice attenuatum. Thorax angustus, parum marginatus, punctatus, ater, immaculatus. Elytra fulcis novem aequalibus exarata, atra, immaculata postice truncata, integra. Corpus et pedes nigra.

31. *C. apterus ater*, thorace postice angustato, marginibus albis, elytris albidis, futura lineaque atris. *trilineatus.*

Habitat in Coromandel. *Mus. Dom. Banks.*

Minor praecedentibus. Caput cum antennis atrum interdum immaculatum, interdum lineolis duabus villoso albidis. Thorax postice valde angustatus, ater lateribus late villoso albidis. Elytra villoso albida futura tota lineaque media atris, quae nec basin nec apicem attingit. Corpus et pedes atra.

Varietas linea elytrorum altera, quae futuram lineamque iungit.

** M i n o r e s .

32. *C. niger*, thoracis basi vtrinque puncto impresso, elytris striatis medio glabris. *Syst. Ent. 240. 24.* striatus.*

Habitat ad Patagoniae littora. *Mus. Dom. Banks.*

33. *C. ater*, thorace quadrato laevi, antennis piceis. *Syst. caliginosus.*
*Ent. 240. 25.**

Habitat in America. *Dom. Lewin.*

Caput punctis duobus impressum.

34. *C. pallidus*, elytris maculis duabus dorsalibus atris. *arenarius.*
*Syst. Ent. 241. 26.**

Habitat in arena mobili Cambriae. *Mus. Dom. Banks.*

35. *C. ater*, elytris fulcatis laevibus, antennis pedibusque rufis. *ruficornis.*
*Syst. Ent. 241. 27.**

Fabr. Spec. Inf.

V

Bupre-

Buprestis niger, elytro singulo striis octo laevis,
pedibus ferrugineis. *Geoff. Inf.* 1. 146. 8.

Scarabaeus niger, pedibus corniculisque croceis. *List.*
Scar. Angl. 390. 24.

Habitat in Europae sylvis frequens.

bicolor. 36. *C. supra niger* subtus ferrugineus. *Syst. Ent.* 241. 28.*
Habitat in America boreali. *Dom. Lewin.*

piceus. 37. *C. thorace* obcordato, antennis tibiisque piceis, elytris striatis. *Syst. Ent.* 241. 29. *Linn. Syst. Nat.* 2. 672. 30.

Schaeff. Icon. tab. 18. fig. 9.

Habitat in Europa boreali.

femorialis. 38. *C. capite* thoraceque aeneis, elytris striatis obscurioribus, femoribus rufis. *Syst. Ent.* 241. 30.*

Habitat in Sierra Leon Africae. *Mus. Dom. Banks.*

madidus. 39. *C. thorace* postice vtrinque impresso niger, femoribus rufis. *Syst. Ent.* 241. 31.*

Habitat in Anglia, capt. die VI. Maii in nemore Richmondensi.

Varietatem vidi femoribus nigris: an distincta species?

inter- 40. *C. ater*, thorace postice rotundato abdomineque re-
ruptus. motis. *Syst. Ent.* 242. 32.*

Habitat in Oriente. *Dom. Forskahl.*

Forte ad tenebriones emendandus.

compla- 41. *C. thorace* orbiculato rufus, elytris fasciis duabus ni-
natus. gris. *Syst. Ent.* 242. 33.*

Carabus complanatus pallidus, elytris fasciis duabus undulatis nigris. *Linn. Syst. Nat.* 2. 671. 17.

Habitat in St. Domingo.

america- 42. *C. niger*, thorace, pedibus antennisque ferrugineis.
nus. *Syst. Ent.* 242. 34. *Linn. Syst. Nat.* 2. 671. 19.

Carabus alatus niger, thorace, antennis pedibusque ferrugineis, genibus nigris, elytris striatis. *Degeer Inf.*

4. 107. 3. tab. 17. fig. 21.

Habitat in America.

43. *C. ferrugineus*, elytris nigro cyaneis. *fumans*.
 Habitat in America. *D. Blackburn*.
 Affinis *C. crepitanti*, at triplo maior et totus ferrugineus folis elytris cyaneis.
44. *C. thorace*, capite pedibusque ferrugineis, elytris nigro crepitans, gris. *Syst. Ent.* 242. 35.
Carabus crepitans. *Linn. Syst. Nat.* 2. 671. 18. *Fu. Sv.* 272.
Carabus alatus ferrugineus, thorace angusto, elytris cinereo nigris. *Degeer Inf.* 4. 103. 22. tab. 3. fig. 18.
Buprestis capite, thorace pedibusque rubris, elytris coeruleo nigris. *Geoff. Inf.* 1. 151. 19.
Cicindela capite, thorace pedibusque rufis, elytris nigro coeruleis. *Rol. Art. Holm.* 1750. 292. tab. 7. fig. 2.
Bergstr. Nomencl. 1. tab. 13. fig. 9.
Schaeff. Icon. tab. 11. fig. 13.
Voet. Scarab. 1. tab. 36. fig. 26.
 Habitat in Europae nemoribus.
 Venatus a maioribus carabis eos crepitu ventris repellit.
45. *C. niger*, capite elytrisque truncatis puncto baseos fasciaque media ferrugineis. *Syst. Ent.* 243. 36. * *bimaculatus*.
Carabus zmaculatus niger, fascia communi flava interrupta, antennis pedibusque testaceis. *Linn. Mant.* 532.
Sulz. Hist. Inf. tab. 7. fig. 5.
 Habitat in India orientali.
 Thorax colore variat, mox flauus, mox niger, mox maculatus.
46. *C. rufus*, elytris nigris, punctis sex rufis. *Syst. Ent.* 6 *opastulatus*.
App. 825. * *tus*.
 Habitat in America meridionali. *Dom. Edler*.
47. *C. thorace orbiculato cyaneus*, ore antennis tibiisque rufis. *Syst. Ent.* 243. 37. * *spinibarbis*.
 Habitat in Anglia. *Dom. Lee*.
48. *C. thorace rotundato*, elytris striatis punctisque impressis, antennis pilosis. *Syst. Ent.* 243. 38. * *pilicornis*.

Habitat in Anglia. *Muf. Dom. Banks.*
 Variat colore nigro et aeneo.

coerule- 49. *C. nigro coerulefcens*, elytris ftriatis. *Syft. Ent.* 243.
fcens. 39. *

Carabus coerulefcens nigro coeruleus, antennis bafi
 rubris. *Linn. Syft. Nat.* 2. 672. 28. *Fn. Sv.* 800.

Schaeff. Icon. tab. 18. fig. 3. 4.

Habitat in Europae hortis, viis.

cupreus. 50. *C. cupreus*, antennis bafi rubris. *Syft. Ent.* 243. 40.*
Linn. Syft. Nat. 2. 672. 29. *Fn. Sv.* 801.

Carabus alatus fupra viridi aeneus, fubtus niger, an-
 tennis bafi rufis. *Degeer Inf.* 4. 97. 13. tab. 3. fig. 15.

Buprefstis totus viridi cupreus, antennis nigris. *Geoff.*
Inf. 1. 161. 40.

Habitat in Europae fyluis.

Carnifex. 51. *C. alatus* viridi aeneus, antennis pedibusque rufis,
 thorace anguftato. *Syft. Ent.* 244. 41. *

Habitat in Terra del Fuego. *Muf. Dom. Banks.*

vulgaris. 52. *C. nigro aeneus*, pedibus antennisque nigris. *Syft.*
Ent. 244. 42. *Linn. Syft. Nat.* 2. 672. 27. *Fn. Sv.*
 799. *Scop. carn.* 268.

Carabus alatus fupra viridi aeneus nitidus fubtus ni-
 ger, pedibus antennisque nigris. *Degeer Inf.* 4.
 97. 14.

Buprefstis fulco aeneus, elytris ftriatis, punctis quatuor
 impreflis. *Geoff. Inf.* 1. 158.

Schaeff. Icon. tab. 18. fig. 2.

Habitat in Europae fyluis frequens.

azureus. 53. *C. cyaneus*, antennis pedibusque rubris. *Syft. Ent.*
 244. 43. *

Bergftr. Nomencl. 1. tab. 10. fig. 3.

Habitat in Lipfiae collibus arenofis.

latus. 54. *C. niger*, elytris ftriatis crenatis, antennis pedibusque
 ferrugineis. *Syft. Ent.* 244. 44. *Linn. Syft. Nat.* 2.
 672. 24.

Carabus alatus niger nitidus, elytris striatis pedibus antennisque rubris. *Degeer Inf.* 4. 101. 18.

Schaeff. Icon. tab. 194. fig. 7.

Habitat in Europa frequens.

Punctum vtrinque thoracis basi impressum.

55. *C. thorace subaequali ferrugineus*, elytris lineola nigra. *Syst. Ent.* 244. 45. * *lineola.*

Habitat in America septentrionali. *Mus. Dom. Banks.*

56. *C. ferrugineus*, elytris striatis obscurioribus. *Syst. ferrugineus.*
Ent. 244. 46.

Carabus ferrugineus thorace glaberrimo. *Linn. Syst. Nat.* 2. 672. 25. *Fn. Sv.* 798.

Carabus alatus flavo griseus nitidus oculis nigris, elytris striatis. *Degeer Inf.* 4. 101. 19.

Buprestis ferrugineo lividus, elytris punctato striatis. *Geoff. Inf.* 1. 162. 43.

Habitat in Europae aruis.

57. *C. pallidus*, elytris striatis. *Syst. Ent.* 244. 47. * *pallens.*

Habitat Dresdae Saxonum.

58. *C. subaeneus*, elytris punctis vagis plurimis impressis. *multipunctatus.*
Syst. Ent. 245. 48. *Linn. Syst. Nat.* 2. 672. 32. *Fn. aeneus.*
Sv. 805.

Habitat in Europae fabulosis.

59. *C. ferrugineus*, thorace elytrisque aeneis. *Syst. Ent.* *aeneus.*
245. 49. *

Habitat in Lipsiae hortis.

60. *C. capite thoraceque viridibus*, elytris cupreis. *Syst. sexpunctatus.*
Ent. 245. 50.

Carabus sexpunctatus subaeneus, elytris punctis longitudinalibus sex impressis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 672. 35. *Fn. Sv.* 807.

Carabus alatus, capite thoraceque viridi aureis, elytris rubro aeneis, punctis sex impressis. *Degeer Inf.* 4. 99. 16.

Buprestis nitens, capite thoraceque viridibus, elytris cupreis punctatis. *Geoff. Inf.* 1. 149. 14.

Goed. *Inf.* 2. 126. tab. 31.

Schaeff. *Icon.* tab. 66. fig. 4.

Habitat in Europa, America boreali.

marginatus. 61. *C. viridis*, elytris margine tibiisque testaceis. *Syst. Ent.* 245. 51. *Linn. Syst. Nat.* 2. 670. 16. *Fn. Sv.* 804.

Buprestis viridis pedibus elytrorumque margine exteriori pallidis. *Geoff. Inf.* 1. 162. 41.

Pontop. Atl. Dan. 1. tab. 29.

Habitat in Europae aruis.

Variat colore nigro et viridi.

cinctus. 62. *C. fuscus*, capite thoraceque viridi aeneis, elytrorum margine pedibusque pallidis.

Habitat in Coromandel. *Mus. Dom. Banks.*

Maior *C. marginato*. Caput et thorax viridi aenea, glabra, nitida. Antennae palpique pallidae. Elytra striata fusca margine pallido. Corpus fuscum abdominis margine pallido. Pedes pallidi.

limbatus. 63. *C. thorace elytrisque viridibus*, margine fasciisque abbreviatis pallidis. *Gen. Inf. Mant.* 240. *

Carabus dubius. *Act. Soc. Berol. phys.* 4. tab. 7. fig. 4.

Habitat Kiliae sub lapidibus. *Dom. de Schestedt.*

melanocephalus. 64. *C. niger*, thorace pedibusque ferrugineis. *Syst. Ent.* 245. 52.

Carabus melanocephalus thorace pedibusque ferrugineis, elytris capiteque atris. *Linn. Syst. Nat.* 2. 671. 22. *Fn. Sv.* 795.

Carabus apterus niger nitidus, elytris laevibus, antennis pedibusque flavo testaceis. *Degeer Inf.* 4. 93. 8.

Buprestis niger, thorace, antennis pedibusque ferrugineis. *Geoff. Inf.* 1. 162. 42.

Habitat in Europae suffocatis.

Variat antennis ferrugineis et fuscis.

cyanocephalus. 65. *C. thorace pedibusque ferrugineis*, elytris capiteque cyaneis. *Syst. Ent.* 245. 53. *Linn. Syst. Nat.* 2. 671. 21. *Fn. Sv.* 794.

Carabus alatus capite elytrisque viridi coeruleis, thorace pedibusque ferrugineis. *Degeer Inf.* 4. 100. 17. tab. 3. fig. 17.

Buprestis capite elytrisque coeruleis, thorace rubro. *Geoff. Inf.* 1. 149. 40.

Cantharis elytris et capite coeruleis, scapulis croceis. *Raj. Inf.* 89. 1.

Schaeff. Icon. tab. 10. fig. 14.

Habitat in Europae fyluis.

66. *C. niger*, elytris ferrugineis, macula media sinuata *flexuosus*, puncto que apicis nigris. *Syst. Ent.* 246. 54. *

Habitat in India orientali. *D. Koenig.*

67. *C. thorace orbiculato rubro, coleoptris truncatis rubris, cruce nigra. Syst. Ent.* 246. 55. * *crux maior.*

Carabus crux maior thorace capiteque nigro rubescente, coleoptris ferrugineis cruce nigra. *Linn. Syst. Nat.* 2. 673. 39.

Buprestis niger, thorace pedibusque rubris, elytris rubris, cruce nigra. *Geoff. Inf.* 1. 150.

Schaeff. Icon. tab. 1. fig. 13.

Habitat in Europae fyluis.

68. *C. thorace marginato rufo, elytris atris, vitta alba. vittatus.* *Gen. Inf. Mant.* 240. *

Habitat in America boreali. *Dom. Teats.*

69. *C. thorace orbiculato rufo, coleoptris apice nigris, macula rufa. Syst. Ent.* 246. 56. * *crux minor.*

Carabus crux minor thorace luteo glabro, elytris postice nigris, maculis duabus flavis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 673. 40. *Fn. Sv.* 809.

Schaeff. Icon. tab. 18. fig. 8.

tab. 41. fig. 13.

Salz. Hist. Inf. tab. 7. fig. 6.

Habitat in Anglia, Europa.

70. *C. thorace orbiculato nigro nitido, elytris pallidis, fascia media nigra. Andreae.*

Habitat in Italia. *D. Allioni.*

Statura omnino *C. crux minor*. Elytra apice parum fusca. Pedes pallidi. Fascia in medio elytrorum ad futuram dilatata.

- germanus.* 71. *C. cyaneus*, capite elytris pedibusque testaceis, elytris apice violaceis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 672. 26, *Schaeff. Icon.* tab. 31. fig. 13.
Habitat in Germania,
- velox.* 72. *C. nigricans*, antennis pedibusque pallidis, elytris obtusissimis. *Syst. Ent.* 247. 57. *Linn. Syst. Nat.* 2. 672. 31. *Fn. Sv.* 803.
Habitat in Europae arena,
- rufescens.* 73. *C. thorace rotundato ferrugineus*, vertice anoque nigris. *Syst. Ent.* 247. 58. *
Habitat in Anglia. *Mus. D. Hunter.*
- apustulatus.* 74. *C. thorace orbiculato elytrisque nigris*, maculis duabus rufis. *Syst. Ent.* 247. 59. *
Habitat in Anglia. *Dom. Lee.*
- apustulatus.* 75. *C. thorace cordato flavus*, elytris fuscis, maculis duabus flavis.
Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*
Paruus. Antennae fuscae. Caput flavum, immaculatum. Thorax cordatus, flavus linea dorsali imprefsa. Elytra substriata, truncata, fusca maculis duabus flavis, altera baseos, altera versus apicem.
- vaporariorum.* 76. *C. thorace*, elytris antice margineque, antennis pedibusque ferrugineis. *Syst. Ent.* 247. 60. *Linn. Syst. Nat.* 2. 261. 23. *Fn. Sv.* 796.
Carabus nigricans, antennis, thorace pedibus elytrisque antice ferrugineis. *Müll. Zool. Dan. prodr.* 78. 850.
Habitat in Europa frequens.
- meridiana.* 77. *C. niger*, elytris antice pedibusque testaceis. *Syst. Ent.* 247. 62. *Linn. Syst. Nat.* 2. 673. 36.
Habitat in Europa.
Paruus a *C. vaporariorum* diversissimus,
- Comma.* 78. *C. niger*, thorace fusco, elytris griseis, macula lineari nigra. *Syst. Ent.* 248. 63. *
Habitat in America. *Dom. Drury.*

79. C. thorace ferrugineo glabro, elytris obtusissimis fuscis, maculis duabus albis. *Syst. Ent.* 248. 64. *Linn. Syst. Nat.* 2. 673. 40. *Fn. Sv.* 809. *4maculatus.*
Buprestis niger, thorace plano ferrugineo, elytris laevibus, maculis quatuor albis. *Geoff. Inf.* 1. 152. 24.
Pontop. Atl. Dan. 1. tab. 29.
 Habitat in Europae quisquiliis.
80. C. thorace rotundato atro, elytris nigris, punctis quatuor albis. *Syst. Ent.* 248. 65. * *4guttatus.*
 Habitat in Anglia.
81. C. thorace nigro, elytris obscuris pallido bifasciatis. *Syst. Ent.* 248. 66. *Linn. Syst. Nat.* 2. 673. 38. *Fn. Sv.* 810. *astulatus.*
 Habitat in Europae quisquiliis.
 Variat maculis magnis obsoletis rubro pallidis.
82. C. thorace rotundato rufo, elytris obtusis testaceis, capite atro. *Syst. Ent.* 248. 67. *atricapillus.*
Carabus atricapillus flavus, capite nigro, elytris obtusissimis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 673. 42.
 Habitat in Europa boreali.
83. C. thorace rotundato aeneo, elytris nigris, macula apicis pallida. *It. Norwag.* d. 13. Iul. * *biguttatus.*
 Habitat sub arborum corticibus, Norwagiae capt. d. 13. Iul.
84. C. capite thoraceque ferrugineis, elytris testaceis. *Syst. Ent.* 248. 68. *testaceus.*
Carabus testaceus pallide testaceus, elytris glabris. *Linn. Syst. Nat.* 2. 673. 37. *Fn. Sv.* 812.
Buprestis testaceus capite nigro. *Geoff. Inf.* 1. 153. 25.
 Habitat in Europa.
85. C. thorace rotundato rufo, elytris abbreviatis testaceis. *It. Norwag.* d. 22. Iul. * *abbreviatus.*
 Habitat in Norwagiae rupibus, capt. d. 22. Iul.
86. C. aeneus, antennis nigris, tibiis pallidis. *Syst. Ent.* 249. 69. *bipunctatus.*

Carabus 2punctatus subaeneus, elytris punctis duobus impressis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 672. 33. *Fn. Sv.* 806. Habitat in Europae quisquiliis.

69. S C A R I T E S.

- gigas.* 1. *S. ater*, pedibus anticis palmato digitatis, mandibulis fulcatis, elytris substriatis.
Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*
Nimis *S. subteritaneo* affinis, at triplo maior. Mandibulae porrectae, fulcatae. Caput antice fulcatum. Elytra obsoletius et rarius striata.
- subterraneus.* 2. *S. ater*, pedibus anticis palmato digitatis, capite antice fulcato, elytris striatis. *Syst. Ent.* 249. 1. *
Habitat in America. *Dom. Lewin.*
- cyaneus.* 3. *S. cyaneus* glaberrimus, antennis pedibusque nigris. *Syst. Ent.* 249. 2. *
Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
- arenarius.* 4. *S. piceus*, tibiis anticis palmato digitatis. *Syst. Ent.* 249. 3.
Tenebrio Fossor. *Linn. Syst. Nat.* 2. 675. 7. *Fn. Sv.* 817.
Attelabus Fossor niger nitidus, elytris fulcatis, tibiis anticis palmato spinosis. *Degeer Inf.* 4. 350. 1. tab. 30. fig. 1, 2.
Habitat in Europae collibus arenosis.
- Cursor.* 5. *S. testaceus*, thorace oblongo, angulis quinque denticulatis. *Syst. Ent.* 249. 4.
Tenebrio Cursor. *Linn. Syst. Nat.* 2. 675. 8. *Fn. Sv.* 817.
Tenebrio fuscus, thorace oblongo tricarinato rugoso, vtrinque denticulato, elytris substriatis. *Müll. Zool. Dan. prodr.* 74. 798.
Habitat in Europae collibus arenosis.
- arabs.* 6. *S. niger*, thorace serrato, antennis pedibusque testaceis. *Syst. Ent.* 250. 5. *
Habitat in Oriente. *Dom. Prof. Forskahl.*

7. *S. piceus*, antennis clauatis. *Syst. Ent.* 250. 6. ³ *clauicor-*
Tenebrio minutus alatus niger, thorace marginato, an- *nis,*
 tennis clauatis pedibusque piceis. *Linn. Syst. Nat.*
 2. 675. 12.
 Habitat in Sueciae fabuletis.

70. S E P I D I V M.

1. *S. thorace* tricuspidato, corpore griseo. *Syst. Ent.* *tricuspi-*
 250. 1. * *datum.*
Tenebrio alexandrinus niger, thorace spina vtrinque
 obtusa, antice gibbo supra caput, coleoptris obtusis,
 striis quatuor aculeatis. *Forskahl Descr. Animal,*
 80. 12. ?
 Habitat in Aegypto. *Dom. Prof. Forskahl.*
2. *S. thorace* tricuspidato cristato, corpore variegato. *cristatum.*
Syst. Ent. 250. 2. *
 Habitat in Aegypto. *Prof. Forskahl.*
3. *S. thoracis* lateribus angulatis, elytris reticulatis. *reticula-*
Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.* *tum.*
 Statura et magnitudo *S. tricuspidati*. Caput et thorax
 nigra interdum cinereo villosa maculis aliquot villo-
 sis, fuscis. Thorax vtrinque in angulum acutum
 dilatatus. Elytra in iunioribus grisea, in adultiori-
 bus nigra lineis eleuatis numerosis longitudinalibus
 et transuersalibus reticulata. Linea intermedia ma-
 gis eleuata ante apicem coit cum intermedia elytri al-
 terius et inde dorsum planum apparet.
4. *S. thorace* laeui nitido atrum, elytris rugosis, linea *rugosum,*
 eleuata vnica.
Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*
 Statura et summa affinitas praecedentis. Antennae ci-
 nereo villosae. Caput et thorax laeui, atra, niti-
 da. Elytra atra, nitida lineolis transuersis eleuatis
 rugosa, lineaque vnica laeui eleuata longitudinali,
 quae tamen apicem haud attingit, nec coit. Pedes atri.
5. *S. thorace* subangulato, elytris atris, vittis duabus al- *vittatum,*
 bis lineaque eleuata vnica.

Habitat

Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*

Praecedentibus duplo minor. Caput nigrum. Thorax marginatus angulo paruo obtuso in medio, niger margine cinereo pubescente. Elytra linea vnica eleuata, atra vittis duabus albis, quarum interior apicem haud attingit.

70. P I M E L I A.

- striata.* 1. P. atra glabra, elytris striis quatuor sanguineis. *Syst. Ent.* 251. 1. *
Habitat in Indiis.
- unicolor.* 2. P. glabra nigra, elytris immaculatis.
Tenebrio gigas. *Sulz. Hist. Inf.* tab. 7. fig. 9.
Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*
Affinis omnino P. striatae, at paullo minor et elytra immaculata.
- hispidata.* 3. P. atra, corpore muricato hispido. *Syst. Ent.* 250. 2. *
Tenebrio hispidus apterus, totus supra fetis hispidus, thorace teretiufculo. *Forskahl Descr. Animal.* 79. 8.
Habitat rarius in hortis Alexandrinis sub sarmentis mense Septembri.
- longipes.* 4. P. atra, elytris connatis muricatis, pedibus longioribus. *Syst. Ent.* 251. 3. *
Habitat in Aegypto. *Prof. Forskahl.*
- muricata.* 5. P. nigra, coleoptris obtusis, striis muricatis. *Syst. Ent.* 251. 4.
Tenebrio muricatus. *Linn. Syst. Nat.* 2. 676. 12. *Mus. Luc. Plr.* 100.
Tenebrio atra aptera rotundata, elytris fulcis tribus eleuatis. *Geoff. Inf.* 1. 352. ?
Habitat in Europa australi, Aegypto.
- punctata.* 6. P. atra, thorace globofo, punctis duobus impressis, elytris rugosis, striis tribus eleuatis laeuibus.
Habitat in Italia. *D. Allioni.*
Statura omnino praecedentium,

7. *P. atra*, elytris scabris, antennis pedibusque fuscis. *scabra*,
Syst. Ent. 251. 5. *
- Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*
8. *P. elytris spinosis*, linea laterali eleuata ferrata. *Syst. angulata*.
Ent. 252. 6. *
- Tenebrio spinosus* apterus niger, thorace teretiufculo,
 elytris margine laterali ferratis, singulis striis tribus
 spinosis, interiectis tuberculis acutis. *Forsk, Descr.*
animal. 80. 13.
- Habitat Alexandriae. *Forskahl.*
9. *P. thoracis lateribus spinosis*, elytris lineis eleuatis tri- *echinata*.
 bus echinatis.
- Habitat ad Promont. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*
- Statura praecedentium. Caput obscurum. Thorax ci-
 nereus punctis longioribus nigris scaber, margine
 antico dentato, laterali in medio spina acuta, reflexa.
 Elytra deflexa, fusco cinerea lineis tribus eleuatis
 echinatis, inprimis lateralibus. Abdomen nigrum.
 Pedes cinerei.
10. *P. thorace laeui nitido*, elytris lineis eleuatis tribus *porcata*.
 interiectis punctis eleuatis.
- Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*
- Minor praecedentibus. Caput et thorax laeuia, atra,
 nitida. Elytra connata, deflexa lineis tribus eleua-
 tis laeuius, quae tamen apicem haud attingunt. Spa-
 tium inter lineas punctis eleuatis scabrum. Pedes
 postici longiores.
11. *P. thorace nigro*, elytris cinereis fusco maculatis, li- *maculata*.
 neis tribus eleuatis, secunda subundata.
- Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*
- Caput et thorax nigra punctis eleuatis longioribus sca-
 bra. Elytra grisea lineis duabus macularum fuscarum,
 altera marginali, altera linea eleuata interiori diui-
 sa. Lineae tres eleuatae nigricantes, quarum inter-
 media vndata. Pedes cinerei punctis eleuatis nigris
 irrorati.
12. *P. thorace varioloso*, elytris lineis tribus eleuatis echi- *ferrata*.
 uatis, interstitiis rugosis, pedibus elongatis.
- Habitat

Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*

Parua, atra. Thorax punctis impressis. Elytra lineis elevatis tribus ferratis. Pedes elongati tibiis obscure rufis.

minuta. 13. P. thorace laevi obscuro, elytris cinereis hispidis, lineis tribus elevatis laevibus.

Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*

Elytra pilis erectis hispida, cinerea. Pedes cinerei. Tibiae anticae apice dentibus tribus rufis.

rugosa. 14. P. thorace scabro, elytris rugosis antice angustioribus.

Syst. Ent. 252. 7. *

Habitat in Aegypto. *Forskahl.*

spinosa. 15. P. thorace marginato, marginibus antice posticeque spinosis, elytris striis elevatis laevibus. *Syst. Ent.* 252. 8.

Tenebrio spinosus. *Linn. Syst. Nat.* 2. 677. 24. *Mus. Lud. Vlr.* 101.

Habitat in Europa australi, Oriente.

reflexa. 16. P. thorace marginato, marginibus reflexis, elytris muricatis, linea laterali carinata laevi. *Syst. Ent.* 352. 9. *

Tenebrio vulgaris apterus ater, elytris latere carinatis, singulis serie tuberculorum duplici, thorace planiusculo pone spinoso, margine acuto. *Forskahl Descr. anim.* 79. 9.

Habitat frequens in Aegypto.

Morio. 17. P. thorace antice rotundato atra, antennis apice rufis.

Gen. Inf. Mant. 240. *

Habitat in Anglia rarius.

fasciata. 18. P. thorace suborbiculato atra, elytris fasciis duabus abbreviatis flavis.

Habitat in India. *Dom. Lund.*

Huius generis videtur specimen mutilatum. Caput prominens, subcylindricum, atrum, immaculatum. Thorax elytris angustior, laevis, ater immaculatus. Elytra connata striata atra fasciis duabus flavis, quarum anterior futuram haud attingit, posterior vero nec futuram nec marginem. Pedes atrii.

19. *P. nigra*, elytris laeuibus vniangulatis thorace angustiore, capite depressiusculo carinato. *Syst. Ent.* 252. 11. *collaris.*

Tenebrio collaris apterus niger, elytris laeuifuscis vniangulatis, thorace angustiore, capite depressiusculo carinato. *Linn. Syst. Nat.* 2. 677. 21.

Habitat in Europa australi.

E geniculis oleum flavescens exsudat.

20. *P. nigra*, thorace orbiculato, elytris lineis eleuatis tribus laeuibus. *Syst. Ent.* 252. 10. * *carinata.*

Tenebrio aegypticus apterus, thorace subrotundo antice et pone truncato, elytris obsolete punctatis, striis tribus eleuatis laeuibus, dorso planiusculo. *Foršk. Descr. anim.* 78. 6.

Habitat in Gallia, Aegypto.

21. *P. nigra* depressa, thorace elytrisque reflexo marginatis ciliatis. *ciliata.*

Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*

Statura omnino praecedentium. Caput paruum intra emarginaturum thoracis. Thorax glaber, depressus, margine dilatato, subreflexo, ciliato, antice emarginato pro receptione capitis. Elytra connata, plana, depressa laeuia margine subreflexo ciliato.

22. *P. thorace rotundato scabro, elytris striis tribus punctato scabris, postice lineolis albis. lineata.*

Habitat in Sibiria. *Pallas. Mus. Dom. Banks.*

Corpus paruum. Caput nigrum ante antennas vtrunque prominens, subspinofum. Thorax rotundatus punctis eleuatis scaber. Elytra dorso plano lateribus deflexis lineisque tribus punctorum eleuatorum et inter has lineolae tres apicis albae. Linea lateralis eleuata, ferrata. Tibiae anticae extus ferratae.

23. *P. atra*, thorace rotundato, elytris glaberrimis. *Syst. Ent.* 253. 12. * *glabra.*

Tenebrio laeuis apterus nitens, thorace suborbiculato marginato, elytris laeuibus marginatis. *Foršk. Descr. animal.* 78. 7.

Habitat in Aegypto.

- angusta*. 24. P. glabra, thorace postice angustato, elytris acuminatis. *Syst. Ent.* 253. 13. *
Habitat in Aegypto. *Forskahl.*
- orbiculata*. 25. P. glabra, thorace orbiculato, elytris acuminatis. *Syst. Ent.* 253. 14. *
Habitat in Oriente. *Forskahl.*

72. S C A V R V S.

- atratus*. 1. Scaurus *Syst. Ent.* 253. 1. *
Habitat in Aegypto. *Prof. Forskahl.*
Tota atra glabra. Thorax addito capite fere longitudine elytrorum. Elytra connata, obtusa. Pedes antici dente altero valido versus apicem femorum, altero ad basin tiliarum.

73. M A N T I C O R A.

- maxillo*. 1. *Manticora*.
sa. *Carabus tuberculatus* apterus niger, elytris scabris, tuberculis conicis hirsutis, tibiis obscure ferrugineis. *Degeer Inf.* 7. 623. 10. tab. 46. fig. 14.
Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*
Genus affine *Pimeliae*, a quo tamen manifeste differt. Os maxillis palpisque. Palpi quatuor subaequales, filiformes, anteriores paullo longiores, quadriarticulati, articulo secundo longiori, ultimo obconico obtuso adhaerentes maxillae dorso, posteriores triarticulati, articulo secundo longiori cylindrico, ultimo obconico, obtuso adnati labii basi interiori. Mandibula exserta, porrecta, apice curvata basi interiori dentata. Maxilla cornea, arcuata, simplex, acutissima, intus ciliata. Labium corneum, durum, trifidum, laciniis lateralibus, latioribus, acutis, intermedia breviori compressa obtusiuscula. Antennae filiformes articulis cylindricis, subaequalibus. Labium hoc vere trifidum nec est palatum porrectum uti in carabis, quum palpi huic ipso sub emarginatura adhaereant.
Corpus magnum atrum. Caput magnum, porrectum, subglobosum, glabrum, vtrinque ante antenas impressum.

pressum. Thorax antice rotundatus, in medio impressus, postice elevatus margine rotundato, apice emarginato. Elytra connata, supra plana, scabra margine deflexo, vti in Pimeliis, et linea laterali acutissima, ferrata. Pedes simplices, nigri.

74. B L A P S.

1. B. nigra, thorace rotundato, elytris laevis obtusis. *Gages.*
Syst. Ent. 254. 1. *
Tenebrio Gages. *Linn. Syst. Nat.* 2. 676. 14.
Sulz. Hist. Inf. 64. tab. 7. fig. 9.
 Habitat in Europa australiori.
2. B. coleoptris mucronatis fulcatis. *Syst. Ent.* 254. 2. * *fulcata.*
Tenebrio polychrestus apterus, elytris mucronatis, singulis striis novem elevatis. *Forjk. Descr. animal.* 79. 10.
 Habitat in Aegypti hortis frequens.
 Butyro coctae a feminis Turcis saginandi causa comeduntur.
 Contra aurium dolores morsumque scorpionum laudantur.
3. B. atra, coleoptris mucronatis laevis. *Syst. Ent.* *mortifaga.*
 254. 3.
Tenebrio mortifagus apterus, thorace aequali, coleoptris laevis mucronatis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 676. 15.
Fn. Sv. 822.
Tenebrio atra aptera, coleoptris laevis pone acuminatis. *Geoff. Inf.* 1. 346.
Tenebrio acuminatus apterus, coleoptris pone acuminatis. *Degeer Inf.* 5. 31. 1.
Scarabaeus maior totus niger, abdomine longo elytris veluti caudatis. *Raj. Inf.* 90. 12.
Scarabaeus ex toto niger, minime nitens, foetidus. *Lister. Scarab. Angl.* 388. 21.
Scarabaeus impennis tardipes. *Pet. Gazoph.* tab. 24. fig. 7.
Blatta foetida. *Mouff. Inf.* 139.
Frijch. Inf. 13. tab. 25.
Fabr. Spec. Inf. X *Schaeff.*

Schaeff. Elem. tab. 124. fig. 1.

Icon. tab. 37. fig. 6.

tab. 6. fig. 13.

Habitat in Europae umbrosis suffocatis.

excavata. 4. B. thorace postice angulato, elytris excavato punctatis acutiusculis. *Syst. Ent.* 254. 4. *

Petiv. Gazoph. tab. 92. fig. 14.

Ait. Angl. 271. 861. 13.

Habitat in Coromandel. *Mus. Brit.*

friata. 5. B. thorace postice angulato atra, elytris obtusis striatis. Habitat in Coromandel. *Mus. Dom. Banks.*

Statura et magnitudo omnino praecedentis. Caput et thorax laevia, atra, minime nitida. Thorax marginis postico vtrinque angulato. Elytra connata, nitidiora, atra, striata striis sublaevibus.

crenata. 6. B. thorace postice angulato, griseo fusca, elytris crenato striatis obtusis.

Habitat in Coromandel. *Mus. Dom. Banks.*

Statura praecedentis, at duplo minor. Caput et thorax laevia, griseo fusca, immaculata. Elytra striata striis crenatis.

75. T E N E B R I O.

ferratus. 1. T. ater glaber, elytris striatis, tibiis posticis ferratis. *Syst. Ent.* 255. 1. *

Habitat in Sierra Leon Africae. *Mus. Dom. Banks.*

Molitor. 2. T. oblongus piceus, elytris striatis. *Syst. Ent.* 255. 2. *Tenebrio Molitor* alatus niger totus, femoribus anticis crassioribus. *Linn. Syst. Nat.* 2. 674. 2. *Fn. Sv.* 875. *Scop. carn.* 259.

Tenebrio atra oblonga, elytris striis novem laevibus. *Geoff. Inf.* 1. 349. 6.

Tenebrio alatus nigro fuscus, subtus castaneus, corpore oblongo, elytris striatis. *Degeer Inf.* 5. 34. 3. tab. 2. fig. 4.

Vermis farinarius. *Raj. Inf.* 4. Larva.

Frisch. Inf. 3. 1. tab. 1.

Sulz. Inf. tab. 7. fig. 52.

Schaeff. Icon. tab. 66. fig. 1.

Habitat in farina pistorum, pane sicco.

Larua alba mollis lusciniarum gratissimus cibus.

3. *T. oblongus ater*, elytris laeviusculis. *laevigatus.*
 Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*
T. molitori paullo minor, totus laevis, glaber, ater.
4. *T. violaceus*, pedibus antennisque piceis. *Syst. Ent. chalybeus.*
 255. 3. *Linn. Syst. Nat.* 2. 674. 3.
Tenebrio aeneus alatus niger, elytris striato punctatis
 aeneo coerulescentibus. *Degeer Inf.* 5. 53. 4. tab. 13.
 fig. 11.
 Habitat in Guinea.
5. *T. oblongus fusco cinereoque varius.* *variegatus.*
 Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*
 Statura oblonga et magnitudo praecedentium, at totus
 fuscus pilis griseis variegatus.
6. *T. ouatus ater*, elytris striatis, capite tuberculato. *Syst. abbreviatus.*
Ent. 256. 5. *
 Habitat in India. *Mus. Brit.*
7. *T. ouatus niger*, elytris striatis, tibiis anticis dentato *fossor.*
 spinosis.
 Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*
 Corpus medium supra totum nigrum, subtus piceum.
 Caput et thorax glabra, laevis. Elytra crenato striata.
 Pedes antici breves, validi tibiis apice dentato
 spinosis.
8. *T. thoracis marginibus crenatis angulisque prominu-* *cornutus.*
lis, thorace bicorni. *Syst. Ent.* 256. 6. *
 Habitat Smirnae. *Dom. Drury.*
9. *T. ater*, antennis pedibusque sanguineis. *Syst. Ent. sanguini-*
 256. 7. * *pes.*
 Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
10. *T. ater*, thorace ovali marginato, elytris connatis *buprestoi-*
 laevis. *des.*

Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*

Statura et summa affinitas *T. caraboidis*, at maior, et elytra laevia.

pallens. 11. *T. pallide testaceus*, thorace transverso.
Tenebrio pallens alatus pallide testaceus. *Linn. Syst. Nat.* 2. 874. 10. *Fn. Sv.* 820.

Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*

Corpus paruum pallide testaceum. Antennae noniformes fuscae articulo primo et ultimo pallidis. Pedes pallidi tibiis basi nigris.

ferrugineus. 12. *T. ferrugineus*, elytris striatis testaceis.
Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*
Corpus praecedenti adhuc minus, magis depresso ferrugineum. Elytra striata, testacea.

caraboides. 13. *T. niger*, thorace ovali marginato, elytris striatis.
Syst. Ent. 256. 8. *Linn. Syst. Nat.* 2. 677. 25. *Fn. Sv.* 825.

Carabus coadunatus apterus niger totus, corpore ovato breui, elytris coadunatis scabriusculis. *Degeer Inf.* 4. 7. 7. tab. 3. fig. 13.

Platycerus fuscus, elytris striatis. *Geoff. Inf.* 1. 64. 5.
Habitat in Europae quisquiliis.

76. H E L O P S.

coeruleus. 1. *H. coerulefcens*, thorace suborbiculato, elytris striatis.
Syst. Ent. 257. 1.

Tenebrio coeruleus. *Linn. Syst. Nat.* 2. 677. 19. *Mus. Lud. Vr.* 98.

List. Angl. app. 4. fig. 14.

Pet. Gazoph. tab. 22. fig. 6.

Habitat in Europa australiori.

lanipes. 2. *H. aeneus*, elytris striatis acuminatis. *Syst. Ent.* 257. 2.*

Tenebrio lanipes alatus aeneus, elytris subbisido mucronatis, plantis subtus hirsutis. *Linn. Mant.* 1. 533.

Tenebrio nigro cuprea, elytro singulo striis octo, coleoptris pone acuminatis. *Geoff. Inf.* 1. 349. 5.

Tenebrio aeneus. *Scop.* 255.

Habitat in Germaniae quisquiliis.

3. H. niger digitis ferrugineis, palpis porrectis. *Syst. Ent. ferratus.*
 257. 3. *
Tenebrio depressus alatus niger, elytris coerulefcentibus, antennis tibiisque sanguineis, thorace depressio.
Linn. Syst. Nat. 2. 675. 11. ?
Serratula. Schulz. Abt. Dresd. 1.
 Habitat in Anglia.
 De Synonymo *Linnaei* adhuc dubito, quum pedes in nostro omnino nigri.
4. H. ater, elytris fascia abbreviata aurea. *Syst. Ent. equestris.*
 257. 4. *
 Habitat in Brasilia. *Mus. Dom. Banks.*
5. H. ater, thorace vtrinque rotundato laeui, elytris excavato punctatis, *maura.*
 Habitat in India orientali. *Dom. Lund.*
 Magnus. Caput atrum laeue clypeo rotundato integro. Palpi antici porrecti, securiformes, postici capitati. Labium submarginatum. Antennae extrorsum crassiores. Elytra connata punctis latis excavatis distantibus striata.
6. H. ater, thorace quadrato laeui, elytris punctato striatis. *morio.*
Gen. Inf. Mant. 241. *
 Habitat in America boreali.
7. H. ater, thoracis marginibus rotundatis, elytris crenato fulcatis, *nigrita.*
Tenebrio atratus oblongus ater, elytris fulcatis acutiusculis. *Syst. Ent.* 256. 4.
 Habitat in America meridionali.
 Corpus magnum, atrum, immaculatum. Antennae apice moniliformes. Thorax glaber, laeuis margine exteriori rotundato anguloque postico acuto. Elytra fulcata fulcis crenatis. Plantae subtus lana rufa.
8. H. niger, elytris antennis pedibusque ferrugineis. *Syst. rufipes.*
Ent. 258. 5. *
 Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
9. H. niger, pedibus fuscis. *Syst. Ent.* 258. 6. * *luridus.*
 Habitat in Brasilia. *Mus. Dom. Banks.*

- longipes.* 10. *H. niger*, elytris striatis, pedibus elongatis, tibiis secundi paris barbatis.
 Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*
 Palpi securiformes huius generis. Corpus magnum, gibbum, totum nigrum, immaculatum, obscurum. Thorax glaber, laevis. Elytra striata. Pedes omnes elongati. Tibiae secundi paris pilis rufis barbatae.
- ater.* 11. *H. ater*, elytris striatis. *Syst. Ent.* 258. 7. *
 Habitat Lipsiae.
 Elytra striata, striis laevibus.
- dentipes.* 12. *H. ater*, elytris punctato fulcatis, femoribus anticis acute dentatis.
 Habitat in Coromandel. *Mus. Dom. Banks.*
 Statura *H. atri* at paullo minor. Caput et thorax laevis, atra, obscura. Elytra fulcata et in singulo fulco linea punctorum impressorum. Pedes nigri femoribus anticis medio interiori acute dentatis.
- quisquilius.* 13. *H. niger*, antennis pedibusque ferrugineis. *Syst. Ent.* 258. 8.
Tenebrio quisquilius niger, ore pedibusque ferrugineis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 676. 13. *Fn. Sv.* 821.
 Habitat in Europae quisquiliis.
 Subtus totus ferrugineus.
- glaber.* 14. *H. corpore atro laevi.* *Syst. Ent.* 258. 9. *
 Habitat in Europae quisquiliis.

77. E R O D I U S.

- testudinarius.* 1. *E. gibbus ater*, elytris connatis scabris, lateribus puluerulento albis.
 Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*
 Corpus magnum, gibbum, subtus planum, atrum. Thorax gibbus antice late emarginatus pro receptione capitis ater margine puluerulento albedo. Elytra valde gibba punctis eleuatis scabra, atra lateribus puluerulento albidis. Pedes simplices, atri.
- gibbus.* 2. *E. gibbus ater*, elytris lineis eleuatis tribus. *Syst. Ent.* 258. 1. *

Tenebrio

Tenebrio cothurnatus apterus niger, thorace laeui, vtrinque antice videntato, elytris tuberculatis, striis duabus elatis. *Forsk. Descr. anim.* 80. 11.?
Habitat in Aegypto frequens.

3. *E. ater*, elytris linea eleuata vnica. *Syst. Ent.* 259. 2.* *planus*.
Habitat in Aegypto. *Prof. Forskahl*.
4. *E. ater*, elytris laeuissimis. *Syst. Ent.* 259. 3.* *minutus*.
Habitat in Oriente. *Dom. Forskahl*.

78. M E L O E.

1. *M. corpore violaceo*. *Syst. Ent.* 259. 1. *Linn. Syst. Nat. proscarabaeus*.
2. 679. 1. *Fn. Sv.* 826.
Meloe. Geoff. Inf. 1. 377. 1.
Cantharis proscarabaeus aptera, violaceo nigra. *Degeer Inf.* 5. 31. tab. 1. fig. 1.
Scarabaeus mollis, e nigra viola nitens. *Lister. Scar. Angl.* 392. 27.
Proscarabaeus. Mouff. Inf. 162. fig. med.
Proscarabaei femina. Ionst. Inf. p. 74. tab. 14.
Vermis maialis. Clut. hemerob. 81. 73.
Frisch. Inf. 6. tab. 6. fig. 5.
Huffnag. Inf. 2. tab. 9.
Schaeff. Icon. tab. 3. fig. 5.
Elem. tab. 82.
Bergstraeff. Nomencl. 1. 17. 15. tab. 2. fig. 15.
Sulz. Hist. Inf. tab. 7. fig. 10.
Sulz. Inf. tab. 7. fig. 54.
Habitat in Europae campis apricis, arenosis.
Meloe Vralensis. Pall. Iter. 2. 722. 56. triplo minor vix specie differt.
Intermedius antennarum articulus maris dimidiatus.
Tacta oleum limpidissimum, flauicans, e poris praesertim geniculis pedum exsudat summe diureticum. Melle vel oleo mixtum in rabie canina laudatur.
Oua suauolentia. *Lister*.
2. *M. segmentis dorsalibus abdominis rubris. Syst. Ent. maialis.*
259. 2. *Linn. Syst. Nat.* 2. 679. 2.

Proscarabaeus alter. *Frisch. Inf.* 6. tab. 6. fig. 4.

Schaeff. Icon. tab. 3. fig. 6.

Pontop. Atl. Dan. 1. tab. 29.

Habitat in Europa australi.

Affinis praecedenti, cuius varietatem dicit *Frisch.*

marginata-3. *M. nigra*, thoracis elytrorumque margine ferrugineo.

Meloe hungarus apterus ater laevis, thoracis basi elytrorumque margine interiore ferrugineis. *Schrank. Beytr.* 71. 19.

Habitat in Italia. *D. Allioni.*

Duplo minor *M. proscarabaeo*. Caput nigrum antennis moniliformibus. Thorax niger margine ferrugineo. Elytra abbreviata, laevia, concava, nigra margine exteriori ferrugineo. Abdomen et pedes nigra, obscure nitida, immaculata. Alae nullae.

79. L Y T T A.

vesicatoria-1. *L. viridis*, antennis nigris. *Syst. Ent.* 260. 1.

Meloe vesicatorius alatus viridissimus nitens, antennis nigris. *Linn. Syst. Nat.* 2. 679. 3. *Fn. Sv.* 827. *Scop. carn.* 185.

Cantharis viridi aurata, antennis nigris. *Geoff. Inf.* 1. 341. 1. tab. 6. fig. 5.

Cantharis vesicatoria alata viridi aurea nitidissima, antennis nigris. *Degeer Inf.* 4. 12. 2. tab. 1. fig. 9.

Cantharis vulgaris officinarum. *Raj. Inf.* 1. 341.

Schaeff. Icon. tab. 47. fig. 1.

Elem. tab. 33.

Sulz. Hist. Inf. tab. 7. fig. 55.

Mouff. Inf. 144.

Ionst. Inf. 76. tab. 7.

Habitat in ligustro, fraxino, sambuco, syringa.

Officinalis pro vesicatorio.

nitidula-2. *L. viridi aenea*, elytris testaceis. *Syst. Ent. Append.* 826. *

Habitat in Anglia.

3. *L. viridi coerulea*, thorace ferrugineo. *fyriaca*.
Meloe fyriacus alatus viridi coeruleus, thorace luteo.
Linn. Syst. Nat. 2. 680. 4. *Mus. Lud. Vlr.* 102.
Gron. Zooph. 620.
 Habitat in Oriente,
 Antennae nigrae. Thorax antice attenuatus. Tibiae
 pallide testaceae.
4. *L. viridi aenea nitida*, elytris testaceis, maculis viridi *festiva*.
 aeneis.
Meloe festiva. *Pall. Iter.* 2. 721. 54.
 Habitat in Sibiria. *Mus. Dom. Banks.*
 Statura praecedentium. Antennae defunt. Corpus to-
 tum viridi aeneum, immaculatum. Elytra testacea
 maculis viridi aeneis. Maculae elytrorum variant.
5. *L. atra*, elytrorum marginibus cinerascens. *Syst. margina-*
Ent. 260. 2. * *ta*.
Meloe cinereus alatus cinereus, antennis elytris que atris
 margine cinereis. *Forst. nou. sp. Cent.* 1. 62. 62.
 Habitat ad Cap. bon. sp.
6. *L. elytris nigris*, vitta marginibusque flavis. *Syst. Ent. vittata*.
 260. 3. *
 Habitat in America. *Mus. D. Hunter*.
7. *L. corpore atro immaculato*. *Syst. Ent.* 260. 4. * *atrata*.
 Habitat in America. *Mus. D. Hunter*.
8. *L. atra*, capite testaceo, thorace elytris que cinereo li-*erythroce-*
 neatis. *phala*.
Pall. Itiner. 1. App. 46.
Scop. Ann. Hist. nat. 5. 103. 81.
 Habitat in Europa australiori.
 Affinis praecedenti, at caput testaceum linea media ni-
 gra. Thorax canaliculatus linea dorsali lateribus-
 que cinereis. Elytra margine futura lineaque media
 cinereis.
9. *L. atra*, capitis vertice fuluo, thorace elytris que im-*dubia*.
 maculatis.

Meloe algiricus. Sulz. *Hist. Inf.* tab. 7. fig. 12.

Habitat in Sibiria. *Mus. Dom. Banks.*

Nimis praecedenti affinis, a qua tamen differt vertice capitis rufo, immaculato, thorace elytrisque atris, immaculatis.

- afra*. 10. *L. nigra*, thorace rufo. *Syst. Ent.* 260. 5.
Meloe ater alatus niger, thorace rufo. *Linn. Syst. Nat.*
 2. 680. 10.
 Habitat in Africa.
 Affinis *L. atratae*, at thorax totus rufus et elytra magis cyanea.

80. MYLABRIS.

- fasciata*. 1. *M. nigra*, elytris fascia media flava. *Syst. Ent.* 261. 1.*
 Habitat in Indiis. *Dom. D. Torstenfen.*
- Cichorei*. 2. *M. nigra*, elytris flavis, fasciis tribus nigris. *Syst. Ent.*
 261. 2.
Meloe Cichorei alatus niger, thorace hirsuto, elytris fasciis tribus flavis, antennis clauatis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 680. 5. *Mus. Lud. Vlr.* 103.
Cantharis Cichorei alata nigra hirsuta, elytris fasciis tribus transuersis flavis, antennis clauatis longitudine thoracis. *Degeer Inf.* 5. 17. 2. tab. 13. fig. 2.
Chrysomela Cichorei. *Hasselqu. Itin.* 410. 101.
Cantharis fasciata. *Imperati nat.* 78.
Sulz. Hist. Inf. tab. 7. fig. 11.
 Habitat in totius Orientis cichoreis.
 Officinalis in China.
 Variat antennis apice flavis et totis nigris elytrorumque fasciis et colore.
- algirica*. 3. *M. atra*, elytris testaceis immaculatis.
Meloe algiricus alatus niger, elytris testaceis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 681. 11.
Mylabris immaculata. *Syst. Ent. App.* 828. *
 Habitat in India.

- capensis*. 4. *M. nigra*, elytris maculis sex flavis, prima arcuata. *Syst. Ent.* 261. 3. *

Meloe capensis alatus niger, elytris maculis sex flavis prima arcuata, antennis flavis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 180. 7. *Mus. Lud. Vr.* 104.

Degeer Inf. 7. tab. 48. fig. 14.

Habitat ad Cap. bon. sp.

Duplo minor M. Cichorei.

5. *M. atra*, elytris testaceis punctis quinque nigris. *ropunctata*
Meloe apunctata. *Linn. Syst. Nat.* 2. 680. 6. *ta*.

Habitat in Italia. *Dr. Allioni*.

Statura omnino M. Cichorei, at triplo minor. Antennae moniliformes articulo ultimo crassiori clauato, nigrae. Corpus nigrum. Elytra testacea punctis quinque nigris 2. 2. 1.

6. *M. nigra*, coleoptris flavis, fascia punctoque communi fuscis. *Syst. Ent.* 261. 4. * *3maculata*
ta.

Habitat in Oriente. *Prof. Forsk.*

7. *M. testacea*, pectore elytrorumque apicibus nigris. *testacea*.

Habitat in Sibiria. *D. Pallas. Mus. Dom. Banks.*

Statura praecedentium, at paullo minor. Caput et thorax ferruginea. Elytra testacea apice nigra. Corpus testaceum pectore abdominisque basi nigris.

81. CEROCOMA.

1. *C. viridis*, antennis pedibusque luteis. *Syst. Ent. Schaefferi*
262. 1. * *ri*.

Meloe Schaefferi alatus viridis, pedibus luteis, antennis mari abbreviatis clauatis breuibus irregularibus. *Linn. Syst. Nat.* 2. 681. 12.

Cerocoma. Geoff. Inf. 1. 358. 1.

Sulz. Hist. Inf. tab. 7. fig. 13.

Schaeff. Elem. tab. 37.

Icon. tab. 53. fig. 8. 9.

Habitat in Europa australiori.

2. *C. viridis* antennis pedibus abdominisque segmentis *Schreberi*
tribus flavis. *ri*.

Habitat in Europa australiori. *Dom. D. Schreber.*

Nimis praecedenti affinis, at duplo fere maior. Antennae irregulares flavae.

82. M O R D E L L A.

- ferruginea.* 1. *M. antennis pectinatis rufa, pectore ano pedibusque nigris. Syst. Ent. 262. 1. **
Habitat in India orientali. *D. Koenig.*
- paradoxa.* 2. *M. antennis pectinatis, thoracis lateribus elytrisque testaceis. Syst. Ent. 262. 2. Linn. Syst. Nat. 2. 682. 1. Fn. Sv. 831.*
Habitat in Europae plantis umbellatis rarius.
- pectinata.* 3. *M. antennis pectinatis rufa, elytris nigris. Syst. Ent. 263. 3. **
Habitat in America. *Dom. Drury.*
Forte proprii generis tres hae species mihi haud rite examinatae.
- sexmaculata.* 4. *M. atra, thorace ferrugineo, elytris testaceis, maculis tribus nigris. Syst. Ent. 263. 4. **
Habitat in America. *D. Hunter.*
- dimidiata.* 5. *M. atra, elytris basi flavis.*
Habitat - - - - *Dom. Teats.*
Statura omnino praecedentium. Antennae breves, pectinatae, atrae. Corpus totum atrum nitidum elytris folis a basi ad medium flavis. Abdomen valde obtusum et fere truncatum.
- limbata.* 6. *M. ferruginea, vertice thoracis disco elytrisque atris.*
Habitat - - - - *Muf. Dom. Teats.*
Statura praecedentium. Antennae breves, ferratae, nigrae primo articulo ferrugineo. Caput ferrugineum, nitidum. Thorax in medio ater limbo omni ferrugineo. Scutellum ferrugineum. Pectus ferrugineum macula laterali atra. Elytra laevia, atra, immaculata. Abdomen breve, obtusiusculum, ferrugineum basi vtrinque macula magna atra. Pedes nigri femoribus ferrugineis.

7. M. ano aculeato, corpore atro immaculato. *Syst. Ent. aculeata.*
263. 5.
Mordella aculeata atra, ano spina terminato. *Linn.*
Syst. Nat. 2. 682. 2. *Fn. Sv.* 832.
Mordella atro caudata vnicolor. *Geoff. Inf.* 1. 353. 1.
Mordella. *Schaeff. Elem.* tab. 84.
Icon. tab. 127. fig. 7.
Sulz. Inf. tab. 7. fig. 45.
Habitat in floribus semitiosculosis, umbellatis Europae
borealis frequens.
8. M. ano aculeato nigra, elytris fasciis duabus cinereis. *fasciata.*
Syst. Ent. 263. 6. *
Mordella atra caudata, fasciis villoso aureis. *Geoff. Inf.*
1. 354. 2.
Habitat in Europae australioris floribus.
Varietatem praecedentis credit a *Linné.*
9. M. ano aculeato, elytris nigris, punctis quatuor flavis, *spuncta-*
primo lunato. *Syst. Ent.* 263. 7. * *ta.*
Habitat in America septentrionali. *Mus. Dom. Banks.*
10. M. ano aculeato nigra, thorace abdomineque fulvis. *abdomi-*
Syst. Ent. 264. 8. * *nalis.*
Mordella bicolor. *Sulz. Hist. Inf.* tab. 7. fig. 15.
Habitat in Germania. *Dom. de Hattorf.*
11. M. atra, ore lateribus thoracis pedibusque flavis. *Syst. humera-*
Ent. 264. 9. *lis.*
Mordella humeralis atra, lateribus thoracis baseosque
elytrorum flavescentibus. *Linn. Syst. Nat.* 2. 682. 3.
Fn. Sv. 833.?
Habitat in Europae floribus.
12. M. atra, fronte pedibusque flavescentibus. *Syst. Ent. frontalis.*
264. 10. *Linn. Syst. Nat.* 2. 682. 4. *Fn. Sv.* 834.
Habitat in Europae borealis floribus.
13. M. atra, capite thoraceque flavis. *Syst. Ent.* 264. 11. *thoracica.*
Linn. Syst. Nat. 2. 682. 5. *Fn. Sv.* 835.
Habitat in Europae floribus.

- flava.* 14. *M. flava*, elytrorum apicibus nigris. *Syst. Ent.* 264. 12. *Linn. Syst. Nat.* 2. 682. 6. *Fn. Sv.* 836.
Habitat in Europae floribus umbellatis frequens.

83. STAPHYLINUS

- hirtus.* 1. *S. hirsutus niger*, thorace abdomineque postice flavis. *Syst. Ent.* 264. 1. *Linn. Syst. Nat.* 2. 683. 1. *Fn. Sv.* 839.
Staphylinus niger villosus, capite thorace anoque pilis fulvo aureis. *Geoff. Inf.* 1. 363. 7.
Staphylinus Bombylius hirsutus niger, capite, thorace abdominisque apice viridi flavis nitidis. *Degeer Inf.* 4. 20. 5.
Schaeff. monogr. 1754. tab. 2. fig. 12.
Icon. tab. 36. fig. 6.
Habitat in Europae locis arenosis.
- murinus.* 2. *S. pubescens cinereus nigro nebulosus.* *Syst. Ent.* 265. 2. *Linn. Syst. Nat.* 2. 683. 2. *Fn. Sv.* 840.
Staphylinus villosus e fusco cinereoque viridi tessellatus. *Geoff. Inf.* 1. 362. 6.
Staphylinus villosus griseo fusco virescens nigro nebulosus, abdomine conico, maculis nigris, capite maximo. *Degeer Inf.* 4. 12. 1. tab. 1. fig. 1.
Schaeff. Icon. tab. 4. fig. 11.
Habitat in cadaueribus, fimo.
Elytra subtus coerulea.
Larva hexapoda nuda, pallida capite segmentisque tribus anterioribus brunneis. Cauda fetis duabus articulatibus subtusque tuberculo pediformi, cylindrico tubuloso. *Stroem. Act. Nidrosf.* 6.
- maxillofus.* 3. *S. pubescens niger*, fasciis cinereis. *Syst. Ent.* 265. 3. *Linn. Syst. Nat.* 2. 683. 3. *Fn. Sv.* 841.
Staphylinus ater extremo antennarum articulo lunulato. *Geoff. Inf.* 1. 360. 1. tab. 7. fig. 1.
Staphylinus balteatus niger nitidus, abdomine subtus elytrisque fascia transversali griseo cinerea punctis nigris. *Degeer Inf.* 4. 18. 4. tab. 1. fig. 7. 8.

Staphylinus maior totus niger. Raj. Inf. 109. 1.

Scarabaeus maiusculus niger, forcipibus infestis. List.

Loqu. 391.

Ionst. Inf. tab. 17. fig. 1. 2. 3.

Bocc. Mus. 2. tab. 31. fig. A. A.

Schaeff. Icon. tab. 20. fig. 1.

Habitat in Europae syluis rapina viclitans.

Adultior totus ater, glaber euadit.

Staphylinus olens totus niger, capite thoraceque scabriusculo. Müll. Faun. Fridrichsd. 23. 228. Zool.

Dan. 97. 1099.

4. *S. ater nitidus, capite vtrinque macula fulua. Syst. oculatus.*

*Ent. 265. 4. **

Habitat in noua Hollandia, Zelandia. *Mus. Dom. Banks.*

5. *S. ater, elytris antennarum basi pedibusque rufis. Syst. erythro-*

Ent. 265. 5. Linn. Syst. Nat. 2. 683. 4. Fn. Sv. 842. pterus.

Staphylinus ater non nitens, elytris pedibusque rufis.

Geoff. Inf. 1. 364. 9.

Scarabaeus rapax elytris breuibus. Frisch. Inf. 5. 49. tab. 25.

Degeer Inf. 4. 21. 6.

Stroem. Atl. nidros. 3. 404. tab. 5. fig. 8.

Schaeff. Icon. tab. 2. fig. 2.

Elem. tab. 117.

Habitat saepius in Europae finio.

6. *S. ater, capite rufo, elytris violaceis. Syst. Ent. erythro-*

*265. 6. **

cephalus.

Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

7. *S. niger, thorace elytrisque nitidis. Syst. Ent. 166. 7. politus.*

Linn. Syst. Nat. 2. 683. 5. Fn. Sv. 843.

Staphylinus ater antennarum extremo articulo subglobo-

bofo, elytris thorace breuioribus. Geoff. Inf. 1. 361. 3.

Staphylinus niger nitidus, antennis obscure fuscis, ab-

domine elongato. Degeer Inf. 4. 22. 7.

Schaeff. Icon. tab. 39. fig. 12.

Scop. carn. 304.

Habitat in Europae cadaueribus.

Recens odorem ambrosiacum spargit.

- brunni- pes.* 8. *S. niger*, pedibus antennarum basi apiceque ferrugineis.
Habitat in Anglia. *Mus. Dom. Banks.*
Statura et magnitudo *S. politus*. Antennae nigrae articulo primo et ultimis duobus ferrugineis. Caput et thorax atra, nitida oculis albis. Elytra et abdomen atra, at obscuriora. Pedes rufi.
- marginatus.* 9. *S. ater*, thoracis lateribus pedibusque flavis. *Syst. Ent.* 266. 8. *
Staphylinus marginatus. *Act. Nidrosf.* 4. 332. 33.
Habitat in Anglia, captus die 11. Maii, in Norwagia die 16. Jun.
- flavescens.* 10. *S. ater*, pedibus rufis, elytrorum margine flavo. *Syst. Ent.* 266. 9. *Linn. Syst. Nat.* 2. 684. 13. *Fn. Sv.* 850.
Habitat in Europa boreali.
- obtusus.* 11. *S. testaceus*, elytris antice anoque nigris. *Syst. Ent.* 266. 10. *Linn. Syst. Nat.* 2. 684. 9.
Habitat in Anglia, Germania.
- 2pustulatus.* 12. *S. niger*, elytris puncto ferrugineo. *Syst. Ent.* 266. 11. *Linn. Syst. Nat.* 2. 685. 16. *Fn. Sv.* 847.
Habitat in Europa boreali.
- 2guttatus.* 13. *S. niger*, elytris puncto albido, oculis prominulis. *Gen. Inf. Mant.* 241. * *Linn. Syst. Nat.* 2. 685. 15. *Fn. Sv.* 851.
Habitat ad littora maris balthici.
- clavicornis.* 14. *S. niger* immaculatus, thorace rotundato laevi, antennis extrorsum crassioribus. *Gen. Inf. Mant.* 241. *
Habitat Kiliae. *Dom. Lund.*
- fuscipes.* 15. *S. ater*, elytris pedibusque testaceis. *Syst. Ent.* 266. 12. *Linn. Syst. Nat.* 2. 685. 23. *Fn. Sv.* 857.
Habitat in Europae stercore.
- hypnotum.* 16. *S. ater* laevis, thoracis lateribus, elytris pedibusque testaceis. *Syst. Ent.* 266. 13. *
Habitat in Anglia.

17. *S. ater*, thoracis marginibus flavescentibus, elytris nitidulus. ferrugineis, margine nigro.

Habitat in Suecia. *Mus. Dom. Banks.*

Duplo minor *S. Hypnorum*. Antennae nigrae basi flavescentes. Caput et thorax glabra, atra margine flavescente. Elytra testacea margine nigro. Pedes flavescentes.

18. *S. ater*, thorace, elytris pedibusque rufis. *Syst. Ent. merdarius.*
266. 14. *

Habitat in Anglia. *Mus. Dom. Banks.*

19. *S. thorace rufo*, elytris fuscis, puncto baseos margine atricapil- que postico albis. *Syst. Ent. 267. 15. ** *lus.*

Habitat in Anglia. *Mus. Dom. Banks.*

20. *S. ater*, elytrorum margine laterali et postico ferru- *marginel-*
gineis. *lus.*

Habitat in Angliae stercore. *Mus. Dom. Banks.*

Medius. Caput, thorax, abdomen, pedes atra immaculata, obscura vix punctata. Elytra atra, at margine laterali et postico obscure ferrugineo.

21. *S. niger*, thorace, elytris pedibusque testaceis. *Syst. chrysome-*
Ent. 267. 16. Linn. Syst. Nat. 2. 685. 21. Fn. Sv. linus.
825.

Geoff. Inf. 1. 368. 18.

Habitat in Europa boreali.

22. *S. ater glaber*, pedibus rufis. *Syst. Ent. 267. 17. Linn. rufipes.*
Syst. Nat. 2. 685. 24. Fn. Sv. 858.

Staphylinus niger, thorace marginato laevi, pedibus rufis. *Geoff. Inf. 1. 367. 19.*

Staphylinus ouatus glaber niger nitidus, pedibus rufis, elytris amplis, abdominis apice truncato. *Degeer Inf. 4. 24. 11. tab. 1. fig. 14.*

Habitat in Europa.

Variat colore omnino testaceo et nigro pedibus testaceis.

23. *S. flavus immaculatus.* *Syst. Ent. 267. 18. Linn. Syst. caraboi-*
Nat. 2. 685. 20. Fn. Sv. 854. *des.*

Staphylinus fulvus rufo flavus postice niger, elytris pedibusque testaceis, antennis longitudine corporis.

Degeer Inf. 4. 25. 12.

Habitat in Europa boreali.

rugosus. 24. *S. niger, thorace elytrisque rugosis.* *Syst. Ent.* 267. 19. *

Habitat in Anglia.

piceus. 25. *S. niger, thorace depresso, lineis elevatis tribus, elytris piceis.* *Syst. Ent.* 267. 20. *Linn. Syst. Nat.* 2. 686. 25.

Habitat in Europa boreali.

84. O X Y P O R V S.

rufus. 1. *O. rufus, capite elytrorum abdominisque posticis nigris.* *Syst. Ent.* 267. 1.

Staphylinus rufus. *Linn. Syst. Nat.* 2. 684. 6. *Fn. Sv.* 844.

Staphylinus flavus capite, elytris abdomineque postice nigris. *Geoff. Inf.* 1. 370. 22.

Staphylinus, capite elytrorum abdominisque posticis nigris. *Degeer Inf.* 4. 24. 10. tab. 1. fig. 11. 12.

Staphylinus pallide rufus, elytris coerulescentibus, capite et apice abdominis nigris. *Gad. Sat.* 80.

Schaeff. Icon. tab. 35. fig. 3.

Habitat in Europae boletis.

lunulatus. 2. *O. flavus, elytris nigris basi apiceque pallidis.* *Syst. Ent.* 268. 2.

Staphylinus lunulatus rufus, capite abdominis elytrorumque posticis nigris, femoribus totis rufis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 689. 7. *Fn. Sv.* 845.

Habitat in Europae boletis.

Caput nigrum. Abdomen apice nigrum annulo albo.

thoracicus. 3. *O. nigricans thorace rufo, elytris fuscis basi albis.* *Gen. Inf. Mant.* 241. *

Habitat in boletis Kiliae, capt. d. 11. Iul. *D. de Scheffedt.*

4. *O. nigricans*, thorace elytrisque pallidis. *Gen. Inf. pygmaeus*.
Mant. 241. *
 Habitat in boletis, capt. Kiliae d. 11. Jul. *Dom. de Schestedt.*
5. *O. niger*, elytris tibiisque fuscis. *Syst. Ent.* 268, 3. *flavipes*.
Linn. Syst. Nat. 2. 685. 22. *Fn. Sv.* 856.
 Habitat in Europae boletis.

85. P A E D E R V S.

1. *P. rufus*, elytris coeruleis, capite abdominisque apice *riparius*.
nigris. Syst. Ent. 268. 1.
Staphylinus riparius. Linn. Syst. Nat. 2. 684. 8. *Fn.*
Sv. 846. *Geoff. Inf.* 1. 369. 21. *Degeer Inf.* 4. 28. 14.
 tab. 1. fig. 1.
Staphylinus gregarius. Scop. carn. 308.
Schaeff. Icon. tab. 71. fig. 3.
 Habitat ad Europae ripas frequens.
2. *P. niger*, thorace rufo, elytris cyaneis. *Gen. Inf. Mant. ruficollis*.
 241. *
 Habitat Kiliae sub lapidibus. *Dom. de Schestedt.*
3. *P. niger*, elytris postice pedibusque fulvis. *Syst. Ent. elongatus*.
 268. 2.
Staphylinus elongatus. Linn. Syst. Nat. 2. 685. 14.
 Habitat in Europa boreali.





CLASSIS II.
VLONATA.

86. FORFICULA.

- auricularia*. 1. **F.** elytris apice albis, antennis 14 articulatis. *Syst. Ent.* 269. 1. *Linn. Syst. Nat.* 2. 686. 1. *Fn. Sv.* 850. *Geoff. Inf.* 1. 375. 1. *Scop. carn.* 312.
Forficula maior fusca pedibus testaceis, antennis articulis 14. *Degeer Inf.* 3. 545. 1. tab. 25. fig. 16.
Forficula auricularia vulgaris. *Mouff. Inf.* 171. fig. inf.
Forficula vulgaris. *Petiv. Gazoph.* tab. 74. fig. 5.
Scarabaeus subrufus cauda furcata. *List. Scar. Angl.* 391. 25.
Frisch. Inf. 8. 31. tab. 15. fig. 1. 2.
Ionst. Inf. tab. 16. fig. 2.
Merian. Inf. tab. 30.
Sulz. Inf. tab. 7. fig. 50.
Hist. Inf. tab. 7. fig. 17.
Schaeff. Elem. tab. 63.
Icon. tab. 144. fig. 3 4.
Habitat in Europæ fructibus frequens.
Aures dormientium intrare creditur, pellitur spiritu frumenti.
- apunctata*. 2. **F.** nigra, capite postice pedibusque rufis, elytris macula alba.
Habitat in Italia. *Dr. Allioni*.
Antennae articulis 11 nigris. Caput nigrum postice rufum. Thorax marginatus niger margine rufo. Elytra nigra macula magna versus futuram albida margineque pallescente. Abdomen nigrum. Forceps acuta, recta.
- minor*. 3. **F.** elytris testaceis immaculatis, antennis 10 articulatis.
Syst. Ent. 269. 2. *Linn. Syst. Nat.* 2. 686. 2. *Fn. Sv.* 861. *Geoff. Inf.* 1. 376. 2.

Forficula minor fusca, capite thoraceque nigris, pedibus flavis, antennis articulis 11. *Degeer Inf.* 3. 553. 2. tab. 25. fig. 26. 27.

Schaeff. Icon. tab. 41. fig. 12. 13.

Habitat in Europa rarius.

Antennarum apex albicat.

4. *F. forcipe flexuosa*, elytris punctis duobus flavis. *Syst. flexuosa.*
Ent. 269. 3. *

Habitat Caiennae. *Dom. Maudit.*

5. *F. antennis decem articulatis fusca*, thoracis marginibus pedibusque pallidis, forcipe basi dentata. *Syst. dentata.*
Ent. 270. 4. *

Habitat in Madera insula. *Mus. Dom. Banks.*

6. *F. nigra*, thoracis marginibus, elytris pedibusque pallidis, forcipe recta inermi. *Syst. Ent.* 270. 5. *

Habitat in insula Madera. *Mus. Dom. Banks.*

7. *F. atra*, antennis fascia alba. *Syst. Ent.* 270. 6. * *Morio.*

Habitat in insula Otaheita maris pacifici. *Mus. Dom. Banks.*

8. *F. forcipe elongata videntata nigra*, pedibus albis. *pallipes.*
Syst. Ent. 270. 7. *

Habitat in insulis promontorii viridis. *Mus. Dom. Banks.*

Antennae mihi defunt.

87. B L A T T A.

1. *B. liuida*, thoracis clypeo macula quadrata fusca. *Syst. gigantea.*
Ent. 271. 1. *Linn. Syst. Nat.* 2. 687. 1. *Mus. Lud.*
Vlr. 106.

Gronov. Zooph. 633. tab. 16. fig. 3.

Seb. Mus. 3. tab. 77. fig. 1. 2.

4. tab. 85. fig. 17. 18.

Drury Inf. 2. tab. 36. fig. 2.

Habitat in America, Asia.

2. *B. fusca*, thorace elytrisque liuidis fusco variegatis. *Maderae.*
Habitat in Madera insula. *Mus. Dom. Banks.*

Statura omnino B. giganteae, at paullo minor. Caput oliuaceum antennis fuscis. Thoracis clypeus transversus liuidus punctis nigris maculatus. Elytra liuida fulcis duobus impressis, altero recto, altero arcuato, apice lineolis fuscis creberrimis variegata. Corpus oliuaceo fuscum.

- aegyptia-* 3. B. atra, thoracis margine antico albo. *Syst. Ent.* 271.
ca. 2. *Linn. Syst. Nat.* 2. 687. 2. *Mus. Lud. Vlr.* 107.
Gronov. Zooph. 637. tab. 15. fig. 2.
Drury Inf. 2. tab. 36. fig. 3.
 Habitat in Aegypto, Oriente.
- surina-* 4. B. liuida, thoracis margine antico albo. *Syst. Ent.* 271.
menfis. 3. *Linn. Syst. Nat.* 2. 687. 3.
Sulz. Inf. tab. 8. fig. 1.
Degeer Inf. 3. tab. 44. fig. 8.
 Habitat Surinami.
- america-* 5. B. ferruginea, thoracis clypeo postice exalbido. *Syst.*
na. *Ent.* 271. 4. *Linn. Syst. Nat.* 2. 687. 4.
Blatta fusco flavescens, elytris fulco ouato impressis
 abdomine longioribus. *Geoff. Inf.* 1. 381. 2.
Blatta ferruginea, thoracis clypeo flavescente, macu-
 lis lineis margineque postico nigris, abdomine rufo,
 antennis longissimis. *Degeer Inf.* 3. tab. 44. fig.
 1. 2. 3.
Blatta molendinaria ab insula Jamaica allata maior.
Raj. Inf. 68.
Merian. Sur. 1. tab. 1.
 Habitat in America; nuper incipit in Europa sacharo
 allata.
- australa-* 6. B. ferruginea, thorace atro, annulo albo, elytris basi
siae. lineola alba. *Syst. Ent.* 271. 5. *
 Capta frequens in naue e mari pacifico insulisque Au-
 stralasiae reuertente.
- erythro-* 7. B. atra, capite pedibusque ferrugineis.
cephala. Habitat - - - *Mus. Dom. Banks.*
 Corpus magnum, atrum. Caput ferrugineum antennis
 oculisque atris. Thoracis clypeus rotundatus, arer,
 imma-

immaculatus. Elytra et abdomen atra. Pedes ferruginei.

8. *B. grisea*, thorace atro, margine antico albo. *Syst. Ent. indica.* 272. 6. *
Habitat in India orientali. *D. Koenig.*
9. *B. alba*, antennis flavis, *Syst. Ent.* 272. 7. *Linn. Syst. niuea.* *Nat.* 2. 688. 5.
Drury Inf. 2. tab. 36. fig. 1.
Degeer Inf. 3. tab. 44. fig. 10.
Habitat in America meridionali.
10. *B. pallida*, thorace elytris que fusco irroratis, alis irrorata. disco nigro. *Syst. Ent.* 272. 8. *
Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
11. *B. viridis*, antennis thoracisque linea laterali flavis, *viridis.* alis albis. *Syst. Ent.* 272. 9. *
Habitat in America. *Mus. Tottianum.*
12. *B. pallida*, abdomine atro. *Syst. Ent.* 272. 10. * *brasiliensis.*
Blatta abdomen nigrum. *Degeer Inf.* 3. 538. 3. tab. 44. fig. 5.
Habitat in Brasilia. *Mus. Dom. Banks.*
13. *B. nigra*, elytris maculis quatuor flavescentibus. *Syst. petiueria-*
Ent. 272. 11. *na.*
Cassida petiueriana. *Linn. Syst. Nat.* 2. 578. 28.
Cassida 7guttata nigra, coleoptris maculis septem albis. *Syst. Ent.* 90. 26. *Linn. Syst. Nat.* 2. 577. 19.
Blatta heteroclita. *Pall. Spicil. Zoolog.* fasc. 9. 9. tab. 1. fig. 5.
Cimici affinis niger. *Petiv. Gazoph.* tab. 71. fig. 1.
Sulz. Hist. Inf. tab. 11. fig. A. B.
Schroet. Abhandl. 1. tab. 1. fig. 7. 8.
Seb. Mus. 4. tab. 95. fig. 21.
Habitat in India.
Dentis antennis statura omnino Cassidae.
14. *B. ferrugineo fusca* immaculata, elytris fulco oblongo. *Syst. Ent.* 272. 12. *Linn. Syst. Nat.* 2. 688. 7. *orientalis.*
Fu. Sv. 862. *Geoff. Inf.* 1. 380. tab. 7. fig. 5.
Blatta

Blatta culinaris ferrugineo fusca, alis mari abdomine breuioribus, femina aptera. *Degeer Inf.* 3. 530. I. tab. 25, fig. 1. 2.

Blatta prima seu mollis *Mouffeti. Raj. Inf.* 68. 1.

Blatta molendinaria. Mouff. Inf. 138. fig. 2. 3.

Scarabaeus alter testudinatus minor atque alatus. Column. Ecphr. 1. 40. tab. 36.

Grylli. Ionst. Inf. tab. 13. fig. A.

Blatta lucifuga f. *molendinaria, Frisch, Inf.* 5. tab. 3.

Sulz. Inf. tab. 7. fig. 47.

Hist. Inf. tab. 8. fig. 2.

Schaeff. Icon. tab. 155. fig. 6. 7.

Habitat in America, hospitatur nunc in Oriente adiacenteque Europa. Lucifuga consumit panem, cibaria, calceos etc, velocissime cursitans,

Femina aptera larvae simillima parit ouum magnitudine dimidii abdominis subcylindricum carina crenulata,

variogata. 15. *B. thorace* flauescente, elytris testaceis apice nigris. *Syst. Ent.* 273. 13. *

Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

lapponica. 16. *B. flauescens*, elytris nigro maculatis. *Syst. Ent.* 273. 14. *Linn. Syst. Nat.* 2. 688. 8. *Fn. Sv.* 863.

Blatta flauescens, elytris ad angulum acutis striatis. *Geoff. Inf.* 1. 381. 3.

Blatta nigro fusca, thoracis margine elytrisque dilute griseis nigro maculatis. *Degeer Inf.* 3. 533. 2. tab. 25. fig. 8. 9.

Sulz. Hist. Inf. tab. 8. fig. 3.

Schaeff. Elem. tab. 26. fig. 2.

Icon. tab. 88. fig. 2. 3.

Habitat in Europa, cibaria consumens,

Thorax niger margine flauescente.

Variat rarius corpore multo breuiori et thorace toto flauescente.

germanica. 17. *B. liuida*, thorace lineis duabus atris parallelis. *Syst. Ent.* 273. 15. *Linn. Syst. Nat.* 2. 688. 9.

Blatta transfuga. Atl. Dan. 1. tab. 29.

Habitat in Europa. In insulis australasiae Brasilia. *Musf. Dom. Banks.*

18. *B. oblonga* liuida, thorace punctis duobus lunulaque nigris. *Linn. Syst. Nat.* 2. 689. 10. *oblongata.*

Blatta oblonga flavo testacea, thorace fascia punctisque duobus nigris, antennis hirsutissimis nigris. *Degeer Inf.* 3. 541. 9. tab. 44. fig. 11.

Habitat Surinami.

19. *B. thorace ferrugineo, elytris cyaneis.* *nitidula.*

Habitat Surinami. *Musf. Dom. Banks.*

Minuta, nitida. Caput atrum fascia oris alba. Antennae nigrae ante apicem albae. Thorax ferrugineus, nitidus macula baseos nigra. Elytra cyanea, immaculata. Alae hyalinae, nitidae macula baseos apicisque nigra. Abdomen fuscum. Pedes pallefcentes.

88. MANTIS.

1. *M. thorace teretiufculo scabro, elytris breuissimis, pedibus spinosis.* *Syst. Ent.* 274. 1. *Linn. Syst. Nat.* 2. 689. 1. *Musf. Lud. Plr.* 109. *Gigas.*

Arumatia, Margr. Brasf. 251.

Bradl. nat. tab. 27. fig. 6.

Petiv. Gazoph. tab. 60. fig. 2.

Seb. Musf. 4. tab. 77. fig. 1, 2.

Habitat in Asia.

2. *M. thorace scabro, elytris ouatis angulatis breuissimis, alis oblongis.* *Syst. Ent.* 274. 2. *Linn. Syst. Nat.* 2. 691. 14. *necydaloides.*

Gryllus necydaloides. Linn. Amoen. acad. 6. 397. 3.

Roef. Inf. 2. *Gryll.* tab. 19.

Degeer Inf. 3. tab. 36. fig. 2.

Habitat in Asia.

3. *M. thorace quadrispinoso, elytris breuissimis basi aristato mucronatis.* *atrophica.*

Mantis atrophica. Pall. Spic. Zool. fasc. 9. tab. 1. fig. 7.

Habitat in insula Iaua,

Caput inerme. Thorax spinis quatuor erectis acutis.
Elytra breuissima ouata basi aristata, apice truncata.

- spinosa*. 4. M. capite thoraceque spinosis, elytris breuissimis acutis. *Syst. Ent.* 274. 3. *
Habitat in India.
- 2spinosa*. 5. M. thorace teretiufculo antice bispinoso, elytris breuissimis, margine flauo. *Syst. Ent.* 274. 4. *
Habitat in America. *Mus. D. Hunter.*
- iamaicensis*. 6. M. linearis viridis, elytris breuissimis margine exteriori flauis.
Mantis iamaicensis. Drury Inf. 2. tab. 49. fig. 1.
Habitat in Iamaica.
Affinis M. laterali, at corpus totum viride elytris solis margine exteriori flauis. Antennae fuscae. Alae pallide roseae margine exteriori viridi.
- lateralis*. 7. M. linearis nigra, elytris breuissimis gibbis, lateribus flauis. *Syst. Ent.* 275. 5. *
Habitat in Brasilia. *Mus. Dom. Banks.*
- gongyloides*. 8. M. thorace apice dilatato, femoribus anticis spina terminatis, reliquis lobo. *Syst. Ent.* 275. 6. *Linn. Syst. Nat.* 2. 690. 4. *Mus. Lud. Vlr.* 112.
Gryllus thorace lineari alarum longitudine, margine denticulis ciliato. *Linn. Amoen. acad.* 1. 504.
Mantis. Aldrov. Inf. tab. 13. fig. 21.
Guayara. Margr. Bras. 246.
Drury Inf. 1. tab. 56. fig. 2.
Roef. Inf. 2. *Gryll.* tab. 7.
Sulz. Hist. Inf. tab. 8. fig. 56.
Seb. Mus. 4. tab. 68. fig. 9 - 12.
Aub. Miscell. tab. 65. fig. 2.
Habitat in Africa, Asia.
Caput vertice subulato, bifido rarius antennis pectinatis.
- pauperata*. 9. M. thorace lineari spinuloso, femoribus anticis spina terminatis, reliquis lobo.
Habitat in Coromandel. *Mus. Dom. Banks.* In Lusitania. *D. Gray.*

Minor *M. gongylode*. Caput vertice subulato, bifido. Thorax elongatus, filiformis spinis rarioribus ciliatus. Elytra albida margine exteriori viridi et ante marginem baseos lineola abbreviata, flavescens. Pedes pallidi, viridi variegati, femoribus anticis spina terminatis, reliquis lobo rotundato, at tantum latere exteriori.

10. *M. thorace marginato dentato, elytris albo viridique variis, margine albo punctato. Syst. Ent. 275. 7.** *mendica.*
Habitat Alexandriae. *Prof. Forskahl.*

11. *M. thorace vtrinque membranaceo dilatato obcordato. Syst. Ent. 276. 8. Linn. Syst. Nat. 2. 691. 13.* *strumaria.*
Roef. Inf. 2. Gryll. tab. 3.
Merian. Inf. Surin. tab. 27.
Seb. Mus. 4. tab. 69. fig. 7. 8.
Habitat in Indiis.

12. *M. thorace lateribus expanso lobato, capite cornuto, pedibus anticis latissimis. Syst. Ent. 276. 11.* *tricolor.*
Linn. Syst. Nat. 2. 691. 12. Mus. Lud. Vlr. 117.
Habitat in India.
Oculi in cornicula auriformia acuta desinunt.

13. *M. thorace vtrinque dilatato membranaceo plano. Syst. Ent. 276. 12.** *cancellata.*
Habitat in Indiis. *Mus. Brit.*

14. *M. thorace denticulato, femoribus ouatis membranaceis. Syst. Ent. 276. 13. Linn. Syst. Nat. 2. 689. 3.* *ficcifolia.*
Mus. Lud. Vlr. 111.
Roef. Inf. 2. Gryll. tab. 17.
Edw. Av. tab. 258.
Merian. Sur. tab. 66.
Seligman. Av. 7. tab. 48.
Habitat in Indiis.

15. *M. thorace laevi, vertice subulato, antennis pectinatis. Syst. Ent. 276. 14. Linn. Syst. Nat. 2. 691. 10.* *pectinicornis.*
Gryllus pectinicornis. Linn. Amoen. acad. 6. 396. 27.
Drury Inf. 1. tab. 50. fig. 1.
Habitat in Indiis, in Iamaica. *Drury.*

- oculata*, 16. M. thorace triangulo filiformi, oculis oblongis porrectis acuminato spinosis.
 Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*
 Media. Caput pallidum oculis magnis acuminato conicis, porrectis, acutis et sub oculis os et antennae. Thorax valde elongatus, filiformis, triangularis, laevis, testaceus angulis obscurioribus. Elytra alis breviora, albo hyalina, striata, obtusa. Alae acutiores, concolores. Pedes elongati, simplices, obscuri.
- superstitiosa*, 17. M. thorace filiformi triangulo antice ferrulato elytris virefcentibus, alarum costa transverse striata.
 Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*
 Magna. Thorax valde elongatus, triangularis antice scaber margine ferrulato, postice laevis. Elytra virefcentia. Alae ex albida costa lineolis transuersis, eleuatis abbreviatis fuscis.
- irrorata*, 18. M. thorace laeui subcarinato, elytris viridibus, punctis ferrugineis vagis. *Syst. Ent.* 276. 13. *Linn. Syst. Nat.* 2. 690. 7. *Amoen. acad.* 6. 397. 29.
 Habitat in America meridionali.
- oratoria*, 19. M. thorace laeui, elytris viridibus immaculatis. *Syst. Ent.* 276. 14.
Mantis oratoria thorace laeui, elytris viridibus, alis uacula nigra antice rufescentibus. *Linn. Syst. Nat.* 2. 690. 6. *Mus. Lud. Vlr.* 115.
Mantis. *Geoff. Inf.* 1. 399. 1. tab. 8. fig. 4.
Roef. Inf. 2. tab. 1. 2.
Mouff. Inf. 118. fig. 3.
Aldrov. Inf. 4. tab. 3. fig. 10.
Degeer Inf. 3. tab. 37. fig. 2.
Seb. Mus. 4. tab. 67. fig. 9. 10.
 ♂. *Mantis religiosa* thorace laeui subcarinato elytris-
 que viridibus immaculatis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 690. 5.
Roef. Inf. 2. *Gryll.* tab. 1. 2.
Schaeff. Elem. tab. 81.
Sut. Hist. Inf. tab. 8. fig. 4.
Seligm. Av. 5. tab. 4.
Seb. Mus. 4. tab. 67. fig. 7. 8.

Habitat in Oriente, Europa australi.

In Gallia australiori infantibus viam monstrare creditur. *Reaum.*

20. M. thorace subciliato, elytris virescentibus, ocello ferrugineo. *Syst. Ent.* 277. 15. *Linn. Syst. Nat.* 2. 691. 8. *Mus. Lud. Vlr.* 114. *precaria.*

Mantis thorace marginato spinoso, elytris flavis, macula fusca, antennis thorace brevioribus, pedibus anticis cheliformibus. *Degeer Inf.* 3. 406. 3. tab. 36. fig. 4.

Merian. Surin. tab. 66.

Seb. Mus. 4. tab. 67. fig. 3 - 6.

Habitat in America, Africa.

Ocellus ferrugineus antice dimidiato albus.

Variat rarius macula elytrorum alba loco ocelli.

21. M. thorace ferrulato, obscure grisea, elytris macula obscura baseos, alis apicis nigris. *obscura.*

Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*

Statura praecedentis, at minor. Caput obscure griseum macula frontali nigra. Thorax lateribus ferrulatis obscurus linea dorsali nigra. Elytra obtusa, obscura macula magna baseos interioris nigra. Alae obscurae macula magna atra marginis exterioris versus apicem. Pedes antici ferrati, reliqui simplices.

22. M. thorace ciliato, elytris hyalinis, margine viridi, fronte bidentata. *hyalina.*

Syst. Ent. 277. 16. *
Mantis hyalina. *Degeer Inf.* 3. 410. 4. tab. 37. fig. 1.
Habitat in America. *Mus. D. Hunter.*

23. M. thorace laevi, alis hyalinis, elytrorum margine exteriori fusco. *fenestrata.*

Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*

Statura praecedentium. Caput griseum oculis prominulis globosis et inter oculos stemmata elevata, globosa. Thorax filiformis, laevis, obscure pallidus. Elytra albo hyalina margine exteriori fusco. Alae albo hyalinae margine exteriori apice fusco. Pedes pallidi tibiis anticis interne punctis aliquot atris.

- bidens.* 24. M. thorace scabro, elytris viridibus, fasciis nigris, alis fuscis, disco atro. *Syst. Ent.* 277. 17.*
Habitat in America. *Mus. D. Hunter.*
- ministra-*
lis. 25. M. thorace scabro crenato longitudine capitis antice ferrugineo, elytris viridibus. *Syst. Ent.* 277. 18.*
Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
- urbana.* 26. M. thorace integro, elytris viridibus, puncto fasciaque ferrugineis. *Syst. Ent.* 278. 19.
Habitat in Indiis. *Mus. Brit.*
- rustica.* 27. M. thorace laeui fusco, elytris ala breuioribus fusco hyalinis, antennis pilosis.
Habitat ad littora Patagoniae. *Mus. Dom. Banks.*
Magnitudo M. paganae. Caput griseo fuscum stemmatibus valde eleuatis, globosis. Antennae pilis breuibus hispidae. Thorax linearis, laeuis, griseo fuscus. Elytra alis breuiora, obtusa, obscura, fusco hyalina. Pedes flauescentes.
- lobata.* 28. M. thorace trilobo, capitis fronte cornu bifido, oculis conico acuminatis.
Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*
Parua. Os viride fuscoque varium. Frons virescens cornu inter antennas porrecto, lato apice bifido. Antennae nigrae. Vertex fuscus. Oculi magni, conico acuminati, testacei. Thorax breuis, obscure virescens margine laterali et postico dilatatis in lobum maiorem, rotundatum, integrum. Elytra viridia basi maculaque media albis. Alae nigrae apice albae. Corpus viridi alboque varium abdominis margine eleuato, lobato.
- pagana.* 29. M. alis reticulatis albis, macula laterali ferruginea, manibus chelatis. *Syst. Ent.* 278. 20.*
Mantis Perla. Pall. Spicil. Zoolog. fasc. 9. 14. tab. 1. fig. 8.
Habitat in Gallia, Germania.
- minuta.* 30. M. thorace cylindrico flauescente, elytris hyalinis costata virescente. *Syst. Ent.* 278. 21.*

Habitat

Habitat in America meridionali. *Muf. Dom. Banks.*
 Elytra hyalina margine exteriori virefcence punctoque
 medio paruo albo. Alae rufefcentes apice hyalinae
 margineque interiori nigricantes.

31. M. thorace cylindrico flaufcente, elytris alisque hya- *pufilla.*
 linis immaculatis. *Gen. Inf. Mant.* 241. *

Mantis pufilla. Pall. Spicil. Zoolog. fasc. 9. 15. tab. 1.
 fig. 9.

Habitat in Africa, ad Cap. bon. sp.

Vix Raphidia ophiopfi maior.

89. ACRYDIUM.

1. A. thoracis fcutello abdominis longitudine. *Syft. Ent.* *2puncta-*
 278. 1. *tum.*

Acrydium elytris nullis, thorace producto, abdomine
 aequali. *Geoff. Inf.* 1. 394. 5.

Gryllus 2punctatus. Linn. Syft. Nat. 2. 693. 7. *Fn. Sv.*
 884.

Acrydium fcutellatum fufcum punctis duobus nigris,
 elytris nullis, thoracis fcutello abdominis longitudi-
 ne alas tegente. *Degeer Inf.* 3. 483. 11. tab. 23.
 fig. 15.

Locufta minor fufcefceus cucullo longo rhomboide.
Raj. Inf. 60.

Scop. Ent. carn. 316.

Lepechin. Itiner. tab. 4. fig. 1. 2.

Sulz. Hift. Inf. tab. 8. fig. 6.

Habitat in Europae collibus arenofis, apricis.

2. A. thoracis fcutello abdomine longiore. *Syft. Ent.* *subula-*
 279. 2. *tum.*

Acrydium elytris nullis, thorace producto abdomine
 longiore. *Geoff. Inf.* 1. 395. 6.

Acrydium subulatum fufcum, elytris nullis thoracis
 fcutello abdomine longiore alas tegente. *Degeer*
Inf. 3. 484. 12. tab. 23. fig. 17.

Gryllus subulatus. Linn. Syft. Nat. 2. 693. 8. *Fn. Sv.*
 865.

Sulz.

Sulz. Hist. Inf. tab. 8. fig. 7.

Schaeff. Icon. tab. 161. fig. 2. 3.

tab. 154. fig. 9. 10.

Habitat cum praecedente.

Praecedenti nimis affinis et forte eius mera varietas.

90. TRUXALIS.

- nasutus.* 1. T. capite conico, corpore viridi. *Syst. Ent.* 279. 1.
Gryllus nasutus. *Linn. Syst. Nat.* 2. 692. 1. *Musf.*
Lud. Vr. 118.
Mantis africana. *Mouff. Inf.* 119.
Roef. Inf. 2. *Gryll.* tab. 4.
Sulz. Inf. tab. 8. fig. 57.
Hist. Inf. tab. 8. fig. 5.
Drury Inf. 2. tab. 40. fig. 1.
Seb. Musf. 4. tab. 96. fig. 41.
 β. *Gryllus turritus* capite conico, antennis ensiformibus, alis hyalinis. *Linn. Syst. Nat.* Ed. X. 427.
Seb. Musf. 4. tab. 80. fig. 1. 2.
 tab. 96. fig. 46.

Habitat in Africa.

Animalculum valde distinctum, capite porrecto conico, apice antennis, basi ore instructo.

- conicus.* 2. T. capite conico, corpore fusco, elytrorum costa dimidiata viridi, linea punctorum alborum.
 Habitat in noua Hollandia. *Musf. Dom. Banks.*
 Nimis affinis T. nasuto. Antennae fuscae ensiformes thorace longiores. Caput conicum fuscum lateribus baseos viridibus. Thorax fuscus lateribus maculae dorsali baseos viridibus. Elytra fusca costa baseos viridi linea punctorum alborum. Corpus fuscum.
- breucornis.* 3. T. capite prominulo viridis, antennis compressis longitudine thoracis. *Syst. Ent.* 279. 2.
Gryllus breucornis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 692. 2. *Amoen. acad.* 6. 398. 37.
Acrydium ensicorne viride capite conico, antennis compressis, alis hyalinis. *Degeer Inf.* 3. 499. 16. tab. 41. fig. 7.
 Habitat in America meridionali.

91. ACHETA.

1. A. alis caudatis elytro longioribus, pedibus anticis pal- *gryllotal-*
 matis. *Syst. Ent.* 279. 1. *pa.*
Gryllus gryllotalpa. Linn. *Syst. Nat.* 2. 693. 10. *Fn.*
Sv. 806. *Geoff. Inf.* 1. 387. 1. *Scop. carn.* 317.
Gryllus supra fuscus, subtus ferrugineo flavus, pedi-
bus anticis latis compressis denticulatis. *Degeer Inf.*
 3. 517. 2.
Gryllotalpa. *Raj. Inf.* 64.
Gryllotalpa. *Ionst. Inf.* tab. 12. fig. vlt.
Catesb. Carol. 1. tab. 8.
Roef. Inf. 2. *Gryll.* tab. 14. 15.
Frisch. Inf. 11. tab. 5.
Sulz. Inf. tab. 9. fig. 59.
Schaeff. Icon. tab. 37. fig. 1.
Barth. Act. Hafn. 4. p. 5. fig. 1—6.
Seb. Mus. 4. tab. 89. fig. 3. 4.
 Habitat in Europae, Americae borealis cultis, horto-
 rum pestis.
 Allicitur fimo equino, pellitur porcino. *Scop.*
 Nidum e gleba struunt, quam aura sicca et calida attol-
 lere perperam affirmat *Goedart.*
2. A. elytris alisque caudato conuolutis. *Syst. Ent.* *Ap- monstro-*
pend. 826. *sa.*
Gryllus monstrosus. *Drury Inf.* 2. tab. 42. fig. 1.
 Habitat in India.
3. A. alis caudatis elytro longioribus, corpore glauco. *domestica.*
Syst. Ent. 280. 2.
Gryllus domesticus. Linn. *Syst. Nat.* 2. 694. 12. *Fn.*
Sv. 868. *Scop. carn.* 318.
Gryllus pedibus anticis simplicibus. *Geoff. Inf.* 1. 389. 2.
Gryllus domesticus. *Raj. Inf.* 63.
Gryllus domesticus. *Mouff. Inf.* 135.
Gryllus griseo fuscus pallidus, capite fasciis fuscis ob-
scuris. *Degeer Inf.* 3. 509. 1. tab. 24. fig. 1. 2.
Roef. Inf. 2. *Gryll.* tab. 12.
Ionst. Inf. tab. 12.
Hufnag. Inf. p. 11. fig. 4.
Seb. Mus. 4. tab. 65. fig. 24.
Fabr. Spec. Inf. **Z** *Hospi-*

Hospitatur in Europae muris domesticis, tota nocte stridens, praesertim instante pluuia. Lactatur calore fornacum.

Vescitur sanie et liquore carniū. *Raj.*

Blattis non cohabitare affirmat *Pod.*

Necatur pillulis ex Arsenico et radice Dauci recentis farina tritici mixtis. Nymphæae lacti incoctæ radicibus. *Linn.*

- affimilis.* 4. A. alis caudatis elytro longioribus, abdomine stylis duobus apice fissis. *Syst. Ent.* 280. 3. *
Habitat in Americae meridionalis insulis.
- reticulata.* 5. A. nigra, elytris rufo reticulatis, antennis albo annulatis.
Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*
Antennae corpore duplo longiores, nigrae annulis septem albis. Caput flauescens vertice nigro. Thorax niger macula media flaua. Elytra breuia, obtusa, nigra rufo valde reticulata. Abdomen atrum stylis duobus villosis enseque ascendente fusco.
- brasiliensis.* 6. A. alis caudatis elytris longioribus fusca, dorso pallidior, cauda ascendente longitudine corporis. *Syst. Ent.* 280. 4. *
Habitat in Brasilia. *Mus. Dom. Banks.*
- orientalis.* 7. A. alis caudatis elytris longioribus albis, corpore atro, capite pedibusque testaceis. *Syst. Ent.* 281. 5. *
Habitat Tranquebariae. *D. Koenig.*
- capensis.* 8. A. alis caudatis elytris longioribus nigra, elytris fuscis, basi flauis. *Syst. Ent.* 281. 6. *
Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*
- Morio.* 9. A. alis caudatis elytro longioribus albis apice nigris, corpore atro.
Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*
Statura et magnitudo A. campestris. Corpus atrum, immaculatum, oculi testacei. Elytra apice rotundata. Alae solae albae apice nigrae. Ensis elongatus, filiformis, fuscus.

10. A. alis elytro breuioribus, corpore nigro, stylo lineari. *Syst. Ent.* 281. 7. *campestris.*
Gryllus campestris. *Linn. Syst. Nat.* 2. 695. 13. *Mus. Lud. Vlr.* 124. *Scop. carn.* 319.
Gryllus campestris *Mouffeti.* *Raj. Inf.* 63.
Roef. Inf. 2. *Gryll.* tab. 13.
Frijch. Inf. 1. tab. 1.
Schaeff. Elem. tab. 66.
Icon. tab. 157. fig. 2. 3. 4.
Seb. Mus. 4. tab. 65. fig. 23.
 tab. 96. fig. 24.
 Habitat in Europa australiori.
 Stridet a primo die Maii ad aequinoctium, domestica facta pellit A. domesticam. *Scop.*
 Coniunxit *Geoffroy* hanc cum A. domestica, at vix vlllo iure. Et character et habitus nimis differunt.
11. A. alis caudatis elytro longioribus albis, costa fusca, elytris nigris albo maculatis. *Syst. Ent.* 281. 8. * *hospes.*
 Habitat in America. *Dom. Eaton.*
12. A. capite thoraceque flauescens, elytris aqueis longitudine alae. *italica.*
 Habitat in Italia. *D. Allioni.*
 Parua. Antennae corpore longiores flauescens. Caput et thorax flaua, immaculata oculis nigris. Elytra plana apice rotundata aquei coloris. Alae vix elytris longiores, conuolutae, acutae. Abdomen nigrum, cauda setis duabus villosis. Pedes antici flauescens, postici fusci pedibus spinosis.
13. A. thorace rotundato flauescens, alis caudatis, cauda bifeta, tibiis posticis trispinosis. *Syst. Ent.* 282. 9. *minuta.*
Gryllus minutus. *Linn. Syst. Nat.* 2. 694. 11.
Gryllus testaceus flauo testaceus, antennis corpore triplo longioribus, cauda feminae ensifera recuruata.
Degeer Inf. 3. 524. 8. tab. 43. fig. 8.
 Habitat in America meridionali.
Gryllus gryllodes. *Pall. Sp. Zool.* tab. 1. fig. 10. nullo modo huc pertinet.

92. L O C U S T A.

- citrifolia*. 1. L. thorace tetragono, angulis crenatis. *Syst. Ent.* 282. 1.
Gryllus citrifolius. Linn. *Syst. Nat.* 2. 695. 16. *Musf.*
Lud. Vlr. 125. Gronov. *Zooph.* 657.
Locusta viridis thorace tetragono, marginibus scabris.
Degeer Inf. 3. 437. 7. tab. 37. fig. 3.
Roef. Inf. 2. *Gryll.* tab. 16. fig. 1.
 Habitat in Indiis.
- laurifolia*. 2. L. thorace tetragono laeui, alis lanceolatis elytro obtusiore longioribus. *Syst. Ent.* 282. 2.
Locusta oblongifolia thorace subtetragono plano, corpore fusco, elytris viridibus ouatis ala brevioribus, pedibus posticis longissimis. *Degeer Inf.* 3. 445. 6. tab. 38. fig. 2.
Gryllus laurifolius. Linn. *Syst. Nat.* 2. 695. 17. *Musf.*
Lud. Vlr. 126.
Locusta maxima viridis, alis latissimis. *Sloan. Iam.* 2. 201. tab. 236. fig. 1.
Tucurubi. Margr. Bras. 246.
 Habitat in America, noua Hollandia. *Musf. Dom. Banks.*
 Elytra dorso gibba.
- myrtifolia*. 3. L. thorace subtetragono laeui, alis deflexis elytro longioribus, ense breuissimo recuruo. *Syst. Ent.* 282. 3.
Gryllus myrtifolius thorace subtetragono laeui, alis deflexis elytro longioribus, tibiis muticis. Linn. *Syst. Nat.* 2. 696. 18.
Locusta myrtifolia viridis pedibus testaceis, thorace tetragono plano, elytris ouatis ala acuminata brevioribus. *Degeer Inf.* 3. 447. 8. tab. 38. fig. 4.
Drury Inf. 2. tab. 41. fig. 2.
 Habitat in America meridionali.
 Femina ense breuissimo recuruo.
- camillifolia*. 4. L. thorace deflexo, elytris concauis apice rotundatis ala longioribus. *Syst. Ent.* 283. 4. *
Locusta ficcifolia elytris maximis ouatis, erectis foliiformibus. *Degeer Inf.* 3. 438. 2. tab. 37. fig. 5.
 Habitat in America. *Musf. D. Hunter.*

5. L. thorace tetragono laeui, clytris sublinearibus fusco punctatis, alis breuioribus. *Syst. Ent.* 283. 5. * *thymifolia.*
 Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
 Variat colore viridi et ferrugineo.
6. L. thorace tetragono, elytris filiformibus fuscis ala breuioribus, capite acuminato. *Syst. Ent. Append.* 826. * *graminifolia.*
 Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*
7. L. thorace deflexo, elytris concauis viridibus, basi ocellulo dorsali vitreo. *Syst. Ent.* 283. 6. * *perspicillata.*
 Habitat in America. *Mus. D. Hunter.*
8. L. thorace rotundato, elytris viridi hyalinis ala breuioribus, pedibus anticis spinosis. *Syst. Ent.* 283. 7. * *spinipes.*
 Habitat in Brasilia. *Mus. Dom. Banks.*
9. L. viridis, antennis maxillisque flauis. *Syst. Ent.* 284. 8. * *maxillofa.*
 Habitat in Americae infulis. *Dom. v. Rohr.*
10. L. thorace subquadrato laeui, elytris alisque griseis corpore longioribus. *Syst. Ent.* 284. 9. *elongata.*
Gryllus elongatus. Linn. Syst. Nat. 2. 696. 20. *Mus. Lud. Vlr.* 127.
Roef. Inf. 2. *Gryll.* tab. 18. fig. 7.
 Habitat in India.
11. L. thorace rotundato, elytris griseis basi oculo dorsali vitreo, antennis longissimis. *Syst. Ent.* 284. 10. * *specularis.*
 Habitat in America. *Mus. D. Hunter.*
12. L. thorace rotundato, alis oculo notatis. *Syst. Ent.* 284. 11. *ocellata.*
Gryllus ocellatus. Linn. Syst. Nat. 2. 696. 22. *Mus. Lud. Vlr.* 129. *Gron. Zooph.* 649.
Seb. Mus. 4. tab. 73. fig. 7. 8.
 Habitat in Indiis.
13. L. thorace rotundato laeui, elytris oblongis alae aequalibus, fronte porrecta lanceolata subtus videntata. *Syst. Ent.* 284. 12. * *lanceolata.*
 Habitat in Sierra Leon Africae. *Mus. Dom. Banks.*

- acuminata*. 14. L. thorace rotundato, vertice subulato, alis virescentibus longitudine corporis. *Syst. Ent.* 284. 13.
Gryllus acuminatus. Linn. *Syst. Nat.* 2. 696. 23. *Musf. Lud. Vlr.* 130.
Locusta acuminata thorace rotundato, vertice cornuto laeui, femoribus spinosis, antennis nigris elytro longioribus. *Degeer Inf.* 3. 443. 4. tab. 37. fig. 8.
Sulz. Hist. Inf. tab. 9. fig. 1.
Sloan. Jam. 2. 202. tab. 236. fig. 3.
 Habitat in America meridionali.
- conocephala*. 15. L. thorace rotundato laeui, elytris oblongis ala breuioribus, capite conico obtuso. *Syst. Ent.* 285. 14.
Gryllus conocephalus. Linn. *Syst. Nat.* 2. 696. 19.
 Habitat in Africa.
 Elytra ferrugineus.
- triops*. 16. L. vertice acuminato, subtus puncto ocellari nigro, elytris alae aequalibus. *Syst. Ent.* 285. 15.
Gryllus triops thorace rotundato, vertice acuminato, subtus puncto ocellari nigro, alis viridibus. Linn. *Syst. Nat.* 2. 697. 24. *Musf. Lud. Vlr.* 131.
 Habitat in Indiis.
- coronata*. 17. L. thorace spinis erectis coronato, elytris varioloso concavis. *Syst. Ent.* 285. 17.
Gryllus coronatus. Linn. *Syst. Nat.* 2. 697. 26.
Locusta coronata thorace spinis erectis coronato, elytris maculis concavis nigris, antennis corpore triplo longioribus. *Degeer Inf.* 3. 448. 9. tab. 38. fig. 5.
 Habitat in Indiis.
- melanoptera*. 18. L. thorace rotundato laeui, elytris abdomine dimidio breuioribus, alis nigris. *Syst. Ent.* 285. 18.
Gryllus melanopterus. Linn. *Syst. Nat.* 2. 697. 28. *Musf. Lud. Vlr.* 134.
 Habitat in Indiis.
 Elytra breuissima, ouata.
- coriacea*. 19. L. thorace rotundato laeui, elytris coriaceis, alis pallidis, antennis longissimis. *Syst. Ent.* 285. 19.

Gryllus coriaceus. Linn. *Syst. Nat.* 2. 697. 30. *Musf. Lud. Vlr.* 136.
Habitat in Indiis.

20. L. thorace postice rotundato laevi, elytris cinereo nigroque variis, capite pallido, ense apice ferrato. *albifrons.*
Syst. Ent. 286. 20. *
Habitat in insula Madera. *Musf. Dom. Banks.* In Italia.

21. L. thorace laevi postice rotundato fusca, capite pallido, ense falcato atro. *falx.*
Syst. Ent. 286. 21. *
Habitat in insula Madera. *Musf. Dom. Banks.*

22. L. thorace postice carinato rotundato fusca, ense falcato atro basi vtrinque pallido. *grisea.*
Habitat in Italia. *D. Allioni.*
Caput et thorax fusca, obscura antennis longitudine corporis flavescentibus. Elytra fusco cinereoque variegata. Alae hyalinae. Pedes virentes.

23. L. alis viridibus immaculatis, antennis longissimis. *viridissima.*
Syst. Ent. 286. 22.

Locusta cauda ensifera recta. *Geoff. Inf.* 1. 397. 2. tab. 8. fig. 3.

Locusta viridis cantatrix viridis immaculata, thorace rotundato, cauda feminae ensifera recta. *Degeer Inf.* 3. 428.

Gryllus viridissimus. Linn. *Syst. Nat.* 2. 698. 31. *Fn. Sv.* 869. *Scop. carn.* 320.

Agrigoneus. *List. Goed.* 301. tab. 121.

Robert. Icon. tab. 27.

Frisch. Inf. 12. tab. 2. fig. 1. 2.

Roef. Inf. 2. *Gryll.* tab. 10. 11.

Schaeff. Elem. tab. 79.

Icon. tab. 139. fig. 3. 4. 5.

Goed. Inf. 65. tab. 40.

Zinann. Obs. tab. 7. fig. 7.

Habitat in Europae graminosis, noctu stridens.

24. L. alis viridibus fusco maculatis, antennis longitudine corporis. *verrucinora.*
Syst. Ent. 286. 23.

Locusta cauda ensifera curua. *Geoff. Inf.* 1. 398. 1.

Locusta verruciuora viridis, elytris fusco maculatis, cauda feminae ensifera recurvata. *Degeer Inf.* 3. 430. 2. tab. 21. fig. 1. 2.

Gryllus verruciuorus. *Linn. Syst. Nat.* 2. 698. 33. *Fn. Sv.* 870. *Scop. carn.* 321.

Locusta viridis maior. *Raj. Inf.* 61.

Locusta maior viridis. *Frisch. Inf.* 12. tab. 2. fig. 1. 2.

Ionst. Inf. tab. 11. fig. 1. 2. 3.

Merian. Inf. tab. 176.

Sulz. Inf. tab. 9. fig. 61.

Roef. Inf. 2. *Gryll.* tab. 8.

Schaeff. Icon. tab. 62. fig. 5.

Habitat in Europae graminosis.

Rustici Sueciae huic insecto verrucas manus admovent, quas praemordet et euomit in vulnus liquorem, unde verruca contabescit. *Linn.*

varia. 25. L. thorace viridi flavo lineato, fronte acuminata, antennis longissimis. *Syst. Ent.* 287. 24. *

Locusta thalassina coeruleo viridis, antennis pedibusque flavescens, cauda feminae ensifera recurvata. *Degeer Inf.* 3. 433. 3.

Goed. Inf. 2. 142. tab. 40.

Frisch. Inf. 12. tab. 2. fig. 4.

Sulz. Hist. Inf. tab. 8. fig. 9.

Habitat in Lipsiae hortis.

brachyptera. 26. L. griseo fusca, elytris alisque corpore dimidio brevioribus.

Locusta brachyptera griseo fusca, thorace lineis duabus albis, elytris alisque abdomine brevioribus. *Degeer Inf.* 3. 434. 4. tab. 22. fig. 2. 3.

Gryllus brachypterus. *Linn. Fn. Sv.* 868.

Habitat in Europae borealis graminosis.

Ensis elongatus, recurvus.

Papa. 27. L. thorace spinoso, corpore aptero. *Syst. Ent.* 287. 25.

Locusta Papa spinosa aptera thorace spinoso, abdomine tuberculis conicis spinosis. *Degeer Inf.* 3. 433. 13. tab. 39. fig. 5.

Gryllus Papus apterus, thorace spinoso, femoribus punctatis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 699. 34. *Amoen. acad.* 1. 322.

Locusta

Locusta talpa capensis pedibus longis. *Pet. Gazoph.*
tab. 13. fig. 7.

Roef. Inf. 2. *Gryll.* tab. 6. fig. 3.

Kundm. Prompt. 118. et 184.

Habitat in Aethiopia.

Scutellum magnum, rotundatum spinis ciliatum. Femora postica subtus quadridentata.

28. L. thorace spinis muricato cinctoque, corpore apte-*spinulosa*.
ro. *Syst. Ent. App.* 826.

Gryllus spinulosus. *Linn. Syst. Nat.* 2. 703. 59. *Amoen. acad.* 6. 389. 35.

Edw. Av. 2. 161. tab. 285. fig. 3. 4. 5.

Habitat in Indiis.

Abdomen nigrum maculis testaceis. Ensis recurvus.

29. L. thorace laevi nigro, lateribus griseis, corpore aptero. *Onos.*

Gryllus Onos. *Pall. Spicil. Zoolog. fasc.* 9. 18. tab. 2. fig. 1.

Locusta echinata impennis e Chufan. *Petiv. Gazoph.*
tab. 39. fig. 9.?

Habitat in Sibiria.

Ensis longitudine abdominis.

Synonymon *Petiuerii* a cel. *Pallas* allatum forte potius ad *L. spinulosum* pertinet.

30. L. thorace postice marginato dentato, ense recurvo, *Laxman-*
apice deflexo, femina aptera. *ni.*

Gryllus Laxmanni. *Pall. Spicil. Zool. fascicul.* 9. 20. tab. 2. fig. 2. 3.

Habitat in Sibiria.

Alae in femina omnino nullae, in mare duae, parvulae, ovatae, reticulatae, fuscae, margine crassiore versus basin pallidae, sub scuto thoracis porrecto latentes.

93. G R Y L L V S.

1. G. thorace carinato integro, corpore aptero. *Linn. Elephas.*
Syst. Nat. 2. 699. 35.

Roef. Inf. 2. *Gryll.* tab. 6. fig. 2.

Habitat in Africa.

- succin-*
æus. 2. *G. thoracis* carina margineque postico elytrorumque
margine dorsali flavis, gula cornuta. *Syst. Ent.* 287.
2. *Linn. Syst. Nat.* 2. 699. 36. *Amoen. academ.*
6. 398. 36.
Habitat in Indiis.
Antennae flavae. Tibiae posticae spinis luteis apice atris.
- criflatus.* 3. *G. thorace* cristato, carina quadrifida, alis apice fuscis.
Syst. Ent. 288. 3. *Linn. Syst. Nat.* 2. 699. 37. *Musf.*
Lud. Vlr. 137. *Amoen. acad.* 1. 21. tab. 17. fig. 4.
Gryllus arabicus. *Hasselqu. It.* 413.
Gryllus ex Aegypto. *Olear. Musf.* tab. 17. fig. 5.
Frisch. Inf. 9. tab. 1. fig. 1.
Roef. Inf. 2. *Gryll.* tab. 5.
Edw. Av. tab. 312.
Seb. Musf. 4. tab. 72. fig. 11. 12.
Habitat in Arabia, Aegypto frequens.
Arabis esculentus.
- Dux.* 4. *G. thorace* carinato scabro, elytris viridibus, alis ru-
fis fusco maculatis.
Gryllus Dux. *Drury Inf.* 1. tab. 44.
Habitat in America meridionali. *Musf. Dom. Banks.*
Magnus. Antennae filiformes nigrae. Caput flavescens.
Thorax carinatus, virescens punctis eleuatis pallidis
scaber carina obscura. Elytra viridia flauo neruosa.
Alae rubrae maculis margineque postico fuscis. Cor-
pus et pedes virescentes.
- carina-*
tus. 5. *G. thorace* cristato, carina trifida, alis fascia nigra.
Syst. Ent. 288. 4. *
Habitat in Aegypto. *Prof. Forskahl.*
- Lunus.* 6. *G. thoracis* segmento crista semiorbiculata, elytris ni-
gris, fasciis albis. *Syst. Ent.* 288. 5. *Linn. Syst. Nat.*
2. 693. 9. *Amoen. acad.* 6. 397. 30.
Habitat in America meridionali.
Alae nigrae, immaculatae.
- reticula-*
tus. 7. *G. thorace* cymbiformi postice producto acuto, elytris
reticulatis.
Habitat in Bengal. *Musf. Dom. Banks.*

Magnitudo fere *G. ferrati*. Caput ferrugineum ore nigro maculato. Antennae ferrugineae articulo primo ultimisque nigris. Thorax crista trifida carinata posticeque producta cymbiformi, ferrugineus carina lineaque laterali abbreviata atris. Elytra nigra flauo reticulata. Pedes nigri subtus rufi.

8. *G. thorace cymbiformi carinato ferrato postice producto acuto.* *Syst. Ent.* 288. 6. *ferratus.*

Gryllus ferratus thorace cymbiformi carinato denticulato, capite acuminato, abdomine coerulco. *Linn. Syst. Nat.* 2. 693. 5. *Mus. Lud. Vlr.* 121.

Aerydium ferratum viride, thorace cymbiformi, carinato denticulato, capite acuminato. *Degeer Inf.* 3. 493. 10. tab. 41. fig. 6.

Gronov. Zooph. 642.

Roef. Inf. 2. *Gryll.* tab. 16. fig. 2. perperam antennas setaceas depingit.

Sulz. Inf. tab. 8. fig. 58.

Habitat ad Cap. bon. sp.

9. *G. viridis*, elytris maculis duabus albis, abdomine vesiculoso, vtrinque maculis tribus albis. *Syst. Ent. Append.* 827. * *inanis.*

Pneumora sexguttata. *Tunberg. Act. Holm.* 1775. 258. 3. tab. 7. fig. 3.

Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*

10. *G. viridis albo maculatus*, scutello carinato vtrinque papillo-dentato, abdomine vesiculoso variegato. *Syst. Ent. App.* 827. * *pus.*

Pneumora immaculata. *Tunberg. Act. Holm.* 1775. 256. 1. tab. 7. fig. 1.

Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*

11. *G. viridis calloso punctatus*, abdomine vesiculoso albo variolo-
variegato. *Syst. Ent. App.* 827. *pus.*

Gryllus variolosus calloso punctatus, abdomine vesiculoso albo punctato. *Linn. Syst. Nat.* 2. 693. 4. *Mus. Lud. Vlr.* 120.

Pneumora maculata. *Tunberg. Act. Holm.* 1775. 257. 2. tab. 7. fig. 2.

Habitat ad Cap. bon. sp.

miliaris. 12. G. thorace subquadrato verrucoso, elytris punctis callosis albis. *Syst. Ent.* 288. 7. *Linn. Syst. Nat.* 2. 700. 39. *Mus. Lud. Vr.* 142.

Acrydium verrucosum thorace ovato plano dentato verrucoso, elytris alisque fuscis, abdomine nigro fasciis albis. *Degeer Inf.* 3. 486. 1. tab. 40. fig. 6.

Habitat in America meridionali.

Sequenti affinis videtur.

morbillifus. 13. G. thorace quadrato rubro verrucoso, elytris fuscis albo punctatis, alis rufis. *Syst. Ent.* 289. 8. *Linn. Syst. Nat.* 2. 700. 38. *Mus. Lud. Vr.* 142.

Gron. Zooph. 179. 662.

Roef. Inf. 2. *Gryll.* tab. 18. fig. 6. perperam antenas depingit setaceas.

Seb. Mus. 4. tab. 79. fig. 7. 8.

Seligm. Av. 1. tab. 43.

Habitat ad Cap. bon. sp.

Antennae nigrae, filiformes.

punctatus. 14. G. thorace verrucoso, elytris atris flavo punctatis, alis atris.

Gryllus punctatus. *Drury Inf.* 2. tab. 41. fig. 4.

Gryllus punctatus. *Sulz. Hist. Inf.* tab. 9. fig. 3.

Habitat in India orientali.

Elytra in nostro specimine multo nigriora, quam in figura *Sulzeri*.

squarrosus. 15. G. thorace subtriarticulato, articulis vtrinque spinosis, alis rubris nigro punctatis.

Gryllus squarrosus viridis, thorace subarticulato, articulis vtrinque subtricuspidibus, alis rubris nigro punctatis. *Linn. Mant.* 533.

Locusta squarrosa. *Syst. Ent.* 285. 16.

Drury Inf. 1. tab. 49. fig. 1.

Habitat in Africa. *Mus. Dom. Banks.*

Caput et thorax obscure viridia. Thoracis articulus primus bispinosus, spina posteriori tricuspidi, articulus secundus spina tricuspidi, tertius multispinosus. Elytra viridia fusco punctata.

16. G. thorace subcarinato scabro, capite obtuso, femori-*haemato-*
bus piloso ciliatis. *Syst. Ent.* 289. 9. *Linn. Syst. Nat.* *pus.*
2. 700. 40. *Mus. Lud. Vlr.* 143.
Acrydium rubripes griseum punctatum, thorace sca-
bro subcristato, femoribus maximis intus nigris, ti-
biis posticis rubris. *Degeer Inf.* 3. 490. 6. tab. 40.
fig. 10.
Habitat in Indiis.
Elytra cinerea. Alae hyalinae venis nigris articulatae.
17. G. elytris viridibus albo punctatis apice rufescenti-*picus.*
bus, corpore coeruleo flavoque variegato. *Syst. Ent.*
289. 10. *
Habitat Caiennae. *D. Mallet.*
18. G. thorace segmentis tribus, fronte impressa, mandibulis *tartari-*
concoloribus. *Syst. Ent.* 289. 11. *Linn. Syst.* *cus.*
Nat. 2. 700. 42. *Mus. Lud. Vlr.* 139.
Roes. Inf. 2. *Gryll.* tab. 18. fig. 8.
Drury Inf. 1. tab. 49. fig. 2.
Habitat in Africa.
Affinis sequenti. Ambo elytris cinerascensibus fusco
maculatis.
19. G. thorace subcarinato, segmento unico, mandibulis *migrato-*
coeruleis. *Syst. Ent.* 289. 12. *Linn. Syst. Nat.* 2. 701. *rius.*
41. *Fn. Sv.* 871. *Scop. carn.* 323.
Acrydium migratorium fuscum seu viride obscure ma-
culatum, elytris dilute fuscis nigro maculatis, denti-
bus nigris. *Degeer Inf.* 3. 456. 1. tab. 23. fig. 1.
Gryllus migratorius. *Frisch. Inf.* 9. tab. 1. fig. 8.
Roes. Inf. Gryll. tab. 24.
Seb. Mus. 4. tab. 65. fig. 21.
Edw. Av. 208. tab. 208.
Seligm. Av. 6. tab. 103.
Habitat in Tartaria, variis annis in Europam migrans,
destruens vegetabilia, gramina.
20. G. thorace subcarinato fusco, linea dorsali rufa, fe-*lineola.*
moribus posticis intus sanguineis, tibiis coeruleis.
Habitat in Italia. *D. Allioni.*

Magnitudo *G. migratorii*. Caput fuscum, fulcatum. Thorax segmentis tribus carinatus, fuscus carina rufo. Elytra grisea. Alae albae fusco reticulatae. Pedes postici femoribus linea interiori sanguinea, tibiis coeruleis adspersis, spinis albis apice atris.

variegatus. 21. *G. thorace lineato flavo, elytris viridibus, alis coeruleis. Syst. Ent. 290. 13. Linn. Syst. Nat. 2. 700. 43. Mus. Lud. Vlr. 144.*

Habitat in America.

Antennae nigrae annulis rubris. Frons rubra maculis atris.

vocans. 22. *G. thorace carinato, elytris pallidis, maculis ocellaribus fuscis, alis basi ferrugineis. Syst. Ent. 290. 17.**
Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

turidus. 23. *G. thorace subcarinato niger, pectoris macula, abdominisque cingulis sanguineis, fronte porrecta.*

Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*

Magnitudo *G. striduli*. Antennae filiformes nigrae articulo penultimo flavescente. Caput nigrum fronte supra antenas porrecta, obtusa, supra plana. Thorax subcarinatus, scaber, obscurus, immaculatus. Pectus atrum, nitidum macula magna, sanguinea. Abdomen atrum annulis sanguineis. Pedes atris.

musicus. 24. *G. thorace carinato, elytris antice nigris fascia alba, postice griseis nigro variis. Syst. Ent. 290. 15.**
Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

tuberculatus. 25. *G. thorace scabro, alis rufis apice cinereis, femoribus posticis supra infraque carinatis. Syst. Ent. 290. 16.**
Habitat in Iutlandiae arenosis.

stridulus. 26. *G. thorace carinato, alis rubris extimo nigris. Syst. Ent. 290. 17. Linn. Syst. Nat. 2. 701. 47. Fn. Sv. 872.*

Acrydium elytris nebulosis, alis rubris externe nigris. Geoff. Inf. 1. 393. 4.

Acrydium rubripenne nigro fuscum, alis rubris extimo nigris, thorace carinato. Degeer Inf. 3. 472. 2.

Frisch.

Frisch. Inf. 9. tab. 1. fig. 2.

Roef. Inf. 2. *Gryll.* tab. 21. fig. 1.

Schaeff. Elem. tab. 15.

Icon. tab. 27. fig. 10. 11.

Seb. Mus. 4. tab. 65. fig. 20.

Scopol. carn. 326.

Habitat in Europae siccis, arenosis.

Variat corpore toto nigro et nigro flavoquo vario. Setae duae parvae in abdominis penultimo segmento.

27. G. thorace tuberculato, elytris obscuris immaculatis, ferrugineis, capite acuminato.

Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*

Antennae filiformes, nigrae annulis duobus flavis. Oes fuscum maculis rubris. Frons et vertex flava. Marggo sub oculis prominentiaque inter antennis fusca. Thorax in medio flavus margine nigro, antico tuberculato, postico punctato subspinoso. Elytra glabra, laevia, obscura, immaculata. Alae ferrugineae margine interiori apice cinerascete. Abdomen fusco flavoquo annulatum. Femora subtus et tibiae totae rufa.

28. G. thorace lineis quatuor flavis, alis coeruleis, elytris coeruleis. *Syst. Ent.* 291. 18. *Linn. Syst. Nat.* 2. 700. 45. *Muj. Lud. Vlr.* 146.

Habitat in America meridionali.

Femora basi sanguinea.

29. G. fuscus, thorace carinato, alis rubris apice hyalinis. *italicus.* *Syst. Ent.* 291. 19. *Linn. Syst. Nat.* 2. 701. 46. *Mus. Lud. Vlr.* 147.

Roef. Inf. 2. *Gryll.* tab. 21. fig. 6.

Schaeff. Icon. tab. 27. fig. 8. 9.

Scop. carn. 327.

Habitat in Europa australiori.

30. G. testaceus, alis sanguineis apice hyalinis, femoribus posticis nigro punctatis. *Syst. Ent.* 291. 20. * *germanicus.* *Roef. Inf.* 2. *Gryll.* tab. 21. fig. 7.

Habitat in Germaniae agris.

31. G. thorace laevi viridi, alis hyalinis latere tenuiori viridibus apice fuscis. *thalassinus.*

Habitat

Habitat in Italia. *D. Allioni.*

Caput viride ore oculisque fuscis. Thorax laevis, viridis antice vtrinque macula magna fusca. Elytra grisea costa baseos viridi. Femora postica viridia fusco maculata. Tibiae sanguineae.

virginianus. 32. *G. thorace carinato, elytris costa viridi, alis nigris basi virescentibus. Syst. Ent. 291. 21.*

Habitat in America boreali. *Dom. Lewin.*

coeruleans. 33. *G. thorace laeviusculo, elytris pallidis nigro maculatis, alis latere tenuiore coeruleiscentibus. Linn. Syst. Nat. 2. 701. 48.*

Habitat in Europa australiori. *D. Allioni.*

carolinus. 34. *G. thorace subcarinato, alis nigris, margine postico cinereo. Syst. Ent. 291. 22. Linn. Syst. Nat. 2. 701. 49.*

Locustella carolina, elytris fuscis, alis inferioribus nigris ad extremitates luteis. Catesb. Carol. 2. 89. tab. 89.

Acrydium carolinum fuscum nebulosum, thorace carinato segmento unico, alis nigris margine flavis. Degeer Inf. 3. 491. 7. tab. 41. fig. 2, 3.

Habitat in America boreali.

Elytra obscura punctis fuscis irrorata.

obscurus. 35. *G. thorace subcarinato, alis disco rubro, fascia nigra apice hyalinis. Linn. Syst. Nat. 2. 701. 50. Mus. Lud. Vlr. 144.*

Acrydium obscurum fuscum, alis rubro roseis, margine nigris, macula hyalina alba, tibiis posticis albis. Degeer Inf. 3. 492. 8. tab. 41. fig. 4.

Drury Inf. 2. tab. 41. fig. 1.

Seb. Mus. 4. tab. 80. fig. 15, 16.

Habitat in Africa.

sibiricus. 36. *G. thorace subcarinato, antennis clauatis, tibiis anticis ovato clauatis. Gen. Inf. Mant. 243. * Linn. Syst. Nat. 2. 701. 51.*

Gryllus clauimanus. Pahl. Spic. Zool. fasc. 9. p. 21. tab. 1. fig. 11.

Nou. Comment. Acad. Scient. Petrop. 14. tab. 25. fig. 8.
Habitat in Sibiria.

Femina tibiis simplicibus.

37. G. thorace subcarinato, alis virefcenti coeruleis, fascia nigra. *Syst. Ent.* 292. 23. *Linn. Syst. Nat.* 2. 700. 44. *Mus. Lud. Vr.* 145. *corrule-
scens.*

Acrydium elytris nebulosis, alis coeruleis extimo nigro. *Geoff. Inf.* 1. 392. 2.

Acrydium coeruleipenne fuscum, elytris griseis, fasciis tribus fuscis, alis virefcenti coeruleis extimo nigris thorace carinato. *Degeer Inf.* 3. 473. 3.

Frisch. Inf. 9. tab. 1. fig. 3.

Sulz. Inf. tab. 9. fig. 60.

Schaeff. Icon. tab. 27. fig. 6. 7.

Roes. Inf. 2. *Gryll.* tab. 21. fig. 4.

Seb. Mus. 4. tab. 65. fig. 19.

Scopöl. carn. 325.

Raj. Inf. 60.

Habitat in Europa australiori.

38. G. thorace carinato, elytris margine tenuiori viridibus, alis basi flavescentibus apice cinereis. *cinera-
scens.*

Habitat in Italia. *Dom. D. Allioni.*

Affinis G. flavo, at duplo maior. Frons virefca ore ferrugineo. Thorax carinatus, fuscus. Elytra fufcescentia albo punctata apice cinerea. Alae basi flavescentes apice late cinerea. Tibiae posticae rufae.

39. G. thorace carinato obscurus, alis flauissimis apice nigricantibus. *fulphu-
reus.*

Habitat in America boreali. *Dom. A. Blackburn.*

Paruus. Caput, thorax et elytra obscure ferruginea.

Elytra apice parum cinerascens. Alae basi sulphureae apice fuscae. Femora postica intus flavo nigroque annulata. Tibiae cyanae basi pallidae.

40. G. thorace carinato, alis flavis, fascia nigra apice cinereis. *Syst. Ent.* 292. 24. * *flavus.*

Gryllus flavus thorace subcarinato, alis disco flavo, fascia nigra apice hyalinis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 702. 52.

Fabr. Spec. Inf.

A a

Acry-

Acrydium nigro fasciatum viride maculis fuscis, elytris nigro maculatis, alis hyalinis virescentibus, medio fascia nigra. *Degeer Inf.* 3. 493. 9. tab. 41. fig. 5.?

Locusta capensis alis inferioribus luteis. *Pet. Gazoph.* 6. tab. 3. fig. 6.

Habitat in Europa australiori, ad Cap. bon. sp.

Elytra fusca albo obsolete maculata. Tibiae posticae sanguineae.

cyanipes. 41. *G. fuscus*, linea dorsali flava, tibiis posticis flavis apice cyaneis. *Syst. Ent.* 292. 25. *

Acrydium flavo fasciatum fuscum, thorace elytrisque fasciis longitudinalibus flavis. *Degeer Inf.* 3. 489. 4. tab. 40. fig. 3.

Habitat in Americae meridionalis insulis.

rusticus. 42. *G. griseus*, elytris basi fuscis flavo maculatis apice cinereo fuscoque variis. *Syst. Ent.* 292. 26. *

Habitat in Americae meridionalis insulis.

lateralis. 43. *G. thorace fusco*, margine punctoque vtrinque tibiisque flavis. *Syst. Ent.* 293. 27. *

Habitat in Americae meridionalis insulis.

viridulus. 44. *G. thorace cruciato*, corpore supra viridi, elytrorum margine albido. *Linn. Syst. Nat.* 2. 702. 54. *Fn. Sv.* 874.

Gryllus capite, thorace elytrisque superne viridibus. *Linn. It. Westrog.* 276.

Acrydium albo marginatum viride seu fuscum, abdomine griseo, elytris albo marginatis. *Degeer Inf.* 3. 480. 7.

Frisch. Inf. 9. tab. 1. fig. 7.

Schaeff. Icon. tab. 141. fig. 2. 3.

Habitat in Europae arvis sterilioribus frequens.

biguttulus. 45. *G. thorace cruciato*, elytris nebulosis, puncto oblongo albo versus apices. *Linn. Syst. Nat.* 2. 702. 55. *Fn. Sv.* 875.

Acrydium biguttulum griseo fuscum nigro maculatum subtus viride, ano rufo, elytris macula albicante. *Degeer Inf.* 3. 479. 6.

Schaeff.

Schaeff. Icon. tab. 190. fig. 1. 2.

Habitat in Europae borealioris aruis sterilioribus frequens.

46. *G. femoribus fanguineis, elytris virescentibus, antennis cylindricis. Syst. Ent.* 293. 28. *Linn. Syst. Nat.* 2. 702. 58. *Fn. Sv.* 877. *grossus.*

Acrydium femoribus fanguineis, alis subfuscis reticulatis. Geoff. Inf. 1. 393. tab. 8. fig. 2.

Acrydium rubripes viride nigro maculatum, elytris fuscis flauo marginatis, femoribus posticis subtus rubris. Degeer Inf. 3. 477. 5. tab. 22. fig. 4.

Hollar. Inf. tab. 10. fig. 5. 6.

Frijch. Inf. 9. 5. tab. 4.

Habitat in Europae aruis arenosis frequens.

47. *G. thorace cruciato fuscus, femoribus tibiisque posticis fascia alba. Syst. Ent.* 293. 29. * *captius.*

Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

48. *G. fuscus, abdomine rufo, antennis subclauatis. Syst. Ent.* 293. 30. *Linn. Syst. Nat.* 2. 702. 56. *Fn. Sv.* 876. *rufus.*

Acrydium clauicorne griseo fuscum, tibiis posticis rubris, antennis clauatis. Degeer Inf. 3. 482. 10. tab. 23. fig. 13.

Schaeff. Icon. tab. 136. fig. 4. 5.

Scop. carn. 329.

Habitat in Europae aruis sterilioribus frequens.

49. *G. corpore incarnato aptero. Syst. Ent.* 293. 31. *Linn. pedestris. Syst. Nat.* 2. 703. 60. *Fn. Sv.* 878.

Acrydium apterum griseo incarnatum, femoribus subtus rubris, tibiis coeruleis. Degeer Inf. 3. 474. 4. fig. 23. fig. 8. 9.

Habitat in Europa.

Insectum perfectum, quamuis apterum, teste *Linné, Pallas.*

50. *G. alarum rudimentis oculo atro, oculis aureis. Syst. perspicill. Ent.* 293. 32. *Linn. Syst. Nat.* 2. 703. 61. *Amoen. latus. acad.* 6. 398. 34.

Habitat in Indiis.

An potius Puppa alius speciei.





CLASSIS III.

S Y N I S T A T A.

94. M O N O C V L V S.

- Polyphe-*
mus. 1. **M.** testa plana conuexa, sutura lunata, postica den-
tata, cauda subulata longissima. *Syst. Ent.* 294. 1.
Linn. Syst. Nat. 2. 1057. 1. *Mus. Lud. Vlr.* 460.
Xiphosura. Gron. Zooph. 953.
Ionst. Exsangu. tab. 7. fig. 1. 2.
Olear. Mus. tab. 28. fig. 1. 2.
Worm. Mus. tab. 249.
Rumph. Mus. 21. tab. 12.
Knorr. Del. tab. F. 1.
Kaempf. Jap. tab. 13. fig. 8.
Schaeff. monogr. 1756. tab. 7.
Cancer moluccanus. Seb. Mus. 3. tab. 17. fig. 1.
Habitat in Indiae aquis. Insectorum omnium facile
maximum euadens.
- piscinus.* 2. **M.** testa cordata plana. *Syst. Ent.* 294. 2. *Linn. Syst.*
Nat. 2. 1057. 2. *Fn. Sv.* 2045.
Binoculus hemisphaericus, cauda foliacea, capitis pun-
cto triplici fusco. *Geoff. Inf.* 2. 660. 2. tab. 21. fig. 3.
Loeffl. Act. Vps. 1750. 42.
Bast. Subf. 157. tab. 8. fig. 9. 10.
Frisch. Inf. 6. tab. 12.
Stroem. Sundm. tab. 1. fig. 4. 5. 6.
Habitat in Oceano.
Duae huius sunt varietates. Stylatus antennis corpore
longioribus, muticus absque exsertis antennis.
- Apus.* 3. **M.** antennis trifidis, cauda bifida. *Syst. Ent.* 295. 3.
Monoculus Apus testa subcompressa antice retusa postice
truncata, cauda bifeta. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1058.
3. *Fn. Sv.* 2046.

Binoculus cauda bifeta. Geoff. *Inf.* 2. 660. 1. tab. 21. fig. 4.

Apus cancriformis. Schaeff. *monogr.* 1756. tab. 1 — 6.
Schaeff. *Elem.* tab. 29. fig. 1.

Frijch. Inf. 10. tab. 1.

Act. Angl. 40. 150. tab. 1. fig. 2.

Sulz. Inf. tab. 24. fig. 153.

Habitat in Europae fossis, piscinis.

Aestate exsiccati reniuiscent affluente aqua.

4. M. antennis dichotomis, cauda inflexa acuta. *Syst. Ent. Pulex.*
295. 4. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1058. 4.

Monoculus Pulex ramosus brachiis dichotomis, cauda appendiculata inflexa, testa postice unispinosa. *Degeer Inf.* 7. 442. 1. tab. 27. fig. 1. 2. 3.

Vermes minimi rubri aquam stagnalem colore rubro inficientes, unde vulgus dira protendit. *Merret. pen.* 207.

Pulex aquaticus. Schaeff. *monogr.* 1755. tab. 1. fig. 1 — 3.

Sulz. Hist. Inf. tab. 30. fig. 10.

Schaeff. Elem. tab. 29. fig. 4.

Geoff. Inf. 2. 655. 1.

Swammerd. bibl. tab. 31. fig. 1. 2. 3.

Toblot. microsc. 1. p. 2. tab. 13. fig. P. Q. R.

Ledermüll. microsc. 146. tab. 72. fig. 2.

Habitat in Europae aquis dulcibus.

5. M. antennis dichotomis, cauda elongata sub corpore inflexa. *lacuis.*

Monoculus exspinofus brachiis dichotomis, cauda simplici inflexa, testa postice rotundata non spinosa. *Degeer Inf.* 7. 457. 2. tab. 27. fig. 9. 10. 11.

Pulex aquaticus ecaudatus. Schaeff. *monogr.* tab. 1. fig. 9.

Habitat in Europae aquis.

Nimis praecedenti affinis videtur.

6. M. antennis dichotomis, cauda inflexa, testa postice bispinosa, capite acuminato. *bispinofus.*

Monoculus bispinosus brachiis dichotomis, capite rostrato, cauda inflexa, testa postice bispinosa. *Degeer Inf.* 7. 463. 3. tab. 28. fig. 3. 4.
Habitat in Europae aquis.

Pediculus. 7. *M. antennis dichotomis, cauda reflexa. Syst. Ent.* 295. 5. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1058. 5. *Fn. Sv.* 2048.
Sulz. Hist. Inf. tab. 30. fig. 8.
Geoff. Inf. 2. 656. 2.

Monoculus Pediculus ramosus brachiis dichotomis, cauda bifida rectiuscula exserta, pedibus nudis. *Degeer Inf.* 7. 467. 4. tab. 28. fig. 9. 10.
Habitat in Europae aquis dulcibus.

quadri-cornis. 8. *M. antennis quaternis, cauda recta bifida. Syst. Ent.* 295. 6. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1058. 6. *Fn. Sv.* 2049.
Geoff. Inf. 2. 656. 3.

Monoculus cornubus quaternis mobilibus setaceis, corpore ovato, cauda longa, recta, cylindrica, bifida. *Degeer Inf.* 7. 483. 7. tab. 29. fig. 11. 12.
Backer microsc. tab. 9. fig. 1. 2.
Blanc. Inf. 149. tab. 13. fig. B.
Ioblot. microsc. 1. p. 2. tab. 14. fig. 6. D.
Degeer Act. Holm. 1747. tab. 6. fig. 2.
Rocf. Inf. 3. tab. 28. fig. 1. 2. 4.
Sulz. Hist. Inf. tab. 30. fig. 9.
Leuwenh. arc. 142. fig. 1.
Scop. carn. 1129.
Act. angl. abbr. 2. 258. tab. 20. fig. 5. 6.
Habitat in Europae aquis stagnantibus frequens.
Antennae caudaque rufescunt.

conchaceus. 9. *M. antennis capillaribus multiplicibus, testa bivalui. Syst. Ent.* 295. 7. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1059. 7. *Fn. Sv.* 2050.

Monoculus ovato conchaceus testa ovata bivalui, brachiis apice capillaceis multiplicibus intra testam. *Degeer Inf.* 7. 476. 6. tab. 29. fig. 5. 6. 7.
Geoff. Inf. 2. 657. 4.

Habitat in aquis stagnantibus, velocissime antennis exsertis natans.

95. O N I S C U S.

1. O. antennis quaternis, segmentorum lateribus falcato spinosis. *Syst. Ent.* 296. 1. * *paradoxus.*
 Habitat in Terra del Fuego. *Mus. Dom. Banks.*
 Affinis Monoculis. An Protypon Entomolithi paradoxo? In multis certe conuenit.

2. O. antennis quaternis compressis, pedibus vnguiculatis, femoribus posticis carinatis. *Syst. Ent.* 296. 2. * *imbricatus.*
 Habitat in noua Zelandia. *Mus. Dom. Banks.*

3. O. abdomine foliolis duobus obtecto, cauda semiouali. *Syst. Ent.* 296. 3. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1059. 1. *Fn. Sv.* 2052. *Mus. Adolph. Frid.* 1. 88. *Afilus.*
Afilus f. Oestrum. Bell. aquat. 443.
Pediculus marinus. Rond. Pisc. 576.
Gron. Zooph. 997.
Petiv. Gazoph. tab. 155. fig. 1.
Planc. de Conch. minus not. tab. 5. fig. A. B.
Pall. Spicil. Zoolog. fasc. IX. p. 71. tab. 4. fig. 12.
 Habitat in Oceano Europaeo viuiparus.

4. O. abdomine foliis sex obtecto, cauda retusa. *Syst. Oestrum. Ent.* 297. 4. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1059. 2. *Fn. Sv.* 2053. *Mus. Adolph. Frid.* 89.
Animalculum crustaceum. Margr. Brasf. 155. fig. 3. 4.
Stroem. Sundm. 165. 2. tab. 1. fig. 2. 3.
Pall. Spicil. Zoolog. fasc. IX. p. 74. tab. 4. fig. 13.
Seb. Mus. 1. tab. 90.
 Habitat in Oceano Europaeo.

5. O. antennis quaternis, cauda oblonga acuta. *Syst. Ent. Entomon.* 297. 5.
Oniscus Entomon abdomine subtus nudo, cauda subulata. Linn. Syst. Nat. 2. 1060. 5. *Fn. Sv.* 2055.
Afellus marinus cornubiensis alius. Raj. Inf. 43.
Entomon pyramidale. Klein. tab. 38. fig. 1. 2.
Squilla Entomon murina cauda longa subulata crustacea. Degeer Inf. 7. 514. 2. tab. 32. fig. 1. 2.
Petiv. Gazoph. tab. 1. fig. 4.
Gron. Zooph. 992.

Bast. subf. 2. 143. tab. 13. fig. 2.

Pall. Spicil. Zool. fasc. IX. p. 64. tab. 5. fig. 1.

Habitat in Oceano.

Natat velocissime, victitat cancris, piscibus, piscatoribus inuisus.

aquaticus. 6. *O. cauda rotundata, stylis bifurcis, antennis quaternis.*
Syst. Ent. 297. 6.

Oniscus aquaticus lanceolatus, cauda rotundata, stylis bifurcis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1061. 11. *Fn. Sv.* 2061.

Squilla Afellus aquatica, cauda rotundata, stylis binis bifurcis. *Degeer Inf.* 7. 496. 1. tab. 31. fig. 1.

Afellus cauda bifida, stylis bifurcis articulis septem.
Geoff. Inf. 2. 672. 1.

Afellus aquaticus Gesneri. *Raj. Inf.* 43. 1.

Sulz. Hist. Inf. tab. 30. fig. 12.

Frisch. Inf. 10. tab. 5.

Schaeff. Elem. tab. 22.

Habitat in Europae aquis dulcibus.

Pulli intra folliculum sexfidum matris.

marinus. 7. *O. femicylindricus, cauda ouato oblonga acuminata.*
Syst. Ent. 297. 7.

Oniscus marinus femicylindricus, cauda ouato oblonga, integra. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1060. 7. *Fn. Sv.* 2057. *Linn. Iter Westrogoth.* 190.

Oniscus balthicus. *Pall. Spicil. Zool. fasc. IX. 66. tab. 4. fig. 6.*

Squilla marina corpore elongato femicylindrico cauda oblonga aequali apice truncata. *Degeer Inf.* 7. 523. 3. tab. 32. fig. 11.

Gron. Zooph. 996. tab. 17. fig. 3.?

Habitat in Oceano Norwagico.

linearis. 8. *O. cauda quadridentata.* *Gen. Inf. Mant.* 243. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1060. 9. *Amoen. acad.* 6. 415. 100.

Oniscus unguulatus. *Pall. Spicil. Zool. fasc. IX. 62. tab. 4. fig. 11.*

Habitat in Indiae Oceano.

chelipes. 9. *O. oblongus, cauda tridentata, pedibus subcheliformibus.* *Syst. Ent.* 297. 8.

Oniscus depressus oblongus, pedibus omnibus subcheliformibus. *Pall. Miscell.* 194. tab. 14. fig. 16. 17.

Oniscus linearis. *Pall. Spicil. Zool. fasc.* IX. 69. tab. 4. fig. 17.

Oniscus longus, teres. *Bast. subsec.* 2. 143. tab. 13. fig. 2. med.

Habitat inter maris atlantici fucos.

10. *O. femicylindricus*, caudis duabus longitudine corporis. *Syst. Ent.* 297. 9. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1760. 8. *Fn. Sv.* 2062. *bicaudatus.*

Habitat in Oceano Norwagico.

11. *O. luteus*, frigis fuscis. *Syst. Ent.* 298. 10. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1061. 10. *Fn. Sv.* 2060. *scopulorum.*
Linn. Iter Westrogoth. 190.
Stroem. Sundm. 166. 3.

Habitat in Oceano Norwagico.

12. *O. abdomine subtus nudo*, cauda femiounali acuta. *Syst. Ent.* 298. 11. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1060. 3. *Fn. Sv.* 2054. *Pfora.*

Oniscus cauda ouali acuta subtus duabus valuulis clausa. *Stroem. Act. Hafn.* IX. 594. tab. 10.

Habitat in Oceano Norwagico.

13. *O. abdomine subtus nudo*, cauda ouata, antennis quaternis. *Syst. Ent.* 298. 12. *Physodes.*

Oniscus Physodes abdomine subtus nudo, cauda ouata. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1060. 4.

Sulz. Hist. Inf. tab. 30. fig. 11.

Habitat in Oceano, in Terra del Fuego. *Mus. Dom. Banks.*

14. *O. oblongus*, corpore spinoso pellucido. *Syst. Ent. spinosus.* 298. 13. *

Habitat in Oceano Atlantico. *Mus. Dom. Banks.*

15. *O. oblongus gibbus*, antennis plicatis longissimis. *Syst. Ent.* 298. 14. * *gibbosus.*

Habitat in Oceano Lusitanico. *Fig. pict. in Mus. Baukiano.*

- quadri-* 16. *O. oblongus*, stylis caudalibus fenis, antennis quater-
cornis. nis *Syst. Ent.* 299. 15. *
Habitat in mari Atlantico. *Mus. Dom. Banks.*
- Ceti.* 17. *O. ovalis*, segmentis distinctis, pedibus tertii quarti-
que paris linearibus muticis. *Syst. Ent.* 299. 16. *Linn.*
Syst. Nat. 2. 1060. 6. *Fn. Sv.* 2056. *Mus. Adolph.*
Frid. 1. 89.
Squilla Balaenae corpore ovali depresso, segmentis di-
stinctis, pedibus cheliferis, tertii quarti-
que paris linearibus muticis. *Degcer Inf.* 7. 541. 6. tab. 42.
fig. 6. 7.
Pediculus Ceti. *Martens Spitzzb.* tab. 8. fig. D.
Seb. Mus. 1. tab. 90. fig. 5.
Pall. Spicil. Zool. fasc. IX. 76. tab. 4. fig. 14.
Egede Groenl. tab. 37.
Habitat in Oceano boreali balaenis molestus.
Ab hoc genere differre videtur vterius examinandus.
- oceanic-* 18. *O. ovalis* cauda bifida, stylis bifidis. *Syst. Ent.* 299.
cus. 17. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1061. 12.
Oniscus stylis caudae vtrinque binis. *Stroem. Sundm.*
202. tab. 1. fig. 14. 15.
Oniscus, corpore lato, pedibus natatoriis, cauda vtra-
que bifeta. *Aët. Helu.* 5. 371. tab. 5. fig. 463.
Bast. subsf. 26. 145. tab. 13. fig. 4.
Gronov. Zooph. 994. tab. 17. fig. 2.
Habitat in Oceano Europaeo.
- affimilis.* 19. *O. ovalis*, cauda obtusa mutica, corpore cinereo. *Gen.*
Inf. Mant. 243. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1061. 13.
Afellus marinus vulgari brevior et latior. *Raj. Inf.* 43.
Oniscus globator. *Pall. Spicil. Zool. fasc. IX.* 70. tab.
4. fig. 18. ?
Bast. subsf. 2. 144. tab. 13. fig. 3.
Habitat in Oceani Europaei fucis.
- macula-* 20. *O. ovalis*, cauda obtusa mutica, corpore plumbeo,
tus. lineis punctatis albis.
Habitat in Italia. *Dr. Allioni.*
Statura *O. Armadillo*, at triplo maior. Color totius
corporis plumbeus lineis septem longitudinalibus e
punctis albis, extimis marginalibus.

21. *O. ovalis ater*, segmento primo punctis quatuor, reliquis duobus rubris. *pustulatus.*

Oniscus Armadillo. Scop. carn. 1144.

Habitat in Lusitania. *D. Gray.*

Differt manifeste ab *O. Armadillo*. Primum segmentum atrum, nitidum punctis quatuor rubris, reliqua segmenta pallidiora punctis duobus.

22. *O. ovalis*, cauda obtusa, stylis duobus simplicibus. *Syst. Afellus.*
Ent. 299. 18. Linn. Syst. Nat. 2. 1061. 14. Fn. Sv. 2058.

Oniscus cauda obtusa bifurca. Geoff. Inf. 2. 670. 2.

Oniscus ovalis subdepressus flavo maculatus, cauda stylis duobus conicis articulatis. *Degeer Inf. 7. 547. 1. tab. 35. fig. 3.*

Afellus afininus s. vulgaris. Raj. Inf. 41. 1.

Scop. carn. 1142.

Matthiol. Discor. 257.

Aldrov. Inf. 632.

Mouff. Inf. 202.

Schæff. Elem. tab. 92.

Grou. Zooph. 993.

Sulz. Inf. tab. 24. fig. 154.

Habitat in domibus, muris, lignis putridis.

Pulli intra folliculum quadrialeuem abdominalem matris.

23. *O. ovalis cinereo fuscus*, cauda obtusa integra. *Syst. Armadillo.*
Ent. 299. 19. Linn. Syst. Nat. 2. 1062. 15. Fn. Sv. 10. 2059. Geoff. Inf. 2. 670. 1.

Afellus lividus. Raj. Inf. 42.

Sulz. Hist. Inf. tab. 30. fig. 13.

Habitat sub Europæ lapidibus.

Tactus se in globum immobilem, durum contrahit.

96. L E P I S M A.

1. *L. squamata argentea*, cauda triplici. *Syst. Ent. 300. 1. saccharina.*
Lepisma saccharina squamata, cauda triplici. *Linn. na.*
Syst. Nat. 2. 1012. 1. Fn. Sv. 1925.

Lepisma vulgaris. Scop. Ent. carn. 1026.

Forbicina plana. Geoff. Inf. 2. 613. 1.

Forbi-

Forbicina. Aldr. *Inf.* 570. tab. 2. fig. 5.

Setoura subargentea, cauda setosa, fetis hirsutis. *Brown. Jamaic.* 425.

Sulz. Inf. tab. 22. fig. 142.

Schaeff. Elem. tab. 75.

Degeer Inf. 7. 14. 1.

Adam. microscop. tab. 28. fig. 147.

Habitat in America inter saccharum, nunc in Europa frequens inter ytenfilia, libros vestesque.

polypoda. 2. *L. saltatoria*, cauda triplici, abdominis segmentis subtus vtrinque villosis. *Syst. Ent.* 300. 2.

Lepisma polypoda scutata, cauda triplici. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1012. 2.

Forticina teres saltatrix. *Geoff. Inf.* 2. 614. 2.

Lepisma squamosa saltatoria, fetis caudae tribus intermedia maiore. *Stroem. Aët. Hafn.* 9. 575. tab. 2.

Habitat in Europae littoribus lapidosis.

Saltat velocissime furca subulata alba ani.

Aliam finillimam inueni cauda quintuplici. Forte mra sexus varietas.

lineata. 3. *L. cauda triplici*, corpore fusco, vittis duabus albis. *Syst. Ent.* 300. 3. *

Habitat in Heluetiae muris, capt. d. 1. Maii.

villosa. 4. *L. fusca*, cauda triplici villosa. *Syst. Ent.* 300. 4. *

Habitat in China. *Dom. Drury.*

97. P O D U R A.

signata. 1. *P. subglobosa fusca*, abdominis lateribus fuluo maculatis. *Gen. Inf. Mant.* 244.

Podura fusco nigra, abdomine globosa, signaturis ferrugineis. *Geoff. Inf.* 2. 607. 1.

Habitat - - - -

viridis. 2. *P. subglobosa viridis*. *Syst. Ent.* 301. 1. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1013. 1. *Fn. Sv.* 1922.

Podura viridis capite flavescente, antennis in medio fractis. *Geoff. Inf.* 2. 607. 2.

Habitat in Europae plantis frequens in Polygony fagopyri foliis primordialibus.

3. *P. subglobosa atra*, antennis longitudine corporis apice albis. *Syst. Ent.* 301. 2. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1013. 2. *Fn. Sv.* 1928. *polypoda.*
 Habitat in Europae plantis variis.
4. *P. globosa fusca nitida*, antennis longis, articulis plurimis. *Syst. Ent.* 301. 3. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1013. 3. *Fn. Sv.* 1929. *atra.*
Podura globosa fusca globosa fusca nitida, antennis longis fractis. *Degeer Inf.* 7. 357. tab. 3. fig. 7. 8.
Act. Holm. 1743. 296. tab. 7.
 Habitat in Europae terrestribus frequens.
5. *P. teres fusco coerulea nitida*. *Syst. Ent.* 301. 4. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1013. 4. *Fn. Sv.* 1930. *plumbea.*
Podura corpore tereti nigro coeruleo plumbeo nitido, antennis quadrinodiis, capite pedibusque griseis.
Degeer Inf. 7. 31. 5. tab. 3. fig. 1.
Podura plumbea. *Geoff. Inf.* 2. 610.
Sulz. Inf. tab. 22. fig. 143.
 Habitat in Europae plantis frequens.
6. *P. ovata flava*, dorso maculis duabus ferrugineis. *Syst. Ent.* 301. 5. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1013. 5. *minuta.*
 Habitat in Europae hortis.
7. *P. oblonga cinerea*, signaturis nigris. *Syst. Ent.* 301. 6. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1013. 6. *Fn. Sv.* 1931. *niualis.*
Podura arborea grisea oblonga griseo cinerea signaturis nigris, antennis longis quadrinodiis. *Degeer Inf.* 7. 21. 2. tab. 2. fig. 8.
Pulex Niuis. *Eph. Nat. Cur.* 6. Dec. 2. Ann. 3. obl. 197.
Degeer Act. Vpf. 1740. 54. tab. 2.
 Habitat in Europae nemoribus, lignis hyeme frequens in vestigiis hominum et mammalium supra niues.
8. *P. oblonga nigra*, abdomine antennisque fascia alba. *Syst. Ent.* 302. 7. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1013. 7. *vaga.*
Podura atra cingulo antennarum abdominisque albo.
Stroem. Act. Hafn. 9. 578. tab. 3.
 Habitat in Europae nemoribus.

- arborea.* 9. *P. oblonga nigra*, pedibus furcaque albis. *Syst. Ent.* 302. 8. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1014. 8. *Fn. Sv.* 1932.
Podura arborea nigra oblonga nigra, antennis quadrinodiis, pedibus furcaque pallide fuscis. *Degeer Inf.* 7. 18. 1. tab. 2. fig. 1. 2.
Degeer Act. Vpjal. 1740. 49. tab. 1.
Act. Holmienf. 1750. 272. tab. 1.
Podura nigra thoracis limbo antennarumque basi flavis, pedibus furcaque pallidis. *Geoff. Inf.* 2. 609. 6.
 Habitat in Europae sylvis.
 Podurae simillimae, at albae his societate iunguntur.
- villosa.* 10. *P. oblonga villosa fusco nigroque variegata.* *Syst. Ent.* 302. 9. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1014. 9.
Podura fusco nigroque variegata villosa. *Geoff. Inf.* 2. 608. tab. 20. fig. 2.
Sulz. Hist. Inf. tab. 29. fig. 2.
Schrank. Beytr. 46. 2. tab. 2. fig. 14. 15.
 Habitat in Europa australiori.
- cincta.* 11. *P. cylindrica grisea*, cingulo atro antice albo. *Syst. Ent.* 302. 10. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1014. 10. *Fn. Sv.* 1933.
 Habitat in Europa.
- annulata.* 12. *P. liuida*, annulis nigris. *Syst. Ent.* 302. 11.
Podura liuido lutea, annulis transuersis nigris. *Geoff. Inf.* 2. 609. 5.
 Habitat in Europa.
- lignorum.* 13. *P. plumbea*, capite, thorace, pedibus furcaque pallidis. *Syst. Ent.* 302. 12. *
 Habitat in Europae lignis antiquis.
- pusilla.* 14. *P. cylindrica aenea*, furca alba. *Syst. Ent.* 302. 13.
Linn. Syst. Nat. 2. 1014. 11.
 Habitat in Europa.
- aquatica.* 15. *P. nigra aquatica.* *Syst. Ent.* 302. 14. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1014. 12. *Fn. Sv.* 1934.
Podura aquatica nigra aquatica tota nigra, antennis quadrinodiis. *Degeer Inf.* 7. 23. 3. tab. 2. fig. 14. 15.
Geoff. Inf. 2. 610. 8.

Degeer Act. Vpsal. 1740. 57. tab. 3.

— — *Act. Holmiensf.* 1750. 279. tab. 3. 4.

Ledermüll. Epist. 15. tab. 7.

Habitat in Europae aquosis, horis matutinis per phalanges decorticat aquas stagnantes.

Podurae cinereae, at rariores his societate iunguntur: an sexu, an aetate, an specie distinctae?

16. *P. terrestris alba.* *Syst. Ent.* 303. 15. *Linn. Syst. Nat. finetaria.* 2. 1014. 13. *Fn. Sv.* 1935.

Podura finetaria. *Scop. carn.* 1935.

Schrank. Beytr. 47. 4. tab. 2. fig. 1.

Habitat in Europae terra praegnante, frequens primo vere cauda mutica. Haud salit.

17. *P. alba, cauda bifida extensa.* *Syst. Ent.* 303. 16. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1014. 14. *Fn. Sv.* 1936. *ambulaus.*

Podura terrestris niuea, antennis quadrinodiis, cauda bifida breui extensa. *Degeer Inf.* 7. 33. 6. tab. 3. fig. 5.

Habitat in Europae muscis.

98. E P H E M E R A.

* Cauda trifeta.

1. *E. cauda trifeta, alis fusco reticulatis maculatisque, corpore fusco.* *Syst. Ent.* 303. 1. *vulgata.*

Ephemerula vulgata cauda trifeta, alis nebuloso maculatis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 906. 1. *Fn. Sv.* 1472.

Ephemerula cauda trifeta, abdomine obscure flavescente, maculis nigris trigonis, alis fusco maculatis. *Degeer Inf.* 2. 7. 1. tab. 16. fig. 1.

Ephemerula alis nebuloso maculatis, cauda trifeta. *Geoff. Inf.* 2. 238. 1.

Sulz. Inf. tab. 17. fig. 103.

Scop. carn. 683.

Habitat in Europae aquis.

Vesperis sub arboribus choreas instituunt.

2. *E. cauda trifeta, alis hyalinis reticulatis, corpore luteo.* *Syst. Ent.* 303. 2. *Linn. Syst. Nat.* 2. 906. 2. *lutea.*

Ephe-

Ephemera lutea alis albis reticulatis, cauda trifeta.

Geoff. Inf. 2. 238. 2.

Habitat in Europae aquosis.

margina- 3. *E.* cauda trifeta, alis albis, margine exteriori fusco,
ta. corpore nigro. *Syst. Ent.* 303. 3. *Linn. Syst. Nat.*
2. 906. 3.

Ephemera luteo fusca, alis fusco viridibus, cauda trifeta. *Geoff. Inf.* 2. 239. 3.

Ephemera cauda trifeta nigra, thoracis marginibus brunneis, alis albo hyalinis. *Degeer Inf.* 2. 2. 24. 2. tab. 17. fig. 14. 15.

Roef. Inf. 2. *Aquat.* 2. tab. 12. fig. 1. 2.

Habitat in Europa.

vesperti- 4. *E.* cauda trifeta, alis nigris, posticis albis. *Syst. Ent.*
na. 303. 4. *Linn. Syst. Nat.* 2. 906. 4. *Fn. Sv.* 1480.

Ephemera nigra, cauda trifeta. *Geoff. Inf.* 2. 239. 4.

Habitat in Europae aquosis.

halter- 5. *E.* cauda trifeta fusca, abdomine albido, alis duabus
ta. albis. *Gen. Inf. Mant.* 244. *

Phryganea cauda trifeta fusca, alis abdominisque medio albis, oculis maris quatuor. *Degeer Inf.* 2. 2. 27. 3. tab. 17. fig. 17. 18.

Habitat Kiliae ad aquas stagnantes frequens.

** Cauda bifeta.

venosa. 6. *E.* cauda bifeta, alis albis reticulatis, corpore fusco.
Syst. Ent. 304. 5. *

Ephemera cauda bifeta fusca, alis hyalinis nigro nervosis, abdomine subtus cinereo. *Degeer Inf.* 2. 2. 28. 4. tab. 18. fig. 1-4.

Habitat in Daniae paludosis.

bioculata. 7. *E.* cauda bifeta, alis albis reticulatis, capite tuberculis duobus luteis. *Syst. Ent.* 304. 6.

Ephemera bioculata cauda bifeta, alis albis reticulatis, abdomine diaphano. *Linn. Syst. Nat.* 2. 906. 5. *Fn. Sv.* 1473.

Ephemera lutea, alis albis reticulatis, cauda bifeta.
Geoff. Inf. 2. 239. 5. tab. 13. fig. 4.

Habitat in Europae aquis.

Caudae albae fusco punctatae corpore longiores.

8. *E. cauda bifeta*, corpore nigro, alis nigricantibus, posticis minimis. *Syst. Ent.* 304. 7. *Linn. Syst. Nat.* 2. 967. 7. *Fn. Sv.* 1478. *nigra.*

Habitat in Europae aquosis.

9. *E. cauda bifeta*, alis albis, margine crassiori nigricante. *Syst. Ent.* 304. 8. *Linn. Syst. Nat.* 2. 907. 9. *Fn. Sv.* 1476. *horaria.*

Ephemera alis albis margine crassiori nigricantibus, cauda bifeta. *Geoff. Inf.* 2. 240. 8.

Ephemera alis albis minima. *Act. Vpsl* 1736. 27. 3.

Ephemera minima. *Swammerd. quart.* 87.

Habitat ad Europae aquas frequens.

Esca piscium ex hac et congeneribus praestantissima.

10. *E. cauda bifeta*, alis albis, corpore fusco. *Syst. Ent. culiciformis.* 304. 9. *Linn. Syst. Nat.* 2. 907. 8. *Fn. Sv.* 1475.

Geoff. Inf. 2. 240. 6.

Pod. Inf. tab. 1. fig. 10.

Habitat in Europae aquosis.

11. *E. cauda bifeta*, alis hyalinis striatis, thorace fusco, abdomine albo. *Syst. Ent. striata.* 304. 10. *Linn. Syst. Nat.* 2. 907. 10.

Ephemera mutica. *Fn. Sv.* 1479.

Ephemera thorace fusco, abdomine albo, cauda bifeta, alis fuscis striatis. *Geoff. Inf.* 2. 240. 7.

Habitat in Europa.

12. *E. cauda bifeta* alis duabus, costa marginali fusca cinereo maculata. *Syst. Ent. diptera.* 304. 11. *Linn. Syst. Nat.* 2. 907. 11. *Fn. Sv.* 1477.

Ephemera diptera bicaudata grisea, abdomine lineolis rubris, alarumque margine brunneo albo maculato.

Degeer Inf. 2. 2. 31. 5. tab. 13. fig. 5.

Habitat in Europae aquosis.

99. S E M B L I S.

- pectinicornis.* 1. S. *antennis pectinatis, alis albis, signaturis nervisque fuscis albo subarticulatis.*
Hemerobius pectinicornis. Syst. Ent. 309. 1. Linn. Syst. Nat. 911. 1. Amoen. Acad. 6. 412.
Hemerobius fuscus, pedibus testaceis, antennis pectinatis nigris, alis griseo fuscis, nervis nigro punctatis. Degeer Inf. 3. 562. 2. tab. 27. fig. 3.
 Habitat in America septentrionali.
- grisea.* 2. S. *alis griseis albo maculatis.*
*Hemerobius griseus. Gen. Inf. Mant. 244. **
 Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Feats.*
- atrata.* 3. S. *alis albidis, anticis nigro maculatis, corpore atro.*
 Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*
 Magna. Caput atrum fronte cinereo pilosa. Antennae defunt. Thorax hirtus ater antice vtrinque linea cinerea. Abdomen cylindricum, atrum versus apicem macula oblonga testacea. Pedes valde pilosi atrii. Alae anticae albiae nervis dilatatis nigris maculatae, posticae albiae nervo marginali maculaque versus apicem nigris.
- fuscata.* 4. S. *alis fuscis albo maculatis, posticis basi atris.*
 Habitat in India orientali. *Mus. Dom. Feats.*
 Praecedentibus minor. Antennae defunt. Caput ferrugineum ore nigro. Thorax obscurus. Abdomen deest. Alae magnae, anticae fuscae fascia media abbreviata punctisque apicis sparsis albis, posticae basi atrae, apice fuscae albo maculatae.
- phalaenoides.* 5. S. *nigra, alis albis, maculis nigris sparsis.* *Syst. Ent. 305. 1.*
Phryganea phalaenoides. Linn. Syst. Nat. 2. 908. 3.
Phryganea nigra, alis albo pallidis, maculis plurimis nigris. Vdm. Diff. 53. fig. 16.
 Habitat in Europa boreali, Finlandia.
- bicaudata.* 6. S. *cauda bifeta, fetis longitudine corporis.* *Syst. Ent. 305. 2.*

Phryganea zcaudata cauda bifeta, alis venoso reticulatis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 908. 1. *Fn. Sv.* 1489.

Phryganea maxima. *Scop. carn.* 705.

Hemerobius cauda bipili, alis cinereis venoso reticulatis. *Act. Vpsal.* 1736. 27. 1.

Perla fusca, capite thoraceque linea longitudinali flava, alis fusco reticulatis. *Geoff. Inf.* 2. 231. 1. tab. 13. fig. 2.

Sulz. Hist. Inf. tab. 24. fig. 8.

Reaum. Inf. 3. tab. 13. fig. 12.

Sulz. Inf. tab. 17. fig. 6.

Habitat in Europae aquosis oua sub ventre circumferens. Corpus totum virescens.

7. *S.* cauda bifeta, fetis truncatis abbreviatis. *Syst. Ent. nebulosa.* 305. 3.

Phryganea nebulosa cauda bifeta, alis subcinereis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 908. 2. *Fn. Sv.* 1499.

Perla nigro fusca, alis subcinereis pallidis, caudae fetis truncatis. *Geoff. Inf.* 2. 232. 3.

Pseudo Phryganea corpore oblongo ouato, alis elongatis cinereis nigro venosis. *Degeer Inf.* 2. 2. 83. tab. 23. fig. 16. 17.

Habitat ad Europae aquas.

8. *S.* ecaudata, alis reticulatis. *Syst. Ent.* 305. 4. *lutaria.*

Hemerobius lutarius niger, alis albidis striatis albo maculatis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 913. 14. *Fn. Sv.* 1513.

Hemerobius niger, thorace plano depresso, alis fuscis nigro neruosis. *Degeer Inf.* 2. 2. 74. 5. tab. 20. fig. 14. 15.

Hemerobius ater, alis fuscis reticulatis, margine exteriori dilatato. *Geoff. Inf.* 2. 255. 3.

Roef. Inf. 2. *aquat.* 2. tab. 13.

Schaeff. Elem. tab. 97.

— — *Icon.* tab. 37. fig. 9. 10.

Hoeffnag. pict. tab. 12.

Habitat in Europae aquosis.

Oua plurima, aggregata, brunnea plantis aquaticis adglutinata.

100. P H R Y G A N E A.

- reticulata*. 1. *P. nigra*, alis subferrugineis atro reticulatis. *Syst. Ent.* 306. 1. *Linn. Syst. Nat.* 2. 908. 4. *Fn. Sv.* 1482.
Habitat in Europa.
- friata*. 2. *P. alis testaceis neruoso striatis.* *Syst. Ent.* 306. 2. *Linn. Syst. Nat.* 2. 908. 5. *Fn. Sv.* 1483.
Hemerobius alis testaceis venoso striatis, antennis longitudine alarum. *Atl. Vpsf.* 1736. 27. 2.
Musca quadripennis, alis longis angustis papilionum in modum variegatis. *Raj. Inf.* 247. 2.
Geoff. Inf. 2. 246. 1. tab. 13. fig. 5.
Frisch. Inf. 13. tab. 3.
Albin. Inf. 763.
Reaum. Inf. 3. tab. 13. fig. 8. 9. 11.
Scop. carn. 688.
Aldrouand. Inf. 763.
Habitat in Europae aquosis.
- analis*. 3. *P. alis fuscis, macula anali alba, nucha hirta aurea.* *Syst. Ent.* 306. 3. *
Habitat in Europa boreali, Suecia.
- fusca*. 4. *P. alis anticis fuscis immaculatis, pedibus flauis.* *Syst. Ent.* 306. 4.
Phryganea fusca immaculata, alis inferioribus hyalinis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 910. 20. *Fn. Sv.* 1500.
Phryganea fusca, antennis corporis longitudine, pedibus luteis, macula alba, alarum neruis albo nigroque variis. *Degeer Inf.* 2. 407. 4.
Habitat in Europa frequens.
Larua intra cylindrum e frustulis plantarum aquaticarum tectis ramentis gramineis longitudine cylindri.
- pilosa*. 5. *P. alis testaceis immaculatis, capite thoraceque hirtis.* *Syst. Ent.* 306. 5. *
Habitat in Sueciae aquosis.
- pallipes*. 6. *P. alis omnibus nigris immaculatis, pedibus pallidis.* Habitat in Italia. *Dr. Allioni.*
Triplio minor *P. fusca*. Antennae mediocres vti totum corpus fuscae, immaculatae. Pedes pallidi.

7. *P. alis griseo fuscis, margine postico flavo striato.* *signata.*
 Habitat in America septentrionali. *Mus. Dom. Banks.*
 Parna. Caput cum antennis fuscum. Alae griseo fuscae, nitidae flavo maculatae et margine postico flavo striato.
8. *P. alis fusco testaceis cinereo maculatis.* *Syst. Ent. grandis.*
 306. 6.
Phryganea grandis alis cinereo testaceis, lineolis duabus longitudinalibus nigris, puncto albo. *Linn. Syst. Nat.* 2. 909. 7. *Fn. Sv.* 1485.
Roef. Inf. 2. *aquat.* 2. tab. 17.
Reaum. Inf. 3. tab. 14. fig. 4.
Sulz. Hist. Inf. tab. 24. fig. 9.
Degeer Inf. 2. 388. 2. tab. 13. fig. 1.
Schaeff. Icon. tab. 180. fig. 1. 2.
 Habitat in Europae aquis intra cylindrum ex ramentis longitudinalibus ligneis.
 Oua cum gelatina ponuntur.
9. *P. alis fusco griseis, maculis atomisque niueis numerosis.* *irrorata.*
 Habitat in America boreali. *Mus. Dom. Banks.*
 Magnitudo *P. rhombicae*. Caput nigrum antennis testaceis. Thorax niger macula dorsali testacea. Alae anticae apice subascendentes cinereo fuscae maculis plurimis rhomboidalibus atomisque niueis. Pedes testacei.
10. *P. alis griseis, macula laterali rhombica alba.* *Syst. rhombica.*
Ent. 307. 7.
Phryganea rhombica alis flavescentibus deflexo compressis, macula laterali rhombea alba. *Linn. Syst. Nat.* 2. 909. 8. *Fn. Sv.* 1486. *Geoff. Inf.* 2. 246. 2.
Reaum. Inf. 3. tab. 14. fig. 5.
Roef. Inf. 2. *aquat.* 2. tab. 16.
Schaeff. Elem. tab. 100.
Icon. tab. 90. fig. 5. 6.
 Habitat in Europae aquis intra cylindrum ex ramulis gramineis transuersis.
11. *P. alis anticis nebulosis, macula marginali nigra.* *Linn. grisea.*
Syst. Nat. 2. 909. 6. *Fn. Sv.* 1484.

Phryganea antennis longitudine corporis fusco maculata punctataque, alis lineola marginali nigra, margine postico rotundato. *Degeer Inf.* 2. 399. 6. tab. 12. fig. 21.

Habitat ad Europae aquas.

Larua intra cylindrum e culmis graminum et iuncorum.

notata. 12. P. alis anticis cinereo flavescentibus, macula marginali fusca.

Habitat in America boreali. *Mus. Dom. Banks.*

Statura et magnitudo praecedentis, at distincta. Corpus fuscum antennis pedibusque testaceis. Alae antice cinereo flavescentes unicolores macula marginali fusca, posticae albae, hyalinae, nitidae.

bimaculata. 13. P. alis fuscis, macula laterali duplici flava. *Syst. Ent.* 307. 8. *Linn. Syst. Nat.* 2. 909. 9. *Fn. Sv.* 1486.

Phryganea antennis longioribus, alis fuscis, maris cinereo fasciatis, feminae macula grisea. *Degeer Inf.* 2. 416. 7. tab. 15. fig. 5.

Habitat in Europa.

Larua intra cylindrum attenuatum ex arena lutoque confectum.

nigra. 14. P. alis nigris, antennis longissimis. *Syst. Ent.* 307. 9. *Linn. Syst. Nat.* 2. 909. 11.

Phryganea antennis longissimis, palpis porrectis pilosis, alis atro coeruleis, oculis rufis. *Degeer Inf.* 2. 424. 12. tab. 15. fig. 21.

Geoff. Inf. 2. 250. 10.

Raj. Inf. 275.

Habitat in Europae riuulis.

azurea. 15. P. alis nigris postice violaceis. *Syst. Ent.* 307. 10. *Linn. Syst. Nat.* 2. 909. 12. *Fn. Sv.* 1491.

Habitat in Europae borealis aquis.

marginata. 16. P. nigricans, alis margine omni flauo. *Syst. Ent.* 307. 11. *Linn. Syst. Nat.* 2. 910. 14.

Habitat in Suecia.

Thorax tomentosus, testaceus.

17. *P. alis fuscis testaceo irroratis.* *variegata.*
 Habitat in Germania. *Dom. de Hattorf.*
 Media. Alae anticae fuscae maculis atomisque testaceis irroratae. Antennae vix longitudine corporis fusco testaceoque tenuissime annulatae. Pedes flavescentes.
18. *P. alis fuscis, utroque margine lineolis duabus transuersis albidis.* *Syst. Ent.* 307. 12. *Linn. Syst. Nat.* 2. 910. 19. *Fn. Sv.* 1496. *bilineata.*
 Habitat in Europa boreali.
19. *P. nigra, alis fuscis, fasciis quatuor niueis, anterioribus interruptis, posteriori marginali punctata.* *Syst. Ent.* 307. 13.* *interrupta.*
 Habitat in Angliae aquosis.
20. *P. fusca, alis anticis hirtis, antennis longitudine corporis.* *Syst. Ent.* 308. 14.* *hirta.*
 Habitat Oxoniae Anglorum.
21. *P. alis fuscis, strigis duabus undatis obscurioribus, antennis longissimis.* *Syst. Ent.* 308. 15. *longicornis.*
Phryganea longicornis alis superioribus nebulosis, antennis corpore triplo longioribus. *Linn. Syst. Nat.* 2. 910. 15. *Fn. Sv.* 1492.
Phryganea alis superioribus nebulosis nigro punctatis, antennis triplo longioribus. *Geoff. Inf.* 2. 249. 7.
 Habitat in Europa.
22. *P. nigra, alis testaceis, fasciis quatuor nigris, antennis longissimis.* *Syst. Ent.* 308. 16.* *4fasciata.*
 Habitat in Angliae aquosis.
23. *P. alis rotundatis fuscis immaculatis, antennis corpore triplo longioribus.* *Syst. Ent.* 308. 17.* *filosa.*
Phryganea filosa alis cylindrico incumbentibus flavescentibus, antennis corpore triplo longioribus. *Linn. Syst. Nat.* 2. 910. 16. *Fn. Sv.* 1493.?
 Habitat in Anglia.
24. *P. fusco cinereoque variegata, palpis villosis.* *minuta.*
Phryganea minuta nigra, palpis villosis capite longioribus. *Linn. Syst. Nat.* 2. 911. 23. *Fn. Sv.* 1501.
 Habitat in Europa.

pusilla. 25. P. alis ciliatis testaceo fuscis, antennis albo nigroque annulatis.

Habitat in Italia. *D. Allioni.*

Corpus paruum, obscurum. Antennae longitudine corporis, annulatae. Alae anticae testaceae, ciliatae, posticae magis fuscae.

101. HEMEROBIUS.

cornutus. 1. H. mandibulis porrectis corniformibus. *Gen. Inf. Mantiss.* 244.

Hemerobius maxillis corniformibus porrectis capite longioribus, alis griseo fuscis albo punctatis. *Degeer Inf.* 3. 559. 1. tab. 27. fig. 1.

Raphidia cornuta maxillis corniformibus porrectis thorace longioribus. *Linn. Syst. Nat.* 2. 916. 3.

Habitat in America boreali.

Forte proprii generis insectum.

perla. 2. H. luteo viridis, alis hyalinis, vasis viridibus. *Syst. Ent.* 309. 2. *Linn. Syst. Nat.* 2. 911. 2. *Fn. Sv.* 1504. *Geoff. Inf.* 2. 253. 1. tab. 13. fig. 6.

Musca quadripennis, corpore luteo viridi, alis peramplis, e flavo pariter virentibus. *Raj. Inf.* 274.

Hemerobius chryfops. *Scop. carn.* 708.

Musca chryfops. *Mouff. Inf.* 937.

Perla merdam olens. *Petiv. Mus.* 4. 6.

Goed. Inf. 2. 40. tab. 14.

Alb. Inf. tab. 64.

Merian. Europ. 3. 49. tab. 8.

Vall. nat. 1. 77. tab. 2.

Reaum. Inf. 3. tab. 33. fig. 2. 5. 6.

Roef. Inf. 3. tab. 21. fig. 4. 5.

Schaeff. Icon. tab. 5. fig. 7.

Habitat in Europa, victitans aphidibus.

Oua stipiti capillari insident.

albus. 3. H. albus, alis hyalinis, oculis aeneis. *Syst. Ent.* 309. 3. *Linn. Syst. Nat.* 2. 911. 3. *Fn. Sv.* 1506.

Habitat in Europae plantis.

Praecedenti nimis affinis.

4. H. viridi nigroque varius, alis hyalinis, maculis reticulatis. *Syst. Ent.* 309. 4. *Linn. Syst. Nat.* 2. 912. 4. *Fn. Sv.* 1505. *chryfops.*
Hemerobius luteus, alis aqueis, vasis fusco punctatis. *Geoff. Inf.* 2. 254. 2.
Hemerobius viridis nigro maculatus, alis nervis nigris. *Degeer Inf.* 2. 2. 68. 1. tab. 22. fig. 1.
Frisch. Inf. 4. 40. tab. 23.
Reaum. Inf. 3. tab. 33. fig. 14 - 16.
Rocf. Inf. 3. tab. 21. fig. 3.
Schaeff. Icon. tab. 5. fig. 7. 8.
Sulz. Hist. Inf. tab. 25. fig. 1.
 Habitat in Europae nemoribus.
5. H. testaceus, alis basi mucronatis postice excisis. *Syst. Ent.* 310. 5. *Linn. Syst. Nat.* 2. 912. 5. *Fn. Sv.* 1508. *phalaeonoides.*
Hemerobius testaceus, thorace angulato, alis latis postice excisis. *Degeer Inf.* 2. 2. 73. 4. tab. 22. fig. 12. 13.
Schaeff. Icon. tab. 3. fig. 11. 12.
Scop. Ann. Hist. nat. 5. 120. 141.
Sulz. Hist. Inf. tab. 25. fig. 2.
Reaum. Inf. 3. tab. 32. fig. 8.
 Habitat in Europa.
 Alae testaceae striga obliqua punctoque fuscis.
6. H. alis fusco nitidulis, corpore testaceo, pedibus pal- *nitidulus.*
 lidis. *Gen. Inf. Mant.* 245. *
 Habitat in Germania. *Dom. de Hattorf.*
7. H. flavescens, alis albis, strigis fuscis. *Syst. Ent.* 310. 6. *hirtus.*
Hemerobius hirtus alis albis fusco reticulatis, fasciis duabus fuscescentibus. *Linn. Syst. Nat.* 2. 912. 6. *Fn. Sv.* 1507.
Hemerobius griseus fusco maculatus, alis albis punctis pilisque fuscis. *Degeer Inf.* 2. 2. 70. 12. tab. 22. fig. 4. 5.
 Habitat in Europae humulo, corylo.
8. H. alis albis, punctis sparsis fuscis, antennis albo nigroque annulatis. *Syst. Ent.* 310. 7. *Linn. Syst. Nat.* 2. 912. 10. *Fn. Sv.* 1510. *Humuli.*
 Habitat in lupuletis Vpsaliensibus.

- longicornis.* 9. H. niger, ore pedibusque pallidis, antennis longioribus fuscis. *Gen. Inf. Mant.* 245. *
Habitat in praedio comitis nobilissimi *Holk. Eikhoff.*
prope a Kilouio.
- friatulus.* 10. H. fuscus flavo maculatus, alis fusco striatis, posticis immaculatis. *Syst. Ent.* 310. 8. *
Habitat in Europae hortis.
- 6punctatus.* 11. H. alis albis, maculis fuscis, postice punctis sex distinctis, antennis fuscis. *Syst. Ent.* 310. 9. *Linn. Syst. Nat.* 2. 913. 12. *Fn. Sv.* 1511.
Phryganea fusca, alis albis fusco maculatis. *Geoffroy Inf.* 2. 250. 10.
Habitat in Europae hortis.
- flavicans.* 12. H. niger, thorace abdomineque flavis. *Syst. Ent.* 310. 10. *Linn. Syst. Nat.* 2. 913. 13. *Fn. Sv.* 1512.
Habitat in Europae hortis.
- 2punctatus.* 13. H. flavo fuscoque varius, alis punctis duobus nigris. *Syst. Ent.* 310. 11. *Linn. Fn. Sv.* 1514.
Habitat in Europa.
Puncta duo alarum nigra, posteriore maiore.
- abdominalis.* 14. H. fuscus, abdomine flavo, ano nigro. *Syst. Ent.* 310. 12. * *It. Norwag.* d. 3. August.
Habitat in Anglia, in Norwagia, capt. d. 3. August.
- pulsatorius.* 15. H. apterus ore rubro, oculis luteis. *Syst. Ent.* 311. 13. *Termes pulsatorium* abdomine oblongo, ore rubro, oculis luteis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1015. 2. *Fn. Sv.* 1937.
Termes lignorum albidum, oculis maculisque abdominalibus rufis. *Degeer Inf.* 7. 41. 1. tab. 4. fig. 1.
Pediculus ligni antiqui. *Geoff. Inf.* 2. 601. 12.
Bradl. nat. tab. 27. fig. 3.
Act. angl. 270. p. 231. et 291.
Roland. Act. Holm. 1754. 152.
Sulz. Inf. tab. 22. fig. 144.
- - *Hist. Inf.* tab. 29. fig. 3.
Schaeff. Elem. tab. 126.

Scop. carn. 1032.

Derh. thcol. 119.

Raj. Inf. 8.

Blank. belg. 169. tab. 14. fig. F.

Habitat in Europa, America frequens in domibus, iu-
uifus vestibus, herbariis, muscis.

Femina horologii instar pulsatoria in ligneis festucis.

16. H. apterus, ore pallido, oculis fuscis. *Syst. Ent. fatidicum.*
311. 14.

Termes fatidicum abdomine ouato, ore pallido, ocu-
lis fuscis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1016. 3. *Fn. Sv.* 1938.

Frisch. Inf. 11. p. 2. tab. 10.

Habitat in Europa.

Nimis praecedenti affinis, at paullo maior.

102. T E R M E S.

1. T. supra fuscum, thorace segmentis tribus, alis palli- *fatiale.*
dis, costa testacea. *Syst. Ent.* 390. 1.

Termes fatale luteum, alterius maxillis longitudine
antennarum. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1015. 1. Larua et
Puppa.

Termes destructor albidum capite luteo, antennis fili-
formibus, alterius maxillis longitudine antennarum.
Degeer Inf. 7. 50. 3. tab. 37. fig. 1. 2.

Termes arda. *Forsk. Descript. anim.* 96. 61. tab. 25.
fig. A.

Acta Soc. Berol. phys. 1. 177.

— — — — 4. tab. 1. fig. 1—5.

Habitat in Indiae orientalis et Africae aequinoctialis
umbrosis, cuius calauitas summa, fornices cylindri-
cos progrediendo inaedificans, nidos e sabulo sinu-
bus daedalaeis in tophum struens, tumulos altitudine
hominis dupla turnulis cauis conicis semper progre-
diendo erigens.

Destruit utensilia, cibaria, vestimenta, relicta sola su-
perficie integra, calce viua coercendum, incolis aui-
busque domesticis esculentum.

Obseruationibus *D. Smeathmann* nuper ex Africa re-
ducis animalculi oeconomiam accuratiorem debe-
mus.

Oua innumera, parua, rotundata, fusca.

Larua parua, hexapoda, plerumque pallens, capite subrotundo, testaceo, maxillis breuibus, validis dentatis, oculis nullis coecutiens, antennis moniliformibus longitudine thoracis. Thorax segmentis tribus abdomen ouatum. Haec sola operaria tumulos semper sub superficie degens erigit, parentes nutrit ouaque curat.

Puppa, olim neutrum dicta, capite maximo ouato laevi testaceo, nitido, maxillis porrectis longitudine capitis forficatis, edentulis, acutis, atris, antennis moniliformibus longitudine thoracis, oculis nullis coecutiens. Thorax et abdomen pallefcentia. Haec nunquam operaria, tantum militans, defendit familiam morfu acuto maxillis forficatis nunquam extrahendis. Maxillis porrectis lignum foliaque cum sibilo pulsant, vt animent operarios ad diligentioremborem.

Mas feminaque simillimae, alatae, capite paruo fusco maxillis breuibus, acutis, dentatis, antennis moniliformibus flauescens, oculisque globosis prominulis nigris. Thorax segmentis tribus aequalibus, marginatis fuscis siue obscure testaceis. Abdomen ouatum dorso fusco strigis albis. Feminae grauidae abdomen intumescit ad magnitudinem digiti maioris vesiculosum, album, maculis transuersis fuscis margine inaequali undulante. Oua continet innumera per lineas parallelas disposita, quae continuo per annos ponit. Alae corpore duplo longiores pallidae costa testacea. Pedes pallefcentes. Examinant ambo aera nocturno tempore, at sole oriente alae exsiccantur, decidunt, includuntur a laruis operariis in cellulis, quarum aperturam diminuunt, ne amplius exeant, et a minoribus operariis sustentantur.

destru-
stor.

2. *T.* supra testaceum, capite atro, antennis flauis.

Hemerobius marginalis flauus, alis hyalinis margine fuscis corpore triplo longioribus. *Linn. Syst. Nat.* 2. 912. 9.

Degeer Inf. 3. tab. 21. fig. 6. 7.

Termes monoceros. *Koenig Act. Soc. Berol. phys.* 4. tab. 1. fig. 5. Larua.

Habitat

Habitat in Americae meridionalis insulis, in India orientali, nidum ouatum, densum circa arborum ramos inaedificans.

Larua obscure pallida, capite ouato atro antice producto conico acuto, absque oculis coecutiens.

Imago praecedenti affinis, at duplo minor capiteque atro distinctus.

3. *T. nigrum*, abdominis segmentis apice albis, pedibus pallidis. *arda.*

Habitat in Africa aequinoctiali, cylindros 2 — 3 pedum, capitulo orbiculato fornicato margine integro vndique prominente, argilla fusca plantis graminibusque variis mixta inaedificans. Oeconomia omnino praecedentium. *D. Sineathmann.*

Larua operaria, capite pallido, antennis moniliformibus, oculis nullis coecutiens maxillisque breuibus, dentatis. Thorax et abdomen ouata, cinereo plumbea pedibus pallidis.

Puppa militans capite maximo testaceo, antice eleuato gibbo, postice ouato obtuso, producto maxillis porrectis furcatis atris antennisque moniliformibus testaceis longitudine capitis, oculis nullis coecutiens. Thorax paruus abdomenque ouatum cinereo plumbea. Pedes testacei.

Imago praecedentibus minor. Nigra segmentorum marginibus albis. Alae incumbentes nigrae. Pedes omnes pallide testacei.

Conf. *Hemerobius testaceus* fusco testaceus, alis nigris corpore triplo longioribus. *Linn. Syst. Nat.* 2. 912. 8.

Degeer Inf. 3. tab. 21. fig. 4. 5.

Hoc Termes ex America videtur affine, attamen differens.

4. *T. nigrum*, abdominis segmentis apice albis, pedibus nigris. *mordax.*

Habitat in Africa aequinoctiali, cylindros minores capitulo orbiculato fornicato margine vndique prominente argilla fusca plantis graminibusque variis mixta struens. Oeconomia omnino praecedentium. *D. Sineathmann.*

Affine

Affine praecedenti, at minus, et differt alis breuioribus margine exteriori fusco pedibusque omnibus nigris. Larua et puppa praecedentis similes, at semper minores, forte praecedentis mera varietas.

Termes viarum. Koenig *Act. Soc. Berol. phys.* 4. tab. 1. fig. 8. etiam in *Mus. Dom. Banks* obseruavi. Est Larua alius speciei huius generis distincta ab omnibus oculis binis nigris. Reliquarum specierum laruae et puppae sub terrae superficie tantum in tenebris degunt, haec vero sub dio uti formica migrat.

Videtur *Termes capensis* luteus antennis filiformibus, dentibus porrectis nigris interdum alatus, alis diaphanis fusco marginatis. *Degeer Inf.* 7. 47. 2. tab. 38. fig. 1. 2. 3. at color differt.

103. M Y R M E L E O N.

libelluloides. 1. M. alis griseis fusco maculatis, corpore nigro flauoque variegato. *Syst. Ent.* 311. 1.

Myrmeleon libelluloides alis nigro punctatis maculatisque. *Linn. Syst. Nat.* 2. 913. 1. *Drury Inf.* 1. tab. 46. fig. 1. *Sulz. Hist. Inf.* tab. 25. fig. 3.

Myrmeleon maculatum niger collari luteo, alis griseis nigro maculatis neruisque flauis. *Degeer Inf.* 3. 365. 2. tab. 27. fig. 9.

Hemerobius libelluloides. *Mus. Lud. Vr.* 401.

Musca rarissima ad libellas referenda. *Raj. Inf.* 53.

Libella turcica maior alis locustae. *Petiv.* 6. tab. 3. fig. 1.

Habitat ad Cap. bon. sp.

Hemerobius speciosus *Linnaei* eiusdem speciei.

Pardalis. 2. M. alis albis, punctis nigris sparsis, femoribus flauis. Habitat in Coromandel. *Mus. Dom. Banks.*

Duplo praecedente minor. Caput et thorax nigro flauoque variegata. Antennae atrae claua compressa. Abdomen flauum nigro maculatum. Alae albae maculis plurimis sparsis nigris. Pedes nigri femoribus flauis.

formicarium. 3. M. alis fusco nebulosis, macula alba marginali postica. *Linn. Syst. Nat.* 2. 914. 3. *Syst. Ent.* 312. 2.

Formi-

Formicaleo. Geoff. *Inf.* 258. tab. 14. fig. 1.

Vallisn. Opera 1. p. 77. tab. 2.

Reaum. Inf. 4. tab. 14. fig. 18. 19.

tab. 11. fig. 6. 8.

tab. 52. 33. 34.

Roef. Inf. 3. tab. 17 — 20.

Sulz. Inf. tab. 17. fig. 105.

Schaeff. Elem. tab. 65.

Icon. tab. 22. fig. 1. 2.

Pod. Inf. tab. 1. fig. 8.

Habitat in Europae arenosis.

Larua retrograda sub fouea excauata formicis infidiatur.

4. *M. alis hyalinis fusco submaculatis, nervis nigro maculatis.* *Syst. Ent.* 312. 3. * *Catta.*

Habitat in Madera Infula. *Mus. Dom. Banks.*

5. *M. alis immaculatis, corpore fusco.* *Syst. Ent.* 312. 4. *formica-*
Myrmeleon formicalynx alis immaculatis hyalinis, an- *lynx.*
tennis fetaceis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 914. 4.

Myrmeleon immaculatum alis hyalinis, macula albida,
corpore fusco maculis griseis. *Degeer Inf.* 3. 564. 1.
tab. 27. fig. 8.

Roef. Inf. 3. tab. 21. fig. 2.

Habitat in America, Africa.

Antennae in nostro specimine clauatae, vti in congenere-
ribus.

6. *M. alis hyalinis immaculatis, corpore fusco, thoracis tigrinum.*
margine pedibusque flavis. *Syst. Ent.* 312. 5. *

Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

104. A S C A L A P H U S.

1. *A. alis reticulatis flavescente hyalinis, maculis duabus barbarus.*
fuscis. *Syst. Ent.* 313. 1.

Myrmeleon barbarum alis hyalinis, antennis longitu-
dine corporis, claua suborbiculata. *Linn. Syst. Nat.*
2. 914. 5.

Libelluloides f. *Libellula spuria*. *Schaeff. Monogr.* 1763.

Schaeff.

Schaeff. Elem. tab. 77.

Icon. tab. 50. fig. 1. 2. 3.

Seb. Musf. 3. tab. 86. fig. 2.

Sulz. Hist. Inf. tab. 25. fig. 4.

Habitat in Europa australi, Africa.

Antennae longitudine corporis claua compressa truncata. Alae hyalinae, reticulatae, flavescentes macula bascos apiceque nigris. Thorax flauo maculatus.

italicus. 2. A. alis anticis hyalinis, macula duplici bascos flaua, posticis flauis basi atris.

Habitat in Italia. *Dr. Allioni.*

Vix a praecedente distinctus. Caput nigrum, hirtum pilis in medio atris superne inferneque ferrugineis.

capensis. 3. A. alis albis nigro reticulatis, cauda forcipata.

Habitat ad Cap. bon. sp. *Musf. Dom. Banks.*

Magnitudo et statura praecedentis. Antennae elongatae fuscae claua compressa nigra. Caput hirtum nigrum. Corpus nigrum. Abdomen terminatur forcipe valida, ciliata. Alae omnes albae fusco reticulatae et praeterea costa alarum nigro maculata. Pedes nigri.

105. P A N O R P A.

communis. 1. P. alis aequalibus nigro maculatis. *Syst. Ent.* 313. 1.
Linn. Syst. Nat. 2. 915. 1. *Fn. Sv.* 1516.

Panorpa flauo nigroque varia, alis nigro maculatis.

Degeer Inf. 2. 2. 86. tab. 24. fig. 3. 4.

Musca scorpiura. *Aldrov. Inf.* 386. fig. 8. 9.

387. fig. 5. 6.

Panorpa. *Geoff. Inf.* 2. 260. tab. 14. fig. 2.

Scorpio Musca. *Frisch. Inf.* 9. tab. 14. fig. 1.

Sulz. Hist. Inf. tab. 25. fig. 5. 6.

Mouff. Inf. 62. fig. 3. 4.

Reaum. Inf. 4. tab. 8. fig. 9.

Schaeff. Elem. tab. 93.

Icon. tab. 88. fig. 7.

Sulz. Inf. tab. 17. fig. 106.

Art. nidros. 3. 414. tab. 6. fig. 10.

Habitat

Habitat in Europa, victitans rapina inprimis dipterorum.

Metamorphosis omnino adhuc latet.

Mas cauda chelifera, femina inermi.

2. P. alis aequalibus hyalinis apice fuscis. *Syst. Ent.* 313. *germanica.*
2. *Linn. Syst. Nat.* 2. 915. 2.

Habitat in Germania.

Vix a praecedente satis distincta.

3. P. alis subulatis subincurvatis ciliatis, femina aptera: *hyemalis.*
Syst. Ent. 314. 3. *Linn. Syst. Nat.* 2. 915. 3.

Habitat Halae Saxonum mense regelationis.

Statura praecedentium, at vix pediculo duplo maior.

4. P. alis immaculatis, abdomine falcato, pedibus longis: *tipularia:*
simis. *Syst. Ent.* 314. 4.

Panorpa italica lutea, alis aequalibus, puncto marginali, abdomine falcato: *Müller. Act. Taurin.* 3. 194.

Panorpa tipuloides alis omnibus aequalibus ferrugineis immaculatis, pedibus longis. *Schrank. Beytr.* 82. 40.

Sulz. Hist. Inf. tab. 25. fig. 7, 8.

Habitat in Europa australiori. *D. Allioni.*

Figura omnino Tipulae, at character huius generis et alae quatuor:

5. P. alis erectis, posticis sublinearibus longissimis: *Syst. Coa.*
Ent. 314. 5. *Linn. Syst. Nat.* 2. 915. 4.

Ephemera Coa. Hasselqu. Iter 423.

Act. Holm. 1747. 176. tab. 6. fig. i. mal.

Ruysch. Thesaur. animal. tab. 1. fig. 2. D.

Petiv. Gazoph. 1. tab. 73. fig. 1.

Habitat in Archipelagi insulis.

6. P. alis anticis flavo fuscoque variis, posticis longissimis fuscis, maculis tribus albis. *Gen. Inf. Mant.* 246.* *halterata.*

Panorpa halterata. *Forsk. Descr. animal.* 97. tab. 25. fig. 2.

Habitat in Oriente.

Staturam et summa affinitas praecedentis.

Fabr. Spec. Inf.

C c

106. RA-

106. R A P H I D I A.

notata. 1. R. thorace cylindrico, alis macula marginali fusca.

Habitat in Anglia. *Muf. Dom. Banks.*

Affinis R. ophiopsi, at paullo maior. Corpus nigrum macula capitis subtestacea. Aculeus extertus longitudine abdominis. Alae magnae, reticulatae, macula magna fusca marginali. Pedes testacei femoribus nigris.

Ophiopsis. 2. R. thorace cylindrico, alis immaculatis. *Syst. Ent.* 314. 1. *Linn. Syst. Nat.* 2. 916. 1. *Fn. Sv.* 1517.

Raphidia nigra, abdomine flavo striato, thorace cylindrico. *Degeer Inf.* 2. 2. 95. tab. 25. fig. 4.

Raphidia. *Geoff. Inf.* 2. 233. 1.

Scop. carn. 711.

Sulz. Hist. Inf. tab. 25. fig. 9.

Roef. Inf. 3. tab. 21. fig. 6. 7.

Schaeff. Elem. tab. 107.

Icon. tab. 95. 1. 2.

Habitat in Europae pinetis.

Puppa agilis, currens, matri simillima, at aptera.

mantispa. 3. R. pedibus anticis thoraci antice annexis, antennis thorace brevioribus. *Syst. Ent.* 314. 2. *Linn. Syst. Nat.* 2. 916. 2.

Sulz. Hist. Inf. tab. 25. fig. 10.

Pod. Inf. 101. tab. 1. fig. 15.

Scop. carn. 712.

Habitat in Europa australiori.

Tarde progreditur vno et tibiis complicatis, folis ferorum geniculis insistens, quibus explicatis ascendit.

107. C Y N I P S.

Rosae. 1. C. nigra, abdomine ferrugineo postice nigro, pedibus ferrugineis. *Syst. Ent.* 315. 1. *Linn. Syst. Nat.* 2. 917. 1. *Fn. Sv.* 1518.

Diplolepis Bedeguaris niger, abdomine ferrugineo, apice nigro, pedibus rufis. *Geoff. Inf.* 2. 310. 2.

Blank.

Blank. Inf. tab. 16. fig. V—Z.

Reaum. Inf. 3. tab. 46. fig. 5—8. et tab. 47. fig. 1—4.

Habitat in Bedeguar rofarum hispido.

2. *C. fusca*, thorace villoso. *Syst. Ent.* 315. 2. *Glecho-*
mae.
Cynips Glechomae hederaceae. *Linn. Syst. Nat.* 2. 917.
3. *Fn. Sv.* 1520.

Cynips totus fuscus, thorace villoso. *Geoff. Inf.* 2. 303. 20.

Reaum. Inf. 3. tab. 42. fig. 1—5.

Welfh. hecast. tab. 127. fig. 1.

Habitat in Glechomae hederaceae gallis globosis, scabris foliorum.

3. *C. nigra*, antennarum basi pedibusque flavescentibus. *Quercus*
Syst. Ent. 315. 3. *Linn. Syst. Nat.* 2. 917. 4. *Fn. Sv.* 1522. *bacca-*
rum.

Cynips niger, pedibus fulvo flavis, gallarum fungiformium quercus. *Geoff. Inf.* 2. 300. 9.

Vdm. Dissert. 81. tab. 1. fig. 14.

Reaum. Inf. 3. 192. tab. 42. fig. 8.

Habitat in gallis foliorum quercus pellucidis subglobosis paginae inferiori adhaerentibus, magnitudine pisi, exiens media aestate.

4. *C. nigra*, thorace lineato, pedibus griseis, femoribus subtus nigris. *Quercus*
Syst. Ent. 315. 4. *Linn. Syst. Nat.* 2. 918. 5. *Fn. Sv.* 1521. *folii.*

Diplolepis fuscus gallae globosae glabrae et durae foliorum quercus. *Geoff. Inf.* 2. 309. 1.

Sulz. Hist. Inf. tab. 26. fig. 1.

Frisch. Inf. 2. tab. 3. fig. 5.

Sulz. Inf. tab. 18. fig. 108.

Reaum. Inf. 3. tab. 39. fig. 14—17.

Blanc. Inf. tab. 16. fig. A—H.

Roef. Inf. 3. tab. 52. 53.

Habitat in gallis foliorum quercus paginae inferioris, auellanae magnitudine.

5. *C. atra*, antennis pedibusque pallidis. *Quercus*
Linn. Syst. Nat. 2. 918. 6. *inferus.*

Habitat in Gallis globosis, opacis, rubris foliorum quercus paginae inferiori innatis.
Alae hyalinae absque venis aut puncto costali.

Quercus petioli. 6. *C. nigra*, pedibus albidis, femoribus fuscis. *Syst. Ent.* 316. 6. *Linn. Syst. Nat.* 2. 918. 7. *Fn. Sv.* 1523.

Cynips fuscus nitens, capite nigro, abdominis apice villoso, gallae racemosae quercus. *Geoff. Inf.* 2. 301. 11.

Roef. Inf. 3. tab. 35. 36.

Reaum. Inf. 3. tab. 35. fig. 3.

Habitat in gallis vtrinque conuexis petiolorum quercus.

Quercus peduncul. 7. *C. grisea*, alis cruce lineari. *Syst. Ent.* 316. 7. *Linn. Syst. Nat.* 2. 918. 8. *Fn. Sv.* 1524.

Cynips gallae pomiformis extremitatis ramorum quercus. *Geoff. Inf.* 2. 302. 16.

Reaum. Inf. 3. tab. 40. fig. 1 — 6.

Habitat in quercus floribus masculis, gallis granulatis in catenas nodorum.

Quercus ramuli. 8. *C. pallida*, alis abdomineque nigris. *Syst. Ent.* 316. 8. *Linn. Syst. Nat.* 2. 918. 10. *Fn. Sv.* 1527.

Habitat in gallis lanatis albis quercus ramulorum.

Fagi. 9. *C. atra*, immaculata. *Syst. Ent.* 316. 9.

Cynips Fagi syluaticae. *Linn. Syst. Nat.* 2. 919. 12. *Fn. Sv.* 1528.

Frisch. Inf. 2. tab. 5.

Habitat in gallis pyriformibus paginae superioris fagi syluaticae foliorum.

viminalis. 10. *C. flaua*, thorace nigro. *Syst. Ent.* 316. 10. *Linn. Syst. Nat.* 2. 919. 13. *Fn. Sv.* 1529.

Roef. Inf. 2. *Vesp.* tab. 10. fig. 5 — 7.

Habitat in falicis viminalis foliis sub costa.

Capreae. 11. *C. viridis nitida*, pedibus pallidis. *Syst. Ent.* 316. 11. *Linn. Syst. Nat.* 2. 919. 14. *Fn. Sv.* 1531.

Frisch. Inf. 4. 39. tab. 22.

Habitat in falicis gallis ferrugineis, hordeiformibus, foliis innatis, nec non in aliis excrecentiis ramorum.

12. *C. atra*, thoracis tergo virescente, *Syst. Ent.* 317. 12. *Salicis strobili.*
Linn. Syst. Nat. 2. 919. 15. *Fn. Sv.* 1532.
Schulze de Rosis Salicinis. Act. Dresd. 1.
 Habitat in falicis glabrae apicibus ramulorum strobili-
 formibus e foliolis.
13. *C. nigra*, pedibus pallidis. *Syst. Ent.* 317. 13. *Linn. Amer.*
Syst. Nat. 2. 919. 16. *Fn. Sv.* 1536. *122.*
 Habitat in falicis pentandrae gallis inaequalibus, ra-
 mos terminantibus.
14. *C. Ficus Caricae.* *Syst. Ent.* 317. 14. *Linn. Syst. Nat. Pfenes.*
 2, 919, 17. *Antoen. acad.* 1. 41.
Hasselqu. Iter 424, 111. 112.
Ponteder. Anthol. tab. 11. fig. 12. 13. 14.
 Habitat in grossis Ficus Caricae orientalis.
15. *C. Ficus Sycomori.* *Syst. Ent.* 317. 15. *Linn. Syst. Nat. Sycomori.*
 2, 919. 18. *Mus. Lud. Vlr.* 404.
Hasselqu. Iter 426. 113.
 Habitat in Aegypti Ficus Sycomori grossis.
 Corpus nigrum aculeo exserto debili.

108, TENTHREDO,

* Antennis clauatis,

1. *T. antennis clauatis luteis, corpore atro, femoribus femorata.*
 posticis maximis, *Syst. Ent.* 317, 1. *Linn. Syst. Nat.*
 920. 1. *Fn. Sv.* 1533.
Tenthredo nigra, antennis clauatis, abdominis basi
 macula flava, antennis pedibusque luteis. *Degeer*
Inf. 2, 2. 229. 2. tab. 34. fig. 3. 4.
Crabro niger, segmento primo margine inciso: lunu-
 la flava. *Geoff. Inf.* 2. 263. tab. 14. fig. 4.
Alb. Inf. tab. 69.
Sulz. Hist. Inf. tab. 26. fig. 4.
Scopol. Ann. Hist. nat. 5. 120. 142.
Schaeff. Icon. tab. 104. fig. 1. 2.
 Habitat in Europae alno, falice.
 Larva viridis linea dorsali coerulea, laterali flava.

- lucorum.* 2. *T. antennis clauatis nigris, corpore villoso atro.* *Syst. Ent.* 317. 2. *Linn, Syst. Nat.* 2, 921. 6. *Fn. Sv.* 1537.
Habitat in betula, alno.
- lutea.* 3. *T. antennis clauatis, abdominis segmentis plerisque flauis.* *Syst. Ent.* 318. 3. *Linn. Syst. Nat.* 2. 921. 3. *Fn. Sv.* 1534.
Tenthredo brunnea, antennis clauatis, abdomine flauo nigro striato fasciatoque. *Degeer Inf.* 2. 2. 223. 1, tab. 33. fig. 8 — 16.
Roef. Inf. 2. *Vesp.* tab. 13.
Albin. Inf. tab. 59. a. b. c.
Schaeff. Icon. tab. 103. fig. 2. 3.
Frisch. Inf. 4. tab. 25.
Habitat in falice, alno, betula.
Larua glabra, viridis, linea dorsali nigra.
- Ameri-
nae.* 4. *T. antennis clauatis, corpore cinereo, abdomine sub-
tus rufo, labio albo.* *Syst. Ent.* 318. 4. *Linn. Syst. Nat.* 2. 921. 4. *Fn. Sv.* 1536.
*Tenthredo nigra, antennis clauatis, abdomine lateri-
bus subtusque rufo, pedibus testaceis.* *Degeer Inf.* 2. 2. 232. 3. tab. 33. fig. 20.
Tenthredo Amerinae. *Scop. carn.* 720.
Roef. Inf. 2. *Vesp.* tab. 1. et tab. 11.
Goed. Inf. 1. tab. 64.
Schaeff. Icon. tab. 90. fig. 8. 9.
Habitat in falice.
Larua rugosa viridis albo irrorata.
- margina-
ta.* 5. *T. antennis clauatis apice lutescentibus, corpore ni-
gro, abdominis segmentis posterioribus margine al-
bis.* *Syst. Ent.* 318. 5. *Linn. Syst. Nat.* 2. 920. 2,
Habitat in Europa, Anglia.
- triflis.* 6. *T. antennis clauatis luteis nigra, alis apice fuscis.* *Iter
Norwag.* 334. *
Habitat in insularum Sundmoerenfium betula. *Dom.
Stroem.*
Larua viridis, linea dorsali azurea, atra et lutea fim-
briata.

7. T. antennis clauatis, abdomine supra nigro, lateribus rufis, femoribus posticis dentatis. *Syst. Ent.* 318. 6.* *Vitellinae.*
Tenthredo Vitellinae antennis clauatis, ore elabiato, abdomine rufo dorso nigro, femoribus posticis dentatis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 921. 5. *Fn. Sv.* 1535,
Stroem. Sundm. 171. tab. 10. fig. 11.
 Habitat in betula, salice.
 Antennae flavae apice nigrae.
 Larva virescens per aperturam ante anum tanquam e siphone aquam expuit.
8. T. antennis clauatis nigris atra, alis anticis fascia fusca. *fasciata.*
Syst. Ent. 318. 7.*
Tenthredo fasciata antennis clauatis nigris, abdomine glabro atro, alis superioribus fascia fusca. *Linn. Syst. Nat.* 2. 921. 7. *Fn. Sv.* 1538.
 Habitat in Europa boreali.
9. T. antennis clauatis luteis, thorace atro, abdomine aeneo. *Syst. Ent.* 319. 8. *Linn. Syst. Nat.* 2. 921. 8. *sericea.*
Tenthredo viridis nitida, tibiis flavis, antennis clauatis novem articulatis, alis flavescentibus macula fusca. *Degeer Inf.* 2. 2. 275. 26. tab. 38. fig. 34.
Schaeff. Elem. tab. 51.
- ♂. *Tenthredo nitens* antennis clauatis luteis, abdomine viridi coerulecente, nitente. *Linn. Syst. Nat.* 2. 922. 10. *Fn. Sv.* 1539. Femina.
Sulz. Inf. tab. 18. fig. 109.
 Habitat in Europae betula.
 Larva brevis, viridis, lineis duabus flavis, capite cinereo, fascia brunnea.
10. T. antennis clauatis, corpore glabro nigro. *Syst. Ent.* 319. 9.* *obscura.*
 Habitat in Sueciae nemoribus.

** Antennis exarticulatis extrorsum crassioribus.

11. T. antennis clauato filiformibus exarticulatis, corpore nigro, abdomine coerulecente, tibiis pallidis. *vstulata.*
Syst. Nat. 2. 922. 13. *Fn. Sv.* 1542.

Tenthredo violacea nitida, antennis clauatis nouem articulatis nigris, alis fusco hyalinis. *Degeer Inf.* 2. 2. 277. tab. 39. fig. 19. 20,

Sulz. Inf. tab. 18. fig. 3.

Act. nidros. 3. 373. 39.

Habitat in Europae rosa canina.

Larua viridis lineis duabus albis, capite testaceo, fascia obscura.

enodis. 12. T. antennis clauato filiformibus exarticulatis, corpore atro coerulescente. *Linn. Syst. Nat.* 2. 922. 11.

Tenthredo violacea, antennis clauatis triarticulatis.

Degeer Inf. 2. 2. 282. 29. tab. 40. fig. 9. 10.

Tenthredo violacea. *Iter Norwag.* 64.

Habitat in Europae salice.

Larua viridis nigro punctata linea laterali rugosa flaua, cauda acuta,

glauicornis. 13. T. antennis clauato filiformibus exarticulatis nigra, abdomine flauo, apice nigro.

Habitat in America septentrionali. *Mus. Dom. Banks.*

Antennae flavescentes basi nigrae. Caput et thorax atra, immaculata. Abdomen flauum ano nigro. Pedes flauis femoribus nigris. Alae anticae macula marginali fusca,

*** Antennis pectinatis.

cephalotes. 14. T. antennis pectinatis atra, abdomine cingulis quatuor flauis.

Habitat in Germania. *Dom. de Hattorf.*

Magna. Caput grande, atrum, punctis tribus inter oculos lunulisque duabus posticis flauis. Antennae breues, pectinatae, testaceae. Thorax ater striga antica interrupta glauca. Abdomen glabrum, atrum, cingulis quatuor flauis anteriore maiore. Pedes ferruginei.

dorsata. 15. T. antennis subpectinatis albida, capite thoracis abdominisque dorso nigris.

Habitat in Anglia. *Mus. Dom. Banks.*

Statura *T. sericeae*. Antennae multiarticulatae, nigrae pilis breuibus fasciculatis ferratae. Caput nigrum. Thorax albidus maculis tribus fere totum abdomen occupantibus nigris. Abdomen albidum dorso fusco, basi apiceque tamen albido. Pedes albi femoribus intus linea atra.

16. *T. antennis pennatis obtusis, thorace glabro.* *Syst. Iuniperi.*
Ent. 319. 10. *Linn. Syst. Nat.* 2. 923. 15. *Fn. Sv.* 1541.
Vdm. Diff. 51. fig. 12.

Tenthredo pterophorus. *Sulz. Inf.* tab. 18. fig. 10.
Hist. Inf. tab. 26. fig. 5. 6.

Habitat in Iunipero.

Larua viridis nigro punctata.

17. *T. antennis pennatis lanceolatis, thorace subuilloso.* *Pini.*
Syst. Ent. 319. 11. *Linn. Syst. Nat.* 2. 922. 14. *Fn. Sv.* 1540.

Tenthredo nigra, antennis vno versu pectinatis, tibiis tarsisque flauis. *Geoff. Inf.* 2. 286. 33.

Tenthredo antennis pectinatis pedibusque cinereis femina cinerea, capite maculisque nigris. *Degeer Inf.*
 2. 2. 247. 10. tab. 36. fig. 13 — 18.

Schaeff. Icon. tab. 68. fig. 7. 8.

Vdm. Diff. 90. fig. 13.

Habitat in pino Europae borealis frequens.

**** Antennis filiformibus articulis 7-9.

18. *T. antennis septemnodiiis, abdomine cingulis quinque flauis, primo remotiore.* *Scrophulariae.*
Syst. Ent. 319. 12. *Linn. Syst. Nat.* 2. 923. 17. *Fn. Sv.* 1545.

Tenthredo nigra, segmentorum abdominalium marginibus, excepto secundo et tertio, flauis. *Geoff. Inf.*
 2. 277. 13.

Reaum. Inf. 5. tab. 13. fig. 12-33.

Blackw. herb. tab. 87. fig. 10.

Habitat in scrophulariis Europae.

Larua 22poda, niuea nigro punctata.

19. *T. antennis septemnodiiis, corpore variegato.* *Salicis.*
Tenthredo Salicis antennis septemnodiiis, corpore fla-

uo, vertice capitis thoracisque nigris, *Linn. Syst. Nat.* 2. 924. 21. *Fn. Sv.* 1548.

Tenthredo antennis filiformibus nouem articulatis, corpore pedibusque flauis, capite, thorace antennisque nigris. *Degeer Inf.* 2. 2. 259. 14. tab. 37. fig. 19. 20.

Reaum. Inf. 5. tab. 11. fig. 10.

Habitat in populo, falicibus.

Larua per phalanges parallelas pascens, plana, hirsuta, flaua, lineis vtrinque duabus lateralibus e punctis nigris, capite nigro.

flauicornis. 20. *T. antennis septemnodiiis flaua, capite caudaque nigris.* Habitat in Germania, in Italia. *D. Allioni.*

Magnitudo praecedentis. Caput atrum antennis flauis. Thorax niger disco flauo. Abdomen subpellucidum, flauum, apice nigrum. Alae hyalinae apice fusciscentes. Pedes flauis.

viridis. 21. *T. antennis septemnodiiis, corpore viridi, abdomine supra fusco.* *Syst. Ent.* 320. 14. *Linn. Syst. Nat.* 2. 924. 27. *Fn. Sv.* 1554.

Tenthredo viridis, capite thoraceque supra caracteribus nigris. *Geoff. Inf.* 2. 271. 1.

Sulz. Inf. tab. 18. fig. 112.

Habitat in Europae borealis betula.

Colore maxime variat. Mox magis viridis, mox magis fusca.

Cerasi. 22. *T. antennis septemmodiiis, corpore nigro, scutello pedibusque flauis.* *Syst. Ent.* 320. 15. *Linn. Syst. Nat.* 2. 923. 20. *Fn. Sv.* 1547.

Tenthredo nigra, pedibus flauis. *Geoff. Inf.* 2. 286.

Tenthredo antennis filiformibus nouem articulatis nigra, pedibus brunneis, alis fuscis. *Degeer Inf.* 2. 2. 269. 23. tab. 38. fig. 22 - 24.

Reaum. Inf. 5. tab. 12. fig. 1 - 5.

Habitat in cerasi foliis.

Larua gelatinosa, nigra.

massata. 23. *T. antennis septemnodiiis lutea, scutello punctoque alarum albis.* *Syst. Ent.* 320. 16. *

Tenthre-

Tenthredo nassata antennis septemnodiiis, corpore luteo, scutello albo, alis fusco reticulatis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 926. 38.

Habitat in Europae borealis nemoribus.

24. *T. antennis septemnodiiis, corpore atro, thorace rubro.* *Syst. Ent.* 320. 17. *Linn. Syst. Nat.* 2. 924. 28. *Fn. Sv.* 1553. *ouata.*

Tenthredo nigra, antennis filiformibus nouem articulatis, thorace macula rufa. *Degeer Inf.* 2. 2. 237. 5. tab. 35. fig. 10.

Aët. Nidros. 4. 292. 64.

Habitat in Europa, folia alni exedens.

Pedes antici pallidiores,

Larua virefcens, puluere albido farinaceo tecta,

Puppa intra folliculum duplicem.

25. *T. antennis septemnodiiis, corpore atro, capite thoraceque rubris.* *Linn. Syst. Nat.* 2. 925. 29. *Fn. Sv.* 1571. *Alni.*

Reaum. Inf. 5. tab. 1. fig. 1. 2.?

Habitat in alni foliis.

Antennae nigrae. Pedes antici testacei. Abdomen atrum, violaceo colore nitidum.

26. *T. antennis septemnodiiis violacea, abdomine flauo, alis macula fusca.* *Syst. Ent.* 321. 18. * *coerulescens.*

Habitat in Angliae nemoribus,

27. *T. antennis septemnodiiis nigra, abdomine segmentis tribus pedibusque ferrugineis.* *Syst. Ent.* 321. 19. * *pauida.*

Tenthredo antennis filiformibus nouem articulatis abdomine cylindrico nigro, medio rufo pedibusque rufis. *Degeer Inf.* 2. 2. 244. 8. tab. 35. fig. 17. 18.

Goed. Inf. 2. tab. 17.

Reaum. Inf. 5. tab. 12. fig. 19. 20. 21.

Habitat in Succiae rosis.

Larua viridis puluere albo farinaceo adspersa, capite flauo.

28. *T. antennis septemnodiiis, corpore nigro, abdominis segmentis quatuor ferrugineis.* *Syst. Ent.* 321. 19. *Linn. Syst. Nat.* 2. 923. 18. *Fn. Sv.* 1545. *Abietis.*

Tenthre.

Tenthredo nigra, abdominis medio ferrugineo. *Geoff. Inf.* 2. 285. 29.

Frisch. Inf. 2. tab. 1. fig. 21 — 24,

Habitat in pino, abiete,

germanica. 29. T. antennis septemnodiiis, corpore nigro, thorace antice abdomineque rufis. *Syst. Ent.* 321. 21. *

Habitat in Germaniæ nemoribus,

liuida, 30. T. antennis septemnodiiis, corpore atro, antennis ante apicem albis. *Syst. Ent.* 321. 22. *Linn. Syst. Nat.* 2. 925. 33. *Fn. Sv.* 1557.

Tenthredo nigra, antennarum apice albo, abdominis macula vtrinque alba, apice fuluo. *Geoff. Inf.* 2. 282. 22.

Habitat in Europa,

Variat abdomine toto atro et supra infraque liuido.

albicornis. 31. T. antennis septemnodiiis apice albis atra, tibiis testaceis alis apice fuscis.

Habitat in Italia. *D. Allioni.*

Magna et brevis. Antennae apice omnino albae. Corpus atrum, immaculatum. Pedes testacei femoribus nigris. Alae albae costa testacea apiceque fusca.

gonagra, 32. T. antennis septemnodiiis, corpore atro nitido, genibus testaceis.

Habitat in Germaniæ plantis.

Media, Corpus totum atrum, immaculatum. Genua siue femora apice et tibiae basi testacea. Punctum sub scutello flavum.

atra. 33. T. antennis septemnodiiis, corpore atro, pedibus rubris. *Syst. Ent.* 321. 23. *Linn. Syst. Nat.* 2. 924. 26. *Fn. Sv.* 1554.

Tenthredo nigra, pedibus ferrugineis, *Geoff. Inf.* 2. 283. *Scopol. carn.* 729.

Habitat in Europae plantis.

cinerea. 34. T. antennis septemnodiiis, nigra, abdominis cingulo tibiisque flavis. *Syst. Ent.* 322. 24.

Tenthredo bicincta antennis septemnodiiis, corpore atro, abdominis cingulo, ano, ore tibiisque flavis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 925. 31.

β. *Tenthredo livida* antennis septemnodiiis, corpore atro, abdominis cingulo albo. *Linn. Syst. Nat.* 2. 925. 32. *Fn. Sv.* 1556.

Habitat in Europa.

35. T. antennis septemnodiiis nigra, abdomine cingulo tribus flavis, posticis duobus interruptis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 923. 16. *Fn. Sv.* 1543. *rufica:*

Tenthredo nigra antennis filiformibus nouem articulatis, abdomine albo, cingulis flavis, pedibus luteis. *Degeer Inf.* 2. 2. 234. 4. tab. 34. fig. 13.

Geoff. Inf. 2. 276. 4. tab. 14. fig. 5.

Habitat in Europae caprifolio.

Larua cinerea, maculis dorsalibus triangularibus brunneis.

36. T. antennis septemnodiiis nigra, dorso medio rufo lateribusque albis. *Iter Norwag.* d. 10. Iun. *lateralis:*

Habitat in Sueciae floribus, capt. d. 10. Iun.

37. T. antennis septemnodiiis, thorace luteo, abdomine coeruleo, alis nigris. *americana:*

Tenthredo americana antennis subclauatis, thorace luteo, abdomine coeruleo, alis nigris. *Linn. Syst. Nat.* 2. 921. 9. *na.*

Tenthredo antennis crassioribus septemnodiiis, thorace flauo, abdomine coeruleo nitido, alis violaceis. *Degeer Inf.* 3. 599. 2. tab. 30. fig. 21.

Habitat Surinami.

38. T. antennis septemnodiiis nigra, alarum costa ferruginea. *Syst. Ent.* 322. 25. * *costalis*

Habitat in Germania. *Dom. de Hattorff.*

39. T. antennis septemnodiiis nigra, abdomine flauo, alarum anteriorum costa nigra. *Syst. Ent.* 322. 26. * *Rosae:*

Tenthredo Rosae antennis septemnodiiis, corpore flauo, costa alarum superiorum longitudinali nigra. *Linn. Syst. Nat.* 2. 925. 30. *Fn. Sv.* 1555.

Tenthredo

Tenthredo crocea thorace supra, capite alarumque margine exteriori nigris. *Geoff. Inf.* 2. 272. 4.

Tenthredo flava, antennis clauatis triarticulatis, capite thoraceque nigris, alis anticis nigro maculatis. *Degeer Inf.* 2. 2. 279. 28. tab. 39. fig. 27.

Roej. Inf. 2. *Vesp.* tab. 2.

Reaum. Inf. 5. tab. 14. fig. 10 — 12.

Merian. Inf. Eur. tab. 144.

Goed. Inf. 2. tab. 3.

Scop. carn. 722.

Atf. nidros. 4. 290. 80.

Schaeff. Icon. tab. 55. fig. 10. 11.

Habitat in Europae rosis.

Variat colore thoracis interdum toto nigro, interdum flavo maculato.

Larua flava, nigro punctata.

Capreae. 40. *T.* antennis septemnodiiis flava, capite thorace abdomineque supra nigris, alis puncto flavo. *Syst. Ent.* 322. 27.

Tenthredo Salicis Capreae. *Linn. Syst. Nat.* 2. 928. 55. *Fn. Sv.* 1572.

Tenthredo nouemnodia flava, capite thoraceque supra nigro. *Geoff. Inf.* 2. 281.

Goed. Inf. 1. tab. 19.

Alb. Inf. tab. 59. fig. 9. h.

Frisch. Inf. 6. tab. 4.

Reaum. Inf. 5. tab. 11. fig. 10.

— — 1. tab. 1. fig. 18.

Habitat in falicibus, ribe.

Larua cyanea, segmentis tribus primis vltimisque fuluis, maculis nigris ordinibus nouem. Destruit quotannis ribem rubram et grossalariam, intacta ribe nigra.

Morio. 41. *T.* antennis septemnodiiis atra, pedibus pallidis.

Habitat in Germania. *D. de Hattorff.*

Statura breuis, parua praecedentium. Corpus totum atrum, immaculatum. Pedes omnes pallidi.

septentrionalis. 42. *T.* antennis septemnodiiis, pedibus posticis compressis dilatatis. *Syst. Ent.* 323. 28. * *Linn. Syst. Nat.* 2. 926. 36. *Fn. Sv.* 1558.

Tenthre-

Tenthredo nigra, antennis filiformibus novem articu-
latis, abdomine rufo apice nigro, pedibus posticis
longis compressis. *Degeer Inf.* 2. 2. 262. 16. tab. 37.
fig. 26.

Schaeff. Icon. tab. 167. fig. 5. 6.

Habitat in alno.

Larva gregaria viridis nigro maculata apicibus flavis.

43. *T. antennis septemnodiiis, corpore atro, punctis duo-* *12 puncta-*
decim albis. *Syst. Ent.* 323. 29. *Linn. Syst. Nat.* 2. *ta.*
926. 39. *Fn. Sv.* 1559.

Habitat in Europae boreali.

44. *T. antennis septemnodiiis, corpore nigro, abdominis* *punctum.*
lateribus albis, femoribus posticis rubris. Linn. Syst.
Nat. 2. 924. 23.

Habitat in Germania.

Affinis *T. 12 punctatae*. Differt tamen labio atro, pe-
dibus albis femoribusque posticis rufis.

45. *T. antennis septemnodiiis atra, abdomine medio ru-* *blanda.*
fo, femoribus posticis macula alba. Syst. Ent. 323.
30. *

Habitat in Anglia. *Mus. Bankianum.*

46. *T. antennis septemnodiiis nigra, ventre pedibusque* *vaga.*
flavis.

Tenthredo mesomela antennis septemnodiiis subflava,
dorso nigro, arcibus flavescentibus. *Linn. Syst. Nat.*
2. 924. 22. *Fn. Sv.* 1549.

Habitat in Anglia. *Mus. Dom. Banks.*

Parva. Caput nigrum ore flavo. Thorax niger. Ab-
domen supra nigrum, strigis aliquot obsoletis flavis.
Subtus vti et pedes flavum.

47. *T. antennis septemnodiiis atra, thorace vtrinque ma-* *opaca.*
cula apicis rufa. Syst. Ent. 323. 31. *

Habitat in Sueciae hortis.

48. *T. antennis septemnodiiis atra, ore tibiisque anticis* *carbona-*
testaceis. Linn. Syst. Nat. 2. 926. 37. *ria.*

Habitat in Germania.

Media labio flavescente. Pedes postice ante apicem albi.

49. *T.*

nigra. 49. T. antennis septemnodiiis, corpore toto nigro. *Syst. Ent.* 323. 32. *Linn. Syst. Nat.* 2. 925. 34.
Habitat Vpfalliae.

Morio. 50. T. antennis septemnodiiis glabra atra, tibiis quatuor anticis pallidis.
Habitat in Anglia. *Mus. Dom. Banks.*
Parua. Corpus totum atrum tibiis folis quatuor anterioribus albis.

***** Antennis fetaceis, articulis plurimis.

erythrocephala. 51. T. antennis fetaceis, corpore coeruleo, capite rubro. *Syst. Ent.* 323. 33. *Linn. Syst. Nat.* 2. 926. 40. *Fn. Sv.* 1560.

Tenthredo coerulea nitida, capite luteo, antennis fetaceis, articulis viginti quatuor: *Degeer Inf.* 2. 2. 290. 33. tab. 40. fig. 19.

Sulz. Inf. tab. 18. fig. 113.

Schaeff. Icon. tab. 96. fig. 9.

Vdm. Dissert. 89.

Habitat in pino sylvestri.

Mas ater, ore tibiisque anticis luteis.

sylvatica. 52. T. antennis fetaceis, corpore nigro, pedibus thoracisque characteribus flauis. *Syst. Ent.* 323. 34. *Linn. Syst. Nat.* 2. 926. 41. *Fn. Sv.* 1561.

Tenthredo nigra, pedibus rufis, antennis fetaceis flauis, antennis 30: *Degeer Inf.* 2. 2. 292. 36. tab. 40. fig. 23.

Habitat in Europä.

Cynosbati. 53. T. antennis fetaceis, corpore atro, pedibus ferrugineis, posticis albo nigroque annulatis. *Syst. Ent.* 324. 35. *Linn. Syst. Nat.* 2. 927. 43. *Fn. Sv.* 1563.

Geoff. Inf. 2. 287. 36.

Reaun. Inf. 5. tab. 15. fig. 1 — 6.

Habitat in Europae rosa.

signata. 54. T. antennis fetaceis pallida, thorace maculis tribus dorsalibus longitudinalibus nigris.

Habitat in Germania. *Dom. de Hattorff.*

Media. Corpus pallidum, Antennae supra fuscae. Caput vertice puncto nigro. Thorax maculis tribus dorsalibus longitudinalibus scutelloque atris. Abdomen basi litura nigra. Pedes pallidi.

55. T. antennis fetaceis atro coerulefcens, ore palpis tibisque flavis. *Syst. Ent.* 324. 36. * *Linn. Syst. Nat.* 2. 927. 44. *Populi.*

Habitat in Europae populo.

56. T. antennis fetaceis, capite nigro albo variegato, pedibus testaceis. *Syst. Ent.* 324. 37. *Linn. Syst. Nat.* 2. 927. 45. *vafra.*

Habitat in Suecia.

57. T. antennis fetaceis, corpore rubro, thorace, ano oculisque nigris, alis postice fuscis. *Syst. Ent.* 324. 38. *Linn. Syst. Nat.* 2. 927. 47. *Fn. Sv.* 1565. *Betulae.*

Tenthredo ferruginea, antennis fetaceis, articulis 24, oculis, thorace caudaque nigris, alis macula fusca. *Degeer Inf.* 2. 2. 291. 34. tab. 40. fig. 21.

Habitat in Europae betula.

58. T. antennis fetaceis, corpore nigro, abdomine luteo. *faltuum.* *Syst. Ent.* 324. 39. *Linn. Syst. Nat.* 2. 927. 48. *Fn. Sv.* 1566.

Habitat in Europa.

Corpus nigrum, abdomine luteo.

59. T. antennis fetaceis atra, ano pedibusque testaceis. *haemor- rhoidalis.* Habitat in Germania. *Dom. de Hattorff.*

Corpus paruum atrum. Antennae fetaceae, nigrae longitudine corporis. Abdomen atrum ano rufo. Pedes testacei femoribus basi nigris.

60. T. antennis fetaceis flava, macula alarum ferruginea. *flava.* *Syst. Ent.* 324. 40. *Linn. Syst. Nat.* 2. 927. 49. *Fn. Sv.* 1567.

Reaum. Inf. 5. tab. 10. fig. 6. 7.

Habitat in Europa.

61. T. antennis fetaceis, abdomine medio rufo, scutello punctoque alarum albis. *lucorum.* *Syst. Ent.* 324. 41. *

Habitat in Angliae nemoribus.

Fabr. Spec. Inf.

D d

109. Si-

109. SIREX.

- gigas.** 1. S. abdomine basi apiceque flavo, corpore nigro. *Syst. Ent.* 325. 1.
Sirex gigas abdomine ferrugineo, segmentis 3. 4. 5. 6. nigris, thorace villoso. *Linn. Syst. Nat.* 2. 928. 1. *Fn. Sv.* 1573.
Vroceros. Geoff. Inf. 2. 265. tab. 14. fig. 3.
Linn. Act. Holm. 1739. tab. 3. fig. 7.
Reaum. Inf. 6. tab. 31. fig. 1. 2.
Degeer Inf. 1. tab. 36. fig. 1. 2.
Roef. Inf. 2. *Vesp.* tab. 8. 9.
Sulz. Inf. tab. 8. fig. 114.
Poda Inf. tab. 1. fig. 6.
Schaeff. Elem. tab. 1. fig. 2.
 tab. 13. fig. 7.
Icon. tab. 10. fig. 2. 3.
Seb. Mus. 4. tab. 53. fig. 15.
 Habitat in Europae arboribus coniferis.
- columba.** 2. S. thorace villoso ferrugineo, abdomine nigro, lateribus flavo maculatis. *Syst. Ent.* 325. 2. *
Sirex Columba abdomine nigro, fasciis testaceis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 929. 2. *Amoen. acad.* 6. 412. 88.
Sirex pensylvanicus capite thoraceque ferrugineis, abdomine atro, supra fasciis transuersis flavis. *Degeer Inf.* 3. 593. 1. tab. 30. fig. 13.
 Habitat in America. *Mus. Dom. Banks.*
- nigricornis.** 3. S. thorace villoso atro coerulefcente, abdomine ferrugineo basi cyaneo.
 Habitat in America boreali. *Mus. Dom. Feats.*
 Caput nigrum cyaneo nitidum antennis nigris. Thorax villosus niger, parum coerulefcentis. Abdomen ferrugineum segmentis tribus baseos cyaneis nitidis. Corniculus brevis, acuminatus ferratus. Aculeus piceus. Pedes picei femoribus nigris.
- flavicornis.** 4. S. thorace villoso atro immaculato, abdominis fasciis, antennis pedibusque flavis.
 Habitat in Labrador Americae. *Mus. Dom. Banks.*

Magnitudo *S. columbae*. Caput atrum antennis oculisque flavis. Thorax villosus, ater, immaculatus. Abdomen atrum segmentis 1. 2. 7. 8. supra flavis, subtus immaculatum. Cornu clauato acuminatum, ferratum, flauum. Aculeus niger. Pedes flauis femoribus atris.

5. *S. abdomine atro, thorace villoso, litura ante alas spectrum. lutea. Syst. Ent. 326. 3. Linn. Syst. Nat. 2. 929. 3. Fn. Sv. 1574.*

Degeer Inf. 1. tab. 36. fig. 6.
Schaeff. Icon. tab. 4. fig. 9. 10.
Linn. Amoen. acad. 3. 325.
Scop. carn. 740.

Habitat in Europae lignis putridis.

6. *S. abdomine atro coerulescente, thorace villoso vnico- iuuenus. lore. Syst. Ent. 326. 4. Linn. Syst. Nat. 2. 929. 4. Fn. Sv. 1575.*

Degeer Inf. 1. tab. 36. fig. 7.
Sulz. Hist. Inf. tab. 26. fig. 9. 10.
Scop. carn. 741.

Habitat in Europae fyluis.

Aculeus corniculo sesqui longior. Pedes rufi.

7. *S. abdomine supra flauo, annulis atris, capite pedibus- fantoma. que luteis.*

Habitat in Germania. *Dom. de Hattorff.*

Magnitudo et statura praecedentium. Caput cum antennis flauum ore atro. Thorax obscurus antice flavicans, subtus niger. Abdomen subtus nigrum, supra flauum in medio annulis atris. Pedes flauis.

8. *S. cyaneus nitidus, pedibus flauis. cyaneus.*

Habitat in America boreali. *Mus. Dom. Teats.*

Medius. Antennae nigrae. Corpus totum cyaneum, nitidum, immaculatum. Thorax subuillofus. Corniculus acutus, ferratus. Aculeus niger. Alae obscure hyalinae. Pedes omnes flauis, immaculati.

9. *S. ater, capite vtrinque macula antennisque medio albicor- albis. ni.*

Habitat in America boreali. *Mus. Dom. Teats.*

Magnitudo praecedentis. Antennae albae basi apiceque nigrae. Caput nigrum pone oculos macula magna glabra, nitida, alba. Thorax subvillosus, ater, immaculatus. Abdomen glabrum, atrum puncto parvo albo vtrinque in segmento penultimo. Corniculus porrectus, acuminatus, ferratus. Aculeus niger. Alae obscurae. Pedes nigri tibiis tarsisque basi albis.

camelus. 10. S. abdomine atro lateribus albo maculato, thorace laevi. *Syst. Ent.* 326. 5. *Linn. Syst. Nat.* 2. 929. 5. *Fn. Sv.* 1576.

Scop. carn. 742.

Vdm. Diff. 82.

Habitat in ligno putrido Europae.

mariscus. 11. S. abdomine testaceo, segmentis duobus vltimis nigris, thorace villosus. *Syst. Ent.* 326. 6. *Linn. Syst. Nat.* 2. 929. 6. *Fn. Sv.* 1577.

Habitat in Europae sylvis.

Aculeus omnino nullus. Corniculus brevissimus, acuminatus.

pygmaeus. 12. S. abdomine compresso nigro, punctis duobus fasciisque tribus luteis. *Syst. Ent.* 326. 7. *Linn. Syst. Nat.* 2. 929. 7.

Habitat in Europa.

Antennae extrorsum subcrassiores sese longitudine corporis.

tabidus. 13. S. niger, abdominis lateribus flavo punctatis, tibiis anticis testaceis. *Syst. Ent.* 326. 8. *

Habitat in Angliae floribus. *Mus. Dom. Banks.*

110. ICHNEUMON.

* Scutello albedo, antennis albo annulatis.

fugillatorius. 1. I. scutello flavicante, thorace immaculato, abdomine atro, segmentis duobus vtrinque puncto albo. *Syst. Ent.* 327. 1. *Linn. Syst. Nat.* 2. 930. 1. *Fn. Sv.* 1578.

- Ichneumon niger*, pedibus ferrugineis, thoracis apice maculisque abdominis quatuor albis, antennarum medio albo. *Geoff. Inf.* 2. 345. 54.
Ichneumon dubitatorius. *Sulz. Hist. Inf.* tab. 26. fig. 11.
 Habitat in Europa.
2. I. scutello albo, thorace immaculato, abdominis segmento secundo tertio quartoque luteis, reliquis apice albis. *Syst. Ent.* 327. 2. *Linn. Syst. Nat.* 2. 930. 2. *Fn. Sv.* 1579. *raptorius.*
Ichneumon niger, abdomine antice ferrugineo, postice nigro, punctis tribus albis, thorace, apice annuloque antennarum albis. *Geoff. Inf.* 2. 342. 49.
 Habitat in Europa.
 Ultima abdominis segmenta terminantur puncto dorsali albo.
3. I. scutello albido, thorace immaculato, abdominis segmento tertio posteriori secundoque ferrugineis, sexto flavo. *Syst. Ent.* 327. 3. *Linn. Syst. Nat.* 2. 930. 3. *Fn. Sv.* 1580. *farcitorius.*
Vespa Ichneumon abdomine nigro duobus luteis circulis diuiso. *Raj. Inf.* 255. 15.
Sulz. Inf. tab. 18. fig. 15.
 Habitat in Europa.
4. I. scutello flavicante, thorace immaculato, abdominis segmento secundo tertioque ferrugineis, ultimis apice albidis. *Syst. Ent.* 327. 4. *Linn. Syst. Nat.* 2. 930. 4. *Fn. Sv.* 1581. *extensorius.*
Vespa Ichneumon thorace nigro cum puncto in dorso albo, abdomine anteriore rubro, posteriore nigro, pedibus rubris. *Raj. Inf.* 253. 8.
Schaeff. Icon. tab. 43. fig. 1. 2.
 Habitat in Europa.
5. I. scutello flavicante, thorace maculato, abdominis tribus ultimis segmentis macula dorsali alba. *Syst. Ent.* 328. 5. *Linn. Syst. Nat.* 2. 930. 5. *Fn. Sv.* 1582. *quaesitorius.*
 Habitat in Europae hortis.
6. I. scutello flavicante, thorace immaculato, abdominis segmento secundo tertioque ferrugineis, reliquis nigris. *culpatorius.*

gris. *Syst. Ent.* 328. 6. *Linn. Syst. Nat.* 2. 930. 6.
Fn. Sv. 1583.

Habitat in Europa.

Thorax in nostro immaculatus.

mutato- 7. I. scutello flauo, thorace maculato, abdomine atro,
rius. segmentorum marginibus flauis, pedibus rufis, plan-
tis albis. *Syst. Ent.* 328. 7. *

Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

irrorato- 8. I. scutello flauicante niger, thorace maculato, abdo-
rius. minis primo segmento puncto, reliquis margine al-
bis. *Syst. Ent.* 328. 8. *

Habitat in America.

infracto- 9. I. scutello flauo, thorace maculato, abdominis segmen-
rius. tis margine flauis, pedibus flauis, femoribus nigris.
Syst. Ent. 328. 9. * *Linn. Syst. Nat.* 2. 931. 7. *Fn.*
Sv. 1584.

Habitat in Europa.

ambula- 10. I. scutello flauicante, thorace maculato, abdominis
torius. segmento secundo ferrugineo, reliquis margine al-
bis. *Syst. Ent.* 329. 10. *

Habitat in Anglia. *Mus. Dom. Banks.*

saturato- 11. I. scutello albo, thorace immaculato, abdomine nigro
rius. apice albo. *Syst. Ent.* 329. 11. *Linn. Syst. Nat.* 2.
931. 9. *Fn. Sv.* 1586.

Degeer Inf. 1. tab. 23. fig. 6.

Schaeff. Icon. tab. 61. fig. 4.

Habitat in Europae hortis.

molito- 12. I. scutello albo, corpore atro. *Syst. Ent.* 329. 12.
rius. *Ichneumon molitorius* scutello flauescente, thorace im-
maculato, abdominis apice tibiatarumque basi albis.
Linn. Syst. Nat. 2. 931. 10. *Fn. Sv.* 1588.

Habitat in Europa.

Pedes colore variant, mox nigri, mox rufi, mox nigri
tibiis basi albis.

erispato- 13. I. scutello albo, thorace immaculato, abdomine lu-
rius. teo apice nigro. *Syst. Ent.* 329. 13. *Linn. Syst. Nat.*
2. 931. 11. *Fn. Sv.* 1588.

Habitat in Europa.

14. I. scutello albo, thorace immaculato, abdomine rubro apice nigro, puncto albo. *Syst. Ent.* 329. 14. * *motatorius.*
Habitat Hafniae.
- ** Scutello albo, antennis nigris totis.
15. I. scutello albo, thorace maculato, abdominis segmento secundo tertioque luteis. *Syst. Ent.* 329. 15. *Linn. Syst. Nat.* 2. 931. 13. *Fn. Sv.* 1590. *luctatorius.*
Ichneumon niger, fronte, thoracis apice, tibiis ex parte abdominisque medio flavis. *Geoff. Inj.* 2. 347. 59.
Habitat in Europa, in noua Zelandia. *Mus. Dom. Banks.*
Zelandicus puncto albo sub alis, vix tamen distinctus.
16. I. scutello flauicante, thorace maculato, abdominis segmento secundo rufo. *Syst. Ent.* 330. 16. * *lotatorius.*
Habitat in noua Zelandia. *Mus. Dom. Banks.*
17. I. scutello albo, thorace maculato, abdomine nigro, fasciato-segmento secundo basi tertio sextoque flavis. *Syst. Ent.* 330. 17. * *fasciatus.*
Habitat in Anglia.
18. I. scutello flauicante, thorace maculato, abdominis segmentis omnibus margine flavis. *Syst. Ent.* 330. 18. *Linn. Syst. Nat.* 2. 932. 14. *Fn. Sv.* 1591. *volutatus.*
Habitat in Europa.
19. I. scutello albo, thorace maculato, abdomine nigro, vaginato-fasciis quinque albis, tertia interrupta. *Syst. Ent.* 330. 19. *rius.*
Ichneumon vaginatorius scutello flauicante, thorace maculato, abdominis segmentis margine flavis, primo quintoque unicolore. *Linn. Syst. Nat.* 2. 932. 15. *Fn. Sv.* 1592.
Habitat in Europa.
Primum segmentum punctis duobus albis.
20. I. scutello flauicante, thorace maculato, abdominis annulato-segmentis quatuor anticis margine flavis. *Syst. Ent.* 330. 20. * *rius.*
Habitat in Anglia. *Mus. Dom. Banks.*

- bidento-* 21. I. scutello flavicante, thorace submaculato, abdominis
rius. secundo tertioque segmento flavo, pedibus rufis. *Syst. Ent.* 331. 21. *
Habitat in Europa boreali.
Variat thorace bidentato et mutico,
- persuasor-* 22. I. scutello albo, thorace maculato, abdominis segmen-
rius. tis omnibus vtrinque punctis duobus albis. *Syst. Ent.* 331. 22. *Linn. Syst. Nat.* 2. 932. 16. *Fn. Sv.* 1593.
Degeer Inf. 1. tab. 36. fig. 8.
Sulz. Hist. Inf. tab. 26. fig. 12.
Schaeff. Icon. tab. 80. fig. 2.
Habitat in Europae hortis.
- designato-* 23. I. scutello flavicante, thorace maculato, abdomine
rius. atro, segmentis primis quatuor vtrinque puncto albo. *Syst. Ent.* 331. 23. *Linn. Syst. Nat.* 2. 932. 18.
Fn. Sv. 1595.
Habitat in Europae hortis.
- edictor-* 24. I. scutello flavicante, thorace maculato, punctis vtrin-
rius. que duobus abdomineque toto atro. *Syst. Ent.* 331. 24. *Linn. Syst. Nat.* 2. 932. 19. *Fn. Sv.* 1596.
Habitat in Europa boreali.
- dubito-* 25. I. scutello flavicante, thorace maculato, abdomine
rius. flavo apice nigro, alis fascia fusca. *Syst. Ent.* 331. 25.*
Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
- laetato-* 26. I. niger, scutello albo, thorace maculato, abdomine
rius. rufo apice nigro, tibiis posticis annulo albo.
Habitat in Germania. *Dom. de Hattorf.*
Parvus. Antennae supra nigrae, subtus fulvae. Caput nigrum orbita oculorum alba. Thorax ater scutello punctis duobus ante alas et vnico sub scutello albis. Abdomen rubrum apice atrum. Pedes rufi tibiis posticis nigris annulo albo.
- fuforius.* 27. I. scutello flavicante, thorace maculato, abdomine
luteo. *Syst. Ent.* 332. 26. *Linn. Syst. Nat.* 2. 933. 21.
Fn. Sv. 1598.

β. *Ichneumon pisorius* scutello flavicante, thorace maculato, abdomine toto luteo. *Linn. Syst. Nat.* 2. 931. 12. *Fn. Sv.* 1589.

Schaeff. Elem. tab. 12. fig. 1.

Icon. tab. 6. fig. 12.

Habitat in Europae sylvis.

β. Vix differt, quamvis antennae albo annulatae.

28. I. scutello flavicante, thorace maculato, punctis vtrinque tribus, abdomine toto atro, tibiis albis. *Syst. Ent.* 332. 27. *Linn. Syst. Nat.* 2. 932. 20. *Fn. Sv.* 1597.

deliratorius.

Habitat in Europa.

29. I. scutello flavicante, thorace immaculato, abdomine atro, pedibus rufis. *Syst. Ent.* 332. 28. *Linn. Syst. Nat.* 2. 933. 22. *Fn. Sv.* 1599.

fossorius.

Habitat in Europa.

Affinis I. quaesitorio.

30. I. scutello flavicante, thorace variegato, abdomine subfalcato ferrugineo basi apiceque nigro. *Syst. Ent.* 332. 29. *

falcatorius.

Habitat Hafniae.

31. I. scutello albo, thorace immaculato, abdomine testaceo basi nigro apice flavo.

sponsorius.

Habitat in Germania. *Dom. de Hattorf.*

Parvus. Antennae elongatae supra nigrae, subtus flavae, Caput atrum ore late flavo. Thorax ater, immaculatus scutello albo. Abdomen testaceum basi nigrum apice flavescens. Pedes flavi.

32. I. scutello flavo, thorace immaculato, abdominis segmento primo secundo tertioque rufis. *Syst. Ent.* 332. 30. *

sollicitorius.

Habitat in nova Zelandia. *Mus. Dom. Banks.*

33. I. scutello albo, thorace immaculato, abdomine atro, fascia anali niuea. *Syst. Ent.* 332. 21. *

cinctorius.

Habitat in Anglia.

- decorato-* 34. I. scutello flauo ferrugineus, abdominis vltimo segmen-
rius. to fascia atra. *Syst. Ent.* 333. 32. *
Habitat in noua Zelandia. *Muf. Dom. Banks.*

*** Scutello thorace concolore, antennis fascia
annulatis.

- relucta-* 35. I. niger, abdomine medio piceo, tibiis anticis claua-
tor. tis. *Syst. Ent.* 333. 33. *Linn. Syst. Nat.* 2. 933. 27.
Fn. Sv. 1603.
Habitat in Europa.

- obiurga-* 36. I. ater, capite thoraceque antice ferrugineis, alis cya-
tor. neis anticis puncto hyalino.
Habitat in Africa aequinoctiali. *Muf. Dom. Banks.*
Magnus. Antennae nigrae albo annulatae. Caput et
thorax antice obscure ferruginea. Thorax postice
niger. Abdomen petiolatum, clauatum primo seg-
mento incuruo, atrum, immaculatum. Aculeus ex-
sertus, rectus longitudine abdominis. Alae cyanae,
anticis puncto neruo diuiso hyalino. Pedes antici
picei, postici atri, tibiis annulo baseos albo.

- comita-* 37. I. ater totus, antennis fascia alba. *Syst. Ent.* 333. 34.
tor. *Linn. Syst. Nat.* 2. 933. 24. *Fn. Sv.* 1600.
Ichneumon totus ater, antennis medio albis. *Geoff. Inf.*
338.
Reaum. Inf. 6. tab. 29. fig. 1 — 4.
Degeer Inf. 1. tab. 24. fig. 10.
Habitat in Europa.

- vigilator.* 38. I. ater, abdominis segmento quinto margine albo, alis
anticis apice nigris.
Habitat in Africa aequinoctiali. *Muf. Dom. Banks.*
Magnus. Antennae nigrae annulo lato albo. Corpus
atrum, immaculatum abdominis segmento quinto
margine superiori albo. Alae obscurae, anticae apice
nigrae. Pedes nigri.

- restaura-* 39. I. niger, abdominis striga alba, pedibus ferrugineis,
tor. antennis fasciatis. *Syst. Ent.* 333. 35. *
Habitat Hafniae.

40. *I. niger*, abdomine clauato, fasciis tribus pallidis, femoribus rufis. *Syst. Ent.* 333. 36. *
 Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
41. *I. niger*, abdominis quatuor segmentis intermediis rufis, femoribus clauatis nigris. *Syst. Ent.* 333. 37. * *debellator.*
 Habitat in Suecia. *D. Solander.*
42. *I. niger*, abdomine ferrugineo apice nigro, antennis fasciatis. *Syst. Ent.* 334. 38. *migrator.*
Ichneumon niger, abdomine ferrugineo apice nigro, tibiis antennisque annulo albo. *Geoff. Inf.* 2. 343. 50.
 Habitat in Europa.
43. *I. niger*, thorace postice abdomineque antice ferrugineis. *dimidiator.*
 Habitat in Germania. *Dom. de Hattorff.*
 Antennae nigrae, basi rufae, medio albo annulatae.
 Thorax niger postice cum scutello ferrugineus. Abdomen antice ferrugineum, postice nigrum. Pedes rufi, postici apice rufi.
44. *I. niger*, abdomine ferrugineo, petiolo nigro, pedibus rufis. *Syst. Ent.* 334. 39. *profligator.*
Ichneumon niger, abdomine toto ferrugineo, antennis annulo albo. *Geoff. Inf.* 2. 341. 46.
 Habitat in Europa australiori.
 Pedes postici nigro varii.
 Variat rarius pedibus nigris.
45. *I. niger*, abdomine ferrugineo, apice nigro, macula alba, alis hyalinis, antennis fasciatis. *Syst. Ent.* 334. 40. *Linn. Syst. Nat.* 2. 933. 26. *Fn. Sv.* 1602. *incubitor.*
Ichneumon abdomine ferrugineo apice nigro, antennis annulo albo. *Geoff. Inf.* 2. 341. 48. tab. 16. fig. 1.
 Habitat in Europa.
- **** Scutello thorace concolore, antennis nigris totis.
46. *I. luteus*, alis fuscis, fascia alba. *Syst. Ent.* 334. 41. *desertor.*
Ichneumon desertor corpore luteo, alis fuscis, fasciis duabus

duabus albis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 334. 29. *Fn. Sv.* 1605.

Schaeff. Icon. tab. 20. fig. 2. 3.

Habitat in Europae floribus.

fastidia- 47. *I. coccineus*, alis fuscis, anticis macula marginali coc-
tor. cineae.

Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*

Affinis *I. desertor*. Antennae totae nigrae. Caput rubrum vertice nigro. Thorax et abdomen coccinea, immaculata. Aculeus exsertus, brevis, niger. Alae omnes nigrae anticis macula magna marginali coccinea, quae antice terminatur macula alba. Pedes coccinei.

ariolator. 48. *I. thorace bispinoso rufo*, abdomine atro, strigis quatuor albis. *Syst. Ent.* 334. 42. *

Ichneumon ariolator thorace ferrugineo bispinoso, alis fasciis binis fuscis, abdomine fasciis quatuor albis.

Linn. Syst. Nat. 2. 933. 23.

Ichneumon spinosus thorace ferrugineo bispinoso, alis maculis binis fuscis, abdomine nigro, fasciis tribus albis. *Degeer Inf.* 3. 596. 2. tab. 38. fig. 16.

Habitat in Americae meridionalis insulis. *Dom. v. Rohr.*

proficifca- 49. *I. luteus*, alis anticis fascia apiceque fuscis, antennis
tor. aculeoque nigris. *Syst. Ent.* 335. 43. *

Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

hospita- 50. *I. luteus*, alis anticis fascia apiceque fuscis, antennis
tor. anoque nigris. *Syst. Ent.* 335. 44. *

Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

denuncia- 51. *I. rufus*, capite abdominisque apice atris, alis nigris,
tor. anticis macula media alba.

Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*

Paruus. Caput atrum ore rufo. Thorax ferrugineus, immaculatus. Abdomen striatum, rufum, apice nigrum. Alae omnes nigrae, anticae macula media alba, posticae immaculatae. Pedes omnes ferruginei.

52. *I. luteus*, abdominis segmentis vtrinque puncto atro, *pedator.*
antennis aculeoque nigris. *Syst. Ent. App. 828.**
Habitat in India. *Mus. D. Hunter.*
53. *I. ferrugineus*, antennis ano pedibusque posticis nigris, alis subfuscis. *defensor.*
*Syst. Ent. 335. 45.**
Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
54. *I. ater*, abdominis segmento secundo tertioque fuluis, *arrogator.*
alis atris, macula costali testacea.
Habitat in Italia. *D. Allioni.*
Magnus. Caput cum antennis, thorax, pedes atra immaculata. Abdomen ouatum, atrum, segmento secundo tertioque rufis. Alae atrae nitidae macula parua costali testacea.
55. *I. ater*, capite pallido, alis nigris, puncto maculaque *insidiator.*
albis.
Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*
Affinis videtur sequenti. Caput pallidum antennis nigris apice piccis. Thorax ater, immaculatus. Abdomen supra atrum, subtus pallefcens. Aculeus fere longitudine corporis. Alae omnes nigrae, anticae puncto paruo pone medium et macula maiori versus apicem hyalino albis, posticae immaculatae. Pedes atri tibiis anticis testaceis.
56. *I. ater*, capite rufo, alis nigris immaculatis. *capitator.*
*Syst. Ent. 335. 46.**
Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
57. *I. ater*, thorace rufo, alis fuscis. *mutator.*
*Syst. Ent. 335. 47.**
Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
58. *I. ater*, alis nigris, lunula hyalina, abdomine coccineo. *denigrator.*
Syst. Ent. 335. 48.
Ichneumon denigrator corpore atro, alis nigris, lunula hyalina, abdomine testaceo subfessili. *Linn. Syst. Nat. 2. 934. 28. Fn. Sv. 1064.*
Ichneumon incertus. Sulz. Hist. Inf. tab. 26. fig. 16.
Ichneumon niger, abdomine coccineo. *Geoff. Inf. 2. 352. 96.*

Schaeff. Icon. tab. 20. fig. 4. 5.

Habitat in Europae hortis.

corruscator. 59. I. corpore artubusque atris, alis fusco hyalinis. *Syst. Ent.* 336. 49. *Linn. Syst. Nat.* 2. 934. 31. *Fn. Sv.* 1606.

Habitat in Europa.

fasciator. 60. I. ater, abdomine fasciis tribus albis, alis apice fuscis. Habitat in Italia. *D. Allioni.*

Paruus. Corpus nigrum, immaculatum abdomine solo fasciis tribus albis, quarum prima interrupta, tertia remota fere analis.

rutilator. 61. I. niger, antennis subtus, abdomine pedibusque quatuor anticis rufis. *Syst. Ent.* 336. 50. *Linn. Syst. Nat.* 2. 934. 30. *Fn. Sv.* 1607.

Habitat in Europa.

manifestator. 62. I. ater immaculatus, abdomine sessili cylindrico, pedibus rufis. *Syst. Ent.* 336. 51. *Linn. Syst. Nat.* 2. 934. 32. *Fn. Sv.* 1608.

Ichneumon ater, pedibus rufis, fetis ani corpore duplo longioribus. *Geoff. Inf.* 2. 323. 5.

Vespa Ichneumon tota nigra praeter pedes, qui crocei sunt. *Raj. Inf.* 256. 19.

Musca tripilis, corpore tenui et praelongo, fetis a cauda longissime exeuntibus. *Raj. Inf.* 261. 1.

Reaum. Inf. 6. tab. 29. fig. 16.

Degeer Inf. 1. tab. 36. fig. 9.

Schaeff. Icon. tab. 10. fig. 3.

Habitat in Europae locis glareosis.

polycerator. 63. I. ater, abdomine lineari longissimo, tibiis posticis clauatis. *Gen. Inf. Mant.* 254. *

Habitat in India. *D. Fothergill.*

lunator. 64. I. nigro flauoque varius, abdomine clauato, vtriuque lunulis flauis.

Habitat in America boreali. *Mus. Dom. Teats.*

Magnus. Antennae nigrae primo articulo flauo. Caput nigrum, subtus orbitaque oculorum flauis. Thorax nigro

nigro

nigro flauoque variegatus. Abdomen clauatum, fuscum, lunulis lateralibus maculisque apicis flauis. Alae hyalinae macula magna marginali fusca. Pedes flauis. Aculeus elongatus corpore duplo longior.

65. *I. ater*, ore pedibusque rufis, abdomine petiolato. *compunctor*.
Syst. Ent. 336. 52.

Ichneumon compunctor corpore atro immaculato, abdomine subpetiolato longo, pedibus rufis, palpis fetaceis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 934. 33. *Fn. Sv.* 1609.

Ichneumon ater, pedibus rufis, fetis ani longitudine corporis, abdomine lacui. *Geoff. Inf.* 2. 324. 6.

Schaeff. Icon. tab. 49. fig. 4.

Habitat in Europa, frequens in papilionum pupis.

66. *I. niger*, abdomine ferrugineo, primo segmento toto, reliquis punctis duobus nigris. *irritator*.
Syst. Ent. 336. 53. *

Habitat in America. *Mus. Dom. Banks.*

67. *I. niger*, abdomine ferrugineo basi apiceque nigro, pedum posticorum patellis solis nigris. *delusor*.
Syst. Ent. 337. 54. *Linn. Syst. Nat.* 2. 934. 34. *Fn. Sv.* 1609.

Habitat in Europae nemoribus.

68. *I. niger*, abdominis segmento secundo tertio quarto pedibusque rufis, femoribus posticis nigris. *elongator*.
Ent. 337. 55. *

Habitat in Anglia.

69. *I. niger*, abdominis segmento secundo tertio quarto, ore pedibusque rufis, posticis nigris rufo annulatis. *latrator*.

Habitat in Anglia. *Mus. Dom. Banks.*

Affinis videtur praecedenti, at triplo minor. Os uti et antennae subtus rufum. Abdomen petiolatum basi apiceque nigrum. Pedes rufi postici nigri femoribus tibiisque basi rufis.

70. *I. corpore nigro*, abdomine ferrugineo basi apiceque nigro, pedibus posticis nigris, plantis albis. *titillator*.
Ent. 337. 56. *Linn. Syst. Nat.* 2. 934. 35. *Fn. Sv.* 1611.

Habitat in Europa.

- venator.* 71. I. niger, abdomine subfalcato basi subtus incarnata, pedibus rufis. *Syst. Ent.* 337. 57.
Ichneumon venator corpore atro immaculato, abdomine basi subtus incarnata, pedibus rufis, aculeo retractili. *Linn. Syst. Nat.* 2. 935. 36. *Fn. Sv.* 1612.
 Habitat in Europa.
- fornicator.* 72. I. ater, abdomine clauato fornicato immaculato, tibiis rufis.
 Habitat in Italia. *D. Allioni.*
 Magnitudo I. venatoris. Corpus totum atrum. Abdomen apice incrassatum subtus fornicatum. Pedes rufi plantis posticis nigris.
- lineator.* 73. I. ater, abdomine petiolato, fronte flavo lineata, pedibus anticis ferrugineis.
 Habitat in Anglia. *Mus. Dom. Banks.*
 Corpus medium totum atrum. Caput atrum fronte lineis duabus flavis vel potius orbita oculorum flava. Thorax immaculatus. Pedes quatuor anteriores ferruginei, postici nigri.
- extensor.* 74. I. niger, abdomine subcylindrico, pedibus rufis, aculeo corpore longiori. *Syst. Ent.* 337. 58.
Ichneumon extensor corpore nigro immaculato, abdomine cylindrico, pedibus rufis, palpis setaceis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 935. 37. *Fn. Sv.* 1613.
Ichneumon linearis, antennis longitudine corporis, tentaculis setaceis, femoribus clauatis. *Geoff. Inf.* 2. 359. 86.
 Habitat in Europa.
- maculator.* 75. I. niger, abdominis lateribus pedibusque rufis. *Syst. Ent.* 337. 59. *
 Habitat in Germania. *Dom. de Hattorf.*
- Turionellae.* 76. I. niger, pedibus rufis, tibiis posticis nigris albo annulatis. *Syst. Ent.* 338. 60.
Ichneumon Turionellae niger, abdomine cylindrico, macula alarum fusca albae inserta, tibiis posterioribus albo annulatis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 935. 40. *Fn. Sv.* 1615.
 Habitat in Phalaenarum laruis.

77. *I. niger*, aculeo corpore duplo longiore, pedibus *strobilel-*
 lutescentibus, posticis tibia digitoque nigris albo *lae.*
 annulatis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 935. 41. *Fn. Sv.* 1616.
 Habitat in laruis *Tiniae strobilellae.*
78. *I. niger*, abdomine petiolato compresso, pedibus pal- *modera-*
 lidis, aculeo corpore subbreuiore. *Linn. Syst. Nat.* *tor.*
 2. 935. 42. *Fn. Sv.* 1617.
 Habitat in larua *Ichneumonis strobilellae*, qua consum-
 ta folliculum cranio superstiti inaeditat. *Linn.*
79. *I. ater*, abdomine clauato breuissimo, aculeo cylin- *saltator.*
 drico, pedibus posticis elongatis.
 Habitat in Anglia. *Mus. Dom. Banks.*
 Paruus. Corpus totum atrum exceptis solis tibiis anticis
 femorumque basi testaceis. Abdomen breue, com-
 pressum, petiolatum terminatur aculeo breui, cylin-
 drico, obtuso. Pedes postici elongati, nigri.
80. *I. ater*, abdominis basi vtrinque puncto flauo, tho- *oculator.*
 race postice bidentato. *Syst. Ent.* 338. 61. *
 Habitat in Anglia. *Mus. Dom. Banks.*
81. *I. niger*, pedibus flauis, abdomine sessili cylindrico *Refinell-*
 incuruo, antennis basi luteis. *Syst. Ent.* 338. 62. *lae.*
Linn. Syst. Nat. 2. 936. 43. *Fn. Sv.* 1618.
 Habitat in *Phalaenae refinellae* laruis.
82. *I. niger*, abdomine oblongo obtuso, ore pedibusque *praero-*
 pallidis. *Syst. Ent.* 338. 63. *Linn. Syst. Nat.* 2. 936. *gator.*
 44. *Fn. Sv.* 1619.
 Habitat in *Bombycis falicis* laruis.
83. *I. niger*, abdomine falcato, segmentis tertio quarto- *fomenta-*
 que basi flavescentibus, pedibus testaceis. *Syst. Ent.* *tor.*
 338. 64. *Linn. Syst. Nat.* 2. 936. 46.
 Habitat in Europa boreali.
84. *I. niger*, abdominis segmentis secundo tertioque fer- *mensura-*
 rugineis, triangulo dorsali nigro. *Syst. Ent.* 338. 65.* *tor.*
 Habitat in Saxonia.

- variegator.* 85. *I. niger*, thorace variegato, abdomine clauato, fasciis tribus flauis. *Syst. Ent.* 339. 66. *
Habitat in Europa boreali.
- gravidator.* 86. *I. niger*, abdominis primo segmento ferrugineo, abdomen dimidium obtegente. *Syst. Ent.* 339. 67. *Linn. Syst. Nat.* 2. 936. 48. *Fn. Sv.* 1622.
Habitat in Europa.
- inculcator.* 87. *I. niger*, abdomine falcato toto ferrugineo. *Syst. Ent.* 339. 68. *Linn. Syst. Nat.* 2. 936. 49. *Fn. Sv.* 1623.
Ichneumon niger, pedibus abdomineque ferrugineis. *Geoff. Inf.* 2. 357. 80.
Reaum. Inf. 6. tab. 30. fig. 9.
Habitat in Europa.
- falcator.* 88. *I. niger*, thorace maculato, abdomine falcato, segmentis secundo tertio quartoque rufis. *Syst. Ent.* 339. 69. *
Habitat in Europa boreali.
- pugillator.* 89. *I. thorace immaculato*, abdomine falcato rufo basi apiceque nigro, pedibus tenuibus ferrugineis. *Syst. Ent.* 339. 70. *Linn. Syst. Nat.* 2. 936. 50. *Fn. Sv.* 1624.
Ichneumon niger, abdomine falcato, pedibus abdominisque medio flauis. *Geoff. Inf.* 2. 332. 24.
Vespa Ichneumon maior et longior, abdomine multo tenuiore ligamento pectori annexo. *Raj. Inf.* 255. 17.
Degeer Inf. 1. tab. 6. fig. 12.
Habitat in Bombycis ziczac laruis.
Frons macula flaua.
- irrorator.* 90. *I. ater*, alis anticis apice nigris, puncto albo, abdomine clauato, apice macula villosa aurea. *Syst. Ent.* 340. 71. *
Ichneumon ater, alis extremo fuscis, abdominis apice villosa ferrugineo. *Geoff. Inf.* 2. 337. 36.
Habitat in Europa australiori.
- ruspator.* 91. *I. niger*, pedibus ferrugineis, femoribus clauatis, posticis dentatis. *Syst. Ent.* 340. 72. *Linn. Syst. Nat.* 2. 937. 51. *Fn. Sv.* 1625.

Ichneumon niger, pedibus ferrugineis, femoribus posticis crassis denticulo armatis. *Geoff. Inf.* 2. 326. 12.
Habitat in Europa.

92. I. niger, abdomine falcato medio rufo, tibiis posticis clauatis basi apiceque albis. *Syst. Ent.* 340. 73.
Linn. Syst. Nat. 2. 937. 52. *Fn. Sv.* 1626.

Ichneumon totus niger, tibiis posticis clauatis, abdomine longo, tenui falcato. *Geoff. Inf.* 2. 328. 16.

Vespa Ichneumon thorace crasso nigro, abdomine a longo et tenuiori filamento incipiente et in caudam crassam desinente. *Raj. Inf.* 253. 5.

Degeer Inf. 1. tab. 36. fig. 10.

Mouff. Inf. tab. 121.

Reaum. Inf. 4. tab. 10. fig. 14.

Habitat in Apum Sphegumque laruis.

93. I. niger, abdomine falcato, maculis tribus lateralibus rufis, tibiis posticis clauatis nigris. *Syst. Ent.* 340. 74. *affector.*

Ichneumon affector niger, abdomine falcato, segmento secundo, tertio quartoque latere rufis, tibiis posticis clauatis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 937. 53. *Fn. Sv.* 1627.

Ichneumon niger, tibiis posticis clauatis, abdomine tenui falcato circa medium fuluo. *Geoff. Inf.* 2. 329. 17.

Scop. carn. 756.

Habitat in Europa.

94. I. niger, abdomine flavo apice nigro, pedibus flavis. *necator.*
Gen. Inf. Mant. 252. *

Roef. Inf. 2. *Vesp.* 4. tab. 4.

Habitat in Phalaenarum laruis, quas folliculis associatis, numerosis, albis obtegunt.

***** Antennis luteis.

95. I. luteus, thorace striato, abdomine falcato. *Syst. Ent.* 341. 75. *lutens.*
Linn. Syst. Nat. 2. 937. 55. *Fn. Sv.* 1628.

Ichneumon corpore luteo falcato, oculis viridibus nitidis. *Degeer Inf.* 2. 2. 169. 5. tab. 29. fig. 16. 17.

Ichneumon luteus totus. *Geoff. Inf.* 2. 330.

Vespa Ichneumon maior tota fulva, alis amplis, anterioribus nota fulva. *Raj. Inf.* 253. 6.

Goed. Inf. 2. tab. 37. et tab. 20. fig. 6.

Schaeff. Icon. tab. 1. fig. 12.

tab. 101. fig. 4.

Sulz. Inf. tab. 18. fig. 118.

Habitat in Europae larvis, in noua Hollandia, Zelandia. *Mus. Dom. Banks.*

flauus. 96. I. luteus, vertice atro, abdomine apice fusco. *Syst. Ent.* 341. 76. *

Habitat in America. *D. v. Rohr.*

fuluus. 97. I. luteus, alis nigris. *Syst. Ent.* 341. 77. *

Habitat in America. *Dom. Drury.*

atratus. 98. I. ater, capite pedibus strigaque anali flauis, aculeo longissimo.

Habitat in America boreali. *Mus. Dom. Teats.*

Corpus magnum. Antennae luteae. Caput luteum mandibulis strigaque inter oculos nigris. Thorax ater, immaculatus. Abdomen compressum, clauatum, atrum, ultimo segmento margine flauo. Aculeus exsertus corpore triplo longior. Alae obscurae. Pedes flauis femoribus quatuor posticis atris.

dentatus. 99. I. niger flauo maculatus, scutello apice bidentato flauo, ano bidentato. *Iter Norweg.* d. 4. Aug. *

Habitat in Norwegiae lucis. *Dom. Præp. Stroem.*

Morio. 100. I. ater, abdomine falcato, alis cyaneis.

Habitat in America boreali. *Mus. Dom. Banks.*

Magnus. Antennae luteae. Caput atrum fronte flauo maculata. Thorax et abdomen petiolatum falcatum, atra, immaculata. Alae omnes cyaneae apice fuscae. Pedes atri, antici testacei.

amictus. 101. I. niger, abdomine falcato, antennis pedibusque ferrugineis. *Syst. Ent.* 341. 78. *

Habitat in Anglia. *Mus. Dom. Banks.*

glaucop- 102. I. luteus, pectore nigro, abdomine falcato, ano nigro. *Syst. Ent.* 341. 79. *Linn. Syst. Nat.* 2. 938. 57.

Fn. Sv. 1630.

Schaeff.

Schaeff. Icon. tab. 82. fig. 3.

Habitat in Europa.

103. *I. niger*, abdomine falcato antice flauo, pedibus posticis nigro geniculatis, scutello flauo. *Syst. Ent.* 341. *circumflexus.*
80. *Linn. Syst. Nat.* 2. 938. 59. *Fn. Sv.* 1631.

Habitat in Europa.

104. *I. flauus*, capite thoraceque maculatis, abdomine vtrinque punctis quinque nigris. *punctatus.*

Habitat in Coromandel. *Mus. Dom. Banks.*

Medius. Caput flauum macula verticis atra et in hac stemmata duo. Antennae paullo obscuriores. Thorax flauus macula dorsali punctisque duobus scutelli atris. Abdomen flauum segmentis 1. 3. 4. 5. 7. vtrinque puncto magno atro. Pedes testacei, immaculati.

105. *I. niger*, antennis pedibusque ferrugineis, alis hyalinis, stigmate nigro. *Syst. Ent.* 342. 81. *Linn. Syst. Nat.* 2. 938. 61. *formicatus.*

Habitat in praedio *Dom. a Linné* Hammarby dicto.

106. *I. flauescens*, abdomine fascia atra, alis fusco maculatis. *Syst. Ent.* 342. 82. * *mutillarius.*

Habitat Hafniae.

107. *I. ater*, antennis pedibusque ferrugineis, alis albis, fasciis duabus nigris. *Syst. Ent.* 342. 83. *Linn. Syst. Nat.* 2. 938. 60. *Fn. Sv.* 1632. *cinctus.*

Ichneumon niger, alis albis fascia duplici nigra posteriori maiori. *Geoff. Inf.* 2. 359. 85.

Habitat in Europae hortis.

108. *I. niger*, abdomine fascia ferruginea, alis fusco maculatis. *fuscatus.*

Habitat in Germania. *D. de Hattorff.*

Statura praecedentis parua. Caput nigrum fronte flauescente. Thorax niger, immaculatus. Abdomen nigrum fascia antica fulua. Pedes ferruginei.

***** Minuti. Antennis filiformibus. Abdomine ovato, sessili.

muscarum. 109. I. auratus, pedibus flavis saltatoriis. *Syst. Ent.* 342. 84. *Linn. Syst. Nat.* 2. 938. 62. *Fn. Sv.* 1636.
Degeer Inf. 1. tab. 32. fig. 19. 20.
Habitat in larvis Muscarum aphidiuorarum.

Bedeguaris. 110. I. viridis nitens, abdomine aureo. *Syst. Ent.* 432. 85. *Linn. Syst. Nat.* 2. 939. 63. *Fn. Sv.* 1634.
Ichneumon antennis clauatis nigris, capite thoraceque viridi aureis, pedibus flavis, abdomine aureo. *Degeer Inf.* 20. 186. 10.
Cynips thorace viridi aeneo, abdomine aureo, setis ani corpore longioribus. *Geoff. Inf.* 2. 296. 1.
Roef. Inf. 3. tab. 53. fig. F. H.
Reaum. Inf. 3. tab. 41. fig. 13. 14.
Act. Nat. Curios. Dec. 2. Ann. 2. obs. 10.
Blancard. Inf. 188. 12.
Habitat in larvis gallarum rosae, quercus.

gallarum. 111. I. fusco aeneus, abdomine nigro, tibiis pallidis. *Syst. Ent.* 342. 86. *Linn. Syst. Nat.* 2. 939. 64. *Fn. Sv.* 1638.
Habitat in Cynipidis quercus larvis.

Iuniperi. 112. I. auratus viridis, antennis nigris, alis hyalinis. *Syst. Ent.* 342. 87. *Linn. Syst. Nat.* 2. 939. 65. *Fn. Sv.* 1635.
Habitat in Tipulae iuniperinae larua.

Puparum. 113. I. auratus coeruleus, abdomine viridi nitido, pedibus pallidis. *Syst. Ent.* 342. 88. *Linn. Syst. Nat.* 2. 939. 66. *Fn. Sv.* 1636.
Cynips viridi fericeus, abdomine aureo, pedibus pallidis chrysalidum papilionum. *Geoff. Inf.* 2. 305. 24.
Ichneumon Antiopae. *Scop. carn.* 765.
Reaum. Inf. 6. tab. 30. fig. 13. 14. 15.
Merian. Inf. Europ. tab. 44. et 52.
Goed. Inf. 1. tab. 77.
Degeer Inf. Verf. Germ. 1. tab. 32. fig. 19. 20.
tab. 35. fig. 17.

Degeer

Degeer Inf. 1. tab. 30. fig. 8.

Roef. Inf. 2. *Vesp.* tab. 3.

Habitat in pupis Papilionum et Muscarum, quibus nuper exuta larua oua imponit.

114. *I. auratus viridis*, abdomine nigro, macula dorsali purpurascente, pedibus flauis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 939. 67. *Fn. Sv.* 1657. *laruarum.*
Ichneumon antennis clauatis fractis, capite thoraceque viridibus, pedibus flauis, abdomine nigro, macula testacea. *Degeer Inf.* 2. 2. 194. 14. tab. 31. fig. 6. 7.
Reaum. Inf. 2. tab. 36. fig. 9. 10. 11.
 Habitat in Phalaenarum laruis.
115. *I. auratus viridis*, abdomine fusco, basi cingulo pal- *cynipedis.*
 lido, pedibus flauiscentibus. *Syst. Ent.* 343. 89. *Linn.*
Syst. Nat. 2. 939. 68. *Fn. Sv.* 1639.
 Habitat in Cynipedum et Phalaenarum laruis.
116. *I. nigro aeneus*, abdomine coerulescente, pedibus *coccorum.*
 liuidis. *Syst. Ent.* 343. 90. *Linn. Syst. Nat.* 2. 939.
 69. *Fn. Sv.* 1640.
Degeer Inf. 1. tab. 35. fig. 17.
 Habitat in Europae Coccis.
117. *I. niger*, capite rufo, oculis viridibus. *Syst. Ent.* 343. *fecalis.*
 91. *Linn. Syst. Nat.* 2. 939. 70. *Fn. Sv.* 1641.
 Habitat in laruis spicarum fecalis.
 Conf. *Ichneumon agricolator niger*, capite ferrugineo,
 abdomine fessili. *Linn. Syst. Nat.* 2. 937. 54. Mera
 huius videtur varietas.
118. *I. niger*, alis hirsutis, macula lunari nigra. *Syst. Ent.* *subcuta-*
 343. 92. *Linn. Syst. Nat.* 2. 940. 71. *Fn. Sv.* 1642. *neus.*
Degeer Inf. 1. tab. 30. fig. 21.
 Habitat in laruis subcutaneis.
119. *I. niger*, abdomine conico acutissimo, femoribus cla- *conicus.*
 uatis ferrugineis. *Syst. Ent.* 343. 93. *
 Habitat in Daniae nemoribus.
120. *I. niger*, pedibus ferrugineis. *Syst. Ent.* 343. 94. *Linn. globatus.*
Syst. Nat. 2. 940. 74. *Fn. Sv.* 1647.

Ichneumon niger, antennis filiformibus, pedibus ferrugineis, abdomine virescente. *Degeer Inf.* 2. 2. 176. 6. tab. 29. fig. 13. 14.

Ichneumon serico conglobato albo. *Geoff. Inf.* 2. 320. 1.

Vespa Ichneumon crucigera parua. *Raj. Inf.* 255. 13.

Merian. Europ. tab. 22.

Frisch. Inf. 6. tab. 10.

Reaum. Inf. 2. tab. 35. fig. 5. 6.

Derham theol. 8. cap. 6. n. 1.

Habitat in culmis intra folliculum communem, bombycinum, subrotundum, album.

glomeratus. 121. *I. niger*, pedibus flavis. *Syst. Ent.* 344. 95. *Linn. Syst. Nat.* 2. 940. 75. *Fn. Sv.* 1646.

Ichneumon serico conglobato flavo. *Geoff. Inf.* 2. 321. 2.

Vespa Ichneumon tripilis, antennis praelongis crucigera f. *crucae brassicarum*. *Raj. Inf.* 254. 12.

Goed. Inf. 1. 59. 11.

Reaum. Inf. 2. tab. 33. fig. 2. 7. 8.

Merian. Europ. tab. 48.

Degeer Inf. 1. tab. 16. fig. 6.

Roes. Inf. 2. *Vesp.* 4. tab. 3. a. b.

Habitat in Papilionum larvis: exeuntes proprios folliculos flavos necunt, intra quos excluduntur.

Aphidum. 122. *I. niger*, abdomine basi pedibusque anticis genibusque posticis flavis. *Syst. Ent.* 344. 96. *Linn. Syst. Nat.* 2. 940. 72. *Fn. Sv.* 1643.

Ichneumon niger, antennis filiformibus, ore flavescente, pedibus variegatis. *Degeer Inf.* 2. 2. 179. 8.

Ichneumon Aphidum. *Geoff. Inf.* 2. 322. 4.

Frisch. Inf. 11. tab. 19.

Habitat in Europae aphidibus.

Ouulorum. 123. *I. niger*, pedibus rufis, antennis filiformibus longis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 940. 73. *Fn. Sv.* 1644.

Degeer Inf. 1. tab. 35. fig. 11. 12. 13.

Habitat in glossatorum ovis.

Conf. *Schrank. Beytr.* tab. 2. fig. 13. Vix differt, at pedes nigri.

124. *I. ater*, antennis ramosis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 941. *pedicini-*
 77. *Fn. Sv.* 1647. *cornis.*
Degeer Inf. 1. tab. 35. fig. 3. 4. 5.
Act. Holm. 1740. 4. 64. tab. 1. fig. 4—6.
 Habitat in laruis subcutaneis *B. quercus*.
125. *I. viridis*, antennis ramosis. *ramicor-*
Degeer Inf. 2. 2. 200. 16. tab. 31. fig. 14. *nis.*
Eulophus. Geoff. Inf. 2. 312. 1. tab. 15. fig. 3.
 Habitat in Phalaenarum laruis.
 Singularis ob antennas ramosas, vix tamen proprii generis.
126. *I. apterus niger*, pedibus rufis. *Syst. Ent.* 344. 97. * *agilis.*
Ichneumon apterus niger, corpore oblongo, antennis
 pedibusque brunneis. *Degeer Inf.* 2. 2. 203. 17. tab.
 31. fig. 18.
 Habitat in laruis Ichneumonis aphidum Sueciae.
127. *I. apterus niger*, abdomine antice pedibusque ferru- *curfitans.*
 gineis. *Syst. Ent.* 344. 98. *
Ichneumon apterus niger, abdomine ovali oblongo,
 antennis pedibusque rufis. *Degeer Inf.* 2. 2. 205.
 18. β.
 Habitat in Sueciae hortis.
128. *I. apterus rufus*, capite abdomineque postico nigris. *Acaro-*
Syst. Ent. 344. 99. *rum.*
Mutilla Acarorum. Linn. Syst. Nat. 2. 968. 9. *Fn.*
Sv. 1729.
Ichneumon apterus rufus, capite, antennis abdominis-
 que postico nigris. *Degeer Inf.* 2. 2. 206. 19. tab. 31.
 fig. 19. 20.
 Habitat in Europae borealis Curculionum laruis.
 Pedes ferruginei.
129. *I. apterus niger*, abdomine rufo basi apiceque nigro. *pedestris.*
Syst. Ent. 344. 100. *
 Habitat in Sueciae hortis.
130. *I. apterus rufus*, capite abdomineque nigris. *Syst. formica-*
Ent. 345. 101. *rius.*

Mutilla formicaria. Linn. *Syst. Nat.* 2. 968. 10. *Fn. Sv.* 1728.

Habitat in Sueciae hortis.

III. E V A N I A.

appendigaster. 1. *E. atra*, abdomine petiolato breuissimo dorso thoracis imposito. *Syst. Ent.* 345. 1.

Sphex appendigaster atra, abdomine petiolato breuissimo, pedibus posticis longissimis. Linn. *Syst. Nat.* 2. 943. 12.

Ichneumon niger, abdomine breuissimo compresso truncato, petiolo longo thoracis dorso imposito, pedibus posticis longissimis. *Degeer Inf.* 3. 594. 1. tab. 30. fig. 14.

Reaum. Inf. 6. tab. 31. fig. 13.

Brown Lam. tab. 44. fig. 6.

Habitat in Europa australi, capite bon. sp., in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

maculata. 2. *E. thorace maculato*, abdominis primo segmento punctis duobus, secundo margine albis. *Syst. Ent.* 345. 2.*

Habitat in Anglia. *Mus. Dom. Banks.*

II2. S P H E X.

* Abdomine petiolato.

fabulosa. 1. *S. nigra hirta*, abdominis petiolo biarticulato, segmento secundo tertioque ferrugineis. *Syst. Ent.* 346. 1. Linn. *Syst. Nat.* 2. 941. 1. *Fn. Sv.* 1648.

Sphex nigra, antennis filiformibus, petiolo elongato, alis fuscis, abdomine antice rubro. *Degeer Inf.* 2. 2. 148. 4. tab. 28. fig. 27.

Ichneumon niger, abdomine fuluo postice nigro, petiolo longissimo. *Geoff. Inf.* 2. 349. 63.

Scopol. carn. 770.

Frisch. Inf. 2. tab. 1. fig. 6. 7.

Sulz. Inf. tab. 19. fig. 120.

Schaeff. Icon. 83. fig. 1.

Habitat in Europae terra fabulosa, vbi canis instar pedibus anterioribus cuniculum fodit laruamque Phalaenae

laenae f. Araneae semimortuam in eo sepelit, cui ouulum concredit, quo facto orificium terra claudit. *Linn.*

2. *S. nigra*, abdomine rufo, petiolo maculaque dorsali nigra. *Thomae.*
Syst. Ent. 346. 2. *
 Habitat in Infula Thomae Americis.
3. *S. nigra*, labio, ano pedibusque ferrugineis. *haemor-
rhoidalis.*
 Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*
 Magnitudo et statura *S. pensylvanicae*. Antennae nigrae basi ferrugineae. Caput nigrum labio ferrugineo. Thorax hirtus, ater, immaculatus. Abdomen glabrum, atrum ano siue ultimo segmento rufo. Pedes ferruginei femoribus basi nigri. Alae subcyaneae.
4. *S. nigra*, abdomine petiolato atro, alis subviolaceis. *pensylvanica.*
Syst. Ent. 346. 3. *Linn. Syst. Nat.* 2. 941. 3. *Amoen. acad.* 6. 412. 89.
Sphex nigra, alis violaceis apice fuscis, abdominis petiolo filiformi, maxillis longissimis incuruatis. *Degeer Inf.* 3. 586. 2. tab. 30. fig. 2.
 Habitat in Pennsylvania, in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
5. *S. cyanea*, alis albis apice fuscis, antennis nigris. *Syst. violacea.*
Ent. 346. 4. *
 Habitat ad Cap. bon. sp.
6. *S. coerulea*, alis cyaneis apice fuscis, antennis nigris. *cyanea.*
Syst. Ent. 346. 5.
Sphex coerulea, alis fuscis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 941. 2. *Amoen. acad.* 6. 412. 90.
Sphex coerulea nigra, coeruleo nitida, antennis nigris, alis fusco violaceis, abdominis petiolo elongato. *Degeer Inf.* 3. 589. 6. tab. 30. fig. 6.
 Habitat in America boreali.
7. *S. cyanea*, abdomine atro, femoribus posticis rufis. *femorata.*
 Habitat in Italia. *D. Allioni.*
 Media. Caput cyaneum antennis nigris. Thorax cyaneus, nitidus. Abdomen petiolatum, atrum, nitidum. Alae subferrugineae. Pedes nigri femoribus posticis rufis. 8. S.

- tibialis.* 8. *S. hirta* nigra cyaneo nitida, tibiis posticis ferrugineis, alis nigris.
 Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*
 Media. Antennae nigrae basi ferrugineae. Caput atrum, corpus hirtum, nigrum, cyaneo nitidum. Pedes quatuor postici ferrugini femoribus nigris. Alae nigrae.
- flavipes.* 9. *S. laevis* atra, pedibus flavis, femoribus nigris.
 Habitat in America. *Dom. Blackburn.*
 Magnitudo *S. cyaneae*. Caput fuscum antennis nigris. Thorax niger puncto flavo ante alas. Abdomen petiolatum, atrum, nitidum, immaculatum. Alae fusco flavescentes. Pedes flavi femoribus nigris.
- Figulus.* 10. *S. laevis* atra, abdomine petiolato, labio segmentorumque marginibus lucidis. *Syst. Ent.* 347. 6. *Linn. Syst. Nat.* 2. 942. 11. *Fn. Sv.* 1650.
 Habitat Vpsaliae in parietum lignorum foraminibus. Larva apoda, pallida.
- lunata.* 11. *S. abdomine* petiolato nigro, primo segmento lunula flava. *Syst. Ent.* 347. 7. *
Sphex asiatica ferruginea, thorace variegato, abdominis petiolo macula vtrinque ad basin flava. *Linn. Syst. Nat.* 2. 942. 5. *Mus. Lud. Vlr.* 405. ?
Sphex flavo maculata nigra, alis fuscis, abdominis petiolo longissimo, thorace abdominisque basi pedibusque flavo maculatis. *Degeer Inf.* 3. 580. 4. tab. 30. fig. 4.
Sphex caementaria. *Drury Inf.* 1. tab. 44. fig. 6—8.
 Habitat in Antigua Insula.
- feruens.* 12. *S. nigra*, abdomine petiolato ferrugineo, alis fuscis. *Syst. Ent.* 347. 9. *Linn. Syst. Nat.* 2. 942. 6. *Mus. Lud. Vlr.* 406.
 Habitat in India.
 Abdominis petiolus niger.
- jamaicensis.* 13. *S. abdomine* petiolato nigro, segmento primo toto reliquis margine flavis. *Syst. Ent.* 347. 10. ●
 Habitat in Iamaica Insula.

14. *S. nigra*, capite petioli basi pedibusque ferrugineis. *erythrocephala.*
 Habitat in Malabar. *Muf. Dom. Banks.*
 Statura *S. spirificis*, at paullo maior. Antennae fuscae basi ferrugineae. Caput ferrugineum maxillis apice atris. Thorax hirtus, ater, lobo antico punctoque ante alas ferrugineis. Abdomen longe petiolatum, atrum, petiolo dimidiato ferrugineo. Pedes ferruginei. Alae cyanae.
15. *S. atra*, thorace hirto immaculato, petiolo vniarticulato flauo longitudine abdominis. *Spirifex.*
Syst. Ent. 347. 11.
Linn. Syst. Nat. 2. 942. 9.
Reaum. Inf. 6. tab. 28. fig. 5.
Schaeff. Icon. tab. 38. fig. 1.
Sulz. Hist. Inf. tab. 7. fig. 2.
 β. *Sphex aegyptia nigra*, petiolo abdominis pedumque articulatis flauis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 942. 10.
Muf. Lud. Vlr. 406.
 Habitat in Europa australi, Aegypto, in cylindris spiralibus sub tectis.
16. *S. nigra*, thorace hirto maculato, abdominis petiolo flauo longitudine abdominis. *madraspatana.*
 Habitat in Malabar. *Muf. Dom. Banks.*
 Affinis *S. spirificis*, at triplo minor. Caput cum antennis nigrum labio pube argentea. Thorax hirtus, niger, punctis duobus anticis, vnico ante alas lineolaque transuersa loco scutelli flauis. Abdomen atrum petiolo elongato flauo. Pedes quatuor antichi flauis femoribus basi nigris, postici flauis femoribus tibiisque apice nigris.
17. *S. nigra*, thorace maculato, abdomine coerulefcente, petiolo elongato rufo, fascia nigra. *clauus.*
Syst. Ent. 348.
 12. *
 Habitat in noua Hollandia. *Muf. Dom. Banks.*
18. *S. viridi cyanea*, thoracis lobo anteriore distincto, alis subferrugineis. *lobata.*
Syst. Ent. 348. 13. *
 Habitat in Africa aequinoctiali. *Muf. Dom. Banks.*
19. *S. viridis nitida*, femoribus quatuor posticis compressis ferrugineis. *compressa.*
 Habitat

Habitat in Malabar. *Muf. Dom. Banks.*

Affinis *S. lobatae*, at triplo minor. Antennae fuscae. Caput et thorax viridi aenea, nitida thorace antice attenuata lobo distincto. Abdomen petiolatum, ovatum, magis cyaneum. Pedes antiqui fusci femoribus in medio crassioribus. Postici quatuor cyanei femoribus compressis ferrugineis. Alae fuscae.

ichneumo- 20. *S. fulva*, abdomine nigro, basi ferrugineo. *Syst. Ent.*
nea. 348. 14.

Apis ichneumonea rostro corneo recto, abdomine petiolato, thoracis futuris auro nitentibus. *Linn. Syst. Nat.* 2. 959. 36.

Apis antennis filiformibus, capite thoraceque nigris auro maculatis, abdomine brunneo, apice nigro, pedibus testaceis. *Degeer Inf.* 2. 2. 105. tab. 32. fig. 13.

Habitat in America meridionali.

fispes. 21. *S. nigra*, abdominis petiolo femoribusque posticis incrassatis flavis.

Chrysis fispes atra, abdomine brevissimo, pedibus posticis clauatis denticulatis rufis. *Syst. Ent.* 359. 15.

Sphex fispes. *Linn. Syst. Nat.* 2. 943. 13. *Fn. Sv.* 1657. ?

Vespa femoribus posticis crassis globosis ferratis denticulo donatis, abdominis globosi petiolo tenui longo. *Geoff. Inf.* 2. 380. 16.

Sphex nigrifex. *Sulz. Hist. Inf.* tab. 27. fig. 1.

Habitat in Europa australiori.

Forte proprii generis animalculum. Antennae ab hoc genere differunt. Femora postica clauata, dentata, flava, macula magna nigra.

punctata. 22. *S. flava* nigro punctata femoribus posticis clauatis dentatis, abdomine conico.

Habitat in Europa.

Singulare insectum hic colloco ad ulteriorem examinationem. Caput mihi deest. Thorax flavus punctis maculisque nigris. Abdomen subpetiolatum, conicum, flavum apice nigrum. Pedes flavi femoribus posticis globosis, dentatis, puncto apicis baseosque nigris. Alae albae immaculatae.

** Abdomine fessili.

23. *S. nigra*, abdomine apice ferrugineo, alis cyaneis. *Syst. vespiformis.*
Ent. 348. 15. *
 Habitat in Malabar. *Dr. Koenig.*
24. *S. atra immaculata*, alis nigris. *Syst. Ent.* 349. 16. * *morio.*
 Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
 Varietatem vidimus simillimam fronte cinerascete articuloque primo antennarum ferrugineo.
25. *S. atro cyanea*, thoracis lobo antico fuluo. *Syst. Ent. collaris.*
 349. 17. *
 Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
26. *S. atra*, fronte thoracisque lobo antico flauis. *Syst. frontalis.*
Ent. 349. 18. *
 Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
27. *S. glabra atra*, abdomine apice ferrugineo, alis albidis. *analis.*
 Habitat in India orientali. *Mus. Dom. Banks.*
 Paulo maior *S. fusca*. Corpus totum atrum, immaculatum folis abdominis vltimis segmentis ferrugineis. Alae albae paulo cyaneo nitidae.
28. *S. glabra atra*, abdomine apice ferrugineo, alis nigris. *similis.*
 Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*
 Differt manifeste a praecedente duplo minor. Corpus totum glabrum, atrum vltimis duobus abdominis segmentis supra ferrugineis. Alae omnes obscurae, nigrae. Pedes nigri femoribus apice tibiisque ferrugineis.
29. *S. glabra atra*, abdomine basi ferrugineo. *Syst. Ent. fusca.*
 349. 19.
Sphex fusca atra laeuis, abdominis segmentis tribus anticis subferrugineis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 944. 16.
Fn. Sv. 1652.
Sphex nigra, antennis filiformibus. *Degeer Inf.* 2. 2. 147. tab. 28. fig. 6.
Ichneumon ater, abdomine subfessili, segmentis tribus anticis rufis, alis nigricantibus. *Geoff. Inf.* 2. 354. 74.

Vespa Ichneumon maior, capite, thorace et pedibus nigris, abdominis anteriore parte rubra, posteriore nigra. *Raj. Inf.* 254. 9.

Goed. Inf. 1. tab. 58.

Habitat in Europae fabuletis, laruas attrahens, sepeliens.

viatica. 30. *S.* pubescens nigra, alis fuscis, abdomine antice ferrugineo, cingulis nigris. *Syst. Ent.* 349. 20. *Linn. Syst. Nat.* 2. 943. 15. *Fn. Sv.* 1651.

Sphex nigra hirta, antennis filiformibus, petiolo breui, alis fuscis, abdomine antice rufo, postice nigro. *Degeer Inf.* 2. 2. 153. 6. tab. 28. fig. 16.

Ichneumon niger, abdominis segmentis tribus anticis fuluis, alis nigris. *Geoff. Inf.* 2. 354. 74.

Frisch. Inf. 2. tab. 1. fig. 13.

Habitat in Europae fabuletis, laruas imposito ouo sepeliens.

cingulata. 31. *S.* nigra, fronte, thoracis striga antica abdominisque segmentorum marginibus cinereis. *Syst. Ent.* 350. 21.*

Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

nigra. 32. *S.* nigra, abdomine sessili, segmentorum marginibus lucidis. *Syst. Ent.* 350. 22.

Habitat in Europae fabulosis.

punctum. 33. *S.* nigra, ano puncto albo.

Habitat in Italia. *D. Allioni.*

Parua. Duplo praecedente minor. Corpus totum nigrum. Abdomen terminatur puncto albo, paruo. Alae hyalinae, immaculatae.

gibba. 34. *S.* nigra, abdomine ferrugineo, apice fusco, alis anticis apice fuscis. *Syst. Ent.* 350. 23. *Linn. Syst. Nat.* 2. 946. 33. *Fn. Sv.* 1658.

Scop. carn. 570.

Habitat in Europae fabuletis.

fasciata. 35. *S.* nigra, antennis rufis, alis albis, fasciis duabus fuscis. *Syst. Ent.* 350. 24.*

Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

36. *S. cinerea*, abdominis segmentis basi atris, apice fuscis. *Syst. Ent.* 350. 25. *
Habitat in noua Hollandia. Mus. Dom. Banks.
37. *S. nigra*, abdominis segmento secundo ferrugineo. *tropica.*
Syst. Ent. 350. 26.
Sphex tropica nigra, oculis albis, abdominis segmento secundo latiori ferrugineo. *Linn. Syst. Nat.* 2. 945. 27. *Mus. Lud. Vlr.* 408.
Habitat in America meridionali.
38. *S. thorace tomentoso aureo*, abdomine ferrugineo, *fugax.*
 alis flavescentibus, fascia fusca. *Syst. Ent.* 350. 27. *
Habitat in noua Hollandia. Mus. Dom. Banks.
39. *S. ferruginea*, thorace postice aureo, alis flavescentibus. *Syst. Ent.* 351. 28. *
Habitat in noua Hollandia. Mus. Dom. Banks.
40. *S. atra*, abdominis segmentis vtrinque puncto albo, *rufipes.*
 alis apice fuscis. *Syst. Ent.* 351. 29. *Linn. Syst. Nat.* 2. 945. 29. *Fn. Sv.* 1659.
Habitat in Europae fabuletis.
Varietatem vidi thorace postice ferrugineo, vix tamen distinctam.
41. *S. atra*, capite thoraceque rufis. *Syst. Ent.* 351. 30. *nigricornis.*
Habitat in noua Hollandia. Mus. Dom. Banks.
42. *S. nigra*, abdomine rufo, apice atro, alis apice fuscis, *exaltata.*
 puncto albo. *Syst. Ent.* 351. 31. *
Habitat in Europa.
43. *S. atra*, thorace antice fascia cinerea, abdomine rufo, *abdominalis.*
 alis apice fuscis. *Syst. Ent.* 351. 32. *
Habitat in Brasilia. Mus. Dom. Banks.
44. *S. nigra*, antennis, tibiis alisque testaceis, his apice fuscis. *Syst. Ent.* 347. 8. *Linn. Syst. Nat.* 2. 942. 4.
Mus. Lud. Vlr. 407.
Habitat in Africa.
45. *S. atra*, alis cyaneis. *nigrita.*
Habitat in Malabaribus. Mus. Dom. Banks.
Fabr. Spec. Inf. F f *Statura*

Statura et magnitudo omnino praecedentis. Corpus totum atrum, immaculatum. Alae cyanae, nitidae.

- turcica*. 46. S. nigra, thorace antice fascia cinerea, abdomine rufo, alis nigris. *Syst. Ent.* 351. 33. *
Habitat in Brasilia. *Mus. Dom. Banks.*
- villosa*. 47. S. nigra, abdomine villosa testaceo, alis atris. *Syst. Ent.* 352. 34. *
Habitat in Malabar. *D. Koenig.*
- flava*. 48. S. atra, dorso anoque ferrugineis, alis flavis apice fuscis. *Syst. Ent.* 352. 35. *
Habitat in India orientali.
- bicolor*. 49. S. atra, capite abdominis apice alisque flavis, his apice fuscis. *Syst. Ent.* 352. 36. *
Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
- flavicornis*. 50. S. atra, labio antennis pedibusque ferrugineis. Habitat in Malabar. *Mus. Dom. Banks.*
Maior S. ruficorni. Caput nigrum labio antennisque totis ferrugineis. Corpus atrum, immaculatum. Alae cyanae. Pedes ferruginei femoribus basi nigris. Tibiae posticae ferratae.
- ocellata*. 51. S. atra, pedibus testaceis, alis cyaneis, anticis macula ocellari ferruginea. Habitat in Africa aequinoctiali.
Magna. Antennae nigrae articulo primo crassiori piceo. Caput nigrum oculis pallidis oreque ferrugineo. Thorax et abdomen glabra, atra, immaculata. Alae omnes cyanae, anticis macula media ferruginea puncto cyaneo. Pedes omnes testacei. Tibiae posticae ferratae.
- ruficornis*. 52. S. cyanea, antennis rufis. *Syst. Ent.* 352. 37. *
Habitat in America meridionali.
- coerulea*. 53. S. coerulea, alis apice albicantibus. *Syst. Ent.* 352. 38. *
Sphex coerulea alis ferrugineis basi nigris. *Linn. Syst. Nat.* 2. 947. 38.
Sphex auripennis nigra coeruleo nitida, alis ferrugineo aureis

aureis basi nigris apice albicantibus, antennis apice ferrugineis. *Degeer Inf.* 2. 2. 585. tab. 30. fig. 1.

Sphex rubra. *Drury Inf.* 2. tab. 39. fig. 6.

Habitat in America meridionali.

Variat alis ferrugineis basi nigris, et nigris macula media ferruginea. Apex alarum semper albicat.

113. T I P H I A.

1. T. nigra, femoribus quatuor posticis angulatis rufis, *femorata*.
Syst. Ent. 353. 1. *
Habitat in Anglia.
2. T. nigra, thorace maculato, abdomine fasciis quinque *scincta*.
flavis, secunda interrupta. *Syst. Ent.* 353. 2. *
Habitat in Europa, Anglia. *Mus. Dom. Banks.*
3. T. thorace nigro flavo vario, abdomine flavo. *variata*.
Habitat in Sibiria. *Pallas. Mus. Dom. Banks.*
Media. Antennae nigrae. Caput nigrum ore flavo fronteque pube argentea. Thorax niger margine antico macula magna ante alas scutelloque flavis. Abdomen flavum fascia vna alteraue atra. Anus incurtus, ater.
4. T. nigra, abdomine vtrinque maculis quinque flavis, *haemorrhoidalis*.
ano pedibusque rufis. *Syst. Ent.* 353. 3. *
Habitat in America meridionali. *D. v. Rohr.*
5. T. nigra, thorace macula dorsali rufa. *Syst. Ent.* 353. 4. * *ephippium*.
Habitat in America meridionali. *Dom. v. Rohr.*
6. T. hirta nigra, thorace antice rufescente, abdominis *radula*.
segmento secundo tertioque flavis. *Syst. Ent.* 354. 5. *
Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
7. T. nigra, abdomine fasciis tribus flavis, ano pedibus- *tricineta*.
que ferrugineis. *Syst. Ent.* 354. 6. *
Habitat in America meridionali. *Dom. v. Rohr.*
8. T. atra, thorace antice cinereo villosa, postice retuso, *collaris*.
alis cyaneis. *Syst. Ent.* 354. 7. *
Habitat in Malabaria. *D. Koenig.*

- pedestris*. 9. T. aptera nigra flavo variegata, thorace compresso.
Syst. Ent. 354. 8. *
 Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

II4. SCOLIA.

- atrata*. 1. S. hirta nigra, alis ferrugineis apice nigris. *Syst. Ent.*
 355. 1. *
 Habitat in America. *Dom. Drury.*
- morio*. 2. S. atra, alis cyaneis.
 Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*
 Corpus medium atrum, immaculatum. Alae cyanae
 puncto paruo transuerso ad marginem crassiore
 alae anticae.
- nigrita*. 3. S. atra, alis albis, costa atra.
 Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*
 Statura praecedentis, tota atra, immaculata. Alae omnes
 albae margine exteriori late atro, qui tamen in alis
 posticis apicem haud attingit.
- maculata*. 4. S. hirta nigra, abdomine maculis quatuor fuluis. *Syst.*
Ent. 355. 2. *
Sphex maculata. Drury Inf. 2. tab. 39. fig. 2.
 Habitat in America boreali.
- flauifrons*. 5. S. atra, fronte flaua, abdomine maculis quatuor flauis.
Syst. Ent. 355. 3. *
Sphex bidens. Sulz. Hist. Inf. tab. 27. fig. 3.
 Habitat in Italia. *D. Allioni.*
- 6maculata*. 6. S. hirta atra, abdomine maculis trium parium flauis.
 Habitat in Italia. *D. Allioni.*
 Statura omnino praecedentium, at paullo minor. Cor-
 pus atrum macula flaua ante et pone oculos. Abdo-
 men maculis sex flauis, quarum posticae fere coeunt.
- 2maculata*. 7. S. hirta atra, abdomine maculis duabus luteis, anten-
 nis flauis.
 Habitat in America boreali. *Mus. Dom. Teats.*
 Praecedentibus minor. Antennae flavae primo articulo
 nigro. Corpus hirtum, nigrum. Maculae duae gla-
 brae,

brac, luteae in tertio abdominis segmento. Alae apice fuscae.

8. *S. hirta ferruginea*, alis apice fuscis. *Syst. Ent.* 355. 4. * *ferruginea.*
Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
9. *S. hirta nigra*, abdomine fasciis quatuor flauis. *Syst. radula.*
Ent. 355. 5. *
Sphex plumipes. *Drury Inf.* 1. tab. 44. fig. 5.
Habitat in America boreali.
10. *S. cinereo hirta*, abdomine cyaneo, fasciis quinque *5fasciata.*
flauis.
Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*
Magna. Antennae nigrae. Caput et thorax pube densa,
cinerea tecta. Abdomen cylindricum, cyaneum, nitidum fasciis quinque flauis, posterioribus obsoletioribus. Anus tridentatus. Alae fuscescentes. Pedes hirti, fusci.
11. *S. hirta atra*, abdomine fasciis duabus flauis, alis cyaneo atris. *Syst. Ent.* 356. 6. * *2cinctā.*
Sphex radula. *Sulz. Inf.* tab. 27. fig. 4.
Habitat in America. *Mus. Dom. Banks.*
12. *S. hirta atra*, vertice fuluo. *Syst. Ent.* 356. 7. * *verticalis.*
Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
13. *S. atra*, abdomine punctis quatuor rufis, alis cyaneis. *4pustulata.*
Habitat in Malabaria. *Mus. Dom. Banks.*
Statura praecedentium, tota atra. Abdominis segmentum secundum et tertium vtrinque puncto rufo, posteriori maiori. Alae omnes cyanae, nitidae.
14. *S. nigra*, abdomine medio rufo apice nigro, punctis *5punctata.*
quinque albis.
Habitat in Germania.
Parua. Antennae petiolatae, nigrae. Caput nigrum, puncto paruo albo in orbita oculorum. Thorax niger antice vtrinque puncto albo. Abdominis segmentum primum atrum, 2. 3. rufa, reliqua atra punctis quinque albis 2. 2. 1. quorum duo intermedia minutissima, Pedes breues, nigri.

- 4guttata*. 15. S. atra, abdomine punctis quatuor albis, alis hyalinis. Habitat in Germania. *Dom. de Hattorf*.
Affinis S. coliae 4punctatae, at paullo minor. Antennae petiolatae, nigrae, subtus ferrugineae. Caput nigrum fronte alba. Thorax niger, immaculatus. Abdomen atrum, nitidum punctis vtrinque duobus transuersalibus albis. Alae hyalinae, immacolatae. Pedes nigri.
- 4punctata*. 16. S. atra, abdomine punctis quatuor albis, alis ferrugineo fuscis. *Syst. Ent.* 356. 8. *
Habitat in Italia.
- sexcincta*. 17. S. nigra flavo maculata, abdomine atro, strigis sex flavis. *Syst. Ent.* 356. 9. *
Habitat in America. *Dom. v. Rohr*.
- interrupta*. 18. S. nigra cinereo hirta, abdomine atro, fasciis sex flavis, anticis tribus interruptis, ano tridentato. Habitat in Italia. *D. Allioni*.
Affinis videtur S. coliae 7cinctae. Antennae nigrae. Caput cinereo hirtum labio basi vtrinque lineola flava. Thorax niger cinereo pubescens punctis tribus scutellaribus flavis. Abdomen pubescens, atrum, fasciis sex flavis anticis tribus interruptis, quarto vtrinque puncto nigro. Anus dentibus tribus validis. Pedes nigri, tibiis quatuor anticis supra flavis. Alae albae costa anteriorum ferruginea.
- 7cincta*. 19. S. cinereo hirta, abdomine coerulecente, fasciis septem flavis, ano tridentato. *Syst. Ent.* 356. 10. *
Habitat in nova Hollandia. *Mus, Dom. Banks*.

115. CHRYSIS.

- splendida*. 1. C. coerulea nitida, ano quadridentato. *Syst. Ent.* 357. 1. *
Habitat in Malabar. *D. Koenig*, in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks*.
Corpus totum coeruleum viridi colore nitens.
- smaragdula*. 2. C. viridis nitida, ano sexdentato coeruleo. *Syst. Ent.* 357. 2. *
Habitat in America boreali. *Mus, Dom. Banks*.

3. *C. coerulea nitida*, abdomine aureo, ano quadridentato coeruleo. *calens.*
 Habitat in Sibiria. *D. Pallas. Mus. Dom. Banks.*
 Magnitudo praecedentis. Antennae fuscae. Caput et thorax coerulea, nitida scutello prominente concauo. Abdomen aureum nitidum ano coeruleo quadridentato. Pedes coerulei apice fusci.
4. *C. viridis nitens*, abdomine vtrinque macula ocellari aurea, ano sexdentato coeruleo. *Syst. Ent. 357. 3.**
 Habitat in Malabaria. *D. Koenig.*
5. *C. viridis nitida*, abdominis secundo segmento vtrinque oculo coerulefcente, scutello prominulo acuto. *Syst. Ent. 357. 4.**
 Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Drury.*
6. *C. glabra nitida*, thorace abdominisque primo segmento viridibus, reliquis carneis, ano ferrato. *Syst. Ent. 357. 5.**
 Habitat in Italia. *D. Allioni.*
7. *C. glabra nitida*, thorace abdominisque primo segmento coeruleis, reliquis aureis, ano quadridentato. *fulgida.*
Linn. Syst. Nat. 2. 948. 7. Fn. Sv. 1669.
 Habitat in Europa.
 Paulo maior *C. ignita*.
8. *C. glabra nitida*, thorace viridi, abdomine aureo apice quadridentato. *ignita.*
Syst. Ent. 358. 6. Linn. Syst. Nat. 2. 947. 1. Fn. Sv. 1665.
Chryfis viridis nitida, thorace postice coeruleo, abdomine aureo quadridentato. *Degeer Inf. 2. 2. 155. 1. tab. 28. fig. 17. 18.*
Vespa thorace viridi coeruleo, abdomine inaurato pone cupreo dentato. Geoff. Inf. 2. 382. 20.
Frisch. Inf. 9. tab. 10. fig. 1.
Sulz. Inf. tab. 19. fig. 121.
Schaeff. Elem. tab. 40.
Icon. tab. 74. fig. 7. 8.
 Habitat in Europae muris.

- bidentata*. 9. *C. glabra nitida cyanea*, thorace bidentato abdominisque segmentis duobus primis aureis. *Syst. Ent.* 358. 7. *Linn. Syst. Nat.* 2. 947. 2.
Chryfis cyanea nitida, abdomine macula magna nigra, alis apice fuscis. *Degeer Inf.* 2. 2. 159. 2. tab. 29. fig. 3. 4.
 Habitat in Europa.
 Anus dentibus tribus breuissimis.
- succincta*. 10. *C. glabra viridis nitens*, thorace fascia coccinea, abdomine aureo subtridentato. *Syst. Ent.* 358. 8. *Linn. Syst. Nat.* 2. 947. 3.
 Habitat in Europa boreali.
- lucidula*. 11. *C. glabra viridis nitens*, thorace antice abdomineque aureis, ano integro. *Syst. Ent.* 358. 9. *
Vespa viridi coerulea, abdomine thoracisque antica parte ruberrimis. *Geoff. Inf.* 2. 382. 19.
Sphex nobilis. *Scop. carn.* 792.
 Habitat in Europa australiori.
- feruida*. 12. *C. glabra aurea nitida*, abdomine subtus atro.
 Habitat in Italia. *D. Allioni*.
 Parua magnitudine *C. auratae*. Caput, thorax, abdomen aurea, glabra, nitida, sub alis cyanea. Abdomen subtus atrum. Pedes atrii.
- aurata*. 13. *C. glabra nitens*, thorace viridi, abdomine aureo, ano bidentato. *Syst. Ent.* 359. 10. *Linn. Syst. Nat.* 2. 948. 4. *Fn. Sv.* 1665.
Vespa thorace viridi coeruleo, abdomine aurato, cupreo pone inermi. *Geoff. Inf.* 2. 383. 27.
Schaeff. Icon. tab. 42. fig. 5. 6.
 Habitat in Europae muris.
- cyanea*. 14. *C. glabra nitens*, thorace abdomineque coeruleis, ano tridentato. *Syst. Ent.* 359. 11. *Linn. Syst. Nat.* 2. 948. 5. *Fn. Sv.* 1667.
Vespa coerulea nitens. *Geoff. Inf.* 2. 384. 23.
Schaeff. Icon. tab. 81. fig. 5.
Scop. carn. 697.
 Habitat in Europae muris.

15. *C. viridis nitens*, ano quadridentato cœruleo. *Syst. amethy-
Ent. 359. 12. ** *stina.*
Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
16. *C. viridis nitens*, thorace postice bidentato, ano qua- *nitidula.*
dridentato. *Syst. Ent. 359. 13. **
Habitat in America. *Mus. Dom. Banks.*
17. *C. aurea*, abdomine ferrugineo apice cyanea. *Syst. semiaura-
Ent. 359. 14.* *ta.*
Sphex semiaurata viridis nitida, abdomine ferrugineo
apice nigro. *Linn. Syst. Nat. 2. 946. 35. Fn. Sv. 1661.*
Vespa capite thoraceque rubro cupreo, abdomine rufo
pone nigro. *Geoff. Inf. 2. 384. 24.*
Habitat in Europa boreali.

116. T H Y N N V S.

1. *T. abdomine atro*, segmento secundo tertio quartoque *dentatus.*
punctis duobus albis. *Syst. Ent. 360. 1. **
Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
2. *T. abdomine nigro*, segmentis fascia interrupta flaua, *emargi-
scutello emarginato. Syst. Ent. 360. 2. ** *natus.*
Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
3. *T. ater*, abdominis segmentis margine villoso cinereis, *integer.*
ano integro. *Syst. Ent. 360. 3. **
Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

117. L E V C O S P I S.

1. *Leucospis. Syst. Ent. 361. 1. ** *dorsifera.*
Sphex dorsifera. Sulz. Hist. Inf. tab. 27. fig. 11.
Habitat in Italia. *D. Allioni.*

118. B E M B E X.

1. *B. labio superiori rotundato integro*, corpore nigro *signata.*
flauoque vario. *Syst. Ent. 361. 1.*
Vespa signata thorace supra nigro, lincis quatuor fascio-
F f 5 *lisque*

lisque duabus flavis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 952. 24.
Mus. Lud. Vlr. 410.

Vespa signata. *Sulz. Hist. Inf.* tab. 27. fig. 9.

Habitat in America meridionali.

punctata. 2. B. labio superiori integro, abdominis segmentis atris, punctis quatuor flavis. *Syst. Ent.* 361. 2. *
Habitat in Brasilia. *Mus. Dom. Banks.*

rostrata. 3. B. labio superiori conico fisso, abdomine atro, fasciis glaucis repandis. *Syst. Ent.* 362. 3.
Apis rostrata labio superiori conico inflexo, abdominis fasciis glaucis repandis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 957. 25. *Fn. Sv.* 1700. *Iter Gotl.* 336.
Habitat in Europae monticulis arenosis, in singulis nidis vnico pullo.

fasciata. 4. B. labio rotundato, nigra, abdomine fasciis sex flavis, anterioribus quinque interruptis.
Habitat in Italia. *D. Allioni.*
Magnitudo praecedentis. Antennae nigrae articulo primo subtus flavo. Caput cinereo pubescens labio rotundato flavo. Thorax fuscus, cinereo pubescens, immaculatus. Abdomen atrum, nitidum fasciis sex flavis, anterioribus quinque interruptis. Pedes flavi femoribus nigris.

119. V E S P A.

cinerea. 1. V. nigra, thorace obscure maculato, abdomine atro, fascia ferruginea. *Syst. Ent.* 362. 1. *
Sphex tropica. *Sulz. Hist. Inf.* tab. 27. fig. 5.
Habitat in Malabaria. *D. Koenig.*
Varietas minor thorace immaculato e Promontorio bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*

ephippium. 2. V. abdomine ferrugineo, segmento secundo maiori atro, scutello tridentato. *Syst. Ent.* 362. 2. *
Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

orientalis. 3. V. ferruginea, abdomine fascia flava vtrinque bipunctata. *Syst. Ent.* 363. 3. *

Vespa orientalis fusca, abdominis segmento tertio quartoque flavis, punctis duobus nigris. *Linn. Mant.* 540.

Vespa turcica. *Drury Inf.* 2. tab. 39. fig. 1.?

Habitat in Oriente.

4. *V. ferruginea*, abdomine atro, fasciis tribus interruptis *tricincla*.
flavis. *Syst. Ent.* 363. 4. *
Habitat in America. *Mus. Dom. Banks.*

5. *V. nigricans*, abdominis primo et secundo segmento basi *analis*.
ferrugineis, sexto toto flavo. *Syst. Ent.* 363. 5. *
Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*

6. *V. thorace lineolis nigris tribus*, corpore ferrugineo, *carolina*.
alis anticis nigricantibus. *Syst. Ent.* 363. 6. *Linn.*
Syst. Nat. 2. 948. 1.
Habitat in America boreali.
Magnitudo *V. crabronis*.

7. *V. ferruginea*, abdomine alisque atris, mandibulis por- *cornuta*.
rectis capite longioribus. *Syst. Ent.* 363. 7. *
Vespa cornuta rostro corneo subulato, abdomine atro,
segmento secundo maiore. *Linn. Syst. Nat.* 2. 951.
20. *Mus. Lud. Vlr.* 409.
Apis cornuta. *Drury Inf.* 2. tab. 48. fig. 3.
Habitat in Africa aequinoctiali.
Mandibulae semper porrectae, in altero sexu cornutae.

8. *V. thorace nigro antice rufo immaculato*, abdominis in- *crabro*.
cisuris puncto nigro duplici contiguo. *Syst. Ent.* 364.
8. *Linn. Syst. Nat.* 2. 948. 3. *Geoff. Inf.* 2. 368. 1.

Vespa nigra luteaque, capite postice, thorace antice, antennarumque primo articulo testaceis. *Degeer Inf.* 2. 132. tab. 27. fig. 9. 10.

Scop. carn. 824.

Mouff. Inf. 50.

Raj. Inf. 250.

Frisch. Inf. 9. tab. 11. fig. 1.

Swammerd. Bibl. Nat. tab. 26. fig. 9.

Reaum. Inf. 6. tab. 18. fig. 1.

— — 4. tab. 10. fig. 9.

Schaeff. Icon. tab. 53. fig. 5.

— — tab. 136. fig. 3.

Habitat sub arborum radicibus. Apibus insidiatur.

- vulgaris.* 9. V. thorace vtrinque lineola interrupta, scutello quadrimaculato, abdominis incisuris punctis nigris distinctis. *Syst. Ent.* 364. 9. *Linn. Syst. Nat.* 2. 949. 4. *Fn. Sv.* 1671.
Vespa thorace lineolis trium parium differentium flavescentium. *Geoff. Inf.* 2. 369. 2.
Vespa nigra luteaque, antennis totis nigris. *Degeer Inf.* 2. 2. 111. tab. 26. fig. 7.
Vespa vulgaris *Raj. Inf.* 256.
Scopol. carniol. 825.
Reaum. Inf. 6. tab. 12. fig. 7. 8.
Frisch. Inf. 9. tab. 12. fig. 2.
Swammerdam Bibl. tab. 26. fig. 8.
Schaeff. Elem. tab. 130.
 — — *Icon.* tab. 35. fig. 4.
 Habitat sub Europae tectis, praedatur Muscas, furatur mel Apum.
- gallica.* 10. V. thorace vtrinque lineola, scutello sexmaculato, abdominis incisuris flavis: secunda bimaculata.
Linn. Syst. Nat. 2. 949. 7.
 Habitat in Europa australiori.
 Affinis *V. vulgari*, at minor.
- rufa.* 11. V. thorace vtrinque lineola, scutello bipunctato, abdomine flavo antice ferrugineo. *Syst. Ent.* 364. 10.
Linn. Syst. Nat. 2. 948. 5. *Fn. Sv.* 1672.
 Habitat in Europa boreali.
- norwegica.* 12. V. thorace vtrinque lineola, scutello immaculato, abdominis segmentis margine flavis, secundo vtrinque macula rufa.
 Habitat in Norwegia. *Dom. Lund.*
 Affinis praecedentibus. Caput nigrum ore flavo. Thorax pubescens niger lineola vtrinque flava. Scutellum omnino immaculatum. Abdomen atrum segmentorum marginibus flavis. Macula magna rufa in secundo segmento.
- maculata.* 15. V. nigra, thorace albo maculato, scutello quadrimaculato, abdomine postice albo. *Syst. Ent.* 364. 11.
Linn. Syst. Nat. 2. 948. 2. *Amoen. acad.* 6. 412. 91.

Vespa nigra, thoracis lateribus apiceque abdomineque postice sulphureo maculatis. *Degeer Inf.* 3. 584. 9. tab. 29. fig. 13.

Habitat in America boreali.

14. *V. nigra*, thorace flavo maculato, abdomine fasciis arenariis sex dentatis luteis: prima lineari interrupta *Syst. Ent.* 365. 12. *

Habitat in Americae arenosis, fauos struens planos, horizontales, incumbentes, cellis hexagono prismaticis, deorsum spectantibus. Delectatur fructibus dulcibus, eorumque succis expressis. *Mus. Dom. Banks.*

15. *V. thoracis dorso nigro: lineis duabus flavis, scutello flavo, lineola nigra. Syst. Ent.* 365. 13. *

Habitat in America *Dom. Drury.*

16. *V. flavas, thoracis dorso nigro: punctis quatuor ferrugineis. Syst. Ent.* 365. 14. *

Habitat in Brasilia. *Mus. Dom. Banks.*

17. *V. fusca, capite ferrugineo, antennis medio nigris, Syst. Ent.* 365. 15. *

Habitat in Brasilia. *Mus. Dom. Banks.*

18. *V. fusco ferruginea, fronte flavescente, antennis unicoloribus. schach.*

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

Nivis praecedenti affinis. Antennae ferrugineae, immaculatae. Corpus totum fusco ferrugineum, immaculatum, abdominis apice tamen paullo pallidior. Frons flauicat. Alae ferrugineae.

19. *V. fusca, genibus, antennarum apicibus margineque primi segmenti flavis. Syst. Ent.* 366. 16. *Linn. annularis, Syst. Nat.* 2. 950. 9. *Amoen. acad.* 6. 413. 93.

Vespa nigro fusca, thoracis lateribus rubris, abdomine fascia tarsisque flavis. *Degeer Inf.* 3. 583. 7. tab. 29. fig. 11.

Habitat in America boreali.

20. *V. fusca, abdomine cinerascente, segmenti primi humilis, margine flavescente.*

Habi-

Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

Nimis praecedenti affinis. Caput et thorax fusca, ferrugineo paullo mixta. Labium mox flauescens, mox fuscum. Abdomen cinerascens, obscurum margine primi segmenti tenuissime flauo. Alae ferrugineo fuscae. Pedes ferruginei femoribus fuscis.

tepida. 21. V. nigra, thorace lobo antico punctisque duobus abdomine apice ferrugineis. *Syst. Ent.* 366. 17. *

Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

aestuans. 22. V. thoracis dorso atro, scutello quadripunctato, abdomine atro, segmento primo et secundo maculis duabus albis.

Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*

Magna. Caput nigrum labio oreque ferrugineis. Maxillae porrectae, exsertae fere longitudine antennarum. Antennae ferrugineae. Thorax subtus ferrugineus dorso atro. Macula vtrinque pallida in margine antico. Puncta quatuor alba in scutello, quorum duo postica eleuata, fere spinosa. Abdomen ouatum, atrum primo segmento basi ferrugineo apice maculis duabus albis. Segmentum secundum maculis duabus maioribus transuersis albis. Alae et pedes ferruginei.

calida. 23. V. nigra, abdomine apice fuluo. *Syst. Ent.* 366. 18. *

Vespa calida nigra, abdominis apice antennisque fuluis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 952. 27.

Habitat in Africa aequinoctiali.

haemorrhoidalis. 24. V. nigra, thorace antice abdomineque postice ferrugineis, alis flauis basi atris. *Syst. Ent.* 366. 19. *

Habitat ad Cap. Bon. Spei. *Mus. Dom. Banks.*

albifrons. 25. V. atra, labio abdominisque fascia niueis. *Syst. Ent.* 366. 20. *

Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

concinna. 26. V. nigra, abdomine ferrugineo, segmento secundo toto atro. *Syst. Ent.* 367. 21. *

Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

27. *V. atra*, scutello abdominisque fascia bascos albis. *uncinata*.
Syst. Ent. 367. 22. *
Vespa quadridens atra, thorace quadridentato, scutello primoque segmento abdominis niueis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 951. 15. *Amoen. acad.* 6. 413. 92. At thorax in nostra omnino inermis.
Vespa cincta nigra, alis fusco violaceis, thorace maculis tribus, abdomine fascia sulphureis. *Degeer Inf.* 3. 584. 8. tab. 29. fig. 12.
 Habitat in America.
28. *V. nigra*, labiis pedibusque rufis. *Syst. Ent.* 367. 23. * *rufipes*.
 Habitat in Insulis Oceani pacifici. *Mus. Dom. Banks.*
29. *V. thorace postice lineolis duabus flavis, abdomine ferrugineo, segmento primo tertioque nigris, margine flauo.* *Syst. Ent.* 367. 24. * *marginalis*.
 Habitat ad Cap. Bon. Spei. *Mus. Dom. Banks.*
30. *V. ferruginea, abdominis segmento secundo nigro: macula vtrinque ocellari lutea.* *oculata*.
 Habitat in Italia. *Dr. Alioni*.
 Statura *V. dorsalis*. Caput cum antennis obscure ferrugineum. Thorax ferrugineus macula magna dorsali nigra. Abdomen ouatum segmento primo ferrugineo, secundo nigro vtrinque macula magna ocellari lutea, reliqua breuissima, ferruginea. Alae ferrugineae apice nigrae. Pedes ferruginei.
31. *V. ferruginea, abdominis primo segmento macula nigra margineque flauo.* *Syst. Ent.* 367. 25. * *dorsalis*.
 Habitat in America boreali. *Lewin*.
32. *V. nigra, thorace punctis duobus, scutello bipuncta-* *parietum*.
 to, abdomine fasciis quinque flavis, prima remotissima. *Syst. Ent.* 368. 26. *Linn. Syst. Nat.* 2. 949. 6. *Fn. Sv.* 1673. et 1679.
Vespa nigra, abdomine fasciis quinque flavis, prima remotissima. *Geoff. Inf.* 2. 376.
Roef. Inf. 2. *Vesp.* tab. 17. fig. 8.
Frisch. Inf. 9. tab. 12. fig. 1.
 Habitat in foraminibus parietum ligneorum.

- tridentens.* 33. V. nigra, abdomine fasciis quinque flavis, ano tridentato.
Habitat in Italia. *Dr. Alioni.*
Parua duplo praecedente minor. Antennae nigrae. Caput nigrum labio flavo: Thorax niger puncto subalis flavo. Abdomen nigrum segmentorum marginibus flavis. Anus tridentatus. Pedes flavi femoribus nigris.
- ferripes.* 34. V. nigra, abdomine fasciis quinque flavis, tibiis serrato spinosis.
Habitat in America boreali. *Mus. Dom. Banks.*
Media. Antennae nigrae articulo secundo tertioque rufis. Caput nigrum maculis tribus, sub antennis punctis duobus pone oculos fulvis. Thorax niger punctis duobus anticis, scutello punctisque duobus posticis flavis. Abdomen atrum fasciis sex flavis, prima fere interrupta. Pedes flavi tibiis omnibus serrato spinosis. Alae fuscae.
- muraria.* 35. V. nigra, thorace maculis duabus luteis, abdomine fasciis quatuor flavis, prima remotissima. *Syst. Ent.* 368. 27. *Linn. Syst. Nat.* 2. 950. 8. *Fn. Sv.* 1674.
Scopol. carn. 828.
Frisch. Inf. 9. tab. 12. fig. 8. 9.
Schaeff. Icon. tab. 24. fig. 3.
Habitat in Europae muris.
Scutellum immaculatum.
- spinipes.* 36. V. nigra, abdomine fasciis quinque flavis, femoribus intermediis denticulatis. *Syst. Ent.* 368. 28. *Linn. Syst. Nat.* 2. 950. 10. *Fn. Sv.* 1682.
Habitat in Europa boreali.
- bidens.* 37. V. nigra, thorace bispinoso, abdominis segmentis tribus margine luteis. *Syst. Ent.* 368. 29. *Linn. Syst. Nat.* 2. 951. 16.
Habitat in Europa boreali.
Scutellum bipunctatum.
- 2fasciata.* 38. V. nigra, thorace immaculato, abdomine fasciis duabus flavis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 950. 14. *Fn. Sv.* 1683.

Habitat in Europa boreali.

Antennae nigrae. Labium flavum.

39. *V. nigra*, thorace maculato, abdomine fasciis duabus *scintilla*.
flavis.

Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*

Parua a praecedente distincta. Antennae nigrae. Caput nigrum puncto inter antennis duobusque ad basin labii flavis. Thorax niger punctis duobus anticis, duobus ante alas quatuorque loco scutelli flavis. Abdomen glabrum, atrum fasciis duabus flavis.

40. *V. abdominis fasciis quatuor flavis, tertia interrupta. arvensis.*
Syst. Ent. 368. 30. *Linn. Syst. Nat.* 2. 950. 12. *Fn. Sv.* 1678.

Vespa primo abdominis segmento pyriformi fasciisque tribus flavis. *Geoff. Inf.* 2. 375. 7.

Degeer Inf. 2. 2. 146. 3.

Schaeff. Icon. tab. 93. 8.

Habitat in Europae muris.

41. *V. nigra*, thorace lineola punctis duobus scutelloque *campe-*
flavis, abdomine fasciis quatuor flavis, prima inter-
rupta. *Syst. Ent.* 369. 31. *stris.*

Vespa campestris nigra, thorace lituris quatuor abdominisque fasciis quatuor flavis, prima interrupta.

Linn. Syst. Nat. 2. 950. 13. *Fn. Sv.* 1677.

Habitat in Europae parietibus.

42. *V. nigra*, abdomine atro nitido, fasciis sex flavis. *sexfascia-*
Habitat in Italia. *D. Allioni.* *ia.*

Parua. Antennae supra nigrae, subtus flavae. Caput nigrum labio punctoque inter antennis flavis. Thorax niger striga marginis anterioris flava. Abdomen atrum, nitidum segmentis margine flavis, fascias sex constituentibus. Pedes flavi femoribus nigris.

43. *V. ferruginea*, abdomine fasciis quinque flavis, antennis medio nigris, apice flavis. *Syst. Ent.* 369. 32. *tricolor.*

Habitat in Iamaica.

44. *V. thorace maculato, abdomine fasciis quatuor punctis. bipuncta-*
que duobus primi segmenti flavis. *Syst. Ent.* 369. 33. *ia.*

Habitat in Germania. *Dom. de Hattorf,*

Fabr. Spec. Inf.

G g

45. *V.*

- flauipes.* 45. V. thorace maculato, abdomine fasciis tribus punctisque duobus primi segmenti flauis. *Syst. Ent.* 369. 34. *
Habitat in America. *Dom. Lewin.*
- variabilis.* 46. V. nigro ferrugineoque varia, abdomine flauo, segmento primo macula, secundo toto nigris.
Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
Statura praecedentium. Caput et thorax ferrugineo nigroque varia. Labium interdum flauescens. Maculae duae flauae sub scutello. Abdomen flauicans. Primum segmentum macula magna nigra, secundum totum atrum, tertium basi atrum. Reliqua flaua. Pedes ferruginei.
Variat rarius colore abdominis magis nigro.
- cinerascens.* 47. V. nigra, thorace postice vtrinque subspinoso, alis violaceis. *Syst. Ent.* 369. 35. *
Habitat in America. *Dom. v. Rohr.*
- tefla.* 48. V. thorace nigro, lobo antico abdomineque ferrugineis, dorso nigro.
Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*
Media. Antennae ferrugineae. Caput nigrum labio poeneque oculos flauum. Thorax niger lobo antico et postico ferrugineis. Abdomen sessile, ferrugineum, linea dorsali late nigra. Alae anticae subcyanae, basi ferrugineae. Pedes ferruginei femoribus posticis atris.
- lateralis.* 49. V. obscura, abdomine atro, lateribus albidis.
Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*
Magnitudo et statura praecedentis. Caput obscure ferrugineum antennis apice nigris. Thorax obscure ferrugineus dorso nigro. Abdomen glabrum atrum lateribus late albidis. Pedes obscure ferruginei.
- flauescens.* 50. V. ferruginea, alis apice macula fusca. *Syst. Ent.* 370. 36. *
Habitat in India orientali. *D. Koenig.*
- gibbosa.* 51. V. capite thoraceque maculatis, abdomine varioloso quadrifasciato, primo segmento gibboso. *Syst. Ent.* 370. 37. *
Habitat in America. *Dom. Lewin.*

52. V. scutello fasciis duabus lineolisque quatuor flavis, abdomine fasciis flavis, ano fusco. *Syst. Ent.* 370. 38.* *americana*.
Habitat in Americae meridionalis insulis.
53. V. abdominis primo segmento infundibuliformi, secundo campanulato maximo. *Syst. Ent.* 370. 39.* *coarctata*.
Linn. Syst. Nat. 2. 950. 11. *Fn. Sv.* 1676.
Vespa nigra, abdominis articulo primo infundibuliformi, secundo campanulato maximo. *Geoff. Inf.* 2. 377. tab. 16. fig. 2.
Scop. carn. 830.
Frisch. Inf. 9. tab. 9.
Habitat in Europae hortis.
Abdomen nigrum fasciis flavis.
54. V. nigra flauo variegata, abdominis petiolo incuruo, maculis quatuor flavis. *Syst. Ent.* 371. 40.* *arcuata*.
Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
55. V. nigra flauo variegata, abdominis petiolo ferrugineo, apice nigro, maculis duabus flavis. *Syst. Ent.* 371. 41.* *campaniformis*.
Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
56. V. ferrugineo flauoque varia, abdominis petiolo incuruo ferrugineo, fascia atra. *petiolata*.
Habitat in Malabar. *Mus. Dom. Banks.*
Media. Antennae ferrugineae, vncinatae. Caput ferrugineum fascia verticis inter oculos atra. Thorax ferrugineus lobo antico flauo. Abdominis petiolus elongatus, incuruus, ferrugineus basi fasciaque apicis atris. Segmentum secundum ferrugineum, apice atrum, reliqua flauescencia. Pedes ferruginei.
57. V. abdomine flauo basi nigro, petiolo incuruo ferrugineo, fasciis duabus nigris. *Syst. Ent.* 371. 42.* *pyriformis*.
Habitat in China. *Drury.*
58. V. nigra flauo variegata, abdominis petiolo bipunctato, secundo segmento fascia interrupta omnibusque margine flavis. *pomiformis*.
Habitat in Italia. *D. Allioni.*

Statura et magnitudo V. coarctatae. Antennae nigrae primo articulo subtus flavo. Caput nigrum labio flavo, puncto medio nigro. Thorax niger fascia antica, puncto magno sub alis maculisque quinque scutellaribus flavis. Abdominis primum segmentum elongatum, infundibuliforme punctis duobus margineque flavis, secundum campaniforme, maximum, nigrum, fascia media interrupta margineque flavis, reliqua brevissima margine flavo. Pedes flavi.

grisea. 59. V. cinerea, abdominis petiolo ferrugineo, lateribusque flavo maculatis. *Syst. Ent.* 372. 43. *
Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*

inimica. 60. V. cinereo fusca, abdominis immaculati petiolo elongato incurvo ferrugineo.
Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*
Statura et summa affinitas V. griseae, at paullo minor et abdominis latera immaculata. Alae nigrae.

macilentata. 61. V. cinerascens, abdominis nigricantis petiolo ferrugineo, secundo segmento maculis duabus cinereis.
Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*
Statura praecedentium, at duplo minor. Antennae ferrugineae dorso nigro. Caput et thorax cinerascens, subvillosa dorso obscuriore. Abdominis petiolus elongatus, incurvus, ferrugineus, immaculatus. Secundum segmentum ferrugineum apice maculis duabus griseis, reliqua nigricantia. Pedes ferruginei. Alae albae.

tabida. 62. V. nigra flavo maculata, abdominis petiolo nigro, secundo segmento basi flavo.
Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*

Corpus paruum. Antennae nigrae. Caput nigrum labio flavo. Thorax niger margine antico punctis duobus sub alis, duobus transversis loco scutelli, lineolisque duabus sub scutello flavis. Abdomen atrum, petiolo elongato, incurvo, immaculato. Segmentum secundum basi flavum, tertium vix basi flavicat. Pedes flavi femoribus posticis nigris.

63. *V. abdominis ferruginæ petiolo nigro, fascia flava. attenuata.*
*Syst. Ent. 372. 44. **
 Habitat in America meridionali. *Dom. Drury.*
64. *V. coerulea, ore ferrugineo, alis fuscis. Syst. Ent. cyanea.*
*372. 45. **
 Habitat in Brasilia. Nidus cordatus cortice tenuissimo
 tectus Anacardii orientalis truncis adhaeret. *Muf.*
Dom. Banks.
65. *V. nigra, thorace antice ferrugineo, abdomine conico conica.*
 conico flavo, segmento secundo fascia, reliquis basi nigris.
Vespa conica nigra, thorace antice ferrugineo, abdo-
 mine conico flavo, segmento secundo et sexto basi
 nigris. *Syst. Ent. 372. 46. **
 Habitat in America meridionali, in Italia. *D. Allioni.*
66. *V. nigra, abdominis petiolo pedibusque rufis. Syst. arietis.*
*Ent. 373. 47. **
 Habitat in America meridionalis infulis. *D. v. Rohr.*
67. *V. scutello quadripunctato, abdominis segmentis mar-*
 gine albis, secundo punctis duobus albis. *Syst. Ent. biglumis.*
373. 48. Linn. Syst. Nat. 2. 951. 17. Fn. Sv. 1680.
 Habitat in Europa, nidum e fistulis aggregatis ad latera
 rupium struens.
68. *V. nigra, abdomine flavo, segmentis triangulo dorsali triangulum.*
 nigro. *Syst. Ent. 373. 49. **
 Habitat Hafniæ.

120. C R A B R O.

1. *C. abdomine fasciis duabus flavis, ano tridentato, alis tridentatus.*
 nigris margine albis. *Syst. Ent. 373. 1. **
 Habitat in Europa australi.
2. *C. thorace postice bidentato, abdomine fasciis tribus spinosus.*
 flavis. *Syst. Ent. 373. 2. **
 Habitat in Europa australiori.
3. *C. thorace immaculato, abdomine maculis vtrinque fossorius.*
 quinque lutescentibus, pedibus nigris. *Syst. Ent. 374. 3.*

- Sphex fofforia*. Linn. *Syst. Nat.* 2. 946. 32. *Fn. Sv.* 1662.
Habitat in Europae montibus fabulosis.
Maculae abdominis posticae connatae in fasciam.
- subterraneus*. 4. C. thorace maculato, abdomine vtrinque maculis quinque flauis, pedibus ferrugineis. *Syst. Ent.* 374. 4. *
Habitat Hafniae,
- maculatus*. 5. C. thorace maculato, abdomine atro, maculis vtrinque quatuor, tibiisque flauis.
Habitat in America boreali. *Mus. Dom. Banks.*
Medius. Antennae nigrae primo articulo flauo. Caput nigrum labio argenteo. Thorax niger striga antica, puncto sub alis scutelloque flauis. Abdomen atrum, nitidum, maculis vtrinque quatuor transuersis flauis. Femora nigra, tibiae flauae.
- flauipes*. 6. C. niger, thorace maculato, abdomine flauo, segmentorum marginibus anoque nigris.
Habitat in Italia. *D. Allioni.*
Medius. Antennae nigrae. Caput nigrum labio flauo fronteque pube argentea. Thorax niger striga marginali antica, punctis sub alis strigaque marginali postica duplicata flauis. Abdomen flauum segmentorum marginibus vltimoque segmento toto atris. Pedes flauis.
- sexcinctus*. 7. C. thorace maculato, abdomine fasciis sex flauis, primis interruptis. *Syst. Ent.* 374. 5. *
Habitat in Germania. *Dom. de Hattorf.*
- cribrarius*. 8. C. niger, abdomine fasciis flauis, intermediis interruptis, tibiis anticis clypeis concauis. *Syst. Ent.* 374. 6.
Sphex cribraria. Linn. *Syst. Nat.* 2. 945. 23. *Fn. Sv.* 1675.
Sphex abdomine fasciis duabus interruptis, pedibus anticis clypeatis. *Degeer Inf.* 2. 2. 139. tab. 28. fig. 1.
Vespa Ichneumon antennis reflexis, pedibus anterioribus velut clypeatis. *Raj. Inf.* 255. 14.
Apis tibiis anticis lamella cribriformi. *Vdm. Diff.* 94.
Roland. Aët. Holm. 1751. 56. tab. 3. fig. 1.
Naturforsch. 2. tab. 2.
Schaeff. Icon. tab. 177. fig. 6.

Sulz. Hist. Inf. tab. 27. fig. 6.

Habitat in Europae floribus.

Sexus alter pedibus simplicibus, alter clypeatis ad arctiorem cohaesionem in copula.

9. *C. niger*, abdomine punctis flavis, pedibus anticis con- *clypeatus*.
cauo clypeatis. *Syst. Ent. 375. 7.*

Sphex clypeata. Linn. Syst. Nat. 2. 945. 24.

Apis nigra, abdomine fasciis sex flavis, primis duabus interruptis, tibiis anticis lamellis integris. *Schreb. Inf. 11. tab. 1. fig. 8.*

Habitat Halae Saxonum.

10. *C. niger*, abdominis fasciis tribus flavis, primis inter- *vagus*.
ruptis, tibiis flavis. *Syst. Ent. 375. 8.*

Sphex vaga. Linn. Syst. Nat. 2. 946. 36. Fn. Sv. 1661. Scop. carn. 785.

Habitat in Europae floribus.

Variat thorace maculato et immaculato.

11. *C. niger*, scutello flavo, abdominis segmentis tribus *mystacea*
margine flavis, primo interrupto, tibiis ferrugineis. *us.*
Syst. Ent. 375. 9.

Sphex mystacea. Linn. Syst. Nat. 2. 944. 21. Fn. Sv. 1653.

Habitat in Europae floribus frequens.

12. *C. laevis ater*, thorace maculato, abdomine antice fa- *dimidiatus*.
scia, punctis duobus anoque flavis.

Habitat in Germania. *Dom. de Hattorf.*

Paruus. Caput atrum labio argenteo primoque antenarum articulo subtus flavo. Thorax niger lineola antica, punctis duobus lineolaque scutelli flavis. Abdomen antice atrum fascia punctisque duobus flavis, postice flavum, strigis obscurioribus. Pedes flavi femoribus nigris.

13. *C. laevis ater*, abdomine pedibusque ferrugineo fla- *diadema*.
uis, labio albo.

Habitat ad Cap. bon. sp. *Mus. Dom. Banks.*

Paruus. Caput nigrum labio albo et inter antenas macula tridentata alba. Thorax niger margine antico,

tico, puncto sub alis maculisque duabus transuersis loco scutelli flauis. Abdomen flauum dorso magis ferrugineo primoque segmento nigro. Pedes flauescentes.

- femoratus*. 14. *C. flauus nigro maculatus, femoribus posticis crassissimis denticulatis flauis. Syst. Ent. 375. 10. **
Habitat in America meridionali. *Dom. v. Rohr.*
- tricinctus*. 15. *C. ater, scutello punctis duobus sub scutello, abdominisque fasciis tribus flauis. Syst. Ent. 375. 11. **
Habitat in America meridionali. *Dom. v. Rohr.*
- uniglumis*. 16. *C. scutello mucronato, abdominis segmentis tribus, punctis duobus albis. Syst. Ent. 376. 12. **
Vespa uniglumis. Linn. Syst. Nat. 2. 951. 18. Fn. Sv. 1781.
Habitat in Europae floribus, imprimis umbellatis.
- leucostoma*. 17. *C. ater glaber, labio argenteo. Syst. Ent. 376. 13.*
Vespa leucostoma atra glabra, labio argenteo, palmis fuscis. Linn. Syst. Nat. 2. 946. 36. Fn. Sv. 1663.
Habitat in Europae floribus.

121. A N D R E N A.

- coerulescens*. 1. *A. fusca subuullosa, abdomine coerulescente, incisurarum marginibus albicantibus. Syst. Ent. 376. 1.*
Apis coerulescens. Linn. Syst. Nat. 2. 955. 21. Fn. Sv. 1696.
Habitat in Europa.
Margines segmentorum abdominis latere inprimis albi.
- labiata*. 2. *A. villosa nigra, abdominis segmento secundo tertioque rufis.*
Habitat in Germania. *Dom. de Hattorf.* In Italia. *D. Allioni.*
Corpus totum villosum, nigrum, abdominis segmentis duobus solis ferrugineis. Labium flauum.
Variat rarius abdominis apice ferrugineo fusco nec nigro.

3. *A. aenea*, grifescente pubescens. *Syst. Ent.* 376. 2. *aenea.*
Apis aenea. Linn. *Syst. Nat.* 2. 955. 20. *Syst. Ent.*
 1695.
Apis tota viridi cuprea. Geoff. *Inf.* 2. 415. 15.
 Habitat in Europa, in America paullo maior.
4. *A. thorace pubescente*, abdomine ferrugineo segmentorum marginibus cinereis, primo segmento atro. *marginata.*
Gen. Inf. Mant. 247. *
 Habitat in Germania. *Dom. de Hattorf.*
5. *A. thorace ferrugineo*, abdomine cinerascete. *Syst. heluola.*
Ent. 376. 3.
Apis heluola rufa villosa oblonga subtus albida. Linn.
Syst. Nat. 2. 955. 16. *Fn. Sv.* 1693.
 Habitat in Europae floribus.
6. *A. thorace villoso ferrugineo*, abdomine atro immaculato. *Syst. Ent.* 376. 4. 4. * *bicolor.*
 Habitat in Daniae memoribus.
7. *A. thorace nigro postice villoso ferrugineo*, abdomine atro, segmentorum marginibus niveis. *tricolor.*
Syst. Ent. 377. 5. *
 Habitat in America boreali.
8. *A. capite thoraceque viridi pubescentibus*, abdomine atro, segmentorum marginibus cyaneis. *cinerea.*
 Habitat in Malabaria. *Mus. Dom. Banks.*
 Magna. Antennae nigrae. Caput fuscum, viridi pubescens ore pallido. Thorax viridi pubescens. Abdomen atrum segmentorum marginibus late cyaneis. Pedes nigri tibiis dorso ferrugineo ciliatis.
9. *A. atra*, abdomine segmentorum marginibus niveis. *nigrita.*
Syst. Ent. 377. 6. *
 Habitat in America.
10. *A. cinereo pubescens*, abdomine atro, fasciis quatuor albis. *fasciata.*
Syst. Ent. 377. 7. *
 Habitat in America.
11. *A. subpubescens fusca*, abdomine fasciis quatuor coeruleis. *zonata.*
Syst. Ent. 377. 8.

Apis zonata. Linn. *Syst. Nat.* 2. 955. 19. *Mus. Lud.*
Plr. 415.

Habitat in India orientali.

Affinis *A. cinctae*, at distincta.

pilipes. 12. *A. atra* glabra, pedibus posticis albo ciliatis, alis
fulcis.

Habitat in Italia. *D. Allioni*.

Statura et magnitudo *A. haemorrhoidalis* tota glabra,
atra, thorace obscuro, abdomine nitido. Alae
omnes fuscae. Pedes nigri postici albo ciliati.

haemor- 13. *A. nigra*, ano ferrugineo. *Syst. Ent.* 377. 9. *
rhoidalis. Habitat in Sueciae nemoribus.

guloſa. 14. *A. nigra*, abdomine flauo basi nigro, lingua longissi-
ma. *Syst. Ent.* 377. 10. *

Habitat ad Cap. bon. spei. *Dom. Drury*.

bidentata. 15. *A. abdomine* fusco, cingulis quinque albidis, ano bi-
dentato. *Syst. Ent.* 377. 11. *

Habitat in America. *Mus. Dom. Banks*. Nidum in mu-
ris e foliis conuolutis arborum struens.

Pedes antici elongati, flauis tarsis ciliatis.

virescens. 16. *A. capite* thoraceque viridi aeneis, abdomine nigro.
Syst. Ent. 378. 12. *

Habitat in America. *Mus. Dom. Banks*.

cingula- 17. *A. thorace* rufo, abdomine atro, fasciis quatuor
ta. coeruleſcentibus. *Syst. Ent.* 378. 13. *

Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks*.

succincta. 18. *A. thorace* hirsuto fuluo, abdomine nigro, cingulis
quatuor albis. *Syst. Ent.* 378. 14.

Apis succincta. Linn. *Syst. Nat.* 2. 955. 18. *Fn. Sv.*
1694.

Apis nigra, thorace hirsuto fuluo, abdomine glabro,
incisuris albis. *Geoff. Inf.* 2. 411. 7.

Schaeff. Icon. tab. 32. fig. 5.

Habitat in Europae floribus.

Varietas minor thorace magis nigricante fasciaque pri-
ma abdominis absoluta.

122. A P I S.

1. *A. hirsuta atra*, tarsis anticis explanatis flavis, intus ciliatis. *Syst. Ent.* 378. 1. * *latipes.*
Apis latipes. *Drury Inf.* 2. tab. 48. fig. 2.
 Habitat in China.
2. *A. hirsuta atra*, alis violaceis. *Syst. Ent.* 2. 379. 2. *violacea.*
Linn. Syst. Nat. 2. 959. 38. *Mus. Lud. Vlr.* 415.
Geoff. Inf. 2. 416. 19.
Apis gigas nigra nitida, oculis fuscis, alis violaceo viridibus aeneo nitentibus. *Degeer Inf.* 5. 76. 10. tab. 28. fig. 15.
Bombylius lusitanicus e nigro coerulefscens. *Petiv. gazoph.* tab. 12. fig. 5.
Reaum. Inf. 6. tab. 5. fig. 1. 2.
Scopol. carn. 812.
 Habitat in truncis exsiccatis Europae australioris et Indiae, quos perforat, longitudinaliter excauat ibique plures nidos a fundo incipiens polline herbarum melle mixto replet, et unicuique ovum concredit. Nidi distinguuntur 4. 5. annulis ligneis.
 Nymphae caput deorsum spectat, ut in vndo exitum quaerat apis perfecta.
3. *A. hirsuta atra*, fronte abdominisque lateribus cinereis. *nigrita.*
Syst. Ent. 379. 3. *
 Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*
4. *A. hirsuta atra*, abdomine supra flavescente. *Syst. Ent.* 379. 4. *carolina.*
Linn. Syst. Nat. 2. 959. 40.
 Habitat in America.
5. *A. hirsuta nigra*, thorace cingulo flavo, ano albo. *Syst. Ent.* 379. 5. *terrestis.*
Linn. Syst. Nat. 2. 959. 41. *Fn. Sv.* 2709.
Bombylius maior niger, linea duplici transuersim ducta lutea, alia supra scapulas, alia per medium abdominis, imo abdomine albo. *Raj. Inf.* 247. 5.
Goed. Inf. 2. tab. 46.
Bradl. nat. tab. 26. fig. 1. D.
Reaum. Inf. 6. tab. 3. fig. 1.
Frischk. Inf. 9. tab. 13. fig. 1.

Sulz. Inf. tab. 19. fig. 124.

Schaeff. Elem. tab. 20. fig. 6.

Icon. tab. 69. fig. 7.

Habitat in Europae terra, profunde nidificans, strenue mellificans.

Varietas quadruplo minor in pratis Kiloniensibus frequens.

- cryptarum.* 6. *A. hirsuta nigra*, abdominis fascia flava, ano albo. *Syst. Ent.* 379. 6. *
Habitat Hafniae. *Dom. Mohr.*
- runderata.* 7. *A. hirsuta atra*, thorace flavo, fascia atra, abdomine antice flavo, ano albo. *Syst. Ent.* 380. 7. *
Habitat Hafniae. *Dom. Mohr.* In Madera. *Mus. Dom. Banks.*
- nemorum.* 8. *A. hirsuta atra*, thorace fascia interrupta flava, ano pallido. *Syst. Ent.* 380. 8. *
Habitat Hafniae. *Dom. Mohr.*
- foroecensis.* 9. *A. hirsuta atra*, ano albo. *Gen. Inf. Mant.* 248. *
Habitat in sylvis Scroecensibus. *Dom. de Slangbusch.*
Statura omnino praecedentium, at tota atra solo ano albo.
- surinamensis.* 10. *A. hirsuta nigra*, abdomine excepto, primo segmento flavo. *Syst. Ent.* 380. 9. *Linn. Syst. Nat.* 2. 961. 52.
Apis abdomen flavum hirsuta nigra, abdomine excepto, primo segmento flavo, tibiis posticis dilatatis, *Degeer Inf.* 3. 574. 6. tab. 28. fig. 9.
Drury Inf. 1. tab. 43. fig. 4.
Habitat Surinami.
- virginica.* 11. *A. hirsuta pallida*, abdomine excepto primo segmento atro. *Syst. Ent.* 380. 10. *Linn. Mant.* 1540.
Drury Inf. 1. tab. 43. fig. 1.
Habitat in Virginia.
- antigenensis.* 12. *A. hirsuta atra*, thorace abdomineque antice flavis. *Syst. Ent.* 380. 11. *
Habitat in Antigua Insula. *Dom. Drury.*

A sequeute manifeste differt.

13. *A. hirsuta nigra*, thorace antice flauo, abdomine flauo, ano nigro. *Syst. Ent.* 380. 12. * *americanorum.*
Habitat in America boreali. *Dom. Lewin.*
14. *A. hirsuta nigra*, thoracis dorso flauo, abdomine virescente, segmento primo flauo. *africana.*
Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*
Statura praecedentium. Caput nigrum pube cinerescente. Antennae nigrae, apice ferrugineae. Thorax flauissimus limbo antico nigro. Abdomen virescens segmento primo flauissimo. Alae fuscae. Pedes nigri.
15. *A. hirsuta nigra*, thorace abdomineque antice flauis, ano albo. *Syst. Ent.* 380. 13. *Linn. Syst. Nat.* 2. 960. 42. *Fn. Sv.* 1710. *hortorum.*
Habitat in Europae hortis.
Affinis *A. hortorum*, at triplo minor.
16. *A. hirsuta nigra*, thorace antice flauo, ano rubro. *arbus-*
Gen. Inf. Maut. 247. * *rum.*
Apis pratorum. *Linn. Syst. Nat.* 2. 960. 43. *Fn. Sv.* 1711.
Habitat in Daniae nemoribus. *Dom. de Slangbush.* In Italia. *Dr. Allioni.*
17. *A. hirsuta atra*, ano fuluo. *Syst. Ent.* 381. 14. *Linn. lapida-*
Syst. Nat. 2. 960. 44. *Fn. Sv.* 1701. *Geoff. Inf.* 2. 417. *ria.*
Bombylius maximus totus niger, exceptis duobus extremis abdominis annulis rufis. *Raj. Inf.* 246. 1.
Scopol. carn. 513.
Frijch. Inf. 9. tab. 25. fig. 2.
Reaum. Inf. 6. tab. 1. fig. 1—4.
Schaeff. Icon. tab. 69. fig. 9.
Habitat in lapidum acruis, strenue mellificans.
Varietas triplo minor, vix distincta.
18. *A. hirsuta pallida*, thoracis fascia abdomineque postice nigris, ano rufo. *Syst. Ent.* 381. 15. * *sylvarum.*
Apis sylvarum hirsuta pallida, thoracis fascia nigra, ano

ano rubro. *Linn. Syst. Nat.* 2. 960. 45. *Fn. Sv.* 1713.

Scopol. carn. 822.

Habitat in Europae nemoribus.

bryorum. 19. *A. hirsuta flava*, abdomine virescente. *Syst. Ent.* 381. 16. *

Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

muscorum. 20. *A. hirsuta fulva*, abdomine flauo. *Syst. Ent.* 381. 17. *Linn. Syst. Nat.* 2. 960. 46. *Fn. Sv.* 1714.

Bombylius medius, dorso longis pilis rufis vestito, mellificus, vulgatissimus, in gramine nidum construens. *Raj. Inf.* 246. 3.

Frisch. Inf. 9. tab. 26. fig. 8.

Schaeff. Icon. tab. 69. fig. 8.

Reaum. Inf. 6. tab. 2. fig. 3. 4.

Habitat sub Europae muscis mellificans.

hypnorum. 21. *A. hirsuta fulva*, abdominis fascia nigra, ano albo. *Syst. Ent.* 381. 18. *Linn. Syst. Nat.* 2. 960. 47. *Fn. Sv.* 1715.

Apis nigra thoracis basi et apice abdominisque basi flauis, ano albo. *Geoff. Inf.* 2. 418. ?

Scopol. carn. 820.

Reaum. Inf. 6. tab. 2. fig. 4. 1.

Habitat sub Europae muscis.

sibirica. 22. *A. hirsuta flava*, thoracis fascia anoque fuluis. Habitat in Sibiria. *Dr. Pallas. Mus. Dom. Banks.*

Caput vti totum corpus atrum. Thorax flauo hirtus fascia fulua inter alas. Abdomen flauo hirtum ano fuluo.

pratourum. 23. *A. hirsuta flava*, thorace fascia nigra. *Syst. Ent.* 382. 19. *

Apis fragrans. Pall. Iter 1. 474. 75.

Habitat in Daniae nemoribus, in Sibiria *Pallas.*

Feminae odore roseo fragrantissimae *Pallas.*

lucorum. 24. *A. hirsuta flava*, ano albido. *Syst. Ent.* 382. 20. *Linn. Syst. Nat.* 2. 961. 48. *Fn. Sv.* 1716.

Habitat in Europae floribus.

25. *A. hirsuta atra*, tibiis posticis ferrugineis. *Syst. Ent.* 382. 21. * *accruorum.*
Apis accruorum hirsuta atra. Linn. *Syst. Nat.* 2. 961. 50. *Fn. Sv.* 1717.
Schaeff. Icon. tab. 78. fig. 5.
 Habitat in Europa sub terra.
26. *A. hirsuta atra*, ano fusco. *Syst. Ent.* 382. 22. Linn. *subterranca.*
Syst. Nat. 2. 961. 51. *Fn. Sv.* 1718.
Geoff. Inf. 2. 416. 20.
Bombylius minor praecedenti concolor, abdomine imo pallidius nitente seu fuluo. *Raj. Inf.* 246. 2.
 Habitat in Europae floribus.
27. *A. hirsuta atra*, scutello abdomineque pallefcscntibus, ano rufo. *Gen. Inf. Mant.* 248. * *minorum.*
 Habitat Kiloniae. *Dom. de Schestedt.*
28. *A. hirsuta heluola*, femoribus basi nigris. *Syst. Ent.* 382. 23. Linn. *brasili-*
Syst. Nat. 2. 961. 49. *norum.*
 Habitat in America.
29. *A. hirsuta coerulefcscnte atra*, thorace supra flauo. *aestuans.*
Syst. Ent. 382. 24. *
Apis aestuans hirsuta nigra, thorace flauo. Linn. *Syst. Nat.* 2. 961. 53. *Muf. Lud. Vlr.* 416.
Apis leucothorax hirsuta nigra, thorace luteo, alis nigro violaceis, abdomine glabro. *Degeer Inf.* 3. 573. 4. tab. 28. fig. 7.
 Habitat in America, noua Hollandia, Cap. b. spei.
30. *A. hirsuta nigra*, abdomine postice flauo. *Syst. Ent.* 382. 25. Linn. *tropica.*
Syst. Nat. 2. 961. 54. *Muf. Lud. Vlr.* 416.
 Habitat in regionibus australioribus.
31. *A. hirsuta cinerea.* *Syst. Ent.* 382. 26. * *senilis.*
 Habitat in Daniae nemoribus.
32. *A. thorace hirta atro antice flauo*, abdomine nudo *feminuda.*
 atro, fascia interrupta hirta.
 Habitat in Germania. *Dom. de Hattorf.*
 Media. Caput vix pubescens, atrum. Thorax valde hirtus

hirtus ater, antice fascia flava. Abdomen ovatum, atrum, nitidum in medio fascia interrupta hirta. Pedes atrii.

- lagopoda*. 33. A. grisea, pedibus anticis dilatato ciliatis, tibiis posticis clauatis, ano emarginato. *Syst. Ent.* 383. 27. *Linn. Syst. Nat.* 2. 957. 27. *Fn. Sv.* 1702.
Sulz. Hist. Inf. tab. 27. fig. 17.
Habitat in Europae floribus.

- pilipes*. 34. A. grisea, pedibus intermediis fasciculato pilosis. *Syst. Ent.* 383. 28. *
Apis plumipes. *Pall. Spicil. Zool. fasc.* 9. 24. tab. 1. fig. 14.
Habitat in Anglia. *Dom. Lewin.*

- plumipes*. 35. A. thorace fulvo, abdomine nigro, apice fulvo, tibiis posticis compresso dilatatis hirsutis atris.
Habitat in India. *Mus. Dom. Teats.*
Antennae nigrae, labium flavum, frons nigra, linea flava. Vertex lana fulva, subtus lana alba. Thorax tectus lana fulva. Abdominis primum et secundum segmentum atrum, reliqua fulva lateribus albo maculatis. Pedes antici albo villosi, reliqui quatuor atrii tibiis valde compressis, dilatatis, hirtis.

- cunicularia*. 36. A. pubescens, thorace ferrugineo, abdomine fusco pedibus vndique villosis. *Syst. Ent.* 383. 29. *Linn. Syst. Nat.* 2. 957. 23. *Fn. Sv.* 1698.
Habitat in terra fabulosa Europae.

- mellifica*. 37. A. pubescens, thorace subgriseo, abdomine fusco, tibiis posticis ciliatis intus transverse striatis. *Syst. Ent.* 383. 30. *Linn. Syst. Nat.* 2. 955. 22. *Fn. Sv.* 1697.
Apis gregaria. *Geoff. Inf.* 2. 407. 1.
Apis domestica siue vulgaris. *Raj. Inf.* 240.
Swammerd. Bibl. Nat. tab. 17. fig. 1. operaria.
fig. 3. femina.
fig. 4. mas.
Reaum. Inf. 5. tab. 21. 22. 23. fig. 1. operaria.
fig. 2. mas.
fig. 3. femina.
Sulz. Inf. tab. 19. fig. 123.

Habitat in Europae arboribus cauis, frequentius culta.

38. *A. nigra*, thorace postice abdomineque antice tomentosis flavis, alis fuscis. *disiuncta*.

Habitat in America.

Magnitudo *A. mellificae*. Caput nigrum. Thorax niger postice tomento denso flavo. Abdomen cyaneum, nitidum, segmento primo tomento flavo tectum. Pedes nigri. Alae fuscae.

39. *A. nigra*, thorace postice abdomineque antice tomentoso ferrugineis, alis testaceis, apice fuscis. *rufipes*.

Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*

Magna. Caput nigrum, immaculatum. Thorax antice niger, immaculatus, postice tomento ferrugineo tectus. Abdomen nigrum segmento primo toto, secundoque margine ferrugineo tomentosis. Alae omnes testaceae, apice fuscae. Pedes ferruginei.

40. *A. atra*, thorace rufo, alis apice fuscis. *Syst. Ent. thoracica*, 383. 31. *

Habitat in Daniae nemoribus.

41. *A. thorace hirsuto albicante, fascia nigra, abdomine coerulefcente, ano cinereo. Syst. Ent. 383. 32. * flauifrons.*

Habitat in Brasilia. *Mus. Dom. Banks.*

42. *A. nigra, thorace hirsuto albicante, fascia nigra, abdomine coerulefcente. Syst. Ent. 384. 33. Linn. Syst.*

Nat. 2. 953. 5. Fn. Sv. 1688.

Schaeff. Icon. tab. 22. fig. 5. 6.

Habitat in Europae floribus.

43. *A. thorace villoso cinereo, abdomine coerulefcente, ano nigro. Syst. Ent. 384. 34. * analis.*

Habitat in America. *Dom. Drury.*

44. *A. thorace villoso ferrugineo, abdomine atro, lateribus glauco maculatis, ano ferrugineo. haemorrhoea.*

Habitat in Germania. *Dom. de Hattorf.*

Caput cum antennis nigrum fronte cinereo pubescente. Thorax niger, lana ferruginea tectus. Abdomen atrum nitidum maculis lateralibus glaucis anoque rufo. Pedes nigri tibiis posticis rufo hirtis.

- manicata*. 45. A. cinerea, abdomine nigro, maculis lateralibus flavis ano quinquedentato. *Syst. Ent.* 384. 35. *Linn. Syst. Nat.* 2. 958. 28. *Fu. Sv.* 1701.
Apis abdomine fasciis flavis interruptis apice spina quintuplici recurva armato. *Geoff. Inf.* 2. 408. 3.
Swammerd. Bibl. Nat. 26. fig. 4.
Schaeff. Icon. tab. 32. fig. 11. 12.
 Habitat in Europae arboribus cauis.
- florentina*. 46. A. abdomine maculis flavis lateralibus subtus hirsutissimo, segmentis tribus ultimis vtrinque dentatis. *Syst. Ent.* 384. 36. *
 Habitat in Europa australi. *Mus. Com. Excell. Dom. Tott.*
- Ireos*. 47. A. thorace hirto ferrugineo, abdomine atro, fasciis tribus interruptis albis, tarsis posticis angulato dilatatis.
Apis Ireos. Pall. Iter 2. 2. pag. 731. 93.
 Habitat in floribus Iridis Russiae. *Mus. Dom. Banks.*
 Maior A. maculata. Os et labium flava. Abdominis segmentum primum lana ferruginea, 2. 3. 4. fascia interrupta alba. Pedes flavi tarsis posticis basi valde angulatis.
- maculata*. 48. A. nigra, thorace maculato, abdomine maculis vtrinque sex transversis flavis, ano integro.
 Habitat in Italia. *D. Allioni.*
 Caput nigrum ore punctisque verticalibus flavis. Thorax niger, subpubescens maculis lateralibus flavis. Abdomen glabrum, atrum, nitidum maculis vtrinque sex transversis flavis. Femora rufa. Tibiae supra flavae, subtus nigrae.
- interrupta*. 49. A. pubescens nigra, abdomine strigis quinque flavis, anticis duabus interruptis, ano bidentato.
 Habitat in Italia. *D. Allioni.*
 Statura omnino praecedentis, at thorax magis pubescens nec maculatus. Caput nigrum clypeo punctoque supra oculos flavis. Abdomen glabrum, nigrum, strigis quinque flavis obsoletis anticis interruptis. Anus bidentatus.

50. *A. nigra*, abdominis segmentis maculis quatuor flavis transuersis. *variegata.*
 Habitat in Italia. *D. Allioni.*
 Affinis *A. maculatae*. Caput fuscum labio vtrinque macula flaua et puncto paruo pone oculos. Thorax fuscus linea marginali maculisque duabus scutellari-
 bus flavis. Abdomen globosum, atrum maculis qua-
 tuor flavis in singulo segmento subtus pilis rufis hir-
 tum. Pedes flavi femoribus supra nigris. Anus integer.
51. *A. supra lutea*, fascia baseos alarum atra. *Syst. Ent. 384. fasciata.*
 37. *Linn. Syst. Nat. 2. 958. 30.*
 Habitat in Africa.
 Abdominis prima duo segmenta atra lateribus albis.
52. *A. fronte bicorni*, capite nigro, abdomine hirsuto ru- *bicornis.*
 fo. *Syst. Ent. 384. 38. Linn. Syst. Nat. 2. 954. 10.*
Fn. Sv. 1691.
 Habitat in Europa.
53. *A. fusca*, abdomine rufescente, fronte alba. *Syst. Ent. rufa.*
 385. 39. *Linn. Syst. Nat. 2. 954. 9. Fn. Sv. 1690.*
Apis syluestris parua, abdomine breuiore, tota supina
 parte lanugine rufa vestita, thorace lanugine albican-
 te. *Raj. Inf. 242. 7.*
Sulz. Hist. Inf. tab. 27. fig. 15.
 Habitat in Europa frequens in floribus.
 Antennae corpore breuiore, nigrae.
54. *A. thorace ferrugineo*, abdomine nigro albo fasciato, *lanata.*
 ventre lana niuea. *Syst. Ent. 385. 40. **
 Habitat in America.
55. *A. nigra*, abdomine hirto, supra fuluo, subtus niueo. *bicolor. ●*
 Habitat in India orientali. *Mus. Dom. Banks.*
 Statura *A. centuncularis*, at maior. Antennae breues, cy-
 lindricae, nigrae. Caput nigrum fronte tomento ci-
 nereo. Thorax ater puncto villoso albo, subalis po-
 stice tomento fuluo. Abdomen supra tomento fuluo,
 subtus albo densiori tectum. Pedes cinereo tomentosi
 plantis tomento fuluo. Alae anticae obscurae.
56. *A. atra*, thorace abdominæque cinereo hirtis, ventre *villosa.*
 lana atra. *Syst. Ent. App. 828. **
 Habitat in India orientali. *Dom. Edler.*

- pubescens.* 57. A. corpore cinereo pubescente immaculato.
Habitat in Italia. *D. Allioni.*
Parua, corpore toto pube cinerascete tecto. Abdominis
segmenta margine albidiora.
- mystacea.* 58. A. nigra, abdomine toto ferrugineo. *Syst. Ent.* 385. 41.*
Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
- centuncularis.* 59. A. nigra, ventre lana fulua. *Syst. Ent.* 385. 42. *Linn.*
Syst. Nat. 2. 953. 4. *Fn. Sv.* 1687.
Apis nigra, abdomine supra lineis albis, subtus lana
fulua. *Geoff. Inf.* 2. 410. 5.
Apis parua nigra, abdomine supino nigro glabro splen-
dente, prono lanugine rufa densa vestito. *Raj. Inf.*
242. 6.
Scop. carn. 799.
Reaum. Inf. 6. tab. 10. fig. 3. 4.
Habitat in Europa intra terram plures nidos cylindri-
cos ex foliis rosae formans tanquam centunculos.
- punctata.* 60. A. nigra cinereo villosa, abdomine atro, segmentis
vtrinque puncto albo, scutello integro. *Syst. Ent.*
385. 43. *
Habitat in Angliae floribus.
- sinclata.* 61. A. thorace cinereo villosa, abdomine fusco, segmento-
rum marginibus fuluis.
Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*
Magna. Caput et thorax fusca, cinereo hirta. Segmen-
tum abdominis primum itidem cinereo hirtum, reli-
qua fusca marginibus fuluis subtus fuluo villosum.
Pedes fusci plantis quatuor posticis fuluo villosis.
Alae fuscae.
- bombylans.* 62. A. cyanea nitida, abdomine aeneo. *Syst. Ent.* 386. 44.*
Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
- muscaria.* 63. A. coerulescens, ano albido. *Syst. Ent.* 386. 45. *
Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
- haemorrhoidalis.* 64. A. atra, abdomine aeneo, ano rufo. *Syst. Ent.* 386. 46.*
Habitat in Americae meridionalis insulis.
- dentata.* 65. A. viridis nitida, alis nigris, femoribus posticis denta-
tis. *Syst. Ent.* 386. 47. *Linn. Syst. Nat.* 2. 954. 14.
Mus. Lud. Vr. 413.

Sulz. Hist. Inf. tab. 27. fig. 16.

Habitat in Americae meridionalis insulis.

66. A. viridis nitida, alis hyalinis, abdomine cordato, tibis posticis dilatatis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 955. 15. *cordata.*
Degeer Inf. 3. 572. 3. tab. 28. fig. 5.
 Habitat Surinami.
67. A. thorace hirto cinerascente, abdomine cyaneo, ano rufescente. *Syst. Ent.* 386. 48. * *versicolor.*
 Habitat in Americae meridionalis insulis. *D. v. Rohr.*
68. A. fusca, abdomine cingulis quinque albidis, ano quadridentato, intermediis bifidis. *Syst. Ent.* 386. 49. *4dentata.*
Linn. Syst. Nat. 2. 958. 29. *Fn. Sv.* 1703.
Swamm. Bibl. Nat. tab. 26. fig. 4.
 Habitat in Europa.
69. A. thorace cinereo, abdomine rufo, pedibus posticis hirsutissimis. *Syst. Ent.* 386. 50. * *lampes.*
 Habitat in Americae meridionalis insulis. *D. v. Rohr.*
70. A. fusca, abdomine glabro ferrugineo, vtrinque nigro maculato. *Syst. Ent.* 387. 51. * *coecutiens.*
 Habitat in Lipsiae hortis.
71. A. scutello tridentato, abdomine conico acutissimo, segmentorum marginibus albis. *Syst. Ent.* 387. 52. * *tridentata.*
 Habitat in Americae meridionalis insulis. *D. v. Rohr.*
72. A. fusca, abdomine conico acutissimo, segmentorum marginibus albis, scutello inermi. *Syst. Ent.* 387. 53. *conica.*
Linn. Syst. Nat. 2. 958. 32. *Fn. Sv.* 1705.
Vespa sylvestris caudacuta, abdomine nigro, annulis flavis distincto. *Raj. Inf.* 252. 4.
Reaum. Inf. 6. tab. 11. fig. 2. 3. 4.
 Habitat in Europae floribus, in nova Hollandia alis cyaneis. *Mus. Dom. Banks.*
73. A. cinerea, abdomine cylindrico nigro, fasciis sex albis, pedibus flavis. *Syst. Ent.* 387. 54. * *sexcincta.*
 Habitat in America.
 Maior A. florifomni.

- quadri-* 74. *A. nigra*, abdomine cylindrico, fasciis quatuor albis.
cincta. *Gen. Inf. Mant.* 248. *
Habitat in Soroea Danorum. *Dom. de Slangbusch.*
- maxillo-* 75. *A. nigra*, maxillis prominentibus, antennis thorace
sa. brevioribus, abdomine cylindrico subtus luteo hirsuto. *Linn. Syst. Nat.* 2. 954. 11.
Habitat in Europae floribus.
Affinis praecedenti. Abdominis segmenta margine interrupta alba.
- flori-* 76. *A. hirsuta*, abdomine cylindrico incurvo, ano bidentato. *Syst. Ent.* 387. 55.
somnis. *Apis florissomnis nigra*, abdomine subcylindrico incurvo ano bidentato, tibiis posticis apice spinosis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 954. 13. *Fn. Sv.* 1704.
Scop. carn. 796.
Habitat in Europa, in floribus pernoctans.
- annulata.* 77. *A. nigra*, fronte annulisque pedum albis. *Syst. Ent.* 387. 56. *Linn. Syst. Nat.* 2. 958. 33. *Fn. Sv.* 1706.
Habitat in Europae floribus frequens.
Parva moschum spirat.
- albipes.* 78. *A. fusca*, abdominis medio rufo, tibiis albis.
Habitat in Italia. *D. Allioni.*
Statura parva omnino *A. annulatae*. Caput et thorax fusca, parum pubescentia. Abdominis segmentum secundum apice, tertium totum, quartumque basi rufum. Pedes nigri tibiis albis macula bascos fusca. Variat interdum segmento secundo tertioque rufis macula media nigra.
- tumulo-* 79. *A. antennis filiformibus longitudine corporis nigri,*
rum. maxillis flavis. *Syst. Ent.* 388. 57. *Linn. Syst. Nat.* 2. 953. 2. *Fn. Sv.* 1685. *Iter Gotl.* 336.
Sulz. Hist. Inf. tab. 27. fig. 14.
Habitat in Europae floribus.
- longicor-* 80. *A. antennis longitudine corporis hirsuti fulvique.*
nis. *Syst. Ent.* 388. 58. *Linn. Syst. Nat.* 2. 953. 1. *Fn. Sv.* 1684.

Apis hirsutiae flavescens, fronte flava, antennis articulatim compressis corpori aequantibus. *Geoff. Inf.* 2. 413. 10.

Apis sylvestris domesticae similis, antennis longis nigris. *Raj. Inf.* 243. 1.

Eucera longicornis. *Scop. Ann. Hist. nat.* 4. p. 8. 1. *Scop. carn.* 794.

Stammerd. Bibl. tab. 26. fig. 6.

Habitat in Europae floribus.

Lingua septemfida.

81. A. antennis ferrugineis longitudine corporis hirsuti *glauc.*
glaucique. *Syst. Ent.* 388. 59. *
Habitat in Oriente. *Prof. Forskahl.*

82. A. antennis nigris longitudine corporis, thorace cinereo, abdomine nigro. *Syst. Ent.* 388. 60. * *lingua-*
Habitat in Saxoniae floribus. *ria.*
Lingua septemfida.

123. N O M A D A.

1. N. thorace, abdomine pedibusque albo nigroque variis, *histrio.*
scutello emarginato. *Syst. Ent.* 388. 1. *
Habitat in India orientali. *D. Koenig.* In noua Hollan-
dia. *Mus. Dom. Banks.*

2. N. nigra cinereo villosa, abdomine atro, vtrinque albo *scutella-*
punctato, scutello porrecto bidentato. *ris.*

Habitat in Sibiria. *D. Pallas. Mus. Dom. Banks.*

Praecedente minor. Caput nigrum fronte albo pubescente. Thorax niger antice cinereo pubescens. Scutellum postice productum emarginato bidentatum. Abdomen totum glabrum, atrum, segmento 1. punctis vtrinque duobus, reliquis vtrinque unico albis. Pedes nigri tibiis macula magna alba. Alae anticae fuscae litura marginali alba.

3. N. thorace abdomineque albo variegatis, pedibus ferrugineis. *Syst. Ent.* 389. 2. *variega-*
ta.

Apis variegata. *Linn. Syst. Nat.* 2. 957. 24. *Fn. Sv.* 1699.

Habitat in Europa, pernoctat in Geranii phaei rostris,
mordicus apprehensis.

Variat scutello albo et ferrugineo.

- ruficornis*. 4. N. antennis, pedibus punctisque quatuor scutelli ferrugineis, abdomine luteo variegato. *Syst. Ent.* 389. 3.
Apis ruficornis antennis pedibus duobus punctisque thoracis ferrugineis, abdomine luteo variegato. *Linn. Syst. Nat.* 2. 958. 34. *Fn. Sv.* 1707.
Habitat in Europae floribus.
Thorax ferrugineo lineatus.
- Fabriciana*. 5. N. nigra, abdomine glabro ferrugineo, maculis duabus flavis. *Syst. Ent.* 389. 4.
Apis Fabriciana. *Linn. Syst. Nat.* 2. 955. 17.
Habitat Vpſaliae.
- gibba*. 6. N. nigra, abdomine rufo apice nigro. *Syst. Ent.* 389. 5.
Nomada succincta. *Scop. Ann. Hist. nat.* 4. 45. 2.
Habitat in Anglia. *Muf. Dom. Banks.*
- Hattorfiana*. 7. N. nigra, abdominis secundo segmento ferrugineo, maculis tribus nigris. *Syst. Ent.* 389. 6. *
Habitat in Germania. *Dom. de Hattorf.*
- cingulata*. 8. N. cinereo villosa, abdomine glabro nigro, segmento secundo tertioque ferrugineis. *Syst. Ent.* 390. 7. *
Habitat in Sueciae nemoribus.

124. F O R M I C A.

- herculeana*. 1. F. nigra, abdomine ovato, pedibus ferrugineis. *Syst. Ent.* 391. 1. *Linn. Syst. Nat.* 2. 962. 1. *Fn. Sv.* 1720.
Formica magna, hippomyrmex. *Linn. It. Gotl.* 232.
Formica maxima. *Raj. Inf.* 69.
Scop. carn. 832.
Habitat in Europae, Americae truncis putrescentibus vagabunda.
- smaragdina*. 2. F. viridis, thorace flavo sublineato. *Syst. Ent.* 828. *
Habitat in India. *Dom. Edler.*
- rufipes*. 3. F. hirta atra, pedibus rufis. *Syst. Ent.* 391. 2. *
Habitat in Brasilia. *Muf. Dom. Banks.*

4. *F. atra*, capite rufo, squama petiolari didyma. *Syst. Ent.* 391. 3. * *erythrocephala.*
 Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
5. *F. nigra*, abdomine cinerascente, squama petiolari didyma. *didyma.*
 Habitat in Italia. *D. Allioni.*
 Statura *F. rufae*. Caput nigrum antennis piceis. Thorax gibbus, niger, immaculatus. Abdomen ouatum, pube cinerea nitidum. Squama petiolaris ouata, didyma vel potius late emarginata. Pedes nigri tibiis piceis.
6. *F. nigra*, thorace compresso pedibusque ferrugineis. *rufa.*
Syst. Ent. 391. 4.
Formica rufa thorace compresso toto ferrugineo, capite abdomineque nigris. *Linn. Syst. Nat.* 2. 962. 3. *Fn. Sv.* 1721.
Formica ferruginea capite abdomineque brunneis squamaque petiolari. *Degeer Inf.* 2. 2. 305. 1. tab. 41. fig. 1. 2.
Formica fusca thorace fuluo. *Geoff. Inf.* 2. 428.
Formica media rubra. *Raj. Inf.* 69.
 Habitat in Europae, Americae aceruis acerosis, sylvaticis, pungens aculeo obsoleto.
 Formicarum respublica consistit maribus feminisque alatis, incuriis, gulae deditis, spadonibusque numerosis, apteris, indefessis. Hae corradunt quisquillas in aceruum, sustentant mares feminasque sub nuptiis, at peractis puerperiis parentes expellunt, retentis liberis pro conseruatione familiae.
7. *F. atra*, abdomine pubescente. *Syst. Ent.* 392. 5. * *pubescens.*
 Habitat in Hungaria. *Mus. Tottianum.*
8. *F. nigra* nitida, ano piceo. *Syst. Ent.* 392. 6. *nigra.*
Formica nigra tota nigra nitida, tibiis cinerascens. *Linn. Syst. Nat.* 2. 963. 5. *Fn. Sv.* 1723.
Formica nigra squama petiolari, plantis autennisque dimidiato ferrugineis. *Degeer Inf.* 2. 2. 323. 4. tab. 42. fig. 16.
Formica atra. *Geoff. Inf.* 2. 429.

Formica minor e fusco nigricans. *Raj. Inf.* 69.
Swammerd. Bibl. Nat. tab. 16, fig. 1 — 11.
Scop. tarn. 834.

Habitat in Europae terra.

fusca. 9. *F. nigra*, ore thoracis apice pedibusque ferrugineis.
Formica fusca cinereo fusca, tibiis pallidis. *Linn. Syst.*
Nat. 2. 963. 4. *Fn. Sv.* 1722. *Geoff. Inf.* 2. 428. 5.

Formica nigra nitida, squama petiolari. *Degeer Inf.* 2.
 2. 321. 3. tab: 42. fig. 12.

Formica media nigro colore splendens. *Raj. Inf.* 69.
 Habitat in Europae syluis.

rubra. 10. *F. testacea*, oculis punctoque sub abdomine nigris.
Linn. Syst. Nat. 2. 963. 7. *Fn. Sv.* 1725.

Formica ferruginea, aculeo spinisque duabus thoracis.
Degeer Inf. 2. 2. 328. 6. tab. 43. fig. 1.

Formica minima rufa. *Raj. Inf.* 69.

Leuwenh. Epist. 9. Sept. 1687. p. 107. fig. 8.

Habitat in Europae sylvaticis sub lapidibus.

obsoleta. 11. *F. supra nigra*, subtus testaceo rufa, abdomine sub-
 globofo. *Syst. Ent.* 392. 7. *Linn. Syst. Nat.* 2. 963. 6.
Fn. Sv. 1724.

Habitat in Europae terra.

4puncta- 12. *F. thorace compresso ferrugineo*, abdomine atro, pun-
ta. ctis quatuor niueis. *Syst. Ent.* 392. 8. *

Formica 4punctata rubra, abdomine nigro, punctis
 quatuor albis. *Linn. Mant.* 1. 541.

Habitat in Alsatia, capt. d. 15. Maj.

virescens. 13. *F. pallida*, capite abdomineque virescentibus. *Syst.*
Ent. 392. 9. *

Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

sacchari- 14. *F. nigra*, pedibus, antennis maxillisque rufis. *Syst.*
vora. *Ent.* 392. 10. *Linn. Syst. Nat.* 2. 963. 10.

Formica minima sacchariuora. *Brown. Jam.* 440.

Habitat in America, intra culmos sacchari nidificans,
 quos destruit.

15. *F. nigra*; thorace postice femoribusque ferrugineis, abdomine pallido maculato. *maculata.*
 Habitat in Africa æquinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*
 Media. Caput magnum, atrum maxillis breuibus, multidentatis. Antennae apice piceae. Thorax compressus, antice niger, postice ferrugineus. Abdomen ouatum, pilosum, nigrum lateribus pallido maculatis. Pedes nigri femoribus ferrugineis.
16. *F. atra*, capite, antennis plantisque ferrugineis, petiolo binodi. *Syst. Ent. 393. 11. Linn. Syst. Nat. 2. 962. 2. barbarata.*
 Habitat in Africa.
17. *F. nigra*, thorace rufo postice bidentato, petiolo binodi. *Syst. Ent. 393. 12. * aegyptiaca.*
 Habitat in Aegypto. *Prof. Forskahl.*
18. *F. nigra*, capite maxime rufo, petiolo binodi. *Syst. Ent. 393. 13. * binodis.*
 Habitat in Aegypto. *Prof. Forskahl.*
19. *F. thorace punctis eleuatis, petiolo binodi, corpore omniuo-*
testaceo, abdomine minuto. Linn. Syst. Nat. 2. 964. 12. ra.
Formica pusilla rufa, abdomine fusco, pedibus testaceis, thorace bidentato. *Degeer Inf. 3. 611. 9. tab. 31. fig. 23. 24.*
 Habitat Surinami.
20. *F. flaua*, abdomine ouato pubescente. *flaua.*
Formica flaua squama petiolari. Degeer Inf. 2. 2. 326. fig. tab. 42. fig. 24 — 28.
 Habitat in Europæ borealis syluis.
 Parua, magnitudine tamen differt.
21. *F. nigra*, abdominis petiolo binodi, scutello bidentato. *Syst. Ent. 393. 14. caespitum.*
Formica caespitum abdominis petiolo binodis, priori subtus thoraceque supra bidentato. *Linn. Syst. Nat. 2. 963. 11. Fn. Sv. 1726.*
Formica ferruginea, capite abdomineque aculeatis rufis, thorace bispinoso. *Degeer Inf. 2. 2. 334. 7. tab. 43. fig. 21. 22.*

Formica binodis. Linn. *Amoen. acad.* 6. 413. 94.

Sulz. Hist. Inf. tab. 17. fig. 20. 21. 22.

Act. Havniens. 10. 1. tab. 1. fig. 1. 2. 3.

Scopol. carn. 837.

Hamb. Mag. 5. 393.

Habitat in Europae pratis ficioribus sub muscis. Mares feminaeque exaninant medio Augusti, meridie calido, more Phryganearum in aere choreas agentes turba volatili, depluentes per paria iuncta. Linn.

tuberum. 22. F. rufa, capite abdominisque fascia nigris, petiolo binodi. *Syst. Ent.* 393. 15. *

Habitat in Suecia.

australis. 23. F. nigra, thorace inermi, squama petiolari bispinosa. *Syst. Ent.* 393. 16. *

Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

bidens. 24. F. thoracis gibbere bidentato, capite ouato, antennis ferrugineis, articulo infimo nigro. Linn. *Syst. Nat.* 2. 964. 13.

Formica rufo fusca, antennis ferrugineis, articulo infimo nigro, capite ouato, thoracis gibbere bidentato, petiolo squama erecta. *Degeer Inf.* 3. 600. 1. tab. 31. fig. 1. 2.

Habitat Surinami.

viscutata. 25. F. thorace bidentato, squama petiolari duplicata. *Syst. Ent.* 394. 17. *

Habitat Cajennae. *Dr. Mallet.*

eleuata. 26. F. nigra, thorace bidentato, abdominis petiolo subtus unidentato. *Syst. Ent.* 394. 18. *

Habitat in India orientali.

attelaboides. 27. F. thorace bispinoso nigra, pedibus ferrugineis, capite postice attenuato. *Syst. Ent.* 394. 19. *

Habitat in Brasilia. *Mus. Dom. Banks.*

Annon. 28. F. thorace bispinoso, squama petiolari spinis duabus incuruis. *Syst. Ent.* 394. 20. *

Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

29. F. thorace quadrispinoso, squama petiolaris spinis *bihamata*-
 duabus arcuatis. *Syst. Ent.* 394. 21. *
Formica bihamata. *Drury Inf.* 2. tab. 38. fig. 7. 8.
Swiz. Hist. Inf. tab. 27. fig. 19.
 Habitat in Insula St. Iohannis Indiae.
30. F. thorace antice bispinoso, squama petiolaris quadri-*militaris.*¹
 spinosa.
 Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*
 Corpus magnum. Caput magnum, gibbum, nigrum,
 inter antennis vtrinque carinatum. Thorax gib-
 bus, fasciis antice vtrinque spina acuta valida.
 Squama petiolaris spinis quatuor erectis, validis,
 lateralibus paullo minoribus. Abdomen globosum,
 pubescens, nigrum. Alae fuscae.
31. F. thorace quadrispinoso, capite didymo magno, vtrin-*cephalo-*
 que postice mucronato. *Syst. Ent.* 395. 22. *Linn. Syst. tes.*
Nat. 2. 964. 15.
Formica migratoria fusco castanea, capite didymo ma-
 gno vtrinque postice spinoso, thorace quadrispinoso.
Degeer Inf. 3. 604. 5. tab. 31. fig. 11.
Formica magna. *Margr. Bras.* 252.
Merian. Sur. tab. 18. fig. maiores.
Seb. Mus. 4. tab. 99. fig. 6.
 Habitat in America meridionali.
32. F. thorace sexspinoso, capite didymo maximo. *Syst.* *6dēns.*
Ent. 395. 23. *Linn. Syst. Nat.* 2. 964. 14.
Formica rufa capite didymo magno vtrinque postice
 spinoso, thorace sexspinoso. *Degeer Inf.* 3. 608. 6.
 tab. 31. fig. 14.
 Habitat in America meridionali.
33. F. thorace quadrispinoso, capite depresso marginato *atrata.*
 vtrinque bispinoso. *Syst. Ent.* 395. 24. *Linn. Syst.*
Nat. 2. 965. 16.
Formica quadridens atra nitida, capite magno depres-
 so marginato vtrinque bispinoso, thorace quadrispi-
 noso. *Degeer Inf.* 3. 609. 7. tab. 31. fig. 17.
Tapicai Margr. Bras. 252.

Seb. Mus. 4. tab. 99. fig. 7.

Habitat in America meridionali.

gulosa. 34. F. rufa, abdomine apice nigro primo segmento contracto, mandibulis porrectis. *Syst. Ent.* 395. 25. *

Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

hamata. 35. F. ferruginea, capite maximo pallido, mandibulis porrectis hamatis.

Habitat Caiennae. *Mus. Dom. Teats.*

Media. Caput maximum subrotundum, pallidum, nitidum, basi vtrinque spina parua, conica. Maxillae porrectae, capite longiores, hamatae, acutae, nigrae. Antennae nigrae basi ferrugineae. Corpus ferrugineum thorace inermi petioloque binodoso.

haemato- 36. F. squama petiolarum conica acutissima, capite subdidymo, mandibulis porrectis. *Syst. Ent.* 395. 26. * *Linn. Syst. Nat.* 2. 965. 17.

Formica maxillofa alata nigro fusca, pedibus maxillisque porrectis rufis, squama petiolarum conica. *Degeer Inf.* 3. 601. 2. tab. 31. fig. 3.

Habitat in America meridionali.

maxillo- 37. F. thorace sexdentato, capite flauescente, mandibulis *fa.* longitudine capitis. *Syst. Ent.* 396. 27. *

Habitat in India orientali. *Mus. Dom. Banks.*

125. M V T I L L A.

occident- 1. M. coccinea, abdomine cingulo nigro. *Syst. Ent.* 396. *lis.* 1. *Linn. Syst. Nat.* 2. 966. 1.

Petiv. Mus. 404.

— — *Gazoph.* tab. 13. fig. 10.

— — *Filic.* 404. tab. 11. fig. 4.

Catesb. Carol. 3. p. 15. tab. 15.

Sulz. Inf. tab. 19. fig. 9.

Habitat in America septentrionali.

Aculeus reconditus, punctorius.

antiguen- 2. M. coccinea, abdominis apice nigro, strigis albis. *Syst. fis.* *Ent.* 396. 2. *

Habitat in Antigua insula. *Dom. Drury.*

america- 3. M. atra, abdomine maculis quatuor flauescensibus *na.* lineisque tribus albis. *Syst. Ent.* 396. 3. *Linn. Syst. Nat.* 2. 966. 2.

Sphex

- Sphex americana* aptera nigra, abdomine maculis rufis quatuor lineisque tribus albis. *Degeer Inf.* 3. 591. 8. tab. 30. fig. 10.
Habitat in America australi.
4. *M. nigra*, abdomine linea dorsali punctorum albido-*formica-*
rum. *Syst. Ent.* 397. 4. *
Habitat in noua Hollaudia. *Mus. Dom. Banks.*
5. *M. atra*, abdomine punctis duobus baseos striga inter-*exulans.*
rupta lineolaque postica flauis. *Syst. Ent.* 397. 5. *
Habitat in America. *Dom. Drury.*
6. *M. coerulescens*, abdomine macula magna aurea. *Syst. aurata.*
Ent. 397. 6. *
Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
7. *M. nigra*, thorace rufo, abdominis segmentis margine *europaea,*
albis. *Syst. Ent.* 397. 7. *
Mutilla europaea nigra, abdomine fasciis duabus al-
bis, thorace antice rufo. *Linn. Syst. Nat.* 2. 966. 4.
Fn. Sv. 1727.
Sulz. Hist. Inf. tab. 27. fig. 23. 24.
Apis aptera. *Vdm. Diff.* 98. tab. 17.
Habitat in Europae syluis acerofis.
8. *M. nigra*, antennis rufis, ano albido. *Syst. Ent.* 397. 8. * *ruficor-*
Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.* *nis.*
9. *M. nigra*, thorace supra rufo, abdomine coeruleo, fa-*atrata.*
sciiis duabus albis. *Syst. Ent.* 397. 9.
Mutilla atrata atra, abdomine fascia alba, thorace im-
maculato. *Linn. Syst. Nat.* 2. 966. 5.
Habitat in Africa.
Alae fuscescentes.
10. *M. nigra*, abdomine maculis quatuor albis, thorace ru-*maura.*
fo. *Syst. Ent.* 398. 10. *Linn. Syst. Nat.* 2. 967. 6.
Habitat in Europa australiori.
11. *M. abdomine basi apiceque nigro, medio rufo, fascia* *versico-*
alba, puncto nigro. *Syst. Ent.* 398. 11. * *lor.*
Habitat in America meridionali. *Dom. Drury.*
12. *M. glabra nigra*, ore, thorace abdomineque subtus ru-*glabrata.*
fis. *Syst. Ent.* 398. 12. *
Habitat in Oriente. *Prof. Forskahl.*



CLASSIS IV.
A G O N A T A.

126. CANCER.

* Thorace laeui lateribus integerrimis.

- vaninus.* 1. **C.** thorace laeui integerrimo oblongo obouato antice truncato dentato. *Syst. Ent.* 400. 1. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1039. 2. *Mus. Lud. Vr.* 430.
Rumph. Mus. tab. 7. fig. T. V.
Habitat in mari Indico.
- mutus.* 2. **C.** thorace laeui integerrimo, margine antice transuerso brunneo. *Syst. Ent.* 400. 2. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1039. 3.
Habitat in mari mediterraneo.
Chelae laeues.
- cordatus.* 3. **C.** thorace laeui undato integerrimo, chelis subtus cordatis. *Syst. Ent.* 400. 3. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1039. 4.
Amoen. acad. 6. 414. 97.
Habitat in America meridionali.
- ruricola.* 4. **C.** thorace laeui integro, pedum primo articulo spinoso, secundo tertioque fasciculato pilosis. *Syst. Ent.* 401. 4.
Cancer ruricola brachyurus, thorace laeui integerrimo antice retuso, pedum articulis vltimis penultimisque vndique spinosis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1040. 11.
Cancer thorace laeui antice bidentato, pedibus depressis, articulis tribus vltimis spinosis, fetis nigris. *Degeer Inf.* 7. 417. 1. tab. 25. fig. 1.
Sloan. Iam. 1. tab. 2.
Fewill. Peruv. 3. p. 237.
Seb. Mus. 3. tab. 30. fig. 4. 5.
Catesb. Carol. 2. tab. 32.
Brown. Iam. 423.
Habitat in America meridionali.

Degit in syluis, quotannis vastissimis agminibus ad littora maris migrans, oua deponendo. Cuniculos fodit. Delectatur fructibus Mancinellae et inde saepe venenatus fertur.

Iuniores articulis pedum tribus vltimis quadrifariam spinosis, at in adultioribus spinae in fasciculos pilorum nigrorum transeunt.

5. C. thorace orbiculato laeui integerrimo obtuso, cauda corporis amplitudine. *Syst. Ent.* 401. 5. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1039. 6. *Pennant. Brit. Zool.* 4. tab. 4. fig. 1. pifum.
Habitat in mari mediterraneo.
Corpus fere orbiculatum.
6. C. thorace laeui subcrenato, cauda basi binodi, brachiis scabris. *Syst. Ent.* 401. 6. * *Koenig.* globus.
Habitat ad littora Malabarica.
7. C. thorace laeui integerrimo ouato glaberrimo, manibus ancipitibus laeuibus. *Syst. Ent.* 402. 8. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1041. 15. *Mus. Lud. Vlr.* 431. *Pctiv. Gazoph.* tab. 9. fig. 3. *Seb. Mus.* 3. tab. 19. fig. 4. 10. *Rumph. Mus.* tab. 10. fig. A. B. craniolaris.
Habitat in mari Asiatico.
8. C. thorace laeui integerrimo subquadrato, margine acutiusculo, pedibus compressis. *Syst. Ent.* 402. 9. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1040. 8. *Mus. Ad. Fr.* 1. 8. *It. Westrogoth.* 137. tab. 3. fig. 1. *Penn. Brit. Zool.* 4. tab. 1. fig. 2. *Sloan. Jam.* 2. tab. 245. fig. 1. *Gronov. Zooph.* 562. *Kalm. It.* 1. 143. *Bast. subj.* 2. 26. tab. 4. fig. 12. minutus.
Habitat in Pelago.
9. C. thorace laeui integerrimo subquadrato, tarsis vni-dentatis. *Syst. Ent.* 402. 10. * *Fabrilus.* pufillus.
Habitat in Oceano boreali.
10. C. glaberrimus, thorace laeui lateribus antice planato, caudae medio noduloso carinato. *Syst. Ent.* 402. 11. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1040. 9. pinnotheres.
Fabr. Spec. Inf. I i I onst.

Ionst. exsang. tab. 20. fig. 3.

Häffelqu. It. 450.

Habitat in mari Asiatico intra testas pinnae. *Forskahl.*
Neque enim vita conchae fortasse seruari posset nisi
opera Cancri. *Bell. aquat.* 401.

pinnophy- 11. C. thorace orbiculato inaequali ciliato, pedibus dor-
lax. salibus quatuor. *Syst. Ent.* 402. 12. *Linn. Syst. Nat.*

2. 1039. 5. *Amoen. acad.* 6. 415. 93.

Pinnotheres. Rumph. Mus. 25.

Habitat in America intra Chamam Lazarum, cuius pinno-
theres et custos est.

orbiculus, 12. C. thorace orbiculato laeui plano, rostro tricuspido.
Syst. Ent. 402. 13. *

Habitat in noua Zelandia. *Mus. Dom. Banks.*

longicor- 13. C. thorace orbiculato laeui chelis minore, antennis lon-
nis. gissimis. *Syst. Ent.* 403. 14. *Linn. Syst. Nat.* 2. 2040. 10.

Penn. Zool. Brit. 4. tab. 1. fig. 3.

Gron. Zooph. 968.

Aët. Heluet. 5. 363. tab. 5. fig. 447.

Bast. subf. 2. 26. tab. 4. fig. 3.

Seb. Musf. 3. 42. tab. 17. fig. 1 — 4.

Habitat in Oceano Europaeo, australi.

hexapus. 14. C. thorace orbiculato laeui integro, pedibus senis, an-
tennis corpore longioribus. *Syst. Ent.* 403. 15. *Linn.*
Syst. Nat. 2. 1039. 7.

Cancer thorace laeui orbiculato subdepresso, chelis va-
lidioribus, antennis longissimis, pedibus posticis mi-
nutioribus. *Bast. subf.* 2. 26. tab. 4. fig. 3.

Habitat in Oceano Europaeo.

Vca. 15. C. thorace laeui cordato litera H. impresso, pedibus
subtus barbatis, brachiis muricatis. *Syst. Ent.* 403.
16. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1041. 13.

Vca vna. Margr. Brasf. 184.

Habitat in Americae paludibus.

** Thorace laeui lateribus inciso.

floridus. 16. C. thorace laeui videntato maculato, fronte triloba.
Syst. Ent. 403. 17.

Cancer floridus brachyurus, thorace laeui mutico macu-
lato margine crenulato, manibus cristatis. *Linn. Syst.*
Nat. 2. 1041. 12. *Amoen. acad.* 6. 414. 98. ?

Rumph.

Rumph. Mus. tab. 8. fig. 5.

Habitat in Indiae aquis.

Figura *Rumphii* cum nostro omnino conuenit, at de synonymo *Linnaeano* dubito, quum margo haud crenulatus, nec manus cristatae.

17. C. thorace laeui videntato, chela altera maiori, oculis elongatis. *vocans.*

Cancer vocans thorace inermi quadrato, lateribus antice prominulis, chela altera magna. *Syst. Ent.* 401. 7. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1041. 14. *Amoen. acad.* 6. 414. 96.

Cancer thorace lato quadrato mutico laeui, chela altera corpore maiori, altera minima. *Degeer Inf.* 7. 430. 4. tab. 26. fig. 12.

Pis. Brasil. 77. tab. 78.

Seb. Mus. 3. tab. 18. fig. 8.

Petiv. Gazoph. tab. 78. fig. 5.

Habitat in Iamaica. *Mus. Dom. Banks.*

Testa media antice truncata vtrinque ad receptionem oculorum excauata, marginibus crenulatis, supra laeuis dente anteriori acuto. Chela altera maxima mox laeuis, mox scabra digitis elongatis granulatis.

18. C. thorace rotundato videntato, oculis porrectis *ceratophtalmus.*
spina terminatis.

Cancer ceratophtalmus. *Pall. spicil. Zool. fasc.* 9. tab. 5. fig. 7.

Habitat — — — —

Oculi singulares terminantur appendiculo lineari obtusiusculo.

19. C. thorace orbiculato laeui, lateribus videntatis, *planatus.*
fronte tridentata. *Syst. Ent.* 403. 18. *

Habitat in Terra del Fuego. *Mus. Dom. Banks.*

20. C. thorace laeui, lateribus antice vnispinosis, fronte *rhombot-*
truncata. *Syst. Ent.* 404. 19. *Linn. Syst. Nat.* 2. *des.*
1042. 17.

Barrel. Icon. rar. tab. 1287. fig. 1.

— — — — tab. 1286. fig. 1. 2.

Habitat in mari mediterraneo.

- maculatus.* 21. *C. thorace laeui, maculis fanguineis rotundis, lateribus videntatis, fronte triloba. Syst. Ent. 404. 20. Linn. Syst. Nat. 2. 1042. 18. Mus. Lud. Vlr. 433. Petiv. Amboin. tab. 1. fig. 8. Seb. Mus. 3. tab. 19. fig. 12. Rumph. Mus. tab. 10. fig. 1. Gron Zooph. 971.*

Habitat in Asiae aquis.

- pelagicus.* 22. *C. thorace laeui vtrinque vnispinoso antice octodentato, fronte sexdentata, manibus multangulo prismaticis. Syst. Ent. 404. 21. Linn. Syst. Nat. 2. 1042. 19. Mus. Lud. Vlr. 434.*

Cancer thorace lato vtrinque vnispinoso, lateribus vtrinque octo dentatis, fronte dentata, manibus elongatis multangulis, pedibus posticis dilatato foliaceis. Degeer Inf. 7. 427. 3. tab. 26. fig. 8.

Cancer manuum articulis omnibus dentatis, extimo heptagono. Osb. It. 307.

Rumph. Mus. tab. 7. fig. R.

Gron. Zooph. 956.

Brown. Jam. 421. tab. 41. fig. 2.

Seb. Mus. 3. tab. 20. fig. 9.

Habitat in Pelagi fuco natante.

- hastatus.* 23. *C. thorace laeui, lateribus octodentatis, postico maximo, manibus angulatis. Syst. Ent. 404. 22. **

Cancer hastatus brachyurus, thorace rugoso nudo, margine vtrinque octodentato, postico maximo, palmis posticis ouatis. Linn. Syst. Nat. 2. 1046. 39.?

Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

- nucleus.* 24. *C. thorace laeui globoso antice vtrinque videntato postice rostroque bidentato. Syst. Ent. 404. 23. Linn. Syst. Nat. 2. 1042. 20.*

Habitat in mari mediterraneo.

- maenas.* 25. *C. thorace laeuiusculo vtrinque quinquedentato, carpis videntatis. Syst. Ent. 405. 24. Linn. Syst. Nat. 2. 1043. 22. Mus. Lud. Vlr. 436. Fn. Sv. 2026.*

Petiv. Amb. tab. 1. fig. 5.

Bast. subf. 2. 19. tab. 2.

Rumph.

Rumph. Mus. tab. 6. fig. O.

Gron. Zooph. 955.

Habitat in oceano Europaeo, Asiatico.

26. C. thorace laeui vtrinque quinquedentato, manibus *depurator*,
apice compressis, pedibus posticis ouatis. *Syst. Ent.* tor.
405. 25. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1043. 23.

Cancer caninus. Mus. Adolph. Frid. 1. 85.

Cancer latipes. Rond. pisc. 565.

Cancer ramipes. Barrel. Icon. 1287. fig. 2. mal.

Planc. conch. 34. tab. 3. fig. 7. mal.

Seb. Mus. 3. tab. 18. fig. 9. bon.

Scopol. carn. 1124.

Habitat in Oceano Europaeo.

27. C. hirsutus, thorace vtrinque dentato, pedibus *podromia*,
sticis unguibus geminis. *Syst. Ent.* 405. 26. *Linn.*
Syst. Nat. 2. 1043. 24. *Amoen. acad.* 6. 413, 96.

Cancer lanosus. Rumph. Mus. tab. 11. fig. 1.

Seb. Mus. 3. tab. 18. fig. 1. 3.

Habitat in Indiae orientalis profundo.

28. C. thorace laeui vtrinque quinquedentato, manibus *feriatus*,
multangulis ouatis, carpis unidentatis. *Syst. Ent.*
405. 27. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1043. 25. *Mus. Lud. Vlv.*
437.

Rumph. Mus. tab. 6. fig. P.

Petiv. Amboin. tab. 1. fig. 6.

Habitat in mari Indico.

29. C. thorace vtrinque obtuse nouemplicato, manibus *pagurus*,
apice atris. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1044. 27. *Fn. Sv.*
2028. *Mus. Adolph. Frid.* 1. 85.

Cancer pagurus thorace laeui vtrinque quadridentato,
fronte fissa, manibus apice atris. *Syst. Ent.* 405. 28.

Gron. Zooph. 967.

Bradl. nat. tab. 3. fig. 4.

Rumph. Mus. tab. 11. fig. 4.

Habitat in Oceano Europaeo, Indico.

30. C. thorace subnodoso crenato, angulis posticis dilata- *granula-*
to quinquedentatis, manibus cristatis. *Syst. Ent.* 406. *tus.*
29. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1043. 26.

Cancer chelis crassissimis. *Catesb. Car.* 2. tab. 36.

Seb. Mus. 3. tab. 19. fig. 13.

Habitat in mari mediterraneo.

calappa. 31. *C.* thorace laeui crenulato, angulis posticis dilatato integerrimis, manibus cristatis. *Syst. Ent.* 406. 30.

Cancer calappa brachyurus, thorace strigis subimbricato gibbo antice trilobo. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1048.

52. *Mus. Lud. Vlr.* 449.

Petiv. Gazoph. tab. 75. fig. 11.

Seb. Mus. 3. tab. 20. fig. 7. 8.

Ramph. Mus. tab. 11. fig. 2. 3.

Habitat in America.

Affinis praecedenti, at duplo maior et anguli dilatati integerrimi.

aeneus. 32. *C.* thorace rugosissimo obtuso vtrinque quadrilobo.

Syst. Ent. 406. 31. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1048. 54.

Mus. Lud. Vlr. 451.

Habitat in India.

depressus. 33. *C.* thorace sublaeui vtrinque quadridentato, femoribus videntatis, vnguibus subtus ferratis. *Syst. Ent.* 406, 32. *

Habitat in mari mediterraneo.

grapsus. 34. *C.* thorace laeui vtrinque tridentato subrugoso, corpore variegato. *Syst. Ent.* 406. 33.

Cancer grapsus brachyurus, thorace strigis lateralibus, fronte retusa. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1048. 53. *Amoen. acad.* 4. tab. 3. fig. 10.

Pagurus maculatus. *Catesb. Carol.* 2. tab. 36. fig. 1.

Seb. Mus. 3. tab. 18. fig. 5.

Gron. Zooph. 966.

Habitat in mari mediterraneo.

*** Thorace supra hirto aut spinoso.

cylindrus. 35. *C.* thorace bifulcato, lateribus dilatato cylindricis apice spinosis. *Gen. Inf. Mant.* 256. *

Habitat in Malabar.

36. C. thorace hirto suborbiculato mutico, manibus ouatis mauricatis. *Syst. Ent.* 407. 34. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1044. 28. *Mus. Lud. Vlr.* 438.
chabrus.
 Habitat in Oceano Indico.
37. C. thorace hirto rugoso vtrinque dentato, rostro bidentato. *Syst. Ent.* 407. 35. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1044. 24.
Planc. conch. 36. tab. 5. fig. 1. *lanatus.*
 Habitat in mari mediterraneo.
38. C. thorace vndique aculeato, rostro bifido, subtus dente vnico, supra duobus. *It. Norweg.* d. 20. Iun.*
nasutus.
 Habitat in Oceano Norwagico, capt. d. 20. Iun.
39. C. thorace lanato tuberculato, rostro bifido, chelis laeuius. *Hircus.*
 Habitat in Iamaica. *Mus. Dom. Banks.*
 Statura omnino C. aranei, at triplo minor. Thorax ouatus pilis densioribus tectus tuberculisque eleuatis fere spinosis. Rostrum porrectum bifidum laciniis acutis. Chelae laeues, glabrae, brachiorum dorso subdentato. Digni apice albi. Pedes reliqui octo hirti vngue arcuato, acuto, albo.
 Iunior totus lanatus tuberculis oblitteratis.
40. C. thorace hirto ouato tuberculato, rostro bifido, manibus ouatis. *Syst. Ent.* 407. 36. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1044. 30. *Fu. Sv.* 2030. *Mus. Lud. Vlr.* 439.
araneus.
Ionst. Exsangu. tab. 5. fig. 13.
 Habitat in Oceano Europaeo.
41. C. thorace pubescente obcordato, dorso spinis duabus erectis, manibus oblongis compressis. *Syst. Ent.* 407. 37. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1045. 31. *Fu. Sv.* 2027.
rostratus.
 Habitat in Oceano Europaeo.
42. C. thorace spinis octo, pedibus filiformibus, rostro bifido. *Syst. Ent.* 407. 32. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1045. 35.
tribulus.
 Habitat in mari mediterraneo.
43. C. thorace aculeato, rostro porrecto bifido cristato, pedibus aculeatis. *Syst. Ent.* 407. 33.
cristatus.

Cancer cristatus brachyurus, thorace aculeato, rostro bifido cristato, manibus teretibus. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1047. 44. *Mus. Lud. Vlr.* 443.

Habitat in Oceano.

Synonyma a *Linnaeo* citata vix huc pertinent.

punctatus. 44. *C.* thorace ouato crenato postice tridentato. *Syst. Ent.* 407. 40. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1045. 36.

Brown. Jam. tab. 42. fig. 3.

Habitat in Asia, America.

cornutus. 45. *C.* thorace aculeato, rostro spinis corniformibus barbatis, manibus rotundatis. *Syst. Ent.* 407. 41. *

Linn. Syst. Nat. 2. 1047. 46. *Mus. Lud. Vlr.* 445.

Habitat in mari mediterraneo.

longirostris. 46. *C.* thorace aculeato porrecto ascendente, rostro acuto bifido, pedibus longissimis. *Syst. Ent.* 408. 42. *

Cancer dodecos brachyurus, thorace pubescente spinis duodecim, rostro bifido. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1046. 38. ?

Habitat in mari mediterraneo.

Variat rostro fere longitudine thoracis.

Scorpio. 47. *C.* thorace pubescente spinis quatuor erectis, pedibus anticis longissimis. *It. Norwag.* d. 9. Aug.

Habitat in Oceano Norwagico, capt. d. 9. Aug.

Paruus, statura *C. Phalangii*.

Phalangium. 48. *C.* thorace pubescente antice spinis tribus erectis acutis, postice tuberculis obtulis, rostro bifido. *Syst. Ent.* 408. 43. *

Habitat — — — —

puber. 49. *C.* thorace hirta cordata vtrinque quinque-dentato, manibus videntatis apice nigris. *Syst. Ent.* 408. 44. *

Cancer puber brachyurus, thorace rugoso villoso vtrinque quinque-dentato, palmis posticis ouatis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1046. 40.

Habitat in mari mediterraneo.

50. C. thorace aculeato, manibus ventricosus spinosis, digi- *maia.*
 titis penicillato hirsutis. *Syst. Ent.* 408. 45. *Linn.*
Syst. Nat. 2. 1046. 41. *Fn. Sv.* 2031.
Jonst. Exsangu. tab. 5. fig. 5.
Gron. Zooph. 973.
 Habitat in Oceano Norwagico.
51. C. thorace aculeato nodoso, pedibus fenis, cauda ca- *horridus.*
 riosa. *Syst. Ent.* 409. 46.
Cancer horridus brachyurus, thorace obtuse aculeato,
 manibus ouatis, cauda cariosa. *Linn. Syst. Nat.* 2.
 1047. 43. *Muf. Lud. Vlr.* 442.
Gron. Zooph. 976.
Petiv. Amb. tab. 1. fig. 7.
Seb. Muf. 3. tab. 18. fig. 10.
 — — tab. 22. fig. 1. 2. 3.
Rumph. Muf. tab. 9. fig. 1.
 Habitat in Oceano Asiatico.
52. C. thorace nodoso inaequali, rostro plano retuso, pe- *chiragra.*
 dibus octo nodulosis. *Syst. Ent.* 409. 47. *
 Habitat in mari mediterraneo.
53. C. thorace antice noduloso dentato, manibus nodu- *gonagra.*
 losis.
 Habitat in Iamaica insula. *Muf. Dom. Banks.*
 Magnitudine variat. Thorax inaequalis antice nodulis
 plurimis eleuatis, obtusis margineque vtrinque
 septedentato. Rostrum omnino nullum, sed testa
 antice fissa. Chelae articulo primo lacui, secundo
 tertioque supra valde nodulosis. Digniti obtuse den-
 tati, fusci. Pedes octo compressi, pilosi.
54. C. thorace vndique noduloso crenato, pedibus digito *nodulosus.*
 spinoso.
 Habitat — — — — *Muf. Dom. Banks.*
 Statura praecedentis. Rostrum omnino nullum, sed te-
 sta antice emarginata, supra tota nodis eleuatis obtu-
 sissimis testa margineque crenato. Chelae breues ma-
 nibus nodulosis digito nigro. Reliqui octo breues
 dorso pilosi ciliati, digitoque nigro spinis plurimis
 erectis, validis.

- longimanus*. 55. C. thorace aculeato, manibus corpore longioribus, digito patulo pollice curvato. *Syst. Ent.* 409. 48. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1046. 42. *Rumph. Mus.* tab. 8. fig. 2. *Petiv. amb.* tab. 2. fig. 15. *Seb. Mus.* 3. tab. 20. fig. 12.
Habitat in Oceano Asiatico.
- longipes*. 56. C. thorace aculeato, manibus ovatis scabris, pedibus posterioribus longissimis. *Syst. Ent.* 409. 49. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1047. 47. *Mus. Lud. Vlr.* 446. *Rumph. Mus.* tab. 8. fig. 4.
Habitat in Oceano Indico.
- spinifer*. 57. C. thorace postice uniaculeato inaequali, pedibus secundi paris longissimis. *Syst. Ent.* 409. 50. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1047. 48. *Mus. Lud. Vlr.* 447.
Habitat in Oceano Asiatico.
- germanus*. 58. C. thorace inaequali, spina altera frontis, altera supra caudam. *Syst. Ent.* 409. 51. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1047. 49.
Habitat in mari Germanico.
Chelae laeves.
- auritus*. 59. C. thorace antice utrinque unispinoso, dorso canaliculato molliusculo. *Syst. Ent.* 410. 52. *
Habitat in Islandia. *Dr. Koenig.*

127. P A G U R U S.

- latro*. 1. P. thorace futuris quadrifido, cauda simplici, subtus ventricosa. *Syst. Ent.* 410. 1. *Cancer latro.* *Linn. Syst. Nat.* 2. 1049. 56. *Cancer crumenatus.* *Rumph. Mus.* tab. 7. fig. 4. *Bourfres Rochef. ant.* 1. c. 21. *Seb. Mus.* 3. tab. 21. fig. 1. 2.
Habitat in Indiae orientalis cryptis rupium, terrestres, nocturnus, victitans nucibus Cocos, quas ascendens deicit, dein manibus violenter aperit. Dentis intestinis esculentus.
- Bernhardus*. 2. P. parasiticus, chelis muricatis, dextra maiore. *Syst. Ent.* 410. 2.

Cancer Bernhardus. Linn. *Syst. Nat.* 2. 1049. 57.
Mus. Lud. Vr. 454. *Fn. Sv.* 2032.

Astacus Bernhardus cauda molli recurvata, thorace
 laeui, pedibus chelisque muricatis scabris, dextra
 maiore. *Degeer Inf.* 7. 405. 4. tab. 23. fig. 5. 6.

Ionst. exjangu. tab. 7. fig. 6. 12.

Swaammerd. Bibl. Nat. tab. 11. fig. 1. 2.

Bast. Jubf. 1. 74. tab. 10. fig. 3. 4.

Gron. Zooph. 982.

Habitat in Oceano Europaeo intra testas cochlearum,
 quas vacuas intrat trahitque mutatas prout adole-
 scit.

3. *P. parasiticus*, chelis laeuius pubescentibus, sinistra *Diogenes*.
 maiore. *Syst. Ent.* 410. 3.

Cancer Diogenes. Linn. *Syst. Nat.* 2. 1049. 58.

Gron. Zooph. 983.

Rumph. Mus. tab. 5. fig. K. L.

Catesb. Carol. 2. tab. 33. fig. 1. 2.

Kaempf. Jap. tab. 13. fig. 7.

Habitat in Oceano Americano, Asiatico intra testas coch-
 learum.

4. *P. parasiticus*, chelis scabris subaequalibus, pedibus *Eremita*.
 sex anterioribus pollicatis. *Syst. Ent.* 411. 4.

Cancer Eremita. Linn. *Syst. Nat.* 2. 1049. 59.

Habitat in mari Italico intra tophum suberosum subro-
 tundum apertura transuersali.

Pedes sex, antici porrecti extra tophum.

5. *P. parasiticus*, chelis muricatis aequalibus, oculorum *oculatus*.
 pedunculis longitudine thoracis. *Syst. Ent.* 411. 5. *

Habitat in Murice Brandaris.

6. *P. parasiticus*, manibus laeuius trialatis, dextra maio- *alatus*.
 re. *Syst. Ent.* 411. 6. *

Habitat in Islandiae Bullis.

7. *P. parasiticus*, chelis scabris, cauda apice callosa vn- *aranei-*
 guiculata. *Syst. Ent.* 411. 7. * *formis.*

Habitat in fissuris rupium maris Edimburgici, intrans
 Helices et Turbines.

- tubularis*. 8. P. parasiticus subcylindricus, testa punctis excavatis.
Syst. Ent. 411. 8.
 Habitat intra testas *Serpulae maris mediterranei*.
- caput mortuum*. 9. P. tomentosus obtectus pileo hemisphaerico suberoso.
Syst. Ent. 411. 9.
Cancer caput mortuum. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1050. 61.
 Habitat in mari mediterraneo.
- strigosus*. 10. P. thorace antrorsum rugoso spinis ciliato, rostro acuto septemdentato. *Syst. Ent.* 412. 10.
Cancer strigosus. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1052. 10.
Cancer macrourus thorace chelisque angulatis hispidis.
Mus. Adolph. Frid. 87.
Astacus marinus Column. aquat. 8. tab. 6.
Astacus similis pediculo marino. *Ionst. exsang.* tab. 2. fig. 7.
Astacus strigosus thorace depresso rugoso lateraliter aculeato, rostro acuto septemdentato, chelis spinosissimis, pedibus posticis filiformibus. *Degeer Inf.* 7. 393. 2. tab. 23. fig. 1.
Sulz. Hist. Inf. tab. 32. fig. 1.
Barrel. rar. tab. 1288. fig. 1.
Seb. Mus. 3. tab. 19. fig. 19. 20.
Gronov. Zooph. 980.
Act. Helvet. 4. 23. tab. 2. fig. 1. 2.
 Habitat in Oceano Europaeo.
- rugosus*. 11. P. thorace rugoso antice ciliato spinoso, rostro tridente, manibus filiformibus. *Syst. Ent.* 412. 11. *
 Habitat in mari mediterraneo.
- gregarius*. 12. P. thorace rugoso ciliato, rostro tridentato, palpis anticis elongatis. *Syst. Ent.* 412. 12. *
 Habitat in Oceano Americano Patagoniam alluente gregarius, vnde mare saepe cruentum videtur. *Mus. Dom. Banks.*
- amplectens*. 13. P. thorace laevi, rostro brevissimo emarginato, pedibus intermediis longissimis. *Syst. Ent.* 412. 13. *
 Habitat in Oceano Atlantico, Brasiliam alluente, noctu fulgens.

128. SCYLLARVS.

1. Sc. antennarum squamis ciliato aculeatis. *Syst. Ent.* 413. *arctus.*
Cancer arctus macrourus, thorace antrorium aculeato, fronte diphylla, manibus subadactylis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1053. 75. *Fn. Sv.* 2040.
Jonst. exjangu. tab. 4. fig. 4. 8. 12.
Sax. Hist. Inf. tab. 32. fig. 3.
Barrel. Icon. 1288. fig. 2.
Rumph. Mus. tab. 2. fig. 6. *D.*
Brown. Jam. tab. 41. fig. 1.
Seb. Mus. 3. tab. 20. fig. 1.
 Habitat in Oceano Europae, Asiae, Africae, Americae.

2. Sc. antennarum squamis laeuibus rotundatis. *australis.*
 Habitat in Oceano australiori. *Mus. Dom. Banks.*
 Specimen nostrum siccatum, male conseruatum. Statura praecedentis, at multo angustior. Squamae biarticulatae, loco antennarum posticarum rotundatae, laeues. Thorax inaequalis, at haud spinosus margine crenato. Pedes decem vngue simplici, vti in praecedente.

129. ASTACVS.

1. A. antennis posticis bifidis, thorace laeui, rostro lateribus dentato, basi supra dente duplici. *Syst. Ent.* 413. 1. *Iter Norw.* *marinus.*
Cancer gammarus. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1051. 62. *Fn. Sv.* 2033.
Iter Wgoth. 174.
Mus. Adolph. Frid. 87.
Bast. subj. 2. 6. tab. 1.
 Habitat in Oceano Norwagico frequens.

2. A. antennis posticis bifidis, thorace laeui, rostro lateribus dentato, basi dente vtrinque vnico. *Syst. Ent.* 413. 2. *fluuiatilis.*
Cancer Astacus. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1051. 63. *Fn. Sv.* 2034.
Astacus fluuiatilis thorace laeui, rostro supra dentato, basi vtrinque dente vnico, chelis maximis papilloso scabris. *Degeer Inf.* 7. 365. 1. tab. 20, fig. 1.

Can-

Cancer macrourus, rostro supra ferrato, basi vtrinque dente simplici, thorace integro. *Geoff. Inf.* 2. 666. 1.
Mus. Adolph. Frid. 1. 87.

Gronov. Zooph. 977.

Roef. Inf. 3. tab. 54. fig. 55.

Ionst. Exsangu. tab. 4. fig. 1.

Sulz. Inf. tab. 23. fig. 151.

Habitat in Europae lacubus, fluuiis.

homarus. 3. A. antennis posticis bifidis, thorace antrorsum aculeato, fronte bicorni, manibus adactylis. *Syst. Ent.* 414. 3.

Cancer homarus. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1053. 74. *Mus. Lud. Vr.* 457.

Rumph. Mus. tab. 1. fig. A.

Gronov. Zooph. 981.

Margraf. Bras. 245. tab. 246.

Petiv. amb. tab. 6. fig. 1.

Seb. Mus. 3. tab. 21. fig. 5.

Habitat in mari Asiatico, Americano.

Corpus punctis rotundis albis variegatum. Aculei apice rufi. Antennae anticae aculeatae. Pedes omnes terminantur digito piloso.

carcinus. 4. A. antennis posticis bifidis, thorace laeui, manibus teretiusculis, brachiis hispido aculeatis. *Syst. Ent.* 414. 4.

Cancer carcinus. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1051. 64.

Locusta marina. *Rumph. Mus.* tab. 1. fig. B.

Astacus fluuiatilis maior chelis aculeatis. *Sloan. Jam.* 2. 271. tab. 245. fig. 2.

Seb. Mus. 3. tab. 21. fig. 4.

Habitat in Americae fluuiis.

coerule-scens. 5. A. antennis posticis bifidis, coerule-scens, thorace laeui, rostro porrecto subulato bidentato. *Syst. Ent.* 414. 5. *

Habitat in Pelago inter Tropicos frequens. *Mus. Dom. Banks.*

fulgens. 6. A. antennis posticis bifidis, rostro breuissimo subulato, pedibus simplicibus. *Syst. Ent.* 415. 6. *

Habitat in Oceano Brasiliam alluente, noctu fulgens. *Mus. Dom. Banks.*

7. A. antennis posticis bifidis, corporis segmentis dorso *Homari*.
 subspinosis, cauda fasciculata, stylis ferratis. *Iter*
Norwag. d. 18. Iul. *
Cancer dorso carinato ferrato. *Stroem. Act. Hafn.* x.
 pag. 5. tab. 2.
Cancer macrourus articularis, dorso carinato ferrato,
 spinis caudae bifidis. *Mill. Zool. Dan.* 197. 2358.
 Habitat in Oceano Norwagico.
8. A. antennis posticis bifidis porrectis, rostro subulato, *Haren-*
 oculis globosis prominentibus. *It. Norwag.* d. 18. *gum.*
 Iul. *
 Habitat in Oceano Norwagico copiosissime, Harengum
 et Gadorum esca.
 Marum articulus primus et secundus pedunculi anten-
 narum posticarum apice inferiori vngiculati, forte
 Genitalia.
9. A. antennis posticis bifidis, thorace articulado, pedi- *crassicorn-*
 bus sexti paris longissimis. *Syst. Ent.* 415. 7. * *nis.*
 Habitat in Oceano Americano. *Mus. Dom. Banks.*
10. A. antennis posticis bifidis, thoracis margine bidenta- *histrio.*
 to, rostro lanceolato ferrato, corpore variegato.
Syst. Ent. 415. 8. *
Cancer pennaceus macrourus, thorace laevi cylindri-
 co, rostro ensiformi, margine superiori ferrato.
Linn. Syst. Nat. 2. 1051. 65. ?
 Habitat in Groenlandia.
11. A. antennis posticis bifidis, thorace laevi inermi, che- *malaba-*
 la dextra maiori, pedibus filiformibus. *Syst. Ent.* *ricus.*
 415. 9. *
 Habitat ad littora Malabarica. *Dr. Koenig.*
12. A. antennis posticis bifidis, thorace aculeato, pedibus *Boreas.*
 secundi tertiique paris filiformibus.
Cancer Boreas macrourus, thorace carinato aculeato,
 manibus laevibus, pollice subulato incurvo. *Phipps.*
Iter boreal. 190. tab. 12. fig. 1.
 Habitat in Oceano boreali. *Mus. Dom. Banks.*
 Rostrum breue, depressum, vtrinque canaliculatum,
 acutum, subtus dente valido.

- carina-* 13. *A. antennis* posticis bifidis, thoracis carina dentata,
tus. rostro breui recuruo apice tridentato.
Habitat — — — — *Muf. Dom. Banks.*
Thoracis carina valde elevata, quadridentata, quae terminat in rostrum breue, recuruum, apice truncatum, tridentatum. Margo thoracis anticus videntatus et spina incumbens, acuta vtrinque fere in medio thoracis. Abdomen carinatum carina antice posticeque spinosa. Cauda foliolis quinque intermedia acutiore.
- groenlan-* 14. *A. antennis* posticis bifidis, thorace margine antico
dicus. rostroque dentatis, palpis apice spinosis, corpore fusco. *Syst. Ent.* 416. 10. *
Habitat in mari Groenlandico.
- varius.* 15. *A. antennis* posticis bifidis, thoracis margine vnidentato, rostro vtrinque serrato, corpore variegato. *Iter Norweg.* d. 4. Aug.
Habitat in Oceano Norwagico capt. d. 4. Aug.
- emeritus.* 16. *A. antennis* — — — — manibus nullis, pedibus vtrinque quinque natatoriis. *Syst. Ent.* 416. 11.
Cancer emeritus. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1055. 79.
Emerita Gron. Zooph. 1000. tab. 17. fig. 8. 9.
Pet. pterigr. tab. 20. fig. 9.
Habitat in mari Indico.
Specimina mea imperfecta, adeoque de genere dubius haereo.
- norwagi-* 17. *A. antennis* posticis trifidis, thorace antrorsum aculeato,
cus. manibus prismaticis, angulis spinosis. *Syst. Ent.* 416. 12.
Cancer Norwagicus. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1053. 73. *Fn. Sv.* 2039.
Muf. Lud. Plv. 456. *Muf. Ad. Frid.* 1. 88.
Astacus norwagicus thorace conuexo, capite aculeato, chelis prismaticis elongatis, seriebus quaternis spinosis. *Degeer Inf.* 7. 398. 3. tab. 24. fig. 1.
Gron. Zooph. 979.
Seb. Muf. 3. tab. 21. fig. 3.
Habitat in mari Norwagico.

Varietatem duplo minorem e mari mediterraneo accepimus.

18. A. antennis posticis trifidis, thorace laeui, rostro supra ferrato, subtus tridentato, thoracis margine quinquentato. *Syst. Ent.* 416. 13. *Squilla.*

Cancer squilla macrourus, thorace laeui, rostro supra ferrato, subtus tridentato, manuum digitis aequalibus. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1051. 66. *Fn. Sv.* 2037.

Sulz. Hist. Inf. tab. 32. fig. 4.

Klein. dub. 35. fig. A.

Seb. Musf. 3. tab. 21. fig. 9. 10.

Bast. subf. 2. 30. fig. 5.

Gron. Zooph. 986.

Habitat in Oceano Europaeo, mari Balthico frequens. Variat rostro recto et incuruo.

19. A. antennis posticis trifidis, thorace laeui, rostro porrecto supra ferrato, subtus laeui, digitis elongatis filiformibus. *locusta.*

Habitat — — — — *Musf. Dom. Banks.*

Statura praecedentis, at minor. Rostrum elongatum, supra ferratum, subtus laeue. Thorax laeuis margine vtrinque videntato. Pedes antici elongati, filiformes. Manus ouatae, breues digitis elongatis, linearibus, acutis.

20. A. antennis posticis trifidis, thorace laeui, rostro breui integerrimo, manuum pollice longiori. *Syst. Ent.* 417. 14. *Crangon.*

Cancer Crangon. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1052. 67. *Fn. Sv.* 2038.

Squilla marina bataua. *Bast. subf.* 2. 27. tab. 3. fig. 1-4.

Seb. Musf. 3. tab. 21. fig. 8.

Roef. Inf. 3. tab. 63. fig. 1. 2.

Habitat in mari Balthico.

21. A. antennis posticis trifidis, thorace spinoso, pedibus quatuor anticis filiformibus. *Syst. Ent.* 417. 15. * *tettignus.*

Habitat in Islandia. *Dr. Koenig.*

Affinis videtur A. Boreae.

Varietas minor carina thoracis tridentata, vix distincta.

Fabr. Spec. Inf.

K k

130. Squil-

130. S Q V I L L A.

Mantis. 1. *S. manibus adaetylis compressis falcatis ferrato dentatis.*

Astacus Mantis. Syst. Ent. 417. 16.

Squilla Mantis marina corpore elongato, thorace angulato, cauda lata depressa spinosa, pedibus anticis chelatis dentatis. *Degeer Inf.* 7. 533. 5. tab. 34. fig. 1.

Cancer Mantis. Linn. Syst. Nat. 2. 1054. 76. *Fu. Sv.* 2635. *Mus. Adolph. Frid.* 1. 86.

Sulz. Hist. Inf. tab. 32. fig. 2.

Cancer arenarius. Rumph. Mus. tab. 3. fig. 2.

Tamaru guacu. Margr. Braj. 186. tab. 187.

Seb. Mus. 3. tab. 20. fig. 2. 3.

Gron. Zooph. 984.

Habitat in mari Asiatico, Indico, mediterraneo. Italis esculentus.

Cenus omnino distinctum. *Os* mandibulis palpisque absque maxillis. *Palpi* sex inaequales. *Anteriores* laterales, elongati, compressi, arcuati, filiformes, quincarticulati, articulo secundo longissimo, ultimo brevissimo, rotundato, ciliato. *Medii* breves, lati, compressi, os obtegentes, quadriarticulati, articulis subaequalibus; ultimo acutiufculo, ciliato. *Posteriores* breves, filiformes, triarticulati, articulis subaequalibus, compressis, mandibulae dorso adhaerentes. *Mandibula* crassa, cornea, apice compressa, concava, dentata processu laterali elongato, subulato, lateribus dentatis. *Labium* duplex. *Exterius* breve, corneum, bifidum, laciniis concavis, fissis, laminis aequalibus, exteriore subulata, acutissima, interiori apice latiori, truncata, ciliata, *interius* breve, subcorneum, bifidum laciniis distantibus, quadratis, angulatis, obtusis. *Clypeus* rotundatus, concavus, fornicatus, integer. *Antennae* quatuor, subaequales. *Anteriores* pedunculatae, setaceae, multiarticulatae; articulis brevissimis, pedunculo triarticulato, extus lamina ovata ciliata basi articulata suffultae. *Posteriores* pedunculatae pedunculo quadriarticulato, setaceae multiarticulatae trifidae.

Scyllarus. 2. *S. manibus adaetylis ventricosis rectis angulatis introrsum tridentatis.*

Asta-

Astacus scyllarus. Syst. Ent. 417. 17.

Cancer scyllarus. Linn. Syst. Nat. 2. 1054. 77. Mus.
Lud. Vtr. 457.

Cancer mirabilis. Linn. Mus. Adolph. Frid. 1. 86.

Seb. Mus. 3. tab. 20. fig. 6.

Habitat in mari Asiatico.

3. S. manibus adaetylis subulatis basi nodosis rufis. *chiragra*.

Squilla arenaria marina Rumph. Mus. tab. 3. fig. F.

Habitat in Oceano Australi. Mus. Dom. Banks. Mani-
bus acutissimis vulnerans.

Statura omnino S. Mantis, at triplo minor. Antennae
aequales pedunculatae posticis trifidis. Thorax
planus, laevis, bifurcatus lamina marginis ante-
rioris mobili tridentata, dente anteriori porrecto
acutissimo. Abdomen segmentis undecim, rotun-
datis laevibus, decimo lineis sex elevatis spinosis
ultimo lineis elevatis spinosis margineque postico
spinis ferrato. Cauda sub decimo segmento infer-
ta foliolis vtrinque tribus exteriore lineato, mar-
gineque exteriori acutissime ferrato, interiori ro-
tundato ciliato, intermedio depresso, apice late
bifido laciniis acutissimis, interiori ovato ciliato.
Pedes 14 anteriores duo femoribus incrassatis, subtus
antice canaliculatis. Tibiae breves, compressae su-
pra canaliculatae, apice subincrassatae coeruleae. Ma-
nus basi exteriori nodo rufo, subulatae, acutissi-
mae. Pedes sex sequentes approximati articulo vlti-
mo compresso acute unguiculato. Pedes reliqui fili-
formes tibiis lamina cylindrica, ciliata suffulti. Na-
tatorii breves, compressi, rotundati, bifidi.

4. S. thorace laevi carinato, angulis subulatis, manibus *vitreus*.
falcato subulatis integris.

Astacus vitreus. Syst. Ent. 417. 18. *

Habitat in Oceano Atlantico. Mus. Dom. Banks.

131. G A M M A R V S.

1. G. manibus adaetylis, pedibus quatuordecim, femori-*ampulla*.
bus posticis compresso dilatatis.

Cancer Ampulla macrourus articularis, corpore ova-
li, pedibus quatuordecim simplicibus, laminis fe-

morum postici paris ovato subrotundis. *Phips Iter Bor.* 191. tab. 12. fig. 3.

Habitat in Oceano boreali. *Mus. Dom. Banks.*

Corpus magnum in hoc genere, ampullaceum, fere album. Rostrum breve, incuruum, acutiusculum.

Cauda foliolis sex articulo ultimo bifido, laciniis acutis.

nugax. 2. G. manibus adactylis, pedibus quatuordecim, femoribus sex posticis compresso dilatatis.

Cancer nugax macrourus articularis pedibus quatuordecim simplicibus laminis femorum sex posteriorum dilatatis subrotundo cordatis. *Phips Iter. Bor.* 192. tab. 12. fig. 2.

Habitat in Oceano boreali. *Mus. Dom. Banks.*

Antennae quatuor posterioribus seta minori suffultis.

cancellus. 3. G. manibus quatuor monodactylis, pedibus sedecim. *Oniscus cancellus.* *Pall. Spicil. Zool. fasc. 9.* 53. tab. 3. fig. 18.

Habitat in Sibiriae fluviis.

Maior G. Locusta. Antennae anticae incurvae.

longicornis. 4. G. manibus adactylis, antennis corpore longioribus, cauda obtusa. *Iter Norw. d.* 4. Aug. *

Cancer grossipes. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1055. 80.

Astacus muticus, pede antico subulato edentulo longissimo crassissimo. *Gron. Zooph.* 989. tab. 17. fig. 7.

Oniscus volutator. *Pallas Spicil. Zool. fasc. 9.* 59. tab. 4. fig. 9.

Habitat in Europae Oceano.

locusta. 5. G. manibus quatuor adactylis, pedibus quatuordecim, femoribus simplicibus. *Syst. Ent.* 418. 1.

Cancer locusta. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1055. 82. *Fn. Sv.* 2042.

Oniscus locusta. *Pall. Spicil. Zool.* 9. 56. tab. 4. fig. 7. *Sulz. Inf.* tab. 23. fig. 152.

Frisch. Inf. 7. tab. 18.

Roef. Inf. 3. tab. 62.

Klein miss. 5. tab. 6. fig. A. B. C.

Habitat sub Europae maritimis frequentissimus, dorso innatans, etiam in fontibus et fossis.

Conf.

Conf. *Oniscus gammarellus*. *Pall. Spicil. Zool. fasc. 9. 57. tab. 4. fig. 8.*

6. G. manibus quatuor adaetylis, pedibus decem. *Syst. pulax. Ent. 418. 2.*

Squilla pulax aquatica, corpore compresso, pedibus quatuor anticis chelatis, cauda setis sex bifurcis terminata. *Degeer Inf. 7. 525. 4. tab. 33. fig. 1. 2.*

Pulex fluuiatilis. *Raj. Inf. 44.*

Pulex marinus. *Bast. subf. 2. 31. tab. 3. fig. 7.*

Gronov. Zooph. 990.

Habitat ad Oceani littora frequentissimus, saliens, piscibus infestus, in branchiis ulcera cauflans.

7. G. manibus adaetylis, rostro incuruo subulato, thoracis lateribus cornu duplici. *Iter Norwag. d. 20. Aug. **

Habitat in Oceano Norwagico, capt. d. 20. Aug.

8. G. manibus quatuor monodactylis, pedibus decem. *linearis. Syst. Ent. 419. 3.*

Cancer linearis. *Linn. Syst. Nat. 2. 1056. 83.*

Oniscus scolopendroides. *Pall. Spicil. Zool. fasc. 9. tab. 4. fig. 15.*

Mart. Spixb. tab. P. fig. 1.

Bast. subf. 1. 32. tab. 4. fig. 2.

Habitat in Oceano Islandico. *Dr. Koenig, in Insula terra noua. Mus. Dom. Banks.*

Cancer atomos. *Linn. Syst. Nat. 2. 1056. 84. vix differt.*

9. G. pedibus viginti patentibus, cauda subulata. *Syst. Ent. salinus. 419. 4.*


Cancer salinus. *Linn. Syst. Nat. 2. 1056. 86.*

Maty diar. brit. 1756.

Habitat in Angliæ salinis Limingtonianis.

Duas video varietates, alteram oculis prominulis, globosis, atris ouarioque vtrinque ouato; alteram coecutientem pedibus anticis porrectis chelatis. An potius Monoculus?

- stagnalis*. 10. G. manibus adaetylis, pedibus patentibus, cauda cylindrica bifida. *Syst. Ent.* 419. 5.
Cancer stagnalis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1056. 87. *Fn. Sv.* 2043.
 Habitat in Europae aquis stagnantibus.
- esca*. 11. G. manibus adaetylis, cauda articulata subulata apice fissa. *Iter Norwag.* d. 4. Aug. *
 Habitat in Oceano Norwagico. Harengum cibus gratissimus.
- Medusarum*. 12. G. manibus quatuor monodactylis, capite obtusissimo. *Iter Norwag.* d. 8. Aug.
Pulex cancriformis. *Stroem. Sundm.* 118. tab. 1. fig. 12. 13.
Cancer Medusarum antennis brevissimis, corpore latiori. *Müll. Zool. Dan. prodr.* 2355.
 Habitat sub Medusis Oceani Norwagici.
-



CLASSIS V.

V N O G A T A.

132. LIBELLULA.

1. **L.** alis posticis basi omnibusque medio antico macula nigricante, abdomine depresso tomentoso. *Syst. Ent.* 420. 1. *amaculata.*

Libellula amaculata alis posticis basi omnibusque medio antico macula nigricante. *Linn. Syst. Nat.* 2. 901. 1. *Fn. Sv.* 1459.

Libellula alis macula duplici marginali. *Geoff. Inf.* 2. 224. 6.

Libellula maxima, abdomine breviori latiorique flavo. *Raj. Inf.* 49. 4.

Reaum. Inf. 6. tab. 35. fig. 1. 2.

Habitat in Europae aquosis.

2. **L.** alis omnibus basi nigricantibus, abdomine depresso lateribus flavicante. *Syst. Ent.* 420. 2. *depressa.*

Libellula depressa alis omnibus basi nigricantibus, thorace lineis duabus flavis, abdomine lanceolato lateribus flavicante. *Linn. Syst. Nat.* 2. 902. 5. *Fn. Sv.* 1413.

Libellula thorace viridi nitido, lineis flavis, alis albis, abdomine nigro coerulescente. *Geoff. Inf.* 2. 226. 9.

Libellula maxima, abdomine breviore latioreque coeruleo. *Raj. Inf.* 49. 5.

Reaum. Inf. 6. tab. 35. fig. 1.

Roef. Inf. 2. aqu. tab. 6. fig. 4.
tab. 7. fig. 3.

Edw. Av. tab. 333.

Habitat ad Europae aquas.

Variat colore. Mas abdomine coerulescente maculis lateralibus baseos flavis, femina abdomine fusco lateribus flavis.

bifasciata. 3. L. alis hyalinis, macula baseos fasciisque duabus fuscis. *Syst. Ent. 421. 3. **

Libellula 3maculata capite globofo, alis albis, media macula, basi fascia longitudinali fuscis. *Degeer Inf. 3. 556. 2. tab. 26. fig. 2.*

Libellula pulchella. *Drury Inf. 1. tab. 48. fig. 5.*

Habitat in America. *Mus. Dom. Banks.*

4punctata. 4. L. alis albis, posticis basi nigris linea flava, omnibus puncto atro, abdomine rotundato.

Habitat in America. *Dom. Blankburn.*

Statura L. bifasciatae. Os nigrum labii lateribus flavis. Frons vesiculosa, viridis. Thorax tomentosus obscure virescens. Abdomen rotundatum basi virescens apice nigricans. Alae omnes albae puncto atro in medio marginis crassioris et stigmate oblongo ordinario ad apicem. Posticae basi atrae flauo tenuissime reticulatae et linea flava lata versus marginem anticum.

flaueola. 5. L. alis basi luteis. *Syst. Ent. 421. 4. Linn. Syst. Nat. 2. 901. 2. Fn. Sv. 1460.*

Libellula alis albis basi luteis, abdomine lutescente. *Geoff. Inf. 2. 225. 7.*

Schaeff. Icon. tab. 4. fig. 1.

Habitat in Europa ad aquas.

Variat rarius alis absque macula lutea.

stigmatizans. 6. L. flauescens, alis macula apiceque fuscis, stigmate nuceo. *Syst. Ent. 421. 5. **

Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

7. L. flavescens, alis anticis apice, posticis margine *oculata*.
aqueis, stigmate nuceo. *Syst. Ent.* 421. 6. *
Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
8. L. alis flauo fuscoque variis apice albis, posticis macula *indica*.
bascos cyanea.
Libellula Arria. Drury Inf. 2. tab. 46. fig. 1.
Habitat in Coromandel. *Mus. Dom. Banks.*
Media. Corpus fuscum. Alae anticae basi flauae ma-
cula fasciaque media fuscis et pone hanc ala aquea
stigmate ordinario nigro. Posticae fere totae flauae
macula bascos cyanea, in medio fascia sinuata, quae
a medio marginis crassioris ad marginem tenuiorem
et inde ad angulum ani extenditur. Versus api-
cem macula fusca puncto magno flauo. Apex alae
flauus.
9. L. alis albis, fronte eleuata vesiculosa thoraceque fla- *vesiculosa*.
uis immaculatis. *Syst. Ent.* 421. 7. *
Habitat in America.
10. L. alis tantum posticis basi nigricantibus, corpore te- *rubicun-*
staceo. *Syst. Ent.* 422. 8. *Linn. Syst. Nat.* 2. 902. 4. *da.*
Fn. Sv. 1462.
Roef. Inf. 2. aqu. 2. tab. 7. fig. 4.
Raj. Inf. 50. 8.
Habitat in Europa ad aquas.
11. L. alis basi flavescentibus, corpore obscure ferrugineo. *ferrugi-*
Habitat ad Cap. Bon. Spei. *Mus. Dom. Banks.* *nata.*
Corpus totum obscure ferrugineum. Alae albiae re-
ticulatae basi flavescentes apiceque stigmate ordina-
rio fusco. Pedes valde ciliati.
12. L. thorace flauo, striis octo nigris. *Syst. Ent.* 422. 9. *vulgatiss-*
Linn. Syst. Nat. 2. 502. 6. *Fn. Sv.* 1464. *ima.*
Libellula lateribus flauis, alis albis. Geoff. Inf. 2. 227.
11.
Roef. Inf. 2. aqu. 2. tab. 5. fig. 3.
Habitat in Europa ad aquas.

- obscura.* 13. L. alis totis ferrugineis, corpore obscuro. *Syst. Ent.* 422. 10. ♀
Habitat in America. *Dom. Lewin.*
- vulgata.* 14. L. alis hyalinis immaculatis, abdomine cylindrico rufo. *Syst. Ent.* 422. 11.
Libellula vulgata alis hyalinis, corpore griseo, cauda simplici. *Linn. Syst. Nat.* 2. 901. 3. *Fn. Sv.* 1461.
Roef. Inf. 2. *aqu.* 2. tab. 8.
Habitat ad Europae aquas.
- cancellata.* 15. L. alis basi immaculatis, abdomine, dorso lateribusque interrupte luteis. *Syst. Ent.* 422. 12. *Linn. Syst. Nat.* 2. 902. 7. *Fn. Sv.* 1465.
Habitat ad Europae aquas.
- paedemontana.* 16. L. alis planis cinereis, fascia apicis fusca.
Libellula Harpedone. *Sulz. Hist. Inf.* tab. 24. fig. 1. ?
Habitat in agro Pedemontano. *D. Allioni.*
Parua. Corpus obscure flavescens.
- fasciata.* 17. L. alis planis fuscis, striga alba. *Syst. Ent.* 422. 13.
Libellula fasciata alis planis fuscis, fascia lineari alba. *Linn. Syst. Nat.* 2. 903. 12.
Libellula violacea capite globoso, alis violaceo fuscis, fascia transuersali lineari alba. *Degeer Inf.* 3. 559. 6. tab. 26. fig. 7.
Edw. Av. 174. tab. 174.
Habitat in India ad aquas.
- umbrata.* 18. L. alis planis atris, fascia alba. *Syst. Ent.* 422. 14. *Linn. Syst. Nat.* 2. 903. 13.
Libellula unifasciata capite globoso, alis albis, fascia transuersali fusca. *Degeer Inf.* 3. 557. 3. tab. 26. fig. 4.
Habitat in America meridionali.
- dimidiata.* 19. L. alis planis a basi ad medium nigris. *Syst. Ent.* 422. 15. *Linn. Syst. Nat.* 2. 903. 14.
Libellula marginata capite globoso, alis dimidiato fuscis albisque fusco cinctis. *Degeer Inf.* 3. 558. 5. tab. 26. fig. 6.

Seb. Mus. 4. tab. 78. fig. 7. 8.
tab. 86. fig. 19.

Habitat in America.

20. L. alis dimidiato nigris, fascia media niuea. *equestris.*
Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*
Parua. Corpus fuscum linea dorsali flaua. Alae omnes
a basi ad medium nigrae, tunc fascia niuea apice
aqueae stigmatate ordinario fusco.
21. L. alis anticis testacco obsoletis, posticis viridibus, *chinensis.*
apice fuscis. *Syst. Ent.* 423. 16. *Linn. Syst. Nat.* 2.
904. 15.
Edw. Av. 112. tab. 112.
Habitat in China.
22. L. alis planis albis, maculis tribus atris tribusque ci-*versicolor.*
nereis. *Syst. Ent.* 423. 17. *
Habitat in America. *Mus. Dr. Hunter.*
23. L. alis purpurascensibus, fascia alba, anticis apice *america-*
albis, posticis linea baseos alba. *Syst. Ent.* 423. 18. *na.*
Linn. Syst. Nat. 2. 904. 16.
Habitat in India.
Corpus viride.
24. L. alis nigris, anticis macula apicis, posticis margine *margina-*
albis. *ta.*
Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*
Media. Frons cyanea. Oculi magni fusci flauo pun-
ctati. Thorax niger immaculatus. Abdomine fus-
cum basi albidum. Alae omnes nigrae, nitidae,
anticae macula magna apicis alba, posticae margi-
ne toto tenuiori albo. Pedes nigri.
25. L. alis albis, corpore ferrugineo, ore puncto vtrin-*ferrugi-*
que flauo. *Syst. Ent.* 423. 19. * *nea.*
Habitat in America.

- tomento-
sa.* 26. L. alis albis, corpore tomentoso fusco viridique variegato. *Syst. Ent.* 423. 20. *
Habitat in America.
- aenea.* 27. L. alis hyalinis, thorace viridi aeneo. *Syst. Ent.* 423. 21. *Linn Syst. Nat.* 2. 902. 8. *Fn. Sv.* 1466.
Libellula viridi inaurata, alis pallidis, pedibus nigris. *Geoff. Inf.* 2. 226. 10.
Libellula viridi aurata, capite rotundato, pedibus nigris, abdominis medio inflato. *Degeer Inf.* 2. 2. 52. tab. 19. fig. 8.
Schaeff. Icon. tab. 113. fig. 4.
Roef. Inf. 2. aqu. tab. 182. f. 1. 2. tab. 5. fig. 2.
Raj. Inf. 49. 5.
Habitat ad Europae aquas.
- cyanea.* 28. L. alis albis, stigmate niueo terminato, corpore cyaneo. *Syst. Ent.* 424. 22. *
Habitat in America. *Dom. Lewin.*
- variegata.* 29. L. alis flavo fuscoque variis apice albis stigmate albo nigro terminato.
Libellula Lucia. Drury Inf. 2. tab. 45. fig. 1.
Habitat in Africa aequinoctiali. *Mus. Dom. Banks.*
Parua. Caput obscure flavescens. Thorax obscurus lineis duabus sub alis scutelloque sulphureis. Abdomen sulphureum striis tribus nigris, lateralibus latioribus, intermedia basi attenuata. Alae omnes basi flavo fuscoque variae apice stigmate ordinario albo nigro terminato. Pedes nigri femoribus basi flavescentibus.
- carolina.* 30. L. alis albis, posticis basi dentato ferrugineis, thorace fusco. *Syst. Ent.* 424. 23.
Libellula carolina alis patentibus hyalinis, posticis basi tota late ferruginea. *Linn. Syst. Nat.* 2. 504. 17. ?
Amoen. acad. 6. 411. 85. ?
Libellula chinensis capite globofo, alis posticis basi macula magna fusca flavo cincta venisque flavis.
Degeer Inf. 3. 556. 1. tab. 26. fig. 1.
Libellula carolina. Drury Inf. 1. tab. 48. fig. 1.
Habitat in America.

31. L. alis patentibus albidis fusco vndique maculatis *capensis*.
 punctatisque. *Syst. Ent.* 424. 24. *Linn. Syst. Nat.*
 2. 904. 19.
Seb. Mus. 4. tab. 86. fig. 17.
 Habitat ad Cap. bon. sp.

133. A E S H N A.

1. A. thorace nigro, characteribus variis flavescentibus, *forcipata*.
 cauda vnguiculata. *Syst. Ent.* 424. 1.
Libellula forcipata. *Linn. Syst. Nat.* 2. 903. 11. *Fn. Sv.*
 1469.
Libellula nigra capite rotundato, thorace segmentisque
 aliquot abdominis viridi maculatis. *Degeer Inf.* 2.
 2. 50.
Libellula thorace luteo virescente lineis nigris, abdo-
 mine nigricante, characteribus flavis. *Geoff. Inf.* 2.
 228. 13.
Schaeff. Icon. tab. 160. fig. 1.
 — — — tab. 186. fig. 1.
Petiv. Mus. 84. tab. 10. fig. 4.
Reaum. Inf. 4. tab. 10. fig. 4.
 — — 6. tab. 35. fig. 5.

Habitat in Europa.

2. A. thorace lineis quatuor flavis, corpore variegato. *grandis*.
Syst. Ent. 424. 2.
Libellula grandis alis glaucescentibus, thoracis lineis
 quatuor flavis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 903. 9. *Fn. Sv.*
 1467.
Libellula fulva, alis flavescentibus, thoracis lateribus
 lineis duabus flavis, fronte flavescente, cauda di-
 phylla. *Geoff. Inf.* 2. 227. 12.
Libellula fusca, capite rotundato, thorace lineolis qua-
 tuor transuersis luteis, alis flavicantibus, abdomine
 cylindrico. *Degeer Inf.* 2. 2. 45. tab. 20. fig. 6.

Libel-

Libellula maxima vulgatissima, alis argenteis. *Raj. Inf.*
48. 1.

Sulz. Inf. tab. 17. fig. 101.

Aët. vidros. 3. 412. tab. 6. fig. 9.

Reaum. Inf. 6. tab. 35. fig. 3.

Roef. Inf. 2. aqu. 2. tab. 4. fig. 14.

Schaeff. Icon. tab. 2. fig. 4.

Habitat in Europa ad aquas.

Colores corporis pulcre variegati vita pereunt.

variegata. 3. A. thorace lineis vtrinque duabus flavis, alis basi macula flava. *Syst. Ent.* 425. 3. *

Habitat in Terra del Fuego. *Mus. Dom. Banks.*

clauata. 4. A. abdomine clauato basi gibbo, corpore fusco viridique variegato. *Syst. Ent.* 425. 4. *

Habitat in China. *Dom. Drury.*

134. AGRION.

virgo. 1. A. alis erectis coloratis. *Syst. Ent.* 425. 1.

Libellula virgo. *Linn. Syst. Nat.* 2. 904. 20. *Fn. Sv.*
1470.

α. *Libellula* corpore viridi coeruleo nitido, alis medio coeruleo-fulvis basi et apice albis, margine immaculato. *Geoff. Inf.* 2. 221. 1.

Roef. Inf. 2. aqu. 2. tab. 9. fig. 7.

Raj. Inf. 50. n. 11.

Schaeff. Elem. tab. 78. fig. 1.

β. *Libellula* corpore sericeo nitido, alis viridi coeruleo-fulvis apice fuscis margine immaculatis. *Linn. Fn. Sv.* 1. 757.

Raj. Inf. 50. n. 10.

Reaum. Inf. 6. tab. 35. fig. 7.

Lewenh. arc. 19. tab. 19.

γ. *Libel-*

γ. *Libellula viridi sericea*, alis subfuscis, puncto marginali albo. *Geoff. Inf.* 2. 122. 2. *Fn. Sv.* 1. 758.

Roef. Inf. 2. *aqu.* 2. tab. 9. fig. 6.

Raj. Inf. 51. n. 12.

δ. *Libellula corpore sericeo nitido*, alis inaurato fuscis macula nigra. *Linn. Fn. Sv.* 1. 759.

Mouff. Inf. 68. fig. 1. 3.

Roef. Inf. 2. *aqu.* 2. tab. 9. fig. 5.

Raj. Inf. 50. n. 9.

Habitat ad Europae fluuios frequens.

2. A. alis erectis hyalinis. *Syst. Ent.* 426. 2.

puella.

Libellula puella. *Linn. Syst. Nat.* 2. 905. 21. *Fn. Sv.* 1471.

α. *Libellula corpore coeruleo cinereoque alterno*, alis puncto marginali nigro. *Geoff. Inf.* 2. 222. 3.

Raj. Inf. 51. n. 15.

Reaum. Inf. 6. tab. 40.

Roef. Inf. 2. *aqu.* 2. tab. 10. fig. 3. 4.

Sulz. Inf. tab. 17. fig. 102.

Schaeff. Icon. tab. 120. fig. 4. 5. 6.

β. *Libellula corpore infra coeruleo viridi*, supra fusco, thorace fasciis fuscis coeruleis etque alternis, puncto alarum marginali nigro. *Geoff. Inf.* 2. 223. 4.

Roef. Inf. 2. *aqu.* 2. tab. 11. fig. 7.

γ. *Libellula corpore viridi pallide incarnato*, thorace fasciis tribus longitudinalibus nigris, alis puncto marginali fusco. *Geoff. Inf.* 2. 224. 5.

Libellula obscure viridis nitida, capite latiore, alis hyalinis, oculis viridibus. *Degeer Inf.* 2. 2. 60.

Habitat in pratis Europae paludosis, victitans rapina muscarum.

Varietates harum specierum innumerae, at copula iunguntur, ideoque haud distinctae.

Aliam

Aliam adhuc vidimus tibiis quatuor posticis albo membranaceis, ciliatis, at vix distincta videtur.

ciliata. 3. A. viridi aenea, abdomine fusco, pedibus ciliatis nigris.

Habitat in Coromandel. *Mus. Dom. Banks.*

Statura omnino praecedentium. Caput aeneum nitidum oculis magnis prominulis fuscis. Thorax obscure aeneus. Alae erectae, obscurae macula marginali ordinaria. Abdomen cylindricum, fuscum. Pedes valde ciliati, nigri.

nobilitata. 4. A. alis erectis, posticis supra viridi sericeis apice atris. *Gen. Inf. Mant.* 248. *

Habitat in America meridionali. *Dom. Spengler.*

linearis. 5. A. alis reticulatis, abdomine longissimo. *Gen. Inf. Mant.* 249. *

Libellula Lucretia. *Drury Inf.* 2. tab. 48. fig. 1.

Sulz. Hist. Inf. tab. 24. fig. 4.

Habitat in India. *D. Fothergill.*

Stigma alarum mox flavescens, mox nigrum.

135. I V L V S.

ouatus. 1. I. pedibus vtrinque 20. *Syst. Ent.* 427. 1. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1064. 1. *Amoen. acad.* 4. 253. 36. tab. 3. fig. 4.

Oniscus. *Gron. Zooph.* 995. tab. 17. fig. 4. 5.

Habitat in Oceano Europaeo.

varius. 2. I. pedibus vtrinque 78, segmentis basi nigris apice albis.

Habitat in Italia. *D. Allioni.*

Medius.

Medius. Caput nigrum fascia media alba. Segmenta corporis albida, basi nigra. Margo tenuissime ferrugineus. Pedes nigri.

3. I. pedibus vtrinque 80. *Syst. Ent.* 427. 2. *Linn. Syst. crassus.*
Nat. 2. 1065. 2. *Amoen. acad.* 4. 253. 35.

Habitat in Asia.

Corpus pallefcens vtrinque linea e punctis minutissimis nigris. Cauda acuta.

4. I. pedibus vtrinque 100. *Syst. Ent.* 427. 3. *Linn. Syst. terrestris.*
Nat. 2. 1065. 3. *Fn. Sv.* 2066. *Geoff. Inf.* 2. 679. 1.

Iulus fasciatus nigro fuscus, lineis binis longitudinalibus rufis, pedibus vtrinque 100. *Degeer Inf.* 7. 578.
2. tab. 36. fig. 9. 10.

Iulus quartus glaber. *Raj. Inf.* 46. 4.

Sulz. Inf. tab. 24. fig. 156.

— *Hist. Inf.* tab. 30. fig. 15.

Aldrov. Inf. 636. fig. 4.

Frisch. Inf. 2. tab. 8. fig. 3.

Ionst. Inf. tab. 23.

Habitat in Europae nemoribus.

Pedes 176. f. 88 paria numerat *Rajus*.

5. I. pedibus vtrinque 30, corpore planiusculo. *Syst. Ent.* *complanatus.*
427. 4.

Iulus complanatus pedibus vtrinque 30, corpore planiusculo, antennis clauatis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1065.
4. *Fn. Sv.* 2068.

Iulus complanatus fuscus, pedibus vtrinque 31. segmentis corporis clypeolis planiusculis marginatis.
Degeer Inf. 7. 586. 3. tab. 36. fig. 23.

Scolopendra fusca, pedibus vtrinque triginta. *Geoff. Inf.* 2. 675. 3.

Scolopendra iulacea. *Scopol. carn.* 1150.

Fabr. Spec. Inf.

L I

Iulus

Iulus scolopendricus. Pod. Inf. 127.

Habitat in Europa, in Anglia frequens.

tridentatus. 6. I. pedibus vtrinque 36, ano tridentato. *Syst. Ent.* 427. 5. *

Habitat in America. *Dom. Drury.*

fabulosus. 7. I. pedibus vtrinque 120. *Syst. Ent.* 428. 6. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1065. 5. *Fn. Sv.* 2067. *Geoff. Inf.* 2. 679. 2.

Iulo glabro affinis, lividis albisque circulis. *Raj. Inf.* 47.

Schaeff. Elem. tab. 73.

Habitat in Europae Corylo.

I. terrestri duplo maior.

stigma. 8. I. pedibus vtrinque 30, corpore atro, segmentis alternis vtrinque puncto calloso albo. *Syst. Ent.* 428. 7. *

Habitat in Coromandel. *D. Koenig.*

carnifex. 9. I. pedibus vtrinque 94, capite cauda linea dorsali pedibusque sanguineis. *Syst. Ent.* 428. 8. *

Schroet. Abh. 1 tab. 3. fig. 7.

Habitat in Coromandel. *D. Koenig.*

indus. 10. I. pedibus vtrinque 115. *Syst. Ent.* 428. 9. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1065. 6. *Mus. Lud. Vlr.* 462. *Mus. Adolph. Frid.* 1. 90.

Iulus cylindricus fuscus pedibus rufis vtrinque 110. *Degeer Inf.* 7. 588. 1. tab. 43. fig. 7.

Gron. Zooph. 1008.

Seb. Mus. 1. tab. 81. fig. 5.

Petiv. Gazoph. tab. 74. fig. 3.

Habitat in Indiis.

Corpus ferrugineum ultimo segmento acuminato. Pedes lutei.

11. I. pedibus vtrinque 124. *Syst. Ent.* 428. 10. *Linn. fuscus*
Syst. Nat. 2. 1065. 7. *Amoen. acad.* 4. 253. 34.
Seb. Mus. 2. tab. 24. fig. 4. 5.

Habitat in Indiis.

12. I. pedibus vtrinque 134. *Syst. Ent.* 428. 11. *Linn. Syst. maximus*
Nat. 2. 1066. 8.

Vermis terrestris. Margr. Brasf. 255.

List. It. 1699. tab. 5.

Habitat in America.

136. SCOLOPENDRA.

1. S. pedibus vtrinque 12, corpore ovali, cauda penicillagura.
 lo albo. *Syst. Ent.* 429. 1. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1062.
 1. *Fn. Sv.* 2063. *Geoff. Inf.* 2. 677. 6. tab. 22.
 fig. 4.

Iulus penicillatus corpore oblongo, fasciculis squamosis, cauda penicillo albo, pedibus vtrinque 12. *Degeer Inf.* 7. 571. 1. tab. 36. fig. 1. 2. 3.

Iulus lagurus. Scop. carn. 1152.

Act. par. miss. 1. 532. tab. 17. fig. 4 — 10.

Habitat sub Europae muscis.

2. S. pedibus vtrinque 14 elongatis, thorace scutellato. coleoptrata.
Syst. Ent. 429. 2.

Scolopendra coleoptrata pedibus vtrinque 14, thorace coleoptrato. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1062. 2.

Iulus araneoides. Pall. Spicil. Zool. fasc. 9. 85. tab. 4.
 fig. 16.

Habitat in Europa australi.

forficata. 3. S. pedibus vtrinque 15. *Syst. Ent.* 429. 3. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1062. 3. *Fn. Sv.* 2064. *Geoffroy Inf.* 2. 674. 1.

Scolopendra rufo fusca, pedibus vtrinque 15. *Degeer Inf.* 7. 557. 1. tab. 35. fig. 12.

Sulz. Inf. tab. 24. fig. 155.

Schacff. Elem. tab. 3. fig. 1.

Habitat in Europa, America.

gigantea. 4. S. pedibus vtrinque 17. *Syst. Ent.* 429. 4. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1063. 4.

Scolopendra maxima pedibus 36. *Brown. Jam.* 426. tab. 42. fig. 4.

Habitat in America.

Sequenti affinis, at multo maior.

morsifans. 5. S. pedibus vtrinque 20, oculis octo. *Syst. Ent.* 429. 5. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1068. 5. *Amoen. acad.* 1. 325. 506.

Scolopendra pedibus vtrinque 21, posterioribus spinosis. *Degeer Inf.* 7. 563. 1. tab. 43. fig. 1.

Sulz. Hist. Inf. tab. 30. fig. 14.

Schroet. Abhandl. 1. tab. 3. fig. 2.

Olear. Mus. tab. 12. fig. 5.

Petiv. Gazoph. tab. 13. fig. 3.

Bradl. nat. tab. 25. fig. 4.

Seb. Mus. 1. tab. 81. fig. 3. 4.

— — 2. tab. 25. fig. 3. 4.

Frisch. Inf. 2. tab. 2. fig. 5.

Catesb. Carol. 3. p. 2. tab. 2.

Habitat in Indiis.

ferruginea. 6. S. pedibus vtrinque 22. *Syst. Ent.* 430. 6. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1068. 6.

Scolopendra pedibus vtrinque 23, posterioribus longissimis bispinosis. *Degeer Inf.* 7. 568. 2. tab. 43. fig. 6.

Habitat

Habitat in Africa.

Corpus ferrugineum pedibus luteis.

7. S. pedibus vtrinque 30, corpore fusco linea dorsali *dorsalis* ferruginea.

Habitat in Coromandel. *Mus. Dom. Teats.*

Corpus magnum, depressum corporis segmentis marginatis fuscis linea dorsali ferruginea. Pedes ferruginei.

8. S. pedibus vtrinque 30, corpore fusco scabro, capite *clypeata* clypeato.

Habitat in Coromandel. *Mus. Dom. Teats.*

Corpus praecedente minus constat segmentis 16 angustis, marginatis, fuscis, substriatis punctisque elevatis scabris. Caput antennis brevibus, pallidis, tegitur clypeo rotundato, integro. Cauda s. vltimum segmentum emarginatum. Pedes pallidi.

9. S. pedibus vtrinque 148. *Syst. Ent.* 430. 7. *Linn. Syst. Gabrielis. Nat.* 2. 1063. 7.

Habitat in Italia.

Statura S. electricae, at quadruplo maior, tota depressa flavescens.

10. S. pedibus vtrinque 70, corpore lineari. *Syst. Ent. electrica.* 430. 8. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1068. 8. *Fn. Sv.* 2065. *Geoff. Inf.* 2. 676. 2.

Scolopendra flava, capite pedibusque vtrinque 54. rufis. *Degeer Inf.* 7. 561. 2. tab. 35. fig. 17.

Aldr. Inf. 636. fig. 8.

Frisch. Inf. 2. tab. 8. fig. 1.

Raj. Inf. 45.

Habitat in Europae suffocatis, in tenebris phosphorea.

phosphorea. 11. S. pedibus vtrinque 76. *Syst. Ent.* 430. 9. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1064. 9.

Habitat in Asia, noctu instar lampyridis ignitae ex alto coelo decidua in nauem, in mari Indico et Aethiopico 100 miliaribus a continente. *Linn.*

occidentalis. 12. S. pedibus vtrinque 123. *Syst. Ent.* 430. 10. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1064. 10.

List. It. 1699. tab. 6.

Habitat in America.

Corpus ferrugineum. Antennae articulis 14.

marina. 13. S. pedibus - - - corpore pallido, linea dorsali rufa. *Syst. Ent.* 430. 11. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1064. 11. *It. Westrogoth.* 191.

Stroem. Sundm. 1. 160.

Habitat in Oceano Norwagico.

Clupearum harengum esca, vnde abdomen piscium rufescit, et corpus breui pubescit. *Stroem. loc. cit.*

137. TROMBIDIUM.

tinctorium. 1. T. abdomine hirsuto rubro postice obtuso, tibiis anterioribus pallidioribus. *Syst. Ent.* 430. 1.

Acarus tinctorius. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1025. 20.

Acarus araneoides. *Pall. Spicil. Zool. fasc.* 9. 42. tab. 3. fig. 11.

Aranea hirsutissima, coccinea, abdomine ouato, pedibus breuibus. *Gron. Zooph. fasc.* 2. 218. 943.

Habitat in Guinea, Surinami.

Corpus vndique hirsutissimum, rubrum in spiritu vini albidum euadit.

holosericeum. 2. T. abdomine sanguineo depresso tomentoso, postice retuso, terrestris. *Syst. Ent.* 431. 2.

Acarus

Acarus holosericeus. Linn. *Syst. Nat.* 2. 1025. 22. *Fn. Sv.* 1979.

Acarus terrestris ruber, abdomine depresso. *Geoff. Inf.* 2. 624. 7.

Acarus holosericeus terrestris ruber ouatus depressus rugoso tomentosus, pedibus posticis remotis. *Degeer Inf.* 7. 136. 22. tab. 8. fig. 12. 13.

List. Aranear. fig. 38.

Roef. Inf. 4. tab. 38.

Blankard. Inf. tab. 14. fig. 1.

Habitat in Europae, Americae siccis.

3. T. abdomine sanguineo depresso tomentoso, postice obtuso, aquaticus. *Syst. Ent.* 431. 3. *aquaticum.*

Acarus aquaticus. Linn. *Syst. Nat.* 2. 1025. 21. *Fn. Sv.* 1978.

Acarus aquaticus ruber, abdomine depresso. *Geoff. Inf.* 2. 625. 8.

Acarus aquaticus ruber, corpore subgloboso, tentaculis longis, pedibus approximatis. *Degeer Inf.* 7. 141. 24. tab. 9. fig. 3. 4.

Frisch. Inf. 8. tab. 3.

Roef. Inf. 3. tab. 25.

Sulz. Inf. tab. 22. fig. 147.

Habitat in Europae aquis dulcibus, velociter natans, oua rubra in nepis ponens.

4. T. abdomine fusco rufo maculato postice porrecto cylindrico. *caudatum.*

Acarus caudatus aquaticus subrotundus fuscus, rufo maculatus, abdomine caudato cylindrico. *Degeer Inf.* 7. 159. 23. tab. 9. fig. 1.

Habitat in Europae aquis celerrime natans.

5. T. fuscum, corpore globoso, pedibus rubris. *globosum.*

Acarus aquaticus globosus aquaticus rubro fuscus, corpore

pore globofo, tentaculis breuioribus, pedibus rubris approximatis. *Degeer Inf.* 7. 146. 25. tab. 9. fig. 11.

Habitat in Europae aquis.

Conf. *Acarus aquaticus maculatus* aquaticus fuscus macula rubra, corpore globofo, tentaculis breuioribus crassis, pedibus viridi grifeis approximatis. *Degeer Inf.* 7. 146. 26. tab. 9. fig. 13.

138. A R A N E A.

* Oculis ::::

extensa. 1. A. abdomine longo argenteo virescente, pedibus longitudinaliter extensis. *Syst. Ent.* 431. 1. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1033. 22. *Fn. Sv.* 2011.

Aranea retiaria, abdomine elongato griseo fusco, pedibus longitudinaliter extensis. *Degeer Inf.* 7. 236. 10.

Geoff. Inf. 2. 642 3.

Raj. Inf. 19. 3.

List. Aran. fig. 3.

Habitat in uliginosis, syluaticis.

lobata. 2. A. abdomine ouato lobato albo, apice lineis geminatis fuscis.

Aranea lobata, *Pall. Spicil. Zoolog. fasc.* 9. 46. tab. 3. fig. 14. 15.

Araneoides capensis, *Petiv. Gazoph.* tab. 12. fig. 11. 12

Habitat - - - - -

longimana. 3. A. abdomine longo cylindrico fusco, pedibus anticis longissimis.

Habitat Cajennae. *Mus. Dr. Hunter.*

Corpus obscure ferrugineum abdomine cylindrico subuilloso, elongato fusco. Mandibulae elongatae cylindricae, apice vnguiculatae. Pedes antici longissimi, tertii paris breuissimi.

4. A. abdomine globofo gibbo, ambitu sexdentato. *Syst. cancriformis.*
Ent. 431. 2.

Aranea cancriformis abdomine femiorbiculato, ambitu sexdentato. *Linn. Syst. Nat. 2. 1037. 45*

Araneus cancriformis campestris reticulum spirale tenens. *Sloan. Iam. 2. 197. tab 235. fig. 45.*

Aranea nigra cancriformis *Brown. Iam. 419. tab. 44. fig. 5.*

Slubber. obs. microsc. tab. 1.

Habitat in America.

5. A. atra, abdomine cinerascente, linea dorsali atra interrupta. *Syst. Ent. 432. 3. ** *latens.*

Habitat in Anglia, latitans sub paruo reticulo in foliorum pagina superiori.

6. A. virescens thoracis lateribus abdominisque lineis duabus nigris. *Gen. Inf. Mant. 249. ** *signata.*

Habitat in nemoribus Kiloniensibus, capt. d. 11. Jul.

7. A. abdomine ouato atro, linea dorsali coccinea. *Syst. madans.*
*Ent. 432. 4. **

Habitat in America boreali. *Dom. Lewin.*

Aliam vidi simillimam, at paullo maiorem, abdomine punctis duorum parium anoque coccineis.

8. A. atra, abdomine subtus punctis duobus testaceis. *nigrita.*
*Syst. Ent. 432. 5. **

Habitat in Saxonia.

** Oculis

9. A. nigra, abdomine lateribus sanguineis. *Syst. Ent. globosa.*
*432. 6. **

Habitat in pratis Lipsiensibus.

*** Oculis ...

- horrida*. 10. A. abdomine subtriangulari apice truncato retuso, pedibus quatuor anticis longioribus. *Syst. Ent.* 432. 7. *
- Habitat Lipsiae in hortis.
- latro*. 11. A. thorace villoso cinereo, abdomine ovato atro ferrugineo maculato.
- Habitat in America. *Dom. Blackburn.*
- Magna Os pallidum. Thorax ovatus, pubescens, cinereus. Abdomen ovatum, atrum, ferrugineo maculatum. Pedes nigri femoribus pallidis.
- viatica*. 12. A. abdomine subrotundo plano obtuso, pedibus quatuor posticis brevissimis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1036. 43. *Fn. Sv.* 2024.
- Aranea cancroides fusco marginata* grisea s. fusca, abdomine ovato plano, fascia laterali nigro fusca lineaque nigro albida. *Degeer Inf.* 7. 901. 31. tab. 18. fig. 23.
- Araneus subfuscus minutissimus oculis e viola purpurascens*, tardipes et gressu et figura cancro marino non adeo dissimilis. *List. Aran.* fig. 29.
- Frisch. Inf.* 7. tab. 5.
- Schaeff. Icon.* tab. 189. fig. 7.
- Habitat in Europae hortis.
- domestica*. 13. A. abdomine ovato fusco, maculis nigris quinque subcontiguas, anterioribus maioribus. *Syst. Ent.* 433. 8. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1031. 9. *Fn. Sv.* 2000.
- Aranea domestica* vestiaria griseo fusca, abdomine ovato tomentoso, maculis nigris marmorato. *Degeer Inf.* 7. 264. 19. tab. 15. fig. 11.
- Aranea Derhamii*. Scop. carn. 1104.
- Raj Inf.* 27. 17.
- List. Aran.* 59. fig. 17.
- Clerk. Aran.* 76. tab. 2. fig. 9.
- Habitat in Europae fenestris et domibus.

14. A. viridis, abdominis dorso fusco. *Gen. Inf. Mantiff. dorсата.*
249. *
Habitat in nemoribus Kiloniensibus.

15. A. nigra, abdomine ovato, punctis sex impressis *impressa.*
subtus punctis duobus flavis. *It. Norwag. d. 14.*
Aug. *
Habitat in Norwagiae rupibus, d. 14. August.

16. A. abdomine rhomboide depresso nigro maculato, *laevipes.*
pedibus extensis variegatis. *Linn. Syst. Nat. 2. 1037.*
44. *Fn. Sv. 2025.*

Aranea cancroides tigrina abdomine obtuso plano al-
bido, maculis nigris, pedibus posticis quatuor bre-
uioribus. *Degeer Inf. 7. 302. 32. tab. 18. fig. 25.*

Araneus margaritatus. *Clerk. Aran. tab. 6. fig. 3.*
Frisch. Inf. 10. tab. 14.

Habitat in Europae muris.

17. A. virescens, abdomine albo, ano rufescente. *Syst. tricuspida-*
*Ent. 433. 9. ** *data.*
Habitat in Lipsiae hortis.

**** Oculis ::::

18. A. abdomine albo postice fusco, ambitu sexdentato. *argenta-*
*Syst. Ent. 433. 10. ** *ta.*
Habitat in Indiis.

***** Oculis ::::

19. A. argentea, abdomine fasciis flavescentibus, pedi- *fasciata.*
bus fusco annulatis. *Syst. Ent. 433. 11. **
Habitat in Madera Infula. *Mus. Dom. Banks.*

20. A. abdomine ovato, antice lateribus angulato acuto, *angulata*
thoracis centro excauato. *Syst. Ent. 434. 12. Linn.*
Syst. Nat. 2. 1031. 8. Fn. Sv. 1999.

Aranea retiaria, abdomine ouato nigro, supra tuberculis magnis conicis nigris. *Degeer Inf.* 7. 221 2. tab. 12. fig. 1.

Clerk. Aran. tab. 1. fig. 1.

Habitat in arboribus rete perpendiculari.

Colore variat.

diadema. 21. A. abdomine subglobofo rubro fusco, cruce albo-punctata. *Syst. Ent.* 434. 13. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1030. 1. *Fn. Sv.* 1993.

Aranea cruciger retiaria, abdomine subglobofo fusco siue rufo tuberculis duobus, cruce dorsali triplici albo punctata. *Degeer. Inf.* 7. 218. 1. tab. 11. fig. 3.

Aranea Linnaei. *Scop. carn.* 1077.

Mouff. Inf. 233. fig. 1.

Aldrov. Inf. 608. fig. 9.

Jonst. Inf. tab. 18. fig. 17. 19. 20.

Raj. Inf. 18. 2.

List. aran. fig. 2.

Frisch. Inf. 7. tab. 4.

Clerk. Aran. tab. 21. fig. 2.

Shaeff. Elem. tab. 21. fig. 2.

--- *Icon.* tab. 19. fig. 9.

Habitat in Europae arboribus.

marmorea. 22. A. fusca, abdomine ouato fusco alboque variegato. *Syst. Ent.* 434. 14. *

Clerk. Aran. tab. 1. fig. 2.

Habitat in Europa, nidum in fruticibus et graminibus struens attractis insectorum cadaueribus.

4punctata. 23. A. abdominis dorso plano nigro, punctis excauatis quatuor. *Syst. Ent.* 434. 15.

Aranea 4punctata abdomine oblongo nigro, punctis excauatis quatuor. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1034. 28.

Fn. Sv. 2014. *It. Oel.* 34.

Habitat in Europae domibus.

militaris. 24. A. spinis dorsalibus quatuor, posticis longioribus patentibus. *Syst. Ent.* 434. 16. *

Habi-

Habitat in America. *Dom. v. Rohr.*

25. A. spinis dorsalibus octonis, posticis duabus patentibus, abdomine subtus conico. *Syst. Ent.* 435. 17. *spinosa.*
Linn. Syst. Nat. 2. 1037. 47.

Aranea triangulari spinosa retiaria, abdomine triangulari, spinis octonis, binis anticis horizontalibus, posticis duabus magnis diuergentibus. *Degeer Inf.* 7. 321. 6. tab. 39. fig. 9. 10.

Habitat in America.

26. A. spinis dorsalibus sex, posticis patentibus. *Syst. aculeata.*
Ent. 435. 18. *

Aranea elongato spinosa retiaria, abdomine oblongo, supra rugoso, spinis octonis magnis, anticis sex erectis, posticis binis patentibus diuergentibus. *Degeer Inf.* 7. 323. 7. tab. 39. fig. 11. 12.

Habitat in America. *Mus. Dom. Banks.*

27. A. abdomine globoso, ambitu quadridentato. *Syst. tetra-*
Ent. 435. 19. * *Linn. Syst. Nat.* 2. 1037. 45. *cantha.*
Pall. Spicil. Zool. fasc. 9. 49. tab. 3. fig. 16. 17.

Habitat in Americae insulis.

28. A. abdomine transuerso, ambitu sexdentato. *hexacan-*
Brown. Jam. tab. 44. fig. 5. *tha.*

Habitat in Jamaica insula.

Affinis A. tetracanthae, at spinae vtrinque duae et postice duae. Margo abdominis anticus punctatus.

29. A. abdomine vtrinque fornicato, bispinoso spinis *fornicata.*
 posterioribus longioribus. *Syst. Ent.* 435. 20. *

Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

30. A. abdomine ouato fusco, linea exalbida pinnata. *labyrin-*
Syst. Ent. 435. 21. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1031. 12. *thica.*
Sv. 2003.

Clerk. Aran. 79. tab. 2. fig. 8.

Raj. Inj. 27. 18.

List. Aran. 60. fig. 18.

Schaeff.

Schaeff. Icon. tab. 19. fig. 8.

Habitat in Europae terra, tela horizontali cum puteo cylindrico.

palustris. 31. A. fusca, thorace abdomineque vtrinque linea nivea
Aranea palustris abdomine oblongo nebuloso, lineis lateralibus albis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1036. 41. *Fn. Sv.* 2023.

Habitat in paludibus caespitosis, capt. Fridrichsdaliae prope Hafniam.

Affinis A. fimbriatae, at oculorum situs omnino differt. Apex thoracis ante oculos terminatur linea nivea.

aquatica. 32. A. fusca, abdomine ovato cinereo, dorso fusco, punctis duobus impressis. *Syst. Ent.* 436. 22.

Aranea aquatica liuida, abdomine ovato, linea transversa punctisque duobus excavatis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1036. 39. *Fn. Sv.* 2020.

Aranea aquatica tota fusca. *Geoff. Inf.* 2. 644. 7.?

Aranea aquatica nigra siue nigro fusca. *Degeer Inf.* 7. 303. 33. tab. 19. fig. 5.

Clerk. Aran. 143. tab. 6. fig. 8.

Habitat in Europae aquis dulcibus vrinatoria. Hybernat in cochleis, quas rete artificioso claudit.

Mandibulae atrac vnguibus sanguineis.

virigutta- 33. A. flavescens, abdomine nigro, maculis tribus albis.
ta. *Syst. Ent.* 436. 23. *

Habitat in Alsatia, capta tempore autumnali in foliis Viburni. *Prof. Hermann.*

scorpiformis. 34. A. nigra, abdomine albicante, lineis duabus nigris, pedibus quatuor anticis longissimis. *Syst. Ent.* 436. 24. *

Habitat in Lipsiae hortis, laterigrada.

sexpunctata. 35. A. abdomine oblongo, punctorum excavatorum paribus tribus. *Syst. Ent.* 436. 25. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1033. 24. *Fn. Sv.* 2013.

Habitat in Europae sylvis.

36. A. ferruginea abdomine cinereo, linea dorsali fusca. *carnifex*.
Syst. Ent. 436. 26. *
 Habitat in Angliae nemoribus.

***** Oculis :::

37. A. abdomine oblongo, tibiis excepto tertio pari clavatis villosis. *Syst. Ent.* 437. 27. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1034. 24. *clavipes*.

Aranea fasciculata retiaria, abdomine oblongo, antice gibbo, thoracis medio spinis duabus erectis nigris extremitate villosis. *Degeer Inf.* 7. 316. 2. tab. 39. fig. 1.

Aranea oblonga luteo variegata, pedibus longissimis articulis inferioribus tumidis hirsutis. *Brown. Jam.* 419. tab. 44. fig. 4.

Habitat in America meridionali.

Abdomen flavum, albo punctatum.

38. A. abdomine ovato ferrugineo fusco. *Syst. Ent.* 437. *faccata*.
 28. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1036. 40. *Fn. Sv.* 2021.

List. Aran. 82. fig. 28.

Frijch. Inf. 8. tab. 2.

Clerk. aran. tab. 4. fig. 5.

Habitat in Europae hortis, ouorum faccum circumferens.

Pedes liuidi annulis fuscis confertis, inaequalibus.

39. A. abdomine ovato fusco, basi punctis duobus albis. *fumigata*.
Syst. Ent. 437. 29. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1032. 16. *Fn. Sv.* 2006.

Clerk. Aran. tab. 5. fig. 6.

Habitat in campis, ante larvarum nidum incubans, quas vnam post alteramprehendit & exfugit.

***** Oculis :::

40. A. nigra linea laterali alba. *Syst. Ent.* 437. 30. *fimbriata*.

Aranea fimbriata abdomine oblongo nigro, linea vtrin-

vtrinque laterali alba. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1033. 23.
Fn. Sv. 2012.

Aranea lupus paludosa corpore oblongo fusco, thorace abdomineque fascia vtrinque laterali alba, pedibus fuscis. *Degeer Inf.* 7. 278. 23. tab. 15. fig. 9. 10.

Aranea tota cinereo villosa, thoracis linea triplici, alba. *Geoff. Inf.* 2. 650. 15.

Clerk. Aran. tab. 5. fig. 9.

Habitat in Europae paludibus caespitosis.

dorsalis. 41. *A. atra*, thorace linea dorsali alba. *Syst. Ent.* 437. 31. *

Habitat in Anglia.

scenica. 42. *A. faliens nigra*, striis tribus semicircularibus albis. *Syst. Ent.* 438. 32. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1035. 34. *Fn. Sv.* 2017.

Aranea phalangium albo fasciata nigra, abdomine oblongo, fasciis tribus albis transuersis semicircularibus. *Degeer Inf.* 7. 287. 27. tab. 17. fig. 8. 9.

Aranea faliens nigra, abdomine vtrinque lineis tribus albis, ad angulum acutum coeuntibus. *Geoff. Inf.* 2. 650. 16.

List. Aran. fig. 31.

Raj. Inf. 37. 31.

Bradl. nat. tab. 24. fig. 5.

Clerk. Aran. tab. 5. fig. 13.

Schaeff. Icon. tab. 44. fig. 11.

Habitat in Europae parietibus.

pubescens. 43. *A. abdomine ouato fusco*, maculis quatuor cinereis, posticis maioribus. *Syst. Ent.* 438. 33. *

Habitat Lipsiae in hortis.

cinerea. 44. *A. cinerea*, abdominis dorso fusco, punctis octo cinereis. *Gen. Inf. Mant.* 249. *

Habitat ad littora sinus Kilonicusis.

45. A. abdominis dorso maculis trigonis nigris, pedibus nigro maculatis. *Syst. Ent.* 438. 34. *Tarantula.*

Aranea Tarantula subtus atra, pedibus subtus atro fasciatis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1035. 35.

Tarantola. Bocc. Mus. 1. 101. tab. 2.

Albin. Aran. 64. tab. 38.

Bradl. nat. tab. 24. fig. 10.

Olear. Mus. 21. tab. 12. fig. 4.

Habitat in Europa australi.

***** Oculis :::

46. A. thorace orbiculato convexo, centro transverse excavato. *Syst. Ent.* 438. 35. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1034. 31. *Mus. Lud. Vlr.* 428. *auicula-ria.*

Aranea vestiaria hirsutissima nigro fusca siue rufescens, plantis amplis tomentosis. *Degeer Inf.* 7. 313. 1. tab. 38. fig. 8.

Linn. Amoen. acad. 1. 323.

Laet. americ. tab. 570.

Worm. Mus. tab. 244.

Seb. Mus. 1. tab. 69. fig. 2. 3.

Olear. Mus. tab. 17. fig. 3.

Merian. Sur. tab. 18.

Roef. Inf. 3. tab. 11.

Habitat in America, insidiatur auiculis, insectis.

*** ** Oculis tantum senis :::

47. A. virefcens, abdominis dorso late fanguineo. *Gen. myopa. Inf. Mant.* 250. *

Habitat in praedio Eckhoff prope Kiel.

48. A. atra, abdomine cylindrico fusco, punctis sex impressis, pedibus longissimis. *longipes.*

Habitat in Australasia. *Mus. Dom. Banks.*

Corpus magnum, atrum. Mandibulae dentatae apice vnguiculatae. Palpi basi ferruginei apice nigri. *Abbr. Fabr. Spec. Inf.* M m domen

domen cylindricum fuscum punctis trium parium dorsilibus impressis nigris. Pedes inprimis anteriores elongati, nigri.

- fenoculata*. 49. A. abdomine virescente, lateribus flavis. *Syst. Ent.* 439. 36. *
Aranea fenoculata oculis tantum senis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1034. 30. *Fn. Sv.* 2036.
Aranea fenoculata textoria, abdomine ovato oblongo griseo, fascia longitudinali laciniosa fusca, thorace fusco. *Degeer Inf.* 7. 258. 18. tab. 15. fig. 5.
Lister. aran. 74. fig. 24.
Raj. Inf. 32. 24.
 Habitat in Germaniae hortis.
- scopulorum*. 50. A. abdomine fusco, linea dorsali pinnata alba. *It. Norw.* d. 3. August.
 Habitat in rupibus Norwagiae submarinis, capt. d. 3. August.
- luca*. 51. A. pallida, abdomine argenteo, lineis ramosis nigris. *Syst. Ent.* 439. 37. *
 Habitat in Coromandel. *D. Koenig.*

† Oculis -----

- cruentata*. 52. A. atra, abdomine fascia baseos flava, pectore sanguineo. *Syst. Ent.* 439. 38. *
 Habitat ad Rio Janeiro Brasiliae. *Mus. Dom. Banks.*
- venatoria*. 53. A. thorace orbiculato glabro, atro, abdomine ovato pubescente fusco. *Syst. Ent.* 439. 39.
Aranea venatoria subhirsuta, thorace orbiculato convexo, abdomine ovato magnitudine thoracis. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1035. 33.
Aranea cornuta. *Pall. Spic. Zool. fasc.* 9. 45. tab. 3. fig. 13.?
Gron. Zooph. 2. 217.
Merian. Surin. tab. 18.

Sloan. Iam. 2. 181. tab. 235. fig. 1. 2.

Brown. Iam. 420. tab. 44. fig. 2.

Habitat in America. Nidum fruit cylindricum, tenacem longitudine pedis, superne operculo claudendum.

54. A. capite antice tridentato, abdomine spinosissimo. *Tribulus.*
Habitat ad Cap. bon. spei. *Mus. Dr. Schulz.*

Corpus medium griseum punctis eleuatis scabrum. Caput antice denticulis tribus ferrugineis, intermedio obtusiore. Abdomen ouatum vndique spinis erectis elongatis validis, anterioribus quibusdam bifidis.

139. PHALANGIUM.

1. P. corpore ouato atro, subtus pedumque basi pallidis. *morio.*
*It. Norwag. d. 9. Aug. **

Habitat in Norwegiae rupibus. Capt. d. 9. Aug.

2. P. abdomine ouato griseo subtus albo. *Syst. Ent. 440. opilio.*
2. Linn. Syst. Nat. 2. 1027. 2. Fn. Sv. 1992.

Phalangium parietinum corpore ouato, supra griseo fusco, subtus albido. *Degeer Inf. 7. 166. 1. tab. 10. fig. 1.*

Araneus rufus non cristatus. Raj. Inf. 40. 35.

Goed. Inf. 2. tab. 49.

Mouff. Inf. 234. fig. 4.

Hoffnag. Inf. 2. tab. 9.

Bradl. nat. tab. 24. fig. 2.

Clerk. Aran. tab. 6. fig. 10. 3.

Sulz. Inf. tab. 22. fig. 140.

Habitat in America, Europa, nocte vagatur.

3. P. abdomine depresso, mandibula conica adscendente, *cornutum.*
palpis pediformibus. *Syst. Ent. 440. 3.*

Phalangium cornutum abdomine depresso, rostro bicorni, palpis pediformibus. *Linn. Syst. Nat. 2. 1028. 3.*

Phalangium corpore ouato supra griseo fusco, fascia nigra, subtus albo, tentaculis longissimis, chelis cornutis. *Degeer Inf.* 7. 173. 2. tab. 10. fig. 12.

Phalangium. *Geoff. Inf.* 2. 629. 1. tab. 20. fig. 6.

Araneus cinereus cristatus. *Raj. Inf.* 39. 35.

Schaeff. Elem. tab. 13. fig. 9.

. . . *Icon.* tab. 39. fig. 13.

Habitat in Europa, Anglia.

bilineatum. 4. *P. pallidum*, lineis duabus dorsalibus punctatis atris. *It. Norwag.* d. 14. Aug.

Habitat in Norwagiae rupibus submarinis, capt. d. 14. Aug. Forte mera *P. opilionis* varietas.

diadema. 5. *P. thoracis* tuberculo dorsali eleuato spinoso. *It. Norwag.* d. 9. Aug.

Phalangium corpore ouato, tuberculo thoracis spinoso. *Stroem. Act. Hafn.* 9. 583. tab. 6.

Müll. Zool. Dan. prodr. Add. 280 192.

Habitat sub muscis rupium Norwagiae.

Tuberculum dorsale elevatum apice spinosum vtrunque oculo magno instructum.

bimaculatum. 6. *P. abdomine* atro, maculis duabus albis. *Syst. Ent.* 440. 4. *

Habitat in Anglia, capt. d. 6. Maj. in Norwagia capt. d. 4. August.

caudatum. 7. *P. chelis* ramosis, ano setifero. *Syst. Ent.* 441. 5. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1029. 8. *Mus. Lud. Utr.* 426.

Scorpio. Gronov. Zooph. 952.

Pall. Spicil. Zool. fasc. 9. 30. tab. 3. fig. 1. 2.

Sulz. Hist. Inj. tab. 29. fig. 11.

Seb. Mus. 1. tab. 70. fig. 7. 8.

Habitat in India orientali.

reniforme. 8. *P. brachiis* dentatis, pedibus primis longissimis filiformibus, thorace reniformi. *Syst. Ent.* 441. 6. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1029. 9. *Luf. Mud. Utr.* 427.

Phalangium palpis longissimis crassis. Gronov. Zooph.
935.

Tarantula fusca maior, pedibus anterioribus crassioribus aculeatis et vngiculatis, fere cheliformibus proximis longissimis et tenuissimis. Brown. Lam.
409. tab. 11. fig. 3.

Cancellus araneoides. Pet. pteriog. tab. 20. fig. 12.

Pall. Spicil. Zoolog. fasc. 9. 34. tab. 3. fig. 3.

Blanc. theat. Inf. tab. 17. B.

Habitat in America meridionali.

9. *P. brachiis longissimis apice spinosis, thorace reniformi. lunatum.*

Phalangium lunatum. Pall. Spicil. Zoolog. fasc. 9.
32. tab. 3. fig. 5. 6.

Habitat in America meridionali.

Paullo praecedente minor, at latior. Brachia corpore quadruplo longiora, laevia apice tantum multispinosa.

10. *P. chelis dentatis villosis, corpore oblongo.*

araneoides.

Phalangium araneoides. Pall. Spicil. Zoolog. fasc.
9. 37. tab. 3. fig. 7. 8. 9.

Proscarabaeoides capensis pedibus plumosis. Petiv.
Gazoph. tab. 85. fig. 9.

Habitat ad Cap. bon. spei.

Species 7-10 nondum rite examinatae. Chelae oris an palpi, an mandibulae. Si palpi, ad Scorpiones emendandae, si mandibulae ad hoc genus pertinebunt. Forte vero proprii generis Insecta, inprimis *P. araneoides* a reliquis differre videtur.

140. S C O R P I O.

- australia-* 1. *S. pectinibus 6dentatis, manibus laeuis.* *Syst. Ent.*
fiae. 399. 1. *

Habitat in Insulis Oceani pacifici. *Mus. Dom. Banks.*

- manrus.* 2. *S. pectinibus 8 dentatis, manibus subcordatis puncta-*
tis. *Syst. Ent.* 399. 2. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1037. 1.

Scorpio fenoculus pectinibus 8dentatis, manibus oua-
tis, cauda corpore breuiore, aculeo simplici. *De-*
geer Inf. 7. 337. 1. tab. 40. fig. 1.

Habitat in Africa.

- afer.* 3. *S. pectinibus 13dentatis, manibus subcordatis pilosis.*
Syst. Ent. 399. 3. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1038. 3.
Mus. Lud. Ulr. 429.

Scorpio Indus octonoculus pectinibus 13dentatis, mani-
bis ouatis scabris, cauda corporis fere longitudine,
aculeo simplici. *Degeer Inf.* 7. 341. 3.

Swammerd. Bibl. Nat. tab. 3. fig. 3.

— — — — *quart.* tab. 6.

Seb. Mus. 1. tab. 70. fig. 4.

Petiv. Gazoph. tab. 13. fig. 2.

Roef. Inf. 3. tab. 65.

Habitat in India.

- america-* 4. *S. pectinibus 14dentatis, manibus subciliatis, digitis*
nus. *filiformibus.* *Syst. Ent.* 399. 4. *Linn. Syst. Nat.*
2. 1038. 4.

Scorpio maculatus octonoculus, fusco maculatus pecti-
nibus 18dentatis, brachiis manibusque longissimis
subulatis, digitis filiformibus, cauda longissima, acu-
leo basi mucronato. *Degeer Inf.* 7. 346. 6. tab.
41. fig. 9. 10.

Roef. Inf. 3. tab. 66. fig. 5.

Sulz. Hist. Inf. tab. 30. fig. 7.

Habi-

Habitat in America meridionali.

5. *S. pectinibus 18dentatis, manibus angulatis.* *Syst. europaeus.*
Ent. 399. 5. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1038. 5. *Musf.*
Lud. Ulr. 429.

Scorpio octonoculus fuscus, pectinibus 18dentatis, manibus elongatis, digitis filiformibus, cauda corpore longiori, aculeo basi mucronato. *Degeer Inf.*
 7. 344. 5. tab. 41. fig. 5.

Mouff. Inf. 204.

Raj. Inf. 19.

Schaeff. Elem. tab. 113.

Aldr. Inf. 517.

Roef. Inf. 3. tab. 66. fig. 1. 2.

Sulz. Inf. tab. 23. fig. 150.

Habitat in Europa australiori.

6. *S. pectinibus 32dentatis, manibus laevis.* *Syst. australis.*
Ent. 400. 6. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1038. 6.

Scorpio octonoculus fuscus, pedibus rufis, pectinibus 30dentatis, manibus elongatis rufis, digitis filiformibus, cauda corpore longiori, aculeo basi mucronato. *Degeer Inf.* 7. 348. 8. tab. 41. fig. 5.

Habitat in Africa.

7. *S. abdomine ecaudato ouato depresso fusco.* *Syst. cancroides.*
Ent. 400. 7.

Phalangium cancroides abdomine obouato depresso, chelis laevis, digitis pilosis. *Linn. Syst. Nat.*
 2. 1028. 4. *Fn. Sv.* 1968.

Chelifer abdomine lineis transversis. *Geoff. Inf.* 2.
 618. 1.

Chelifer europaeus, obscure fuscus, corpore ouato depresso, chelis elongatis. *Degeer Inf.* 7. 355. 2.
 tab. 19. fig. 14.

Seb. Musf. 1. tab. 70. fig. 11.

Roef.

Roef. Inf. 3. tab. 64.

Sulz. Hist. Inf. tab. 29. fig. 11.

Frisch. Inf. 8. tab. 1.

Schæff. Elem. tab. 38.

Clerk. Aran. tab. 6. fig. 10.

Habitat in Europae umbrosis, suffocatis.


Retrogradus victitat Hemerobio pulfatorio, Acaris.


acaroides. 8. S. abdomine ecaudato cylindrico flavescente.

Phalangium acaroides abdomine cylindrico, chelis lacuibus, capite appendiculato. *Linn. Syst. Nat.* 2. 1028. 5.

Chelifer americanus, corpore cylindrico flavescente, thorace chelisque obouatis fusco castaneis. *Degeer Inf.* 7. 353. 1. tab. 42. fig. 1. 2.

Habitat in Americae meridionalis suffocatis.





Faint, illegible handwriting at the top of the page.

